

HAANDBOG

i

DEN DANSKE FLORA

af

Joh. Lange.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

Tredie forøgede Udgave.

Kjøbenhavn.

C. A. Reitzels Forlag.

1864.

QK287

.L3

1864

Fortale til første Udgave.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

Idet jeg herved overleverer mine Landsmænd nærværende Arbeide over den danske Flora, turde det maaskee være nødvendigt at ledsage samme med nogle Bemærkninger, i hvilke jeg skal gjøre Rede, deels for de Grunde, som have foranlediget mig til at optræde som Forfatter, deels for Bogens Indretning.

De betydelige Fremskridt, som Botaniken, ogsaa dens beskrivende Deel, i de senere Aar har gjort, havde længe ladet denne Videnskabs Dyrkere her i Landet føle Savnet af en Haandbog, i hvilken man kunde finde hvad der fra ældre Tid var bekjendt om Danmarks Vegetation forøget med det i senere Tid iagttagne, og som altsaa ved paa eet Sted at samle det, der hidtil maatte søges paa mange, til en Tid kunde træde istedetfor de tidligere Arbeider i denne Retning. Efterat jeg i længere Tid med Forkjærlighed havde beskæftiget mig med at iagttage mit Fædrelands Planter og deres Fordeling, blev jeg fra flere Sider opfordret til at udarbeide en Haandbog af den omtalte Beskaffenhed og jeg begyndte altsaa paa dette Arbeide, men jo længere dette rykkede frem, desto mere indsaae jeg de dermed forbundne Vanskeligheder, og hvis ikke Haab om velvillig Overbærelse fra det botaniske Publikums Side og den Tro, at det jeg vilde være istand til at levere, dog i hvert Fald vilde kunne gjøre nogen Nytte som Materiale, hvormed der senere kunde bygges videre, havde bestyrket mig i at vedblive, vilde jeg maaskee ikke have havt den

SEP 5 1906

fornødne Taalmodighed for at bringe det tilende, men forlængst have opgivet et Arbeide, som jeg ikke troede at kunne fuldføre paa en for mig selv eller Andre tilfredsstillende Maade. Og de Vanskeligheder af forskjellig Art, som efterhaanden viste sig for mig, vare tilvisse ikke faa. Jeg vil ikke omtale det Vanskelige og næsten Umulige i at vedligeholde den til et mere omfattende Arbeide fornødne Ro under de sidste Aars politiske Bevægelser, (dette Tryk ville Alle, der i dette Tidsrum optraadte som Forfattere, have følt); jeg vil ikke opholde mig ved at udvikle videre, hvad Enhver let indseer, at Botanikens nærværende Standpunkt mere opfordrer til at anvende sin Tid paa physiologiske og morphologiske end paa floristiske Arbeider; men jeg vil indskrænke mig til, med særligt Hensyn paa det foreliggende Skrift, at fremhæve nogle af de betydeligste Hindringer, som jeg har havt at kæmpe imod, fordi jeg baaber, at mange Enkeltheder, som jeg selv høiligen føler kunde og burde have været anderledes, derved maaskee, idetmindste tildeels, turde finde sin Undskyldning.

Skjøndt næsten alle de i Bogen indeholdte Planter ere forud vel kjendte og for største Delen fortræffeligt beskrevne, ansaae jeg dog en Revision af Arterne i den levende Natur for aldeles nødvendig; thi foruden at der ofte ved Beskrivelserne af selv de bedst kjendte Arter kan være Et eller Andet at tilføie eller forandre, saa antage mange Planter i de forskjellige Lande et forskjelligt Præg, hvilket fordrer at Arterne skildres efter Exemplarer fra det Land selv, hvis Flora man vil beskrive. Jeg har søgt, saavidt muligt, at opfylde denne Fordring, men naar man erindrer, at Beskrivelserne ikke affattes efter Individuer, men efter Masser, at det ikke er nok at iagttage Planten paa et enkelt Tidspunkt, men paa dens forskjellige Udviklingstrin, og naar det fremdeles tages i Betragtning, hvor vanskeligt det er at tilbageføre de ofte i det Uendelige varierende Former indenfor bestemte Grændser og at adskille de blot locale eller tilfældige Afændringer fra virkelig typiske Former, saa vil det let indsees, at det ikke er faa

Aars Arbeide. Jeg har derfor ved enkelte Arters Beskrivelse maattet indskrænke mig til at jevnføre tørrede Exemplarer og de bedre Afbildninger i Fl. Dan. med de allerede forhaanden værende Beskrivelser. Ved Behandlingen af nogle Slægter, f. Ex. *Calamagrostis*, *Callitriche*, *Atriplex*, *Rosa*, har jeg især levende følt det Ønske, i længere Tid end der efter Omstændighederne stod mig til Raadighed, at have kunnet indsamle lagttagelser over deres talrige og yderst foranderlige Former; blandt det Meget, som endnu staaer tilbage at iagttage angaaende de danske Planter, troer jeg fortrinsvis at burde anbefale disse Slægter til nærmere Prøvelse af Botanikere her i Landet.

Hvad Beskrivelsernes Form angaaer, da blev jeg snart enig med mig selv om at disse burde forfattes i det danske Sprog, navnlig fordi et ikke lidet Antal af Dem, jeg tænkte mig som Bogens Læsere, ikke uden Møie kunne benytte de latinske Beskrivelser; større Vanskelighed forsaarsagede det mig derimod at træffe den rette Middelvei mellem for lange og for korte Beskrivelser. De blotte Diagnoser, som kun have til Opgave at adskille Arten fra de nærmest beslægtede, give, naar de staae isolerede, paa Grund af deres Korthed, kun et meget ufuldstændigt Billede af den Plante, de skulle betegne, derimod kunne de aldeles fuldstændige Beskrivelser af Planten fra overst til nederst vistnok være meget lærerige for Begyndere, men ikke at tale om at de optage en betydelig Plads, saa ere de trættende at gennemløbe for den noget Viderekomne; ogsaa have de, efter min Mening, kun deres Plads i specielle Monographier eller hvor det gjælder om at beskrive nye Arter, men ikke hvor den omhandlede Plante allerede utallige Gange iforveien har været Gjenstand for Beskrivelse. Jeg har i denne Henseende især taget til Mønster Kochs fortræffelige Synopsis; at jeg overalt skulde have været heldig, tør jeg ikke haabe, men jeg troer, at Enhver, der har givet sig af med at affatte Beskrivelser af Naturgjenstande, vil have erfaret Vanskeligheden ved at affile disse saaledes, at de forene Tydelighed i Udtryk paa

den ene Side med det passende Jevnmaal (hvor kun det Væsenlige fremhæves og det Tilfældige holdes borte) paa den anden Side. — De danske Benævnelser paa Plantedelenes Former ville i Almindelighed kunne forstaaes ved Hjælp af Drejers Terminologi; de enkelte Afvigelser herfra ere i Regelen forklarede ved Anmærkninger under Texten; at afvige betydelig fra denne Bog, hvortil jeg ofte var fristet, ansaae jeg ikke for rigtigt, saalænge intet nyere Arbeide foreligger, hvortil Forandringerne kunde støtte sig.

Valget af et passende Antal Citater og Synonymer blandt den uendelige Mængde heraf, som enhver Art endnu stadigt maa slæbe omkring med sig, er ikke heller altid saa aldeles let; i et Arbeide som det nærværende ansaae jeg det dog for tilstrækkeligt at anføre de vigtigste af vore egne og de fortrinligste og meest bekjendte af Nabolandenes floristiske Forfattere: af indenlandske Værker har jeg derfor i Regelen henviist til Hornemanns Plantelære og Drejers flora excursoria, ved enkelte Slægter tillige til Rafns og Schumachers Florer; af udenlandske til et eller andet af Fries's Værker og i Tilfælde af Navne-Ulighed til Kochs Synopsis. Ved enhver Art har jeg anført hvor den findes afbildet i Flora Danica og i Reichenbachs nøiagtige Afbildninger; kun naar en Plante ikke findes optaget i noget af disse Billedværker, har jeg, for saavidt muligt at nævne en Figur for hver Art, citeret et eller andet let tilgængeligt Værk. Prof. Fries's Herbarium normale har jeg ogsaa stadigt nævnt ved de Planter, som ere optagne i denne vigtige Kilde til Kundskab om vore nordiske Planter.

Det er nutildags temmelig almindeligt at lægge et eller andet naturligt System til Grund for Inddelingen af Planterne i floristiske Arbeider; det vil derfor maaskee af Flere blive lagt mig til Last, at jeg har ordnet Stoffet efter linnéiske Klasser. Jeg behøver neppe at bemærke, at dette ikke har sin Grund i nogen Forkjærlighed for hiin Inddelingsmaade betragtet i og for sig, men derimod vil jeg ikke fragaae at være konservativ forsaavidt at jeg anseer

den kunstige Inddelingsmaade for uden Sammenligning den beqvemmeste som Nøgle til at opsøge Slægterne, og derfor troer at Begynderen lettest vil finde sig tilrette ved Hjælp af denne. Mange have vistnok med mig gjort den Erfaring, at Intet mere forstyrrer og afskrækker selv de dygtigste Begyndere ved Planternes Bestemmelse, end Mangel paa faste Regler og Kjendetegn; og hvorvel ogsaa den linnéiske Classification indeholder Undtagelser og Uregelmæssigheder, saa ere disse dog baade langt færre og lettere at omgaae end i de naturlige Familier, hvor de først finde deres Løsning ved at sees i Sammenhæng med det Hele. Men i en Haandbog som nærværende, der for en saa væsenlig Deel er beregnet paa at give Begynderen Midler ihænde til den enkelte Plantearts Bestemmelse, forekommer Lettelsen af det hermed forbundne Arbejde at være et ikke uvigtigt Hensyn; dette vilde jeg dog have sat tilside, hvis jeg havde troet at derved en mindre videnskabelig Opfattelse kunde befrygtes; men skjøndt de fleste Botanikere hidtil have gjort Begyndelse med at bestemme Planterne efter det linnéiske Systems mere schematiske Form, er der vel neppe Mange, som ville paastaae at have taget Skade paa deres senere botaniske Studier ved at være indførte i Videnskaben ad denne Vei. Derimod er der naturligviis ingen Tvivl om, at Enhver, som vil gaae ud over det Elementære, snart maa begynde med Øvelser i at henføre de bekjendte Planter til deres naturlige Slægtskab, hvortil da kan benyttes et eller andet Værk, som særligt omhandler de naturlige Familier. For at imidlertid ogsaa de Læsere, som savne Adgang til slige fuldstændigere systematiske Værker, kunne erholde en foreløbig Øvelse i at classificere de i vor Floras Omraade forekommende Planter efter naturlige Familier, har jeg anseet det for hensigtsmæssigt, som et Hjælpemiddel hertil at vedføie ved enhver Slægts Plads i Systemet og i Begyndelsen af Bogen at give en kort Oversigt over de vigtigste Kjendetegn for hver Familie som er repræsenteret i vor Flora, med Indordning af de danske Slægter og Angivelser af disses Artsantal.

Ved enhver Familie har jeg henviist til Mag. Anderssons «Atlas öfver den Skand. Florans nat. Familjer», et Arbeide, der saavel paa Grund af de nøiagtige Tegninger, som paa Grund af dets Prisbillighed fortjener at være i Manges Hænder.

Hvad Planternes Udbredelse i Landet angaaer, da har jeg anvendt al den Omhu som var mig mulig paa at samle saa mange Data, at deraf kunde udbringes et Resultat til Oplysning om de enkelte Arters Grændser og Fordeling. Jeg skal her nævne de vigtigste Kilder, hvoraf jeg i denne Henseende har øst, for at Læserne lettere kunne sættes istand til at dømme, hvorledes jeg har benyttet disse. Hovedværket til Kundskab om de danske Planter er naturligviis endnu Hornemanns Plantelære, og naar man betænker, at den af Botanikens Studium her i Landet høit fortjente Forfatter af hiint Værk har maattet samle saagodtsom forfra den betydelige Mængde Detail-Angivelser om Planternes Voxesteder, som indeholdes i samme, maa dette i høi Grad paaskjønnnes, ikke alene som et for sin Tid yderst værdifuldt Arbeide, men ogsaa som et vigtigt Grundlag for senere Undersøgelser. Ogsaa Drejers Flora excursoria er et Arbeide, som har gjort megen Nytte især ved sin bekvemme Indretning, der gjør den særdeles brugbar ved Planternes foreløbige Bestemmelse; ogsaa denne indeholder mange værdifulde Bidrag til Floraen, af hvilken den dog kun giver Oplysning om en liden Deel, idet den kun omhandler Sjællands Planter og tilmed det vestlige Sjælland dengang kun var ufuldstændigt undersøgt. Men et ikke kort Tidsrum er allerede forløbet siden begge hine Værker bleve til, de i den mellenliggende Tid stadigt fortsatte Undersøgelser over vore indenlandske Planter have baade forøget disses Tal betydeligt*) og modificeret de

*) Hornemann angiver i 1821 de danske Phanerogamers Tal til 1064, medens næsten 1300 Arter nu ere kjendte herfra, og alene Sjællands Flora er i de 12 Aar, siden Drejers Flora udkom, idetmindste forøget med 50 Arter.

dengang antagne Meninger om Fordelingen af et stort Antal blandt de tidligere bekjendte. Men hvad der især bevirker, at de to nævnte Arbeider ofte maa benyttes med Varsomhed, er den Omstændighed, at den nuværende Tids Opfattelse af Artsbegrebet er anderledes end dengang, og at det altsaa i Tilfælde af at man har at gjøre med en forhen collectiv Art, som nu er deelt i 2 eller flere, oftest er yderst vanskeligt at henføre de tidligere anførte Voxesteder til en bestemt af de nyere Arter. (Som Exempel blandt flere kunde anføres de forhen collective Navne *Betula alba*, *Agrimonia Eupatoria*, *Montia fontana*, *Valeriana officinalis*, *Glyceria fluitans*, flere *Rubus*- og *Hieracium*-Arter). De floristiske Arbeider af Rafn, Schumacher og Nolte, hvis vigtigste Udbytte er optaget i de 2 ovenfor nævnte Værker, har jeg dog stadigt raadspurgt i tvivlsomme Tilfælde, og naar hertil endnu føies nogle spredte Noticer, især bekjendtgjorte i Krøyers Naturhist. Tidsskrift, saa har jeg omtrent nævnt Alt, hvad der af trykte Materialier foreligger til Afbenyttelse. Af Localflorer, et Materiale, hvorpaa Nabolandenes botaniske Litteratur er rig indtil Overflod, ere kun yderst faa tilstede hos os. Lige saa vigtige som imidlertid slige Angivelser over Planterne i en vis Egn, naar de ere fuldstændige og nøiagtige, ere som Forarbeider for den samlede Oversigt over Floraen, lige saa meget har jeg følt Savnet deraf, fordi det derved blev vanskeligt at have nogen bestemt Mening om mangen Arts Forekomst eller Mangel i en vis Egn. Det var nemlig hidtil almindelig Brug i Rubriken om Planternes geographiske Fordeling kun at angive Voxesteder for de Arter, som ansaaes for sjeldnere, og derimod om dem, der i Sjælland og især omkring Kjøbenhavn forekomme hyppigt, at bruge Udtrykket «almindelig», uden at angive om dette ogsaa er Tilfældet i Landets øvrige Egne. Derfor forekommer det Enhver, der kun har undersøgt Jylland og Fyen, ligesaa forunderligt at see Planter som *Plantago media*, *Carduus acanthoides*, *Helianthemum vulgare*, *Alopecurus pratensis* o. fl. nævnte blandt de almindelige, som det vilde undre Den, der kun har

gjort Excursioner i Sjælland, om man kaldte *Myrica*, *Genista tinctoria*, *Phyteuma*, *Arnica*, *Narthecium* o. fl. almindelige, hvilket de dog i Virkeligheden kunne kaldes med lige saa stor Ret som hine. Den omtalte Mangel paa Specialflorer er imidlertid for en stor Deel bleven mig erstattet ved talrige Bidrag af Planter og Noticer fra de forskellige Egne af Landet, som ere komne til min Kundskab, dels gennem den herværende botaniske Forening, dels ad privat Vei ved flere Dyrkere af Botaniken saavel i Hovedstaden som i Provindserne og dels endelig ved egne Undersøgelser, hvilke jeg har været saa heldig at have kunnet fortsætte i en Række af Aar paa Reiser gennem de fleste danske Provindser. Ved Ordningen af de saaledes indsamlede Angivelser om Planternes geographiske Udbredelse har jeg nu sædvanligviis fulgt den Regel, kun at betegne som almindelige uden videre Bemærkning de Planter, som jeg havde Grund til at ansee for omtrent ligeligt udbredte over hele Landet, for enhver Art derimod, der maatte antages at have en ueensartet Udbredelse, har jeg fremhævet de Egne, hvor samme synes at være sjelden eller aldeles at mangle. Specielle Voxesteder har jeg troet at burde anføre ikke alene for de strængt taget sjeldne Arter, men ogsaa for mange, som have en adspredt Forekomst, og kun naar der for slige sporadiske Planter var et saa stort Antal Voxesteder bekjendt, at Opregnelsen af dem alle vilde optage uforholdsmæssig stor Plads, har jeg undladt at nævne dem særskilt. Ved at ordne Provindserne og de enkelte Findesteder indenfor hver af disse i en bestemt Rækkefølge efter deres Beliggenhed, ved fremdeles at begynde med den Egn af Landet, hvor den omhandlede Plante synes at være meest udbredt, troer jeg at have lettet Oversigten for Dem, der ville benytte denne Deel af Bogen, og skjønt visselig Meget endnu staaer tilbage, før vor Flora er saa vel undersøgt som det kunde ønskes, haaber jeg dog, at en noget fuldstændigere Forestilling om Vegetationsforholdene i Danmark ved Hjælp af de her leverede Bidrag efterhaanden skulde kunne erholdes.

Det havde været mit Ønske at vedføie en almindelig Skildring af Vegetationen i Danmark og sammes afvigende Character i de forskjellige Egne: et Bilag, som jeg troer vilde have givet Bogen mere Værd, idet derved paa eet Sted kunde være sammenfattet hvad der nu maa søges i spredte Noticer for hver enkelt Plante, men da en slig Oversigt, for at have nogen Betydning, ikke kunde være aldeles kortfattet, har jeg, saavel af Hensyn til Forlægger og Kjøbere af Bogen (idet denne allerede har overskredet det Arkeantal, hvortil den foreløbigt var anslaaet), som af Mangel paa tilstrækkelig Tid, da jeg er beskjæftiget med de fornødne Forberedelser til en Reise i Syden, opgivet dette. Nogle herhen hørende Bemærkninger har jeg be- kjendtgjort i «den naturhistoriske Forenings videnskabelige Meddelelser» 1849, p. 77; til disse saavel som til Horne- manns «Bemærkninger angaaende Forskjelligheden af Vegetationen i Danmark» maa jeg altsaa her nøies med at henvise.

Endnu staaer tilbage for mig den behagelige Pligt at udtale min anerkjendende Tak til de Mange, uden hvis Op- muntring, Raad og Medvirkning jeg ikke vilde have været istand til at udføre dette Arbeide. Jeg maa først bringe min varmeste Taksigelse til Hr. Etatsraad Schouw, hvis be- kjendte Velvillie og virksomme Deeltagelse for de yngre Botanikere ogsaa i høi Grad her kommet mig til Gode og paa mange Maader har bidraget til at fremme mine Forsk- ninger i den danske Flora, og til Hr. Professor Fries, ikke alene fordi ethvert Blad i hans Skrifter over Skandi- naviens Flora er en Guldgrube for alle senere Arbeider i denne Retning, men ogsaa for de værdifulde Oplysninger om mangan tvivlsom Form, som han har havt den Godhed at meddele mig af sin rige Erfaring over Arternes vexlende Skikkelser. Blandt de mange Andre, hvis Interesse for mit Arbeide har forskaffet mig saa mange vigtige Med- delelser om Planternes Udbredelse, maa jeg især nævne min mangeaarige Ven, Dr. Poulsen, hvis nøie Kundskab til Halvøens og fornemlig Slesvigs Flora har havt stort Værd

for mig; min Broder, Cand. theol. M. T. Lange, hvem jeg bl. A. skylder flere heldige Iagttagelser angaaende adskillige Arters Characteristik; mine Venner Apotheker Piper og Cand. pharm. Th. Schiøtz, om hvis Ufortrødenhed i at efterforske vore indenlandske Planter næsten enhver Side i Bogen kan vidne; Godseier Hofman-Bang, som endnu i sin høie Alderdom vedbliver med ungdommelig Iver at dyrke sin Yndlingsvidenskab; Frøken Rosenberg, hvem jeg skylder en Mængde Oplysninger om Vegetationen i det nordlige Fyen; Professor Liebmann, som velvilligt har overladt mig sit danske Herbarium til Gjennemsyn; Dr. J. Vahl; Apotheker Steenberg; Bot. Gartner Weilbach; Pastor Fausbøll; Cand. pharm. G. Jensen; Cand. theol. Vaupell; Cand. phil. E. Møller-Holst; Underlæge Meinert; Stud. polyt. Rostrup. Disse og mange Flere modtage herved min erkjendtligste Tak!

Og hermed anbefaler jeg min Haandbog til omhyggelig Prøvelse og velvillig Overbærelse af Botanikens Dyrkere i Fædrelandet.

Kjøbenhavn i December 1850.

Joh. Lange.

Fortale til anden og tredie Udgave.

Da jeg i Fortalen til første Udgave har gjort Rede for Haandbogens Plan og Indretning, har jeg anseet det for hensigtsmæssigt at aftrykke denne uforandret. Kun om de vigtigste i de senere Udgaver foretagne Forandringer skal jeg her tilføie nogle Bemærkninger.

1. Det vil sees, at et ikke ubetydeligt Antal af Arter er tilkommet siden Bogen først udkom, idet Totalsummen af de deri beskrevne Planter, som dengang kun beløb sig til 1291, nu er voxet til 1378 (hvorunder dog er indbefattet

22 Arter af Slægterne *Chara* og *Nitella*, som heelt og holdent ere tilføiede i den nye Udgave). Dette Antal af over 80 for Danmark nye Planter indbefatter dels saadanne Arter, som tidligere vare bekendte fra Nabolandene, men ikke fundne i Danmark eller idetmindste optagne med Tvivl (f. Ex. *Agropyrum strictum* og *pungens*, *Poa bulbosa*, *Aira uliginosa*, *Setaria glauca*, *Carex maxima*, *Juncus tenuis*, *Potamogeton zosteraceus*, flere *Salices*, *Hieracium pratense* og *gothicum*, *Linnæa borealis*, *Orobanche Cirsii*, *Pedicularis Sceptum carolinum*, *Camelina silvestris*, *Melilotus arvensis*, hvortil endnu kan føies det mærkelige Fund af Nødderne af *Trapa natans*), dels nogle Arter, som enten ere beskrevne i de senere Aar, eller om hvis Ret som gode og holdbare Arter der tidligere var Tvivl, f. Ex. *Ruppia brachypus*, *Allium Kochii*, *Atriplex Babingtonii*, *Polygonum nodosum*, *Hieracium integrifolium* og *anfractum*, *Bidens platycephala*, *Galium elongatum*, *Cuscuta Trifolii*, *Primula variabilis*, *Galeopsis angustifolia*, *Rubus Arrhenii*, *Polygala depressa* o. fl.). Denne ikke ubetydelige Tilvæxt skyldes især den Iver og Utrættelighed, hvormed flere Botanikere i de senere Aar have arbeidet for en nøiere Undersøgelse af Danmarks Vegetation; ogsaa har den Redebonhed, hvormed disse have meddeelt mig Udbyttet af deres Undersøgelser, sat mig istand til at tilføie mange nye Voxesteder for de sjeldnere Arter, hvorved det for flere af disse er bleven muligt at paavise en mere bestemt begrændset Udbredelse. Jeg selv har i de senere Aar ikke havt Leilighed til at foretage mange længere Reiser indenfor Landets Grændser, og mine Undersøgelser have fornemlig været indskrænkede til det nordlige og østlige Sjælland. En Reise til det vestlige og nordlige Jylland, som jeg i Sommeren 1858 foretog for kongelig Regning som Udgiver af *Flora danica*, bragte mig dog mange interessante Resultater om disse Egenes Vegetation og om enkelte sjeldnere Arters Forekomst.

2. Ved Revisionen af de tidligere i Haandbogen beskrevne Slægter og Arter har jeg bestræbt mig for ikke at

foretage andre Forandringer end saadanne, som en nøiere Prøvelse og sikke lagttagelser gjorde fornødne; enten der var Spørgsmaal om at forøge eller om at formindske Slægternes og Arternes Antal har jeg derfor enten selv anstillet yderligere Undersøgelser eiler i tvivlsomme Tilfælde raadført mig med de dygtigste Floristers Fremstilling. Læserne ville see, at kun yderst faa Slægter have faaet en forandret Begrændsning eller Benævnelse; i Henseende til Arterne ere Forandringerne vistnok flere, men jeg haaber dog ikke at skulle klive beskyldt for at have foretaget mange Forandringer uden Grund. Da jeg overhovedet anseer det for urigtigt at forandre Planternes Navne uden bydende Nødvendighed, har jeg kun foretaget Forandring af saadanne Navne, som enten ifølge de vedtagne Regler for Prioriteten eller paa Grund af en tidligere stedfunden Forvexling af Arter formeentlig ikke kunde beholdes.

3. I Henseende til Plantebeskrivelsernes Form og Omfang har jeg foretaget enkelte Modificationer, især sigtende til at gjøre Beskrivelserne mere ensartede, og, hvor jeg ansaae det for hensigtsmæssigt, noget udførligere. Da det for Begyndere ofte kan være vanskeligt at finde sig tilrette med de aldeles kortfattede Beskrivelser, haaber jeg, at den derved bevirkede Forøgelse af Bogens Omfang ikke vil blive misbilliget. Det er ligeledes fornemlig Hensyn til Begyndernes Tarv, som har bevæget mig til fremdeles at fastholde den tidligere Ordning efter det linnéiske System, og jeg henviser i denne Henseende til mine Yttringer i den tidligere Fortale, hvor villig jeg end er til at indrømme, at den mere videnskabelige Ordning af Planterne efter et naturligt System vilde have gjort Bogen mere tiltalende for de mere øvede Botanikens Dyrkere og mere tilfredsstillende for mig selv. Det er mit Forsæt, hvis der forundes mig Helbred og den fornødne Tid, senere at udarbeide et kort Compendium af den danske Flora, ordnet efter naturlige Familier og maaskee forfattet paa Latin, dels for at give en billigere og beqvemmere Haandbog til Brug paa Excursioner, dels for at bidrage til et nøiere Be-

kjendtskab, ogsaa udenfor Landets Grændser, med Danmarks Vegetation, som synes at være de fleste Botanikere i Udlandet saagodtsom ubekjendt.

4. Den systematiske Oversigt i Begyndelsen af Haandbogen er i tredie Udgave forøget ved Tilføielsen af Familie-Kjendetegn og Slægtsnavne af de blomsterløse Planter (Alger, Lavarter og Mosser) samt en Angivelse af disses omtrentlige Artsantal i Danmark. Ved Udarbeidelsen af denne Oversigt, som var forbunden med ikke liden Vanskelighed, idet vi for de fleste af disse Familiers Vedkommende savne det ønskelige Materiale til Oplysning om de i Danmark forekommende Arter, har jeg støttet mig dels paa værdifulde Oplysninger, der velvillig ere mig meddeelte af Frøken Rosenberg, Dhrr. Branth, Th. Jensen, M. T. Lange og Rostrup, dels paa en Revision af de i min egen Samling indeholdte Cryptogamer.

5. Ligesom den anden Udgave blev forøget med en Anviisning for Begyndere til Haandbogens Brug ved Planters Bestemmelse, har jeg, ifølge Anmodning af Flere, i tredie Udgave tilføiet, ligeledes som et Hjælpemiddel for Begyndere, en alfabetisk ordnet Fortegnelse over de vigtigste i Haandbogen brugte Kunstord med en kort Forklaring over ethvert af disse.

Foruden de i første Udgave nævnte Hjælpemidler til Kundskab om Danmarks Flora har jeg af trykte Arbejder fornemlig afbenyttet følgende: H. P. G. Koch, «Falsters Vegetation»; M. T. Lange, «den sydfyenske Øgaards Vegetation» og «Tillæg til Danmarks Flora»; Th. Schiøtz, «Bidrag til Bornholms Flora» og «Beretning om en botanisk Reise i Slesvig og paa Vesterhavsoerne», fremdeles en Afhandling af F. Müller: i «Flora» 1853, som omhandler de i Eidersted og i Egnen om Husum fundne Planter. Desuden har jeg havt rigelig Understøttelse af flere Botanikens Dyrkere, som med største Forekommenhed og Velvillie have meddeelt mig hver fra sin Egn dels Planter, dels haandskrevne Bemærkninger. Idet jeg fornyer min Tak til de Mange, som allerede understøttede mig ved den første Udgave, er

det med Sorg jeg mindes, at flere af disse, og deriblandt saa udmærkede Botanikere som Schouw, Hofman - Bang, J. Vahl, Liebmann og Vaupell, ere bortkaldte fra Videnskaben i de faa Aar, som siden den Tid ere forløbne. Blandt dem, som de 2 sidste Udgaver især skylde saavel saare mange og værdifulde Bidrag af nye og sjeldne Planter som Berigtigelser og kritiske Bemærkninger om enkelte Arter eller Grupper, maa jeg særligt nævne Dhrr. Kammerraad Andresen, Bibliothekar Dr. Didrichsen, Professorerne Steenstrup og Ørsted, Seminarielærerne Mortensen, Th. Jensen og Rostrup; Dr. phil. Heiberg, Cand. theol. Branth, Cand. pharm. Schiøtz og Baagøe, Provst Koch, Sognepræsterne M. T. Lange, Jacobsen, Fausbøll og Visby, Overretsprocurator Morville, Adjunkterne Feddersen, Grønlund, Hoff, Juel, Jørgensen, Knæckenborg, Lütken, d'Origny, Strøm og Thomsen, Baron Rosenørn Lehn, afd. Premierlieutenant Lund, Fuldmægtig Smith, Forstcandidat West, Stud. mag. E. Warming, Stud. med. Valløe, Landinspecteur J. Mørch, Skolelærerne Hjorth, P. Nielsen og V. Schmidt, Assessor pharm. Piper, Apothekerne Aabye og Benzon. Alle disse og flere Andre, som have meddeelt mig Bidrag og Oplysninger, bringer jeg herved min oprigtige Taksigelse.

Kjøbenhavn, December 1864.

Joh. Lange.

Forklaring

over

adskillige af de i Haandbogen hyppigst forekommende
Tegn og Forkortninger.

Kyll. = P. Kylling, *viridarium danicum*, Hafn. 1688.

Rafn. = C. G. Rafn, *Danmarks og Holsteens Flora*. Kbhavn. 1 D. 1796, 2 D. 1800.

Schum. = C. F. Schumacher, *Enumeratio plantarum Sjællandiæ sept. & orient.*, vol. 1—2. Hafn. 1802—3.

H. = Hornemanns *oekonomiske Plantelære* 3 Udg., 1 Deel, 1821, **H. II.** — 2 Deel, 1837.

N., Nolt. = E. F. Nolte, *Novitiæ Floræ holsaticæ*, Kilon. 1826. — *Bidrag til Fl. Dan.*

Dr., Drej. = S. T. N. Drejer, *flora excursoria Hafniensis* 1838. — *Bidrag til den danske Flora i Krøyers Tidsskrift.*

Fr. Nov. = E. Fries, *novitiæ flor. Suec.* ed. II, 1828. — **Mant.**, = *mantissa* I—III, 1832—42. — **S. Veg. Sc.** = *Summa vegetabilium Scandinaviæ* sect. 1—2, 1845—49.

Koch Syn. II. = W. D. I. Koch, *Synopsis floræ germanicæ & helveticæ* ed. 2, vol. 1—3. Lipsiæ 1843—45.

F. D. = *Flora Danica*.

E. B. = *English Botany*.

Rehb. ic. fl. g. = Reichenbach, *Icones floræ germanicæ & helveticæ*, vol. I—XIX; **Rehb. ic. crit.** = *iconographia botanica*, cent. I—X, 1823 etc.

And. Atl. = N. J. Andersson, *Atlas öfver den Skand. Flor. nat. Fam.* Stockh. 1849 — **Cyp. Scand.** = *Cyperacæ Scandinaviæ*, Holm. 1849. — **Gram. Scand.** = *Gramineæ Scandinaviæ*, Holm. 1852.

H. N. = E. Fries, *Herbarium normale plantarum rariorum & criticar. Sueciæ*, fasc. 1—15.

L. Herb. = *Herbarium for den landoekonomiske Botanik*, udg. af Joh. Lange, 1—9 Hæfte.

⊙ = enaarig; ⊕ = toaarig; ♀ = vedvarende urteagtig; ♂ = træ- eller buskagtig.

♂ = Støvblomst; ♀ = Frugtblomst; ♂ = Tvekjønsblomst.

∞ = ubestemt Antal.

† foran en Planteart (med Ac) betegner indførte og nu akklimatiserede Planter.

† foran en Planteart (uden №) = dyrkede eller tilfældigviis forvildede Arter.

X = Arter, som tidligere have været fundne i Danmark, men nu synes at være forsvundne.

? = Tvivlsomme Arter for vor Flora.

* = (med №) Sandsynligviis egne Arter.

* = (uden №) Udmærkede Varieteter.

⌒ = Bastardformer.

▷ = Misdannelser.

Tegnene ved Slægterne i Klassen Tetradynamia ere forklarede i Oversigten over de naturlige Familier (Fam. Cruciferae).

Tallene efter Plantebeskrivelserne betegne de til de resp. Tal svarende Maaneder af Aaret, i hvilke Planten blomstrer, f. Ex. 5 = Mai, 6 = Juni o. s. v. $\frac{5}{2}-\frac{6}{1}$ = Blomstringstid fra Slutningen af Mai til Begyndelsen af Juni.

J. — Jylland.

Sl. — Slesvig.

F. — Fyen.

Loll. — Lolland.

Falst. — Falster.

Sj. — Sjælland.

Bornh. — Bornholm.

Tegnet * med en Linie i forskjellig Retning, efter Artiklen om Planternes Forekomst, betegner den resp. Plantes Grændser mod Nabolandene, f. Ex. $\frac{*}{\text{—}}$ Planter, som mangle i Norge, [* i England, *] i Sverige, $\frac{*}{\text{—}}$ i Tydskland.

! efter et Voxested betegner at jeg selv har fundet Planten paa det angivne Voxested. Navnene i Parenthes efter Voxesteder betegne Finderne af den paagjældende Plante. De oftest nævnte blandt disse ere betegnede ved Tal, hvis Betydning nedenstaaende Fortegnelse angiver.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Den botan. Forening i Kbh. *) | 16. Poulsen, Dr. phil., Justitsraad. |
| 2. Fausbøll, Præst. | 17. Petit, pract. Læge. |
| 3. Gøtsche, Provst. | 18. Rosenberg, Frøken. |
| 4. Hofman-Bang, N., Etatsraad. | 19. Rostrup, Seminarielærer. |
| 5. Holst, E. Møller-, Cand. phil. Redacteur. | 20. Schiøtz, Cand. pharm., Fabrikant. |
| 6. Hübertz, Cand. pharm. | 21. Steenberg, Apotheker. |
| 7. Jensen, G., Apotheker. | 22. Steenbuch, pract. Læge. |
| 8. Jensen, Th., Seminarielærer. | 23. Steenstrup, Professor. |
| 9. Kamphøener, Docent. | 24. Strøm, V., Adjunkt. |
| 10. Kjærbølling, Dr. phil. | 25. Tuxen, Præst. |
| 11. Liebmans, Professor. | 26. Tutein, Contoirchef. |
| 12. Lange, M. T., Præst. | 27. Vahl, Dr. phil. |
| 13. Meinert, Underlæge. | 28. Vaupell, Dr. phil. |
| 14. Mortensen, Seminarielærer. | 29. Westesen, Præst. |
| 15. Piper, Assessor pharm. | 30. Warming, Stud. mag. |

*) De til den bot. Forening indsendte Planter ere i Regelen betegnede med Indsenderens Numer, og Nr. 1 er derfor kun brugt naar det ikke er blevet optegnet fra hvem Planten er modtaget.

Kortfattet Anviisning

til

Haandbogens Brug ved Planternes Bestemmelse.

Mange af dem, som ville gjøre Brug af nærværende Haandbog til paa egen Haand at undersøge de danske Planter, kunde muligen ønske at erholde nogle Vink med Hensyn til den bekvemteste Maade, hvorpaa dette kan skee, og jeg skal derfor ledsage Bogen med en kort Veiledning til sammes Brug.

Undersøgelsen af den Plante, man ønsker at kjende, begynder man med at bestemme dens *Plads i det linnéiske System* efter den pag. XLVIII meddeelte Tabel. *Classen* finder man bedst ved at gjennemgaae Tabellen nedenfra, saaledes at man først forvisser sig om, hvorvidt Planten har tydelige eller utydelige Blomster, i første Tilfælde om Blomsterne ere særkjønnede eller tvekjønnede. Er Blomsten særkjønnet, da undersøger man om den er Enbo eller Tvebo, er den derimod tvekjønnet, da efterseer man, om en Sammenvoxning af Befrugtningsdelene finder Sted (og i saa Fald paa hvilken Maade) eller om Delene ere frie o. s. v. Har man ved denne Fremgangsmaade fundet Classen, da gaaer man videre til at bestemme *Ordenen*, hvilket skeer efter Tabellen pag. XLIX. Dersom man f. Ex. har valgt til Undersøgelse den almindelige Døvnælde (hvid Tvetand), som har 2 lange og 2 korte Støvdragere og altsaa hører til 14de Classe, da finder man paa Ordenstabellen, at der i denne Classe ere 2 Ordener (Spaltefrugtede og Kapselfrugtede). Man bemærker, at den Plante man har for sig, har 4 frie Nødder, og den hører altsaa til 1ste Orden (Spaltefrugtede). Nu gaaer man videre frem i Bogen, hvor en Oversigt over de til 14de Cl. 1ste Ord. hørende

Slægter er fremstillet S. 427. Denne Orden er, for at lette Bestemmelsen af de talrige Slægter, yderligere underafdeelt, og de til hinanden svarende (med ensartede Mærker betegnede) Underafdelinger maa nu stadigt sammenlignes, efterhaanden som Undersøgelsen rykker frem. Dersom f. Ex. den Plante, hvis Slægtsnavn jeg søger, har Frugten allerede før Modenheden deelt i 4 Nødder og Blomsterne tilsyneladende krandsstillede, da hører den til Afdelingen A, og denne er atter deelt i 3 Underafdelinger efter Bægerets Beskaffenhed, idet dette enten kan være titandet (AA), regelmæssig femtandet (BB) eller tolæbet (CC). Den Plante jeg har for mig, har et regelm. femtandet Bæger, den hører altsaa til Underafd. BB, og jeg maa nu dernæst lægge Mærke til, om Støvtraadene ere parallelle (a) eller efter Bestøvningen bøiede fra hinanden foroven (b). Paa denne Maade fortsættes saalænge der findes opstillet Underafdelinger, som ere betegnede ved Mærker der svare til hinanden indbyrdes. Har man ad denne analytiske Vei fundet, at den søgte Plante hører til $\beta\beta$, Underafdelingen *, da har man i denne kun 2 Slægter at sammenligne, nemlig *Lanium* og *Galeobdolon*, og ved at gennemgaae de for hver af disse angivne særegne Kjendetegn, finder man, at disse passe paa den førstnævnte Slægt, som i Oversigten er betegnet med Nr. 6. Der staaer endnu tilbage at finde Navnet paa *Arten*, og dette skeer ved at opslaae den fundne Slægt (efter det angivne Numer), som indeholder flere Arter, der ere beskrevne S. 440. For at spare Gjennemlæsningen af de talrige Arters Beskrivelse ere disse atter fordeelte i Afdelinger, som ere betegnede med Bogstaver, der maa sammenlignes ligesom i Slægtoversigten. Finder man, at Planten har tilspidsede Blade og er vedvarende (a), at dens Kronrør er krummet med en Haarkrands indvendig i Røret (aa), da er der i denne Afdeling kun 2 Arter at vælge imellem; ved nøiagtig at gennemgaae de for disse Arter givne Beskrivelser findes at den første, *L. album*, har udeelt Stængel, børsteformede Bægerflige, en skjæv Haarkrands i Kronrøret og hvide Kroner. Alle disse

Kjendetegn, men derimod ikke de for den anden Art (*L. maculatum*) anførte, passe paa den Plante, jeg har til Undersøgelse, og jeg har saaledes fundet dens Navn. Foruden den egenlige Beskrivelse bør man ikke forsømme at lægge Mærke til de med mindre Tryk tilføjede Bemærkninger om Høiden, Blomstens Farve, Plantens Varighed, Blomstringstid o. s. v., hvilke Angivelser ofte kunne være oplysende ved Plantens Bestemmelse. Adskillige af disse ere udtrykte ved Tegn, hvis Forklaring er meddeelt S. XVII—XVIII.

Den her beskrevne Fremgangsmaade vil ved nogen Øvelse lette Arbeidet ved Planternes Undersøgelse betydeligt, idet man ved en nøiagtig Sammenligning af de hinanden modsatte Underafdelinger sparer den Uleilighed, som er forbunden med at gennemlæse Beskrivelserne paa en stor Mængde Slægter eller Arter. Men ved enhver Plantebestemmelse, og ikke mindst ved Brugen af det linnéiske System, udfordres en omhyggelig Undersøgelse af de enkelte Plantedele, især af Blomsten og Frugten, hvortil man bør være forsynet med en god Lupe*) og en skarp Kniv, samt nogle Naale. Det Exemplar, man vælger til Undersøgelse, bør være i god Tilstand, om muligt forsynet med Blomster og Frugter paa eengang, og man maa da ikke nøies med at undersøge en enkelt Blomst, men helst flere, deriblandt især nys udsprungne Blomster eller større Blomsterknopper, fordi de ældre Blomster ofte tidligt tabe enkelte af de til Bestemmelsen væsenlige Dele. Frugten er altid vigtig og hos enkelte Slægter, f. Ex. Skjærplanter, *Rumex*, *Atriplex*, aldeles nødvendig til Slægtens eller Artens Bestemmelse. Ofte er det ogsaa vigtigt at undersøge Roden og Rodbladene, og da de sidste stundom tidligt visne, bør man undersøge Planten i flere forskellige Afsnit af dens Liv. Hos Tveboplanter, f. Ex. Pileslægten, bør man saavidt muligt søge at forskaffe sig begge Kjøn, og tillige de ældre Blade, da flere Arter blomstre førend Bladenes Udvikling.

*) De Kjendetegn, som i Haandbogen ere benyttede til Planternes Beskrivelse, ere i Regelen saadanne, som kunne sees med blot Øie eller med en stærk Lupeforstørrelse.

Endnu bør omtales de enkelte Uregelmæssigheder, som finde Sted i det linnéiske System, og som stundom forvirre Begynderne. Hertil høre især de Tilfælde, da en Plante har Blomster med et forskjelligt Antal Støvdragere, endog paa samme Individ, f. Ex. *Chrysosplenium*, *Adoxa*, *Polygonum* o. fl.; disse henføres da til den Classe, hvortil de ifølge Fleertallet af deres Blomster henhøre. Fremdeles kan en Slægt indeholde flere Arter, hvoraf nogle efter den kunstige Inddeling henhøre til en, andre til en anden Classe. Denne Uregelmæssighed er søgt afhjulpen derved, at Slægten er *beskreven* i den Classe, hvortil dens fleste Arter henhøre; men enhver af de afvigende Arter er *nævnt* i den Classe og Orden, hvorhen man ifølge dens Befrugtningsdeles Antal eller andre Forhold maatte sætte den, og naar man altsaa i Slægtsoversigten foran en Classe finder enkelte Arter nævnte særskilt uden Beskrivelse, maa man eftersee, om Kjendetegnene paa den Slægt, hvortil de høre, og hvis Plads i Systemet ved hver især er angivet, muligviis passe paa den Plante, man søger; f. Ex. i 22de Classe 6te Orden anføres *Rumex Acetosa* og *Acetosella*, som ere Tvebo-Planter, medens de øvrige Arter af Slægten *Rumex* henhøre til 6te Classe 3die Orden.

For at erhverve sig nogen Øvelse i at bestemme Plantens Plads i det naturlige System bør man ikke forsømme at benytte den Oversigt over de danske naturlige Familier, som findes foran i Bogen S. LII. Til Lettelse ved det hermed forbundne Arbejde er der i Slægtsoversigten foran hver Classe angivet den Familie, hvortil enhver Slægt hører, og ved at gennemgaae de Familiers Kjendetegn, hvortil de undersøgte Slægter henhøre, vil man efterhaanden erhverve sig en foreløbig Kundskab om de vigtigste af disse.

Alfabetisk Fortegnelse

over

de vigtigste i Haandbogen forekommende Kunstudtryk
for Plantedelene og disses Former.

A.

Aarsskud (turio) en hos flere Buskvæxter (f. Ex. Rosa, Rubus) oftest fra Rodstokken udgaaende Green, som i sit første Aar er blød og urteagtig, bærer Blade, men ikke Blomster.

Afbidt (præmorsus) kaldes den lodrette Rodstok hos *Succisa pratensis*, *Primula* Arter o. fl., der er i Spidsen ligesom afnavet, idet de ældre Dele efterhaanden bortdøe nedenfra; den benævntes tidligere »afbidt Rod« paa Grund af dens Lighed med en Pælerod.

Afsnit (segmentum) s. *Snitdeelt*.

Afvexlende (alternans), den Bladstilling, hvor der kun udgaaer eet Blad fra hvert Led, men Bladene ere reetede vekselsviis til 2 forskellige Sider af Stængelen, saa at det tredie Blad dækker det første, det fjerde det andet o. s. v., (f. Ex. *Ulmus*).

Androgyn benævnes de sammensatte Ax hos *Carex*-Slægten o. fl., i hvilke nogle Blomster ere ♂, andre ♀.

Antheridier eller Støvkolber ere oftest rundagtige eller kølleformede Legemer, som indenfor en Hinde indeholde en Vædske med Sædtraade af forskjellig Form; de findes hos Sporeplanterne og udføre idetmindste hos mange af disse Befrugtningen af Sporerne.

Ar (stigma), den øvre Deel af Støvveien, alm. beklædt med Haar eller Kirtler, som udsondre en klæbrig Vædske, hvorved Arret opfanger og fastholder det fra Støvkapperne nedfaldende Blomsterstøv.

Avne (palea), skjælformede Dækblade f. Ex. ved Grunden af de enkelte Smaablomster paa Blomsterleiet hos flere Kurvblomstrede, (f. Ex. *Hypochoeris*, *Anthemis*). Hos Græsarterne faae de Smaaaxet omgivende (oftest 2) i forskjellig Retning udgaaende Dækblade Navn af *Yderavner* (glumæ), det ene (øvre) udgaaende lidet ovenfor det andet (nedre), hvorimod de hver enkelt Græsblomst omgivende og paa lignende Maade stillede 2 Dækblade kaldes *Inderavner* (paleæ).

Ax (spica), en forlænget Blomsterstand med siddende Blomster. A. kan være enkelt, med enligt stillede Blomster eller sammensat, naar det bærer mindre Blomsterstande (Krandse, Nøgler eller Ax); i det sidste Tilfælde kaldes de mindre Blomsterstande *Smaaax*, f. Ex. hos flere Græsarter (*Lolium*, *Elymus*, *Triticum*), hos andre Græsarter ere Smaaaxene sammenstillede i en Top (*Bromus*, *Poa*).

Axe (axis, rachis) kaldes Plantens Centralorgan i dets forskellige Udviklingsformer (Rod, Rodstok, Stængel, Grene o. s. v.) *Blomsterstandens Axe* er særligt den Deel af Stængelen, som udgjør det fælles Udgangspunkt for flere nær ved hverandre samlede Blomster (s. Blomsterstand).

Axelblade (stipulæ) ere de ved Grunden af de egenlige Blade, oftest et ved hver Side af Bladstilken, siddende Blade af en fra selve Bladet forskjellig Form; de ere at ansee for en særegen Udviklingsform af Bladskeden, findes hos Fleertallet af Planter og ere snart vedblivende (endog tilvoxende), snart tidligt affaldende, stundom ere de saa smaae, at de kun med Vanskelighed iagttages. *Smaaaxelblade* eller *Smaabilblade* (stipellæ) findes ved Grunden af et sammensat eller snitdeelt Blads Smaablade eller Afsnit (f. Ex. hos *Thalictrum*, *Sanguisorba*, *Phaseolus*).

Axelstillet (s. endestillet).

B.

Barktorn (aculeus), en fra Barklagets Overhud udgaaende spids, stikkende, tilsidst træagtig Fremragning hos *Rosa*, *Rubus*, *Ribes Grosularia* o. fl.

Bibæger eller **Yderbæger** (calyculus), en Kreds af bladagtige Dele udenfor det egenlige Bæger, dannet enten af Dækblade eller af axelbladlignende Tilhængsler til Bægeret (f. Ex. *Malvaceæ*, *Dipsaceæ*, *Potentilla*).

Bikrone (parapetala). Herunder indbefattes dels de oftest kronbladagtigt farvede Tilhængsler af forskjellig Form, som hos adskillige Planter findes indenfor den egenlige Krone, og enten hidrøre fra en ny Række Kronblade eller fra axelbladlignende Dele (f. Ex. *Vincetoxicum*, *Agrostemma*) dels indadvendte Ujævnheder i Form af Skjæl eller Tænder i Kronens Rør eller Svælg (f. Ex. hos *Borrage*, *Symphytum*, *Myosotis*).

Bistøvdragere (parastemones) omdannede og golde Støvdragere (f. Ex. hos *Parnassia*, *Scrophularia*, *Ajuga*).

Blad (folium): Plantens Sideorganer. Et fuldstændigt B. bestaaer af *Bladplade* (lamina), *Bladstilk* (petiolus) og *Bladskede* (vagina). Enhver især af disse Dele kan mangle, og naar Bladet nævnes uden yderligere Tilføielse, er derved for det meste særlig at forstaae Bladpladen.

Bladagtig (foliaceus) kaldes Plantedele af grøn Farve og som forøvrigt besidde et normalt Blads Egenskaber, i Modsætning til Axedele og desuden dels til *farvede* (ikke grønne), dels til *kjødfulde* og dels til *hindeagtige* Plantedele.

Bladdusk (coma) en Samling af tomme Dækblade i Spidsen af en Blomsterstand (f. Ex. *Melampyrum nemorosum*, *Mentha arvensis*).

Bladknopper (gemmae foliaceæ) kaldes de Knopper, af hvilke der senere udvikles bladbærende Grene, i Modsætning til *Blomsterknopper* (albabra), som indeholde Blomstens Dele i uudviklet Tilstand.

Bladplade
Bladskede } s. *Blad*.
Bladstilk }

Blomst (flos) dannes af en Axedeel (Frugtbunden) og bladagtige Dele,

nemlig, forsaavidt Blomsten er *fuldstændig*, af 2 ydre Bladkredse som beskytte de indre og kaldes *Blomsterdækket* (perigonium : Bæger og Krone) og af 2 indre Bladkredse, som paa Grund af deres særlige physiologiske Bestemmelse kaldes *Befrugtningsdele* (genitalia) s. *Støvdrager* og *Støvvei*. En Blomst kaldes *ufuldstændig*, naar den mangler en eller flere Bladkredse.

Blomsterdække (perigonium), s. *Blomst*. *Enkelt B.* er et saadant, hvor enten den ene Kreds (Bæger eller Krone) mangler eller hvor begge disse ere hinanden aldeles lige indbyrdes i Form, Størrelse og Farve. Bladene i det enkelte Blomsterdække kaldes *Perigonblade*.

Blomsterknop (alabastrum) s. *Bladknop*.

Blomsterkop (cyamium) kaldes den for Slægten Euphorbia særegne Blomsterstand, i hvilken der i Midten findes en stillet Hunblomst, der omgives af en Kreds *enblomstrede* nøgne, enhannede Hanblomster med særskilte Dækblade, og udenfor disse Dele et fælles sambladet Hylster (*Kopdække*).

Blomsterkurv (calathium) s. p. 554.

Blomsterlele (anthoclinium) s. p. 554.

Blomsterskjæl (lodicula) Græsarternes Blomsterdække (indenfor Inderavnerne), dannet af 2—3 smaae hindeagtig-gjennemsigtige, hele eller toffigede Skjæl.

Blomsterstand (inflorescentia) en Samling af Blomster, som sidde i Nærheden af hverandre paa en fælles Axedeel (Blomsteraxen eller Blomsterstandens Axe). Efter dennes Beskaffenhed og Blomsternes Udvikling paa samme kaldes B. forlænget eller forkortet, begrændset eller ubegrændset, enkelt eller sammensat.

Blomsterstilk (pedunculus), den Forgrening af Blomsteraxen, som umiddelbart bærer Blomsten. Naar flere stilkede Blomster udgaae fra en fælles Blomsterstilk, kaldes de enkelte Blomsters Stilke *Smaa-blomsterstilke* (pedicelli).

Blødpigge (murices, echini) ere stikkende, men urteagtige og temmelig bløde (ikke træagtige) Fremragninger af Overhuden (f. Ex. hos Kapselen af *Æsculus* og *Datura*, Skaalen hos *Fagus* og *Castanea*).

Bractée s. *Dækblad*.

Bredvægget (latiseptus) s. pag. 471.

Buddike (theca, pyxidium), en paatværs opspringende Kapsel, ved hvis Aabning et Laag (operculum) adskilles fra Kapselens nedre, vedblivende Deel (f. Ex. hos *Hyoscyamus*, *Anagallis*, *Plantago*, *Bladmoss*).

Budt (obtusus), kaldes en Plantedeel med kort og afstumpet, svagt afrundet Spidse.

Buenervet (converginervius), et Blad med ugrene Nerver, som fjerne sig fra hverandre og danne Buer paa Midten, men løbe sammen mod Spidsen og Grunden (f. Ex. *Convallaria majalis*, *Cephalanther*).

Bugflade (commissura), den mod Axen indadvendt Flade mellem den yderste Ribbe paa hver Side af Skjærplanternes Smaafrugter.

Bugsøm (sutura ventralis), s. *Søm*.

Bugt (sinuatus) kaldes Indskjæringen i Randen af et Blad, naar denne i Dybde staaer omtrent midt imellem det tandede og lappede Blad (f. Ex. *Datura Stramonium*, *Solanum nigrum* og *villosum*).

Bæger (calyx), Blomsterdækkets ydre Kreds, hvis Blade kaldes *Bægerblade* (sepala), naar de ere fuldkomment adskilte fra hverandre (fribladet B.), ere de derimod mere eller mindre sammenvoxne (sambladet B.) faae de frie Dele af Bægeret Navn af Flige eller Tænder.

Bælle eller **Bælg** (legumen), en enkelt, kapselagtig, enrummet Frugt, som aabner sig paalangs saavel i Bug- som Rygsømmen, med Frøstolen langs Bugsømmen (f. Ex. Ærteblomstrede).

Bællekapsel (folliculus), en oftest fleerfoldig, kapselagtig enrummet Frugt, som aabner sig paalangs i Bugsømmen, hvor ogsaa Frøstolen findes, men forbliver lukket i Rygsømmen (f. Ex. Helleborus, Aquilegia, Sedum, Spiræa).

Bær (bacca), en kjødfuld, uopspringende Frugt med oftest flere Frøe. *Oversædige B.* findes hos Convallaria, Asparagus, Solanum, *undersædige* hos Ribes, Sambucus, Vaccinium.

Bærkogle (galbulus) kaldes den bærlignende Frugtstand hos Juniperus (en Art Kogle), i hvilken de nedre Kogleskjæl feilslaae og henvisne, medens de øvre (alm. 3) efterhaanden voxer sammen og blive kjødfulde.

Bølget (undulatus) er Randen af et Blad (uden Hensyn til dets Indskjæring) med en ujævn og i flere Retninger foldet Flade (f. Ex. hos Primula-Arter, Salix undulata).

Børste (seta): 1, Frugtstilken hos Bladmossene; 2, Haar, som ere længere og stivere end de sædvanlige, (f. Ex. hos Galeopsis versicolor, Papaver Argemone).

Børsteformet (setaceus) kaldes Blade eller Bladafsnit, som ere saa smale og stive, at de faae Lighed med Haar eller Børster (f. Ex. Bladene af Eleocharis acicularis, Potamogeton marinus. Bladafsnittene af Myriophyllum, Blomsterdækket hos flere Halvgræsarter, Avnerne paa Blomsterleiet hos flere Kurvblomstrede).

C.

Centrifugal (midtpunktflyende) kaldes en Blomsterstand, naar de indre (eller øvre) Blomster udvikles før de ydre (eller nedre); den modsatte Orden i Blomsternes Udvikling kaldes *centripetal* (midtpunktsøgende).

D.

Dusk (thyrsus), en klaseformet Blomsterstand med korte Grene og derved sammentrængte Blomster (f. Ex. Ligustrum, Alopecurus, Psamma).

Duunhaaret (pubescens) kaldes Plantedelenes Beklædning, naar Haarene ere korte og meget bløde.

Dverggreen (brachyblastus), en Green med meget korte Ledstykker og knippeformigt sammenhobede Blade (f. Ex. Larix, Pinus o. fl. Træer).

Dæblad (bractea), det støttende Blad ved Grunden af en Blomst eller Blomsterstand, som ofte har Lighed med Blomstens Dele, uagtet det ikke egenlig henhører til disse, og derimod i Form, Størrelse og Farve afviger fra de alm. Blade. I en sammensat Blomsterstand faae de D., som udgaar nedenfor Smaablomsterstilkene og umiddelbart støtte de enkelte Blomster, Navn af *Smaadæklblade*.

{bracteolæ). De i Regelen smaae, hindeagtige og skjællignende D. hos Halvgræsarterne kaldes *Dækskjæl*.

E.

Elliptisk (ellipticus) er en Plantedeel med buetformet Omrids, omtrent dobbelt saa langt som bredt, bredest paa Midten og spidst tilløbende mod Grunden og Spidsen.

Enbo (monoecus) ere Særkjønsplanter med Han- og Hunblomster paa samme Plante.

Endestillet (terminalis), et Organ, som afslutter en Axedeel. I Modsætning hertil kaldes *sidestillet* (lateralis) ethvert Organ, der udgaaer fra Siderne af Axedele, og særligt *axelstillet* (axillaris), naar det udgaaer fra Bladvinkelen. Endestillede Blomster kunne stundom faae Udseende af at være sidestillede, naar de bøie sig til Siden og det støttende Blad derimod gaaer lige i Veiret ligesom en Fortsættelse af Axen, dette kaldes *falsk sidestillet* (f. Ex. Kolben hos Acorus, Qvasten hos Juncus effusus o. s. v.).

Ensidig (secundus) er den Stilling af Blomster eller Blade, naar disse, selv om de udgaaer fra flere Sider, dog alle ere vendte i een Retning (f. Ex. Blomsterne af Pyrola secunda, Epipactis atrorubens). Det modsatte Forhold benævnes *alsidig*.

Enskjønned (homogamus) kaldes første Orden i den 19de linnéiske Klasse (de Kurvblomstrede), hvor Kurvene indeholde lutter Tvekjønsblomster. Er der derimod Tvekjønsblomster i Skiven, men 1 eller flere Rækker Hunblomster i Randen af Kurven, kaldes denne *forskjelligkjønned* (heterogamus).

F.

Falsk fjernervet (s. *fjernervet*).

Falsk Frugt kaldes i Almindelighed enhver Frugt eller Frugtstand, i hvilken en betydelig Deel er dannet, ikke af Frøgjemmet, men af andre Plantedele, og særligt naar disse, Frugten ikke egenligt tilhørende Dele ere stærkt og iøinefaldende udviklede, f. Ex. Hyben- og Æblefrugter, hvor Underbageret, Morbær, hvor Blomsterdækkerne udvoxe og blive kjødfulde imod Modenheden.

Falsk sidestillet (s. *endestillet*).

Fane (vexillum), det øverste, i Almindelighed større Blad i Ærteblomsternes Krone, som i Knopleiet bedækker de øvrige Kronblade.

Fjerrigt (pinnatifidus), et fjernervet Blad med Indsnit mellem Sidenervene, som naae over Halvveien af Afstanden mellem Randen og Midtnerven. (Kaldes ogsaa *halvfinnet*.)

Fjernervet (penninervius), et Blad, i hvilket en stærkere Nerve løber paa langs fra Bladets Grund til dets Spidse og deler Bladet i 2 Halvdele; fra denne Hoved- eller Midtnerve udgaaer mindre og almyderligere forgrenede (Side-) Nerver. *Falsk fjernervet* (spurie p.) kaldes Bladet, naar den større Nerve i Midten er dannet af flere ugrene Nerver, som ved Grunden ere forenede, men efterhaanden bøie sig ud mod Bladranden (f. Ex. Calla).

Fjersnitdeelt (pinnatisectus) er et fjernervet Blad med dybere Indsnit end det fjerfligede, som naae indtil eller henimod Midtnerven.

Filt (tomentum), hvoraf Benævnelsen *filtet* (tomentosus), en tæt, kort og blød Beklædning af Plantedelene, som derved alm. faae en graaagtig Farve, idet den tætte Haarbeklædning skjuler Overfladen af vedkommende Plantedeel.

Fingret eller *fingerdeelt* (digitatus), et haandnervet, sammensat Blad, hvis Smaablade udgaae fra eet Punkt til flere Sider (f. Ex. Kløver, Potentil). Kaldes ogsaa *koblet* og betegnes nøiere efter Antallet af Smaablade, f. Ex. trekoblet, femkoblet o. s. v.

Finnet (pinnatus), et fjernervet, sammensat Blad, hvis Smaablade udgaae fra forskellige Punkter af den fælles Bladstilk (Midtnerven). Man skjelner mellem *ligefinnet* og *uligefinnet*, i første Tilfelde ender Bladet med et Bladpar, i sidste med et umage Blad, og mellem *modsat-* og *afvexlende finnet*, eftersom Smaablade sidde parviis ligeoverfor hinanden eller afvekle.

Fladkravet (hypocrateriformis), en Krone med Kraven vandret udstaaende fra det i Regelen temmelig lange og valseformede Rør (f. Ex. *Primula grandiflora*, *Anchusa officinalis*).

Fleerbo (polygamus) kaldes Planter, som bære baade Han-, Hun- og Tvekjønblomster (f. Ex. *Acer*, *Parietaria*, *Fraxinus*).

Fleerfoldig (Fleerfoldfrugt), kaldes flere Frugter indenfor een Blomst, som fra Begyndelsen af ere fuldstændigt adskilte i deres enkelte Frugtblade (f. Ex. *Alisma*, *Aconitum*, *Anemone*, *Geum*).

Fliget (lacinatus), et Blad med smale og temmelig dybe Indskjæringer mellem Nerverne, de saakaldte *Indsnit* (incisuræ); Bladets tilbageblevne Partier omkring Nerverne kaldes *Flige* (laciniae).

Fnok (pappus), det oversædige Bæger med haar- eller fjerformet, sjældnere hindeagtig Krave (f. Ex. hos de Kurvblomstrede og Kartebollefamilien, s. p. 554 og 106).

Fodnervet (pedinervius), Blad med en mindre, til begge Sider forgrenet Nerve i Midten og en større, kun opadtil forgrenet Nerve paa hver Side fra Grunden (f. Ex. *Petasites*, *Asarum*, *Helleborus*).

Forskjelligkjønnet (s. *Enskjønnet*).

Fremliggende (procumbens) eller **nedliggende** (decumbens), Stængler, som i hele deres Længde ere udstrakte langs Jordoverfladen, dog uden at slaae Rødder (f. Ex. *Veronica hederæfolia*, *Jinaria* *Elatine*).

Fribladet (eleutherosepalus eller eleutheropetalus) kaldes Blomsterdækket (Bæger eller Krone), naar dets Blade i deres hele Længde ere indbyrdes adskilte.

Frugt (fructus), den til Modenhed udviklede Frugtknude. Hertil hører Frøgemmet (perispermium), bestaaende af et forskelligt Antal *Frugtblade* (carpella) og de deri indesluttede *Frøe* (semina) o: de udviklede *Æg*, tilligemed *Frøstolen* eller *Ægstolen* (spermatophorum), den Deel hvorpaa Frøene ere befæstede.

Frugtbund (torus, receptaculum) er Axedelen i den enkelte Blomst, fra hvilken saavel Blomsterdække som Befrugtningsdele udgaae. Den kan være kegleformigt forlænget, fladt udbredt eller hul o. s. v. — Dersom Axedelen forlænges mellem 2 paa hinanden følgende af Blomstens Bladkredse (f. Ex. mellem Støvdragerne og Støvveien hos *Silene*, *Capparis*), kaldes denne forlængede Deel af Frugtbunden

Frugtholder (gynophorum); dersom den øvre Deel af Frugtbunden er forlænget og bærer talrige Fleeerfoldfrugter, kaldes den særligt *Frugtaxe* (f. Ex. hos *Myosurus*, *Batrachium sceleratum*), og i en Spaltefrugt bruges almindelig for den samme Axedeel Benævnelsen *Frugtstol* (carpophorum), f. Ex. hos *Umbelliferæ*, *Geranium*.

Frugtblad (s. *Frugt*).

Frugtblomst (s. *Hunblomst*).

Frugthob (sorus) s. p. 750.

Frugtholder (s. *Frugtbund*).

Frugtknude (germen, ovarium) er den nederste og alm. tykkeste Deel af Støvveien, som senere udvikles til Frugt og indslutter Ægstolen tilligemed Ægene.

Frugtstand er en Samling af flere Frugter, hidrørende fra et tilsvarende Antal Blomster, som have været samlede i en Blomsterstand (f. Ex. Naaletræernes Kogler, Morbær).

Frugtstol (s. *Frugtbund*).

Frøndset (fimbriatus), Randen eller Overfladen af et bladagtigt Organ, naar samme er deelt i fine Trævler (f. Ex. Kronen af *Menyanthes trifoliata*, *Lychnis Flos cuculi*).

Frø (semen), det fuldt udvikede og modne Æg, bestaaende af *Frøskallen* (Ægets Hinder) og *Kjærnen*, der enten bestaaer alene af *Kimen* (embryo) eller tillige af en *Frøhvide* (albumen), som dannes under Frøets Udvikling enten indenfor Kimsækken (Endosperm) eller udenfor samme (Perisperm).

Frøblad eller Kimblad (Cotyledon), den unge Plantes første Blade, som allerede ere tilstede i det udviklede Frø (før Spiringen), hvor de udgjøre en betydelig Deel af Kimen. F. er enten udeelt (hos Enfrøbladplanterne), sjældnere flere (maaskee rettest 2 til Grunden deelte) F., s. f. Ex. hos Gran, Fyr og Lærke).

Frøjemme (s. *Frugt*).

Frøhale (cauda) kaldes den vedblivende og tilvoxende Griffel hos *Pulsatilla*, *Clematis*, *Geum* o. fl.

Frøhud eller Frøkappe (arillus) er et fra Frøstrængens Udvidelse eller særegne Udvikling hidrørende Legeme, som omgiver en større eller mindre Deel af Skallens Overflade hos flere Frøe (f. Ex. *Corydalis*, *Polygala*, *Euonymus*).

Frøhvide (albumen), s. *Frø*. Den kan være melet, kjødfuld, hornagtig o. s. v., og i Forhold til Kimen ligger den enten udenom (periferisk F.), ved Siden af (sideliggende F.) eller indenfor Kimen (central F.).

Frøstol (s. *Frugt*).

Frøuld (desma), en uldagtig eller haarformet Udvidelse af Frøstrængen (f. Ex. hos *Salix*, *Epilobium*).

Fuldstændig kaldes en Blomst, i hvilken alle de 4 Bladkredse (Bæger og Kronblade, Støv- og Frugtblade) ere tilstede.

G.

Gabende (ringens), en læbedannet Krone, hvis 2 Læber ere fjernede fra hinanden saaledes, at Svælget kommer tilsyne.

Gane (palatum) kaldes en opadvendt Fold paa flere Maskeblomstredes Underlæbe, som tillukker Kronens Svælg (f. Ex. *Linaria*, *Antirrhinum*).

Gjennemvoxt Blad (eg. gennemvoxende Stængel, *caulis perfoliatus*), et siddende, skjoldformet Blad, som til alle Sider omgiver Stængelen, der ligesom er voxt igjennem Bladpladen i sammes Midtpunkt (f. Ex. *Bupleurum rotundifolium*).

Glat (glaber) er en Plantedeel, som mangler enhver Slags Haar-beklædning.

Gnavet (erosus) kaldes Bladranden, naar denne er aldeles uregelmæssigt indskaaren, omtrent som om den var affidt af Dyrenes Tænder.

Gold Blomst (flos neuter) eller **kjønsløs** er en Blomst, indenfor hvis Blomsterdække der ikke findes Støvdragere eller Støvveie (f. Ex. Randblomsterne af *Centaurea*, *Viburnum Opulus*).

Green (ramus) kaldes i Almindelighed enhver Forgrening af Axen (Stængel eller Rod); hyppigt forstaaes herved Stængelens Grene, som i Regelen fremgaar ved Udvikling af Knopper i Bladhjørnerne. Man skjælnes mellem *Hovedgrene* (r. *primarii*), *secundære Grene* (r. *secundarii* ell. *ramuli*) o. s. v.

Griffel (stylus), Støvveiens mellemste Deel, mellem Arret og Frugtknuden; den er oftest tynd og valseformet, med een eller flere Huulheder eller Gange (Griffelcanal) i det Indre. Er G. nedentil stærkt opsvulmet ovenfor Frugtknuden, kaldes denne tykkere, stundom vedblivende Deel *Griffelfod* (stylopodium), f. Ex. hos flere Skjærmplanter.

Griffelstøtte (androstylum) s. p. 632.

Grubet (favosus, faveolatus), med afvexlende Ophøjninger og Fordybninger ved Siden af hverandre (f. Ex. Blomsterleiet hos flere Kurvblomstrede, Frøstolen hos *Anagallis*, Frugterne hos *Teucrium*).

Grundnervet (basinervius) er Bladet, naar flere grenede Nerver udgaar fra Grunden af Pladen og danne Buer indtil de alle løbe sammen mod Spidsen (f. Ex. *Erythræa*, *Plantago major* og *media*).

Græsfrugt (seminum), en nødagtig Frugt med tyndt og hindeagtigt Frøjemme, som er nøie sammenvokset med Frøets Skal (f. Ex. *Gramineæ*). Denne Frugtform er i Regelen fri, men hos enkelte Græsslægter er Frugten yderligere sammenvokset med Inderavnerne (f. Ex. *Hordeum*).

H.

Haandnervet (palminervius), et Blad med flere lige stærke, grenede Nerver udgaende fra Bladpladens Grnd (som hyppigt er opsvulmet til en Knude) og derfra ikke sammenløbende mod Spidsen, men udbredende sig til forskjellige Sider ud imod Bladranden (f. Ex. *Malva*, *Acer*, *Ribes*).

Haandlappet, haandfliget, haandsnitdeelt ere haandnervede Blade med forskjellig Dybde af Indskjæring mellem Nerverne (s. *fjerfliget* o. s. v.).

Haaret (pilosus) er enhver Plantedeel, som er beklædt med *Haar* (pili) o: Celler eller Cellerækker, som rage udover Overhuden.

Haarformet (capillaceus) kaldes meget fine og slappe Bladflige (f. Ex. af *Batrachium heterophyllum* og *trichophyllum*).

Hagebørste (glochis) kaldes stive Haar, som i Spidsen ere tilbagebøiede eller forsynede med 2 eller flere Hager eller Kroge (f. Ex. Bægeret af *Myosotis*, Frugterne af *Galium Aparine*, *Cynoglossum officinale*).

Halvbusk (suffrutex), en træagtig Væxt, hvis Stængler kun hæve sig ganske lidet over Jordoverfladen (f. Ex. *Thymus*, *Calluna*, *Helianthemum*).

Halvfinnet (s. *fjerfliget*).

Halvkrand (semiverticillus) kaldes Blomsterstanden hos mange Græsarter, hvor flere Topgrene eller Smaaax ere stillede i Krandform paa den ene, men mangle paa den anden Side af Blomsteraxen. Oftest udgaae disse H. afvexlende i 2 eller 3 forskellige Retninger, saa at den samlede Blomsterstand bliver en alsidig og ikke en ensidig Top.

Halvomfattende (s. *Omfattende*).

Halvskjærm (corymbus), en klaseformet Blomsterstand, hvis nedre Blomsterstilke eller Grene naae omtrent ligesaa høit som de øvre, saa at alle Blomsterne, skjøndt de udgaae fra forskellige Punkter af Stængelen, ligge i en Flade foroven (f. Ex. *Acer platanoides*, *Prunus Cerasus*, de Korsblomstre før Afblostringen).

Hanblomst eller Støvblomst (flos masculus), en Særkjønsblomst, som indeholder Støvdragere, men ingen (eller kun ufuldstændige og golde) Støvveie. Betegnes med Mærket ♂.

Hase er et bladagtigt fliget Dækblad, som omgiver Hasselens og Avnbøgens Hunblomst og tilvoxer med Frugtens Udvikling, saa at den skjuler den største Deel af eller hele Nødden.

Heelfrugt (holocarpium), en Frugt, som er fremgaaet af en enlig Frugtknude i en Blomst og ved Modenheden enten forbliver lukket eller aabner sig i Klapper, der tydeligt udgjøre Dele af et Hele (jvf. *Spaltefrugt* og *Fleerfoldfrugt*).

Heelrandet (integerrimus) er et Blad, hvis Rand er aldeles uden Indskjæring (f. Ex. *Syringa*, Græsarter og de fleste Enfrøbladplanter). *Heelt* (integer) kaldes Bladet, naar det er uden dybe Indskjæringer, selv om Bladranden er deelt i svage Tænder ell. desl.

Hindefrugt (utriculus), en nøddignende, en- eller faafrøet, men kapselagtig-opspringende Frugt med tyndt, oftest hindeagtigt Frøjemme (f. Ex. *Amarantus*, Smaafrugterne af *Geranium*).

Hjelm (galea) kaldes (paa Grund af Formen) hos *Aconitum* det større, umage, hætteformigt hvælvede og farvede Bægerblad, hos Gjøgeblomsterne de 5 Perigonblade (i Modsætning til Læben), som bøie sig sammen med deres Spidser i Hjelm- eller Hætteform.

Hjerteformet (cordatus) kaldes Bladpladen, naar den ved Grunden er bred og afrundet med et Indsnit for Bladstilken eller Tilhæftningspunktet og er rundagtigt Øre paa hver Side af dette, samt derpaa jævnt afsmalnende henimod Spidsen (f. Ex. *Tilia*, *Viola silvatica*).

Hjulformet (rotatus) er et sammensat skjoldformet *Blad*, hvis Smaa- blade udgaae fra et Midtpunkt til alle Sider (f. Ex. *Æsculus*, *Lupinus*); *hj. Krone* en sambladet Krone med meget kort Rør og vandret udstaaende Krave (f. Ex. *Rorago*, *Myosotis*, *Solanum*).

Honninggemme (nectarium), Udsondrings- eller Opbevaringsstedet for den søde, honningagtige Vædske, som mange Blomster indeholde; de findes oftest ved Grunden af Kronbladene og fremtræde under

- forskjellige Former, f. Ex. som en *Honninggrube* hos *Fritillaria*, en *Honningfure* hos *Lilium*, *Honningkirtler* hos *Acer* o. fl., men hyppigt udsondres Honningvædsken frit i Kronrøret uden særeget Gjemmested (f. Ex. hos *Primula*, *Lonicera*, *Trifolium*).
- Hoved** eller **Blomsterhoved** (capitulum), en Blomsterstand af rundagtig Form med forkortet eller til et enkelt Punkt sammentrængt Blomsteraxe og siddende eller yderst kortstilkede Blomster (f. Ex. *Trifolium*, *Armeria*, *Eryngium*).
- Hunblomst** eller **Frugtblomst** (flos foemineus), en Særkjønsblomst indeholdende Støvveie, men enten aldeles ingen eller golde Støvdragere. Betegnes ved Mærket ♀.
- Hybenfrugt** kaldes Rosens Fleerfoldfrugt, som er dannet af et Antal Nødder, indsluttede i det vedblivende og ved Modenheden kjødfuld tilvoxende Underbæger.
- Hylster** (spatha), et Dækblad, som er større end den Blomst eller Blomsterstand, ved hvis Grund det udgaaer, og som før Udspringningen indhyller denne. H. er snart farvet, snart grønt, hindeagtigt eller endog træagtigt (hos *Palmerne*), det er enbladet hos *Arum*, *Calla*, *Narcissus*, 2—3-bladet hos adskillige Løgarter, *Mais* o. s. v.
- Hæfterød** kaldes de fra Stængelens overjordiske Deel udgaaende Rodtrævler, som befæste Planten til fremmede Legemer, men ikke indsuge Næring af disse (f. Ex. *Hedera Helix*, flere Mosser og Lavarter).
- Høvlformet** (runcinatus) kaldes et fjernervet-indskaaret (lappet, fliget eller snitdeelt) Blad, hvis Sidenerver ere rettede nedad og Indsnittene derfor vende opad (f. Ex. *Crepis biennis*, *Taraxacum officinale*).

I.

Inderavne (s. *Arve*).

Indrullet (involutus) kaldes Randen af et Blad, naar samme danner en større eller mindre Bue med Huulheden vendt indad mod Plantens Axe (f. Ex. *Carex vulgaris*, *Agropyrum*-Arter o. s. v.).

Indtrykt (retusus) er en Plantedeel med et meget svagt Indsnit i den forøvrigt budte eller afrundede Spidse (med ligesom tilbagekrænget Spidse) f. Ex. Smaablade af *Melilotus officinalis*, *Medicago lupulina*, Skulpen af *Camelina foetida*.

Jævn (lævis) er Overfladen af Plantedelene, forsaavidtsom Overhudens Flade er ligelig, uden punktformede eller stribede Fremragninger.

K.

Kamdeeelt (pectinatus), et fjersnitdeelt Blad, hvis Bladkjød er saagodt som forsvundet mellem Nerverne og de tilbageblevne Afsnit ere temmelig korte og stive (f. Ex. *Myriophyllum verticillatum*, *Hottonia palustris*).

Kamformet (cristatus), omtrent af Form som en Hanekam (f. Ex. Dækblade af *Melampyrum cristatum*).

Kapsel (capsula), en tør, opspringende og oftest fleerfrøet Frugt. *Oversædlig* er K. hos *Lilium*, *Datura*, *Linaria*, *undersædlig* hos *Iris*, *Campanula*, *Epilobium*.

Kileformet (cuneatus), et Blad med smal og langagtig Plade, som fra en smal Basis jævnt udvides foroven og i Spidsen er afstumpet (f. Ex. hos *Euphorbia helioscopia*).

Kim (embryo) s. *Frø*.

Kirtelhaaret (glandulosus), beklædt med *Kirtelhaar* 3: Haar med en kugleformet Udvidelse i Spidsen, af hvilken der ofte udsondres en klæbrig Vædske (f. Ex. *Rosa rubiginosa*, *Rubus glandulosus* og *Radula*, *Sonchus arvensis*).

Kjerneæble (s. *Æblefrugt*).

Kjel (carina) benævnes de 2 nedre Blade af Ærte-Kronen, som have adskilte Negle, men hvis Plader ere sammenvoxne saaledes, at de danne et baadformet, udadtil ofte skarpkjøllet Legeme, der omslutter Befrugtningsdelene.

Kjølformet (carinatus) ere Bladene f. Ex. hos flere Græs- og Halvgræsarter, hvor de 2 Sider af Bladpladen danne en Vinkel og Midtnerven en skarpt fremspringende Kant.

Kjønsløs Blomst (s. *gold*).

Klase (racemus), en Blomsterstand med forlænget Blomsteraxe og stilkede Blomster, som udvikles i Ordenen fræden opefter. Den fælles Blomsterstilk, som bærer Klasen, kaldes *Klasestilk* (f. Ex. *Prunus Padus*, *Veronica Chamædrys* og *Beccabunga*).

Klattrende (scandens) kaldes en Plante, som ikke ved Stængelens egen Slyngekraft, men ved egne Redskaber (Slyngtraade eller Hæfterødder) fasthæftes til fremmede Gjenstande og derved holdes opreist.

Klokkeformet (campanulatus), et Blomsterdække (Bæger eller Krone, som er indsnøret paa Midten og udvidet saavel nedenfor Midten som foroven imod Kraven (f. Ex. *Campanula*, *Atropa*, *Vaccinium Vitis idæa*).

Knappaand eller Støvknappaand (connectivum) s. *Støvdrager*.

Knippe (fasciculus), en qvastformet Blomsterstand med korte Grene eller Blomsterstilke, hvorved Blomsterne blive tæt sammenhobede (f. Ex. *Dianthus Armeria* og *barbatus*, *Juncus effusus*). *Knippestillede* (fasciculati) kaldes de tæt sammentrængte Blade paa en Dværggreen (s. *d. A.*).

Knol (tuber), en underjordisk, opsvulmet, ofte kjødfuld Stængeldeel, som indeholder en eller flere Knopper (f. Ex. *Orchis*, *Solanum tuberosum*, *Scirpus maritimus*).

Knop (gemma) er den sammentrængte og endnu uudviklede Begyndelse til en Axedeel med tilhørende Blade, i hvilken Bladene ligge sammenfoldede paa forskjellig Maade omkring den forkortede Axe. K. i Stængelens eller Grenenes Spidse kaldes *Endeknop*, hvorimod de øvrige K. (Sideknopper) i Regelen fremkomme i Bladhjørnerne, sjeldnere paa tilfældige Steder udenfor disse.

Knopskjæl (perulæ) benævnes de skjælformede, hinde- eller læderagtige Bladskeder uden Plade, som omgive Knoppen og beskytte den om Vinteren, men falde af ved Løvspringet.

Knudret (nodosus, tuberculatus) er en Plantedeel, som er ujævn af større eller mindre Knuder eller Vorter.

Knæbølet (geniculatus) kaldes en Stængeldeel, som paa et eller flere Steder (ved Ledene) er bøiet saaledes, at det ene Ledstykke danner en Vinkel med det næstfølgende (f. Ex. *Alopecurus geniculatus*).

Koblet (s. *fingeret*).

Kogle (strobilus), Frugtstanden hos Naaletræerne, i hvilken flere, i Alm. ved Modenheden træ- eller læderagtige, aabne Frugtblade (*Kogleskjæl*) sidde axformigt ordnede omkring en fælles Blomsteraxe og indenfor hvert Skjæl alm. 2 eller flere nøgne Frøe.

Kolbe (spadix), en axformet Blomsterstand med kjødfuld Axe og smaae, ofte ufuldstændige Blomster alm. indsænkede i Axen (f. Ex. Arum, Calla, Acorus).

opdække (s. *Blomsterkop*).

Korthaaret (hirtus) kaldes Plantedelens Beklædning, naar Haarene ere korte og temmelig stive (f. Ex. *Thrinicia hirta*, *Ranunculus lanuginosus*).

Krands (verticillus) kaldes en Samling af flere Blade (Bladkrands) eller Blomster (Blomsterkrands), stillede i samme Høide men udgaaende fra forskellige Sider af Stængelen, deraf Benævnelsen *krandsstillet* (verticillatus), med Angivelse af, hvormange Blade (eller Blomster) der udgaae fra samme Punkt (f. Ex. 4 hos *Galium boreale*, 3 hos *Juniperus*). *Falsk krandsstillede* kaldes de modsatte Qvaster eller Nøgler hos flere Læbeblomstrede, som ved Blomsternes tætte Sammenhobning faae Udseende af at være krandsstillede.

Krave (limbus), den øverste, bredere og oftest tandede eller fligede Deel af et sambladet Blomsterdække.

Krone (corolla), den indre af Blomsterdækkets Kredse, som oftest farvet (sjældnere grøn). I den fribladede K. kaldes de enkelte Blade *Kronblade* (petala), i den sambladede skjelnes mellem Kronrøret og Kraven, den sidste er ofte mere eller mindre dybt deelt, og efter Indsnittenes Dybde benævnes Kravens frie Stykker mellem Indsnittene Kronflige eller Tænder.

Krukkeformet (urceolatus), en sambladet, regelret Krone med oppustet Rør og lille, indsnøret Krave (f. Ex. *Erica Tetralix*, *Vaccinium uliginosum*).

Krybende (repens) kaldes Stængelen, naar den er udstrakt langs henad Jordoverfladen og tillige skyder Rødder enten i hele sin Længde eller idetmindste ved Ledene.

Kræmmerhuus (ochrea), en Axelbladdannelse hos Polygoneæ, dannende et enkelt, foroven fliget eller fryndset Rør indenfor Bladstilken og ikke sammenvoxet med denne, men ofte omfattende Stængelen.

Kurvdekke (periclinium) s. pag. 554.

Kølleformet (clavatus) kaldes Kronen, naar Røret er smalere forneden og bliver jævnt tykkere opadtil, med en meget liden Krave (f. Ex. *Symphytum officinale*).

L.

Lanceiformet (lanceolatus) er et bladagtigt Organ med omtrent 3 Gange større Længde end Brede, spidst udløbende foroven og forneden og paa Siderne begrændset af Buer (f. Ex. *Salix alba*, *lanceolata*, *acutifolia*).

Lappet (lobatus) kaldes et Blad, hvis Indskjæringer ere brede, men ikke dybe o: omtrent naaende Bladpladens Midte. Indskjæringerne kaldes her *Bugter* (sinus) og de fremstaaende Stykker af Bladpladen *Lapper* (lobi).

Ledbælle (lomentum), en Bælle som er afdeelt ved Skillevægge paa tværs mellem Frøene og ikke aabner sig paalangs, men enlen forbliver uopspringende eller adskilles i de enkelte Led efter Tværskillevæggene (f. Ex. Ornithopus, Hedysarum).

Ledskulpe (s. *Skulpe*).

Ledstykke (internodium) kaldes Afstanden mellem de 2 hinanden nærmeste *Led* (nodi) af Stængelen. De ere *forlængede*, naar Ledene (og Bladene) ere fjernede fra hinanden, *forkortede*, naar Ledene og de fra samme udgaaende Blade ere saa tæt samlede, at deres indbyrdes Afstand er utydelig.

Ligefinnet (paripinnatus) s. *finnet*.

Linieformet (linearis) er et Blad, hvis Rande danne mere eller mindre rette og parallelt løbende Linier, saaledes at Bladet er næsten ligebredt overalt (f. Ex. Zostera, Potamogeton obtusifolius, Græsarterne).

Lyreformet (lyratus), et fjerfliget eller fjersnitdeelt Blad, hvis Endeflig eller Endeafsnit er meget større end Sidefigene (f. Ex. Geum rivale, Senecio Jacobæa).

Læbe (labellum), det nedadvendte Perigonblad i den indre Kreds af Gjøgeblomsternes Blomsterdække, som i Form, Størrelse o. s. v. er forskjelligt fra Blomsterdækkets øvrige Blade.

Læbedannet (labiatus) s. *tolæbet*.

Løg (bulbus), en underjordisk Knop af oftest rundagtig Form, dannet af en kort, sammentrængt Axedeel (Løgkagen), og derfra udgaaende forneden Rodtrævler, foroven kjødfulde, enten taglagte eller concentriske Blade (Løgskjæl), f. Ex. Allium, Tulipa, Gagea.

Løgknop eller Yngleknop (bulbillus) en over- eller underjordisk Knop, som ikke udvikles til en Green paa Moderplanten, men tidligt frigjøres og danner en ny Plante (f. Ex. Polygonum viviparum, Dentaria bulbifera, Allium oleraceum, Saxifraga granulata).

Løgknol (bulbotuber) er forskjellig fra Løget derved, at Axedelen (Løgkagen) er stærkere udviklet, kjødfuld eller meelstoffoldig, Knoppen derimod lille og omgivet af de visnede eller optrævede Løgskjæl (f. Ex. Crocus, Gladiolus).

Løv (frons) kaldes Brægnernes Blade, som ere eiendommelige derved, at Sporehusene sidde i Frugthobe paa Bagsiden. **L.** (thallus) kaldes hos de lavere Sporeplanter en Forening af Axen og Bladdele, af meget forskjellig Form og oftest af en ikke grøn Farve (f. Ex. Marchantia polymorpha, Alger og Lavarter).

M.

Maskeret (personatus) s. pag. 432.

Mellembrydt (interruptus) kaldes et Ax, naar Blomsteraxen ikke overalt bærer Blomster, men er nøgen i større eller mindre Mellemlum (f. Ex. Carex divulsa, Arum maculatum); *mellembrydt-fjersnitdeelt* (interrupte pinnatisectus) er et Blad med afvejlende større og mindre Afsnit (f. Ex. Geum rivale, Poterium, Potentilla anserina).

Mellemstok (s. *Rodstok*).

Modsatte Blade (folia opposita) kaldes 2 Blade, som udgaae fra samme Høide af Stængelen (Spidsen af et Ledstykke), men vende til forskjellige Sider (f. Ex. Lonicera, Syringa, Læbeblomstrede).

Muurskeeformet (deltoideus), et Blad, begrændset af rette Linier, skjævt firekantet i Omrids, med Firekantens korteste Sider mod Grunden, de længste mod Spidsen (f. Ex. *Atriplex hortensis*, *arenaria*). (Staaer i Form omtrent midt imellem det rudeformede og spydformede Blad).

N.

Naalebørste (aciculus), stive, stikkende Haar, som danne en Overgang fra de egenlige Haar til Barktorne og alm. forekomme blandede med disse sidste (f. Ex. hos *Rosa spinosissima*, *Rubus hirtus*, *Radula* o. s. v.).

Naaleformet (acicularis), Bladene hos *Pinus*, *Abies*, *Ulex* o. fl., *Bracteæ* og Svøbblade hos *Characeæ*.

Naalehuus (vaginella), en Samling af vedblivende eller kun tildeels af-faldende Knopskjæl, som i Form af en lille Skede omgive Dværggrenene af *Larix*, *Pinus* o. fl. Naaletræer.

Navle (hilum) kaldes det Sted paa Frøets ydre Skal, hvor denne har været tilvoxet til Frøstrængen eller Frøstolen og ved Modenheden er løsrevet derfra, kjendelig i Almindelighed ved en anden Farve end den øvrige Frøskal; den er meget stor hos *Æsculus Hippocastanum*.

Nedliggende (decumbens) s. *fremliggende*.

Nedløbende (decurrens) er et siddende Blad, hvis Substans er forlænget nedad Stængelen (nedenfor Pladens Tilhæftningspunkt), hvorved denne bliver vinget (f. Ex. *Verbascum Thapsus*, *Symphytum officinale*, *Carduus crispus*).

Negl (unguis) er den nederste, smalere og stilkformede Deel af et Bæger- eller Kronblad.

Nikkende (nutans) kaldes en Blomst eller Blomsterstand, som paa Grund af at Blomsterstikken eller Stængelens øvre Deel er bøiet i en Bue, vender nedad (f. Ex. *Helianthus annuus*, *Carduus nutans*, *Schedonorus asper*).

Nyreformet (reniformis), et Blad med større Brede end Længde, afrundet foroven og med 2 rundagtige Lapper ved Grunden samt imellem disse et Indsnit ved Bladstilkens Udgangspunkt (f. Ex. *Asarum europæum*, *Viola palustris*).

Næb (rostrum) kaldes den smalere Deel af flere Frugter, oftest dannet af Bægerrørets Forlængelse udover den undersædige Frugt (f. Ex. *Taraxacum*, *Tragopogon*, *Anthriscus*).

Nød (nux, caryopsis) en en- eller faafrøet, uopspringende Frugt med tørt Frøgemme.

Nøgen (nudus) kaldes: 1, Blomster som mangle Blomsterdække (f. Ex. *Fraxinus excelsior*, *Salix*, flere Halvgræsarter); 2, Blomsterdækket hos de Kurvblomstrede, naar dette mangler Avner (f. Ex. *Bellis*, *Matricaria*); 3, Bladenes Overflade, naar den mangler den for flere Arter eiendommelige Filt (f. Ex. nogle Arter af *Hieracium*).

Nøgle (glomerulus), en qvastformet Blomsterstand med smaae og kortstilkede Blomster (f. Ex. *Juncus conglomeratus*, *Beta vulgaris*, *Atriplex arenaria*), *Nøgleformet* (glomeratus) kaldes en anden Blomsterstand, som har Lighed med et Nøgle (f. Ex. Krandsene hos *Rumex glomeratus*).

O.

Oliekanaler (vittæ) kaldes de rørformede Gange indenfor Frøgjemmet hos de fleste Skjærplanter Skalkfrugter, i hvilke der indeholdes en ætherisk Olie. De ere regelmæssigt ordnede og i et bestemt Antal for hver Slægt eller Art, deels paa Skalkfrugternes Bugflade, deels paa Ryggen mellem Ribberne.

Omfattende (amplectens) kaldes et siddende Blad med 2 Lapper eller Ører ved Grunden, hvormed det omgiver hele Stængelen (f. Ex. *Brassica campestris*, *Turritis glabra*). *Halvomfattende* (semamplectens), naar Bladets Ører kun omfatte Stængelens halve Deel (f. Ex. *Crepis tectorum*, *Hieracium boreale*).

Omkryngsædig (perigynus) er en Blomst, naar Kurvblade og Støvdragere ere forneden sammenvoxne med Bægeret, som hæver sig op og danner et Rør udenom den frie, men i Bægerrørets Huulhed indsenkte Frugtknude (f. Ex. *Prunus*, *Lythrum*).

Omvendt hjerteformet (obcordatus) er et ved Grunden spidst, foroven efterhaanden bredere og i Spidsen i 2 afrundede Lapper deelt Blad (f. Ex. Smaablade af *Vicia sativa*, *Oxalis acetosella*).

Omvendt ægformet (obovatus), en Plantedeel, som fra en smalere og spids Basis jævnt udvides imod den budte eller afrundede Spidse (f. Ex. Bladene af *Samolus Valerandi*, Skulperne af *Isatis tinctoria*).

Opret (erectus) er en Stængel, som fra Grunden af har en lodret Væxt (i Modsætning til den slyngende eller nedliggende Stængel).

Opstigende (adscendens) kaldes Stængelen, naar den fra Begyndelsen er svag og nedliggende, men efterhaanden hæver sig buetformigt i Veiret (f. Ex. *Thymus Chamædrys*, *Juncus lamprocarpus*).

Oval (ovalis), et bladagtigt Organ, som er omtrent dobbelt saa langt som bredt, budt eller afrundet ved Grunden og i Spidsen, og hvis Sider ere begrændsede af Buer (f. Ex. *Pyrus communis*, *Cotoneaster*).

Overlæbe (labium superius) s. *tolæbet*.

Oversædig Blomst (flos superus, epigynus) er ved Bægerrørets Sammenvoxning med Frugtknuden hævet op over Frugten, saaledes at Bægerflige, Kronblade og Støvdragere synes at udgaae fra Frugtens Spidse (f. Ex. *Iris*, *Umbelliferae*, *Pyrus*).

P.

Parallelnervet (= retnervet).

Penselformet (penicillatus), en Plantedeel med mange Haar udgaående fra eet Punkt (f. Ex. *Arrene* hos *Rumex* og mange Græsarter).

Perigonblade (s. *Blomsterdække*).

Perigynium, et sambladet, flaskeformet Blomsterdække, som løst omslutter Frugtknuden og Nødden hos *Carex*, s. p. 671.

Piilformet (sagittatus) kaldes et Blad med 2 spidse Ører ved Grunden, som danne en spids Vinkel med Bladstilk, en stump Vinkel med Midtnerven (f. Ex. *Sagittaria*, *Rumex Acetosa*). *Halvt piilformede* ere Axelbladene hos flere *Vicia*- og *Salix*-Arter, idet det indadvendte Øre mangler og saaledes kun begge Axelbladene i Forening frembringe Piilformen.

Plade (s. *Bladplade*).

Pælerod eller pæleformet Bod er en saadan, hvor Rodens Hovedaxe uafbrudt vedbliver at fortsættes stærkere end Grenene, der udgaae fra samme.

Q.

Qvast (cyma), en Blomsterstand med begrændset (midtpunktflyende) Udvikling af Blomsterne, saaledes at den midterste eller i Hovedaxens Spidse stillede Blomst udvikles først og derpaa de i Spidsen af Hovedgrenene o. s. fr. Q. er oftest flad foroven, hyppigst deelt i 2, stundom i flere Grene, den er *regelmæssig* hos Erythræa, Hypericum, Cerastium o. fl., *ensidig* hos de Rubladedes Familie, hvor bestandig kun den ene Green kommer til Udvikling, og Blomsterstanden derved faaer Lighed med en ensidig, forneden gaffeldeelt Klase eller Ax.

R.

Rakle (amentum), en axformet Blomsterstand med Særkjønsblomster (Han- eller Hunrakler) og alm. et meget ufuldstændigt Blomsterdække eller nøgne Blomster, som derimod beskyttes af skjælformede Dækblade (*Rakleskjæl*). R. er enten *enbo* (Birk, Æl, Avnbøg) eller *tvebo* (Pors, Piil, Poppel), og nogle Planter have kun Hanblomsterne ordnede i Rakler, medens Hunblomsterne ere stillede i en anden Blomsterstand (f. Ex. Corylus, Juglans).

Randblomst (s. p. 554).

Randkrone. Kronen af Randblomsterne er ofte af forskjellig Form fra Skiveblomsternes, f. Ex. de udstraalende tungeformede Kroner hos Aster, Chrysanthemum o. fl., hvis Skivekroner ere regelmæssig rørformede.

Randhaaret (ciliatus) er et fladt (alm. bladagtigt) Organ, naar samme i Randen er forsynet med Haar, medens den øvrige Flade enten er glat eller svagere haaret.

Ranke (sarmentum), overjordiske Sidegrene fra Rodstokken af Fragaria, Potentilla reptans o. fl., som ved Ledene ere bladbærende og rodslaaende, men forøvrigt bladløse.

Regelmæssig eller **regelret** (regularis) kaldes et Blomsterdække (Bæger eller Krone), hvis enkelte Dele ere lige i Form og Størrelse, ligesom ogsaa Mellemrummene mellem Bladene eller Fligene ere ligestore. Ere Delene derimod ulige i Form eller Størrelse, kaldes Blomsten *uregelmæssig* (irregularis).

Retnervet (rectinerviis) er et Blad med flere ugrenede Nerver, som løbe i en ret Linie og oftest parallelt fra Grunden til Spidsen (f. Ex. hos de fleste Græsarter).

Ribbe (costa) kaldes en fremspringende Linie, oftest hidrørende fra Nerver eller sammenstødende Bladrande langs nedad en af sammenvoxne Blade dannet Plantedeel, f. Ex. Bæger, Frugt o. s. v. Paa Skjærmpflanternes undersædige (med Bægerrøret sammenvoxne) Frugter findes hos hver Slægt et bestemt Antal R., og man skjelner mellem *Hovedribberne* (alm. 5, dannede af Nerverne) og *Biribberne* (alm. 4, dannede af de nedløbende og sammenvoxne Bladrande).

Riflet (tesselatus) er en Plantedeel, som er forsynet med fremspringende Linier eller Længdeujævnheder, som i forskellige Retninger krydse hverandre.

Rod (radix), Plantens nedadvokende, foroven alm. tykkere og forneden tilspidse Axedeel. Fra Rodens Hovedaxe eller Rodhalsen udgaae Grene og finere Trævler, stundom meget fine *Rodhaaar*.

Rodblade (folia radicalia), de nærmest ved Roden stillede, egenlig fra Stængelens nederste eller underjordiske Deel udgaaende Blade, som i Regelen ere forskjellige fra de langs opad Stængelen siddende Blade.

Rodhals kaldes den ofte indsnørede Grændseflade mellem Stængelen og Roden.

Rodhætte (spongiola radicalis), en Overhuddannelse, som hos mange Planter mere eller mindre løst omgiver de yngste Spidser af Rodtrævlerne (f. Ex. hos Lemna).

Rodskud (turio), s. *Aarsskud*. Ogsaa hos de urteagtige vedvarende Planter kaldes de Knopper fra Rodstokken, som efter Vinterhvilen udvikles og danne nye Stængler, Rodskud.

Rodslaaende (radicans) = krybende.

Rodstok eller **Mellemstok** (rhizoma) kaldes hos vedvarende Planter den under Jorden nedsænkte, vedblivende Deel af Stængelen, i Modsætning til den overjordiske, aarligt bortdøende Stængeldeel. Den nedsender Rødder og bærer i Spidsen en eller flere Knopper (s. *Rodskud*), som udvikles til overjordiske Stængler.

Rodtrævler (s. *Rod*).

Rosette stillede (rosulati) kaldes Blade, som, udgaaende fra en Stængeldeel med med meget forkortede Ledstykker, ere meget tæt sammenhobede og udbrede sig i forskellige Retninger. Oftest forekomme slige Bladrossetter ved Grunden af Stængelen (Rodblade).

Ru (scaber) er Overfladen af en Plantedeel, naar samme ved talrige korte og stive Børster eller Vorter viser sig meget ujævn ved Berøring.

Rudeformet (rhomboides) er en Bladplade, som begrænses af 4 rette eller næsten rette Linier, der i Spidsen og ved Grunden danne spidse Vinkler, medens de 2 mellemliggende Vinkler ere stumpede (f. Ex. hos flere Atriplex-Arter).

Runddelende (loculicidus) kaldes Opspringningen af Kapselfrugterne, naar disses Frugtblade halveres og adskille sig i Rygsømmene, medens Vægsømmene forblive sammenvoxne og Klapperne derfor hyppigt langs deres Midtlinie bære den fremspringende Plade af Skillevæggen, Vægsømmens Fortsættelse (f. Ex. Syringa, Oenothera, Tulipa).

Rundbugtet (repandus) er Randen af et bladagtigt Organ, naar samme er begrændset af en Bølgelinie med meget svage, men brede Indsnit (f. Ex. Ajuga reptans, Blitum glaucum).

Rundtakket (crenatus) kaldes Bladranden, naar den er afbrudt af korte, spidse Indsnit, og de derved frembragte udstaaende Takker ere afrundede.

Rygsøm (sutura dorsalis) s. *Søm*.

Rynket (rugosus) er Overfladen af en Plantedeel, som er ujævn af fremspringende, bu- eller bølgeformede og alm. uregelmæssige Linier. (Oftede ere disse Linier frembragte ved Tørring).

Rør (tubus) kaldes den nedre, sammenvoxne Deel af det sambladede Bæger eller Krone, i Modsætning til den frie Deel (Kraven).

Rørformet (tubulosus) kaldes Blomsterdækket, naar Røret jævnt og uden kjendelig Indsnøring gaaer over i den alm. oprette eller kun lidet udstaaende Krave (f. Ex. *Primula officinalis*, Skivekronerne hos flere Kurvblomstrede).

S.

Saftplet (gynizus), Arret hos Orchideæ i Form af en Plet eller Fordybning, som er uden Overhud og afsondrer en Vædske (f. Ex. stort hos *Platanthera* o. fl.).

Samladet (gamopetalus eller -sepalus) kaldes Krone eller Bæger, naar deres Blade forneden ere sammenhængende og danne et Rør.

Sammensat Blad (folium compositum) er et Blad, bestaaende af flere Smaablade, som ere tilleddede til en fælles Bladstilk, fra hvilken de løsnes og affalde naar Bladet visner. Smaabladene ere ofte forsynede med en særlig Smaabladstilk, deres Ordning paa den fælles Bladstilk er forskjellig (s. *fingeret*, *finnet* og *hjuldannet*). *Dobbelt sammensat* er Bladet, naar Smaabladene atter ere sammensatte (f. Ex. dobbelt finned Blade hos *Acacia lophantha*).

Saugtakket (serratus) er Bladranden, naar de korte og ikke dybe Indsnit i samme ere spidse og de af Indsnittene begrænsede Takker ligeledes spidse og vende opad mod Bladets Spidse.

Seglformet (falcatus), jævnt bøiet i en halvmaaneformet Bue (f. Ex. Dækbladene af *Callitriche hamulata*, Bællerne af *Medicago falcata*).

Siddende eller stilkløs (sessilis) kaldes Bladene naar Bladstilken, og Blomsterne naar Blomsterstilken mangler.

Sideliggende kaldes *Knopleiet*, naar Bladenes Rande i Knoppen støde sammen uden at dække hinanden, og *Kimen*, naar denne i Forhold til Frøhviden er saaledes beliggende, at de indtage en Plads ved Siden af hinanden.

Sidestillet (lateralis) s. *endestillet*.

Silkehaaret (sericeus), beklædt med bløde, korte og tiltrykte Haar, som give vedkommende Plantedeel en silkeagtig Glands.

Skaal (cupula) er den for en Deel af Rakletræerne eiendommelige Dækbladform, hvor en eller flere Nødfrugter ere enten ved Grunden eller heelt omgivne af en kopformet eller kapsellignende Udvidelse af Blomsterstilken, der bærer et større Antal skjælfornede Dækblade (f. Ex. *Quercus*, *Fagus*, *Castanea*).

Skaft (scapus), en Blomsterstængel uden Grene og oftest uden eller med ufuldkomne Blade (f. Ex. *Taraxacum officinale*, *Narcissus*, *Allium*).

Skal (testa), Ægets Hinder, som ved Frøets Modenhed danne en tæt og fast, ofte haard Beklædning omkring Kjærnen.

Skalfrugt (achænium), en undersædig, nødagtig Frugt, som er beklædt med Bagerørret og ofte bærer en vedblivende Bagerkrave foroven.

Skede (vagina), Bladets nederste, ofte stærkt udvidede Deel, som sjeldnere er fladt udbredt, men hyppigere omgiver Stængelen enten heelt eller tildeels (f. Ex. Græsarter, Halvgræs og Skjæmplanter).

Skedehinde (ligula), et hindeagtigt Legeme mellem Skeden og Pladen af Græsarternes og Halvgræsarternes Blade; dens Form, Længde og Retning er meget forskjellig og ofte af Betydning for Arternes Bestemmelse.

Skillevæg (dissepimentum), en Flade, som begrænder og adskiller til hinanden stødende Naborum, f. Ex. i Rodstokken af *Cicuta virosa*, Bladene af *Juncus lamprocarpus*. Særligt betegnes derved de Flader, som i Frugter med 2 eller flere Rum adskille disse indbyrdes. Sk. kunne være fuldstændige eller ufuldstændige (det sidste f. Ex. hos *Papaver*).

Skillevægbydende (septifragus) kaldes Opspringningen af flere kapselagtige Frugter, hvor Klapperne (o: Frugtbladene) ved Modningen løsne sig fra den vedblivende Skillevæg (f. Ex. hos *Korsblomsterne*).

Skillevægdelende (septicidus) er den Opspringningsmaade, hvorved Frugtbladene ved Modningen adskille sig i deres naturlige Sammenføjningslinie, idet de af 2 Nabofrugtblades Sammenvoxning opstaaede Skillevægge halveres (f. Ex. *Digitalis*).

Skiveblomst } s. p. 564.
Skivekrone }

Skjoldformet (peltatus) er et Blad, hvis Stilk er tilhæftet indenfor Randen, alm. henimod Midten af Pladen, hvorved dennes Omrids som oftest bliver kreds rundt (f. Ex. *Hydrocotyle vulgaris*, *Tropæolum majus*).

Skjæghaaret (barbatus) kaldes et Organ, som er beklædt med knippeformigt fra eet enkelt Punkt udgaaende Haar (f. Ex. *Støvknapperne* af *Odontites*, *Griffelen* af *Vicia*).

Skjæl (squama): 1, Overhuddannelser, som beklæde Planten og nærmest ere at ansee for omdannede Haar (f. Ex. hos *Hippophaë rhamnoides*, flere *Brægger*); 2, skædeformede Blade uden Plade og oftest af en ikke grøn Farve (f. Ex. hos *Asparagus*, *Orobanche*); 3, Dækbladene hos *Carex*, *Rakletræer* o. s. v.

Skjærm (umbella), en forkortet Blomsterstand med stilkede Blomster, som udgaae fra eet Punkt og alm. naae lige høit. S. kan være enkelt eller sammensat, i sidste Tilfælde kaldes de secundære ligeledes skjærmformede Blomsterstande *Smaaskjærme* (f. Ex. hos *Umbelliferæ*).

Skulpe (siliqua), en kapselagtig Frugt med 2 Rum, adskilte ved en hindeagtig Skillevæg, som tilligemed de vægstillede Frøstole bliver staaende tilbage naar Klapperne (Frugtbladene) ved Modningen adskille sig franedes paalangs og falde af. *Smaaskulpe* (silicula) er en Form af S. med omtrent lige stor Længde og Brede, hos *Stor-skulpen* er Længden meget større end Bredden. *Ledskulpen* aabner sig ikke paalangs, men der dannes i denne Indsnøringer paatværs mellem de enkelte Frøe (f. Ex. *Raphanus Raphanistrum*).

Skulpeformet (siliquæformis) kaldes Kapselen hos *Chelidonium*, som opspringer paa samme Maade som Skulpen, men mangler Skillevæg og som Følge deraf er enrummet.

Slyngende (volubilis), en Stængel, som snoer sig omkring fremmede Gjenstande og derved holder sig opreist uden særlige Redskaber (s. *Klattrende*), men ved Stængelens egen Spiralkraft, enten tilhøre (f. Ex. *Humulus*) eller tilvenstre (f. Ex. *Phaseolus*).

Slyngtraad (cirrus), et spiralformig snoet Hæfteredskab, som tjener til at holde de klattrende Planter fast ved fremmede Gjenstande. Ifølge dens forskellige Plads paa Planten kan Slyngtraaden snart udledes af en omdannet Green eller Blomsterstilk, snart af et Blad eller Axelblade (*Vitis*, *Vicia*, *Bryonia*).

Slør (indusium) kaldes et hindeagtigt Legeme paa Underfladen af flere Brægners Løv, som løsriveres fra Overhuden ved Grunden af Frugthobene (s. p. 750) og omgiver disse indtil Sporehusenes Modenhed, da de falde af. Nogle Brægner mangle S., hos andre erstattes det af Løvet's tilbagebøiede Rand (falsk S.).

Smaaax (s. *Ax*).

Smaaaxelblade eller **Smaabiblade** (s. *Axelblade*).

Smaablade (foliolum) s. *sammensat Blad*.

Smaablomsterstilk (s. *Blomsterstilk*).

Smaafrugter (carpidia, mericarpia) benævnes i en fleerfoldig Frugt eller Spaltefrugt de enkelte selvstændige Frugter af forskjellig Art, som udvikles indenfor eet Blomsterdække (f. Ex. Aquilegia, Anemone, Acer, Skjærplanter).

Smaaskjærm (s. *Skjærm*).

Smalvægget (angustiseptus), s. p. 470.

Snitdeelt (sectus) kaldes Bladets Indskjæring naar denne naaer lige indtil eller næsten til Midtnerven (fjersnitdeelt) eller til Grunden (haand- eller fodsnitdeelt). De Stykker, hvori Bladet er deelt, kaldes *Afsnit*, disse blive ikke, naar Bladet visner, adskilte fra den fælles Bladstilk, men vedblive fastsiddende paa denne. Dobbelt eller fleerdobbelt s. ere Bladene, naar Afsnittene ere yderligere deelte paa denne Maade en eller flere Gange (f. Ex. hos flere Skjærplanter).

Spadeformet eller **Spatelformet** (spathulatus), fra en smal og forlænget Basis jævnt udvidende sig til en budt eller afrundet Spidse (f. Ex. Bladene af Bellis perennis, Kronbladene af Rubus saxatilis).

Spaltefrugt (schizocarpium), en Frugt bestaaende af flere Frugtblade, som før Modenheden ere sammenhængende, men ved Modningen adskilles i lige saa mange selvstændige Frugter som der er Frugtblade tilstede. (S. er *todelelig* hos Acer, Mercurialis, *tredelelig* hos Euphorbia, *firedelelig* hos Labiatæ og Asperifoliæ, mangedelelig hos Malva).

Spore (calcar), en tilspidset, alm. kegleformet, ret eller bøiet Tilhængsel til et eller flere af Blomsterdækkets Blade (f. Ex. hos Bægeret af Delphinium, Kronen af Linaria, Blomsterdækket af Orchis).

Sporer (sporæ, sporidia) kaldes de encellede Formeringsorganer hos de saakaldte Sporeplanter; de ere enten frie eller indesluttede i et Gjemme, *Sporehuus* (sporangium).

Spredte (sparsa) kaldes Blade eller Grene, naar der af disse kun udgaaer eet fra hvert Led, i Modsætning til de modsatte eller krandsstillede Blade, hvor flere Blade udgaae i lige Høide fra samme Led. De spredte Blade ere hyppigst ordnede i et bestemt Talforhold, idet de enten udgaae i 2 ($1\frac{1}{2}$), 3 ($1\frac{1}{3}$) eller 5 ($2\frac{2}{5}$) sjældnere i endnu flere forskellige Retninger.

Spydformet (hastatus) er Bladet, naar fra dets Basis udgaaer 2 større fremspringende Lapper, en til hver Side, som danne en ret Vinkel med Bladets Midtnerve (f. Ex. Blitum bonus Henricus, Rumex acetosella).

Stak (arista) er en lang og tynd, tilspidset og ofte stikkende Tilhængsel paa Blomstens forskellige Dele eller Bladene; især er Stakken almindelig paa Græsarternes (nedre) Inderavne, hvor den

enten danner en ligefrem Fortsættelse af Avnens Spidse (Byg) eller træder ud nedenfor Spidsen, fra Midten eller fra Grunden (Bromus, Avena). *Stakbærende* (aristatus) kaldes en med Stak forsynet Plantedeel, *stakløs* (muticus) en Plantedeel som mangler S.

Steenfrugt (drupa), en oftest enfrøet, uopspringende Frugt med tynd Overhud, kjødfuld og saftigt Mellemlag, hvis indre Parti er haardt og træagtigt (Stenen). S. er enkelt hos Prunus, Juglans, *sammen-sat* (fleerfoldig) hos Rubus.

Steenbær (pyrenium) kaldes Frugten hos Ilex o. fl., den er forskellig fra Steenfrugten derved, at den har flere Frøe og flere Rum med haarde, ofte træagtige Skillevægge.

Steenæble (s. *Æblefrugt*).

Stivhaaret (hispidus) kaldes Plantedelenes Beklædning, naar Haarene ere stive og udstaaende.

Stjernehaar kaldes Haar, som fra Grunden af ere forgrenede, med Grenene straaleformigt udgaaende til forskjellige Sider og alm. tiltrykte til den Plantedeel, de beklæde (f. Ex. Bladene af Potentilla incana, Malva Alcea).

Storskjærm s. *Skjærm*.

Straa (culmus), Græsarternes Stængel, som har forlængede, indvendig hule Ledstykker, adskilte fra hinanden ved opsvulmede Led og med spredte, omskedende Blade.

Straaleblomster kaldes de Kurvblomstredes Randblomster, naar disse have tungeformede Kroner, medens de indre (Skiveblomsterne) ere rørformede (Blomsterkurven kaldes i dette Tilfælde *udstraalende*).

Stængel (caulis), Plantens opadvokende Axedeel, som bærer Knopper, Blade og Blomster.

Stængelblade (s. *Rodblade*).

Støv eller Blomsterstøv (s. *Støvdrager*).

Støvblomst (s. *Hanblomst*).

Støvdrager (stamen), det mandlige Befrugtningsorgan i Blomsten, bestaaende af *Støvtraaden* (filamentum) den nedre, smalere, ofte traadformede Deel, *Støvknappen* (anthera), den øvre, bredere Deel, oftest bestaaende af 2 Rum, som ved Bestøvningen aabne sig, og *Støvknappbaandet* (connectivum), en Fortsættelse af Støvtraaden igjennem Støvknappen, hvis Rum det adskiller. I det Indre af Rummene indeholdes *Blomsterstøvet* (pollen), fine Korn af forskellig Form, bestaaende af en enkelt Celle omgivet af 2 Hinder.

Støvholder (retinaculum) er en klæbrig Kirtel ved Grunden af Støvmasserne hos Orchidæe og Asclepiadæe; ved denne fastklæbes Støvmasserne til Griffelstøtten.

Støvknep (s. *Støvdrager*).

Støvmasse (pollinium) kaldes Støvet hos enkelte Familier (Gjøggeblomster og Svalerodsfamilien), naar dets enkelte Korn ikke ligge frie og indbyrdes adskilte, men ved et klæbrigt Stof ere forenede til en sammenhængende, kornet eller voxagtig Masse.

Støvtraad (s. *Støvdrager*).

Støvvei (pistillum), Blomstens kvindelige Befrugtningsorgan, dannet af et eller flere Frugtblade og bestaaende af Frugtknude, Griffel og Ar (s. d. A.).

Svælg (faux) er det Sted i det Indre af et sambladet Blomsterdække, hvor Rør og Krave støde sammen.

Svælgkrands (coronula), en i Svælget befæstet krandsformet Bikrone (f. Ex. hos Narcissus).

Sværdformet (ensiformis) er et overalt ligebredt (kun foroven spidst udløbende) Blad, der ikke, som Græsbladene, vender Fladerne op- og nedad, men tilhøre og tilvenstre for Axen, som det omfatter med en tveægget skedeformet Basis. Imod Spidsen er det stundom bøiet i Sabelform (f. Ex. Iris, Narthecium).

Svøb (involucrum) kaldes en Samling af krandsstillede Dækblade (Svøbblade), som omgive en sammentrængt Blomsterstand (Skjærm eller Hoved, f. Ex. hos Primula, Jasione). Er Blomsterstanden sammensat, kaldes de ved Grunden af dens første Forgrening stillede Svøbblade *Storsvøb*, de ved Grunden af Smaablomsterstandene stillede *Smaasvøb* (involucellum) f. Ex. hos Skjærplanterne.

Sylformet (subulatus) er et Blad, som er stift og temmelig kort, begrændset af 2 rette Linier og fra en bredere Basis jævnt udløbende i en Spids (f. Ex. Juniperus).

Særkjønnet (diclinis) er en Blomst, hvis Befrugtningsorganer (Støvdragere og Støvveie) ikke ere samlede indenfor eet Blomsterdække, men ere fordeelte i forskellige Blomster, enten paa een eller to Planter (s. *Enbo* og *Tvebo*).

Søm (sutura) kaldes fremspringende Linier paa Overfladen af Frugtknuden eller den modne Frugt, de gaae hyppigst paalangs og ere da enten opstaaede af Frugtbladernes Midtnerve (*Rygsøm*), af deres sammenstødende Rande (*Bugsøm*) eller af 2 til hinanden stødende Frugtbladets Adskillelseslinie (*Vægsøm*).

T.

Tandet (dentatus) er et bladagtigt Organ med korte og brede Indskjæringer i Randen, hvorimod de mellem Indskjæringerne fremragende Stykker ere spidse (f. Ex. Bladene af Tussilago).

Tilbagerullet (revolutus) kaldes et Blad (i Modsætning til *indrullet*), naar den Bue, som Bladets Rande danne med dets Midtlinie, vender Haulheden bort fra Plantens Axe (f. Ex. Bladene af Vaccinium Oxycoccus, Carex stricta).

Tilhængsel (appendix) kaldes Udvidelser af forskjellig Form udenfor en Plantedeels normale Omkreds (f. Ex. Sporen hos Orchis, Viola, Skjæl i Kronrøret af Symphytum, Lapper ved Grunden af Bægerbladene eller Bægerfligene hos Viola og Campanula).

Tilspidset (acuminatus) benævnes et Organ, som foroven udløber i en spids Vinkel med forlængede Sider, og som alm. er pludselig udtaget udover Organets Flade (f. Ex. Bladene af Salix cuspidata, Fagopyrum tataricum).

Tolæbet (bilabius, labiatus) kaldes en særegen Form af det uregelmæssige Blomsterdække (Bæger eller Krone), hvis Blade eller Fligene vendte i 2 hinanden modsatte Retninger, det ene opad (*Overlæben*), det andet nedad (*Underlæben*). Bruges fortrinsviis om Størstedelen af Planterne i Linnés 14de Classe (Læbe- og Maskeblomstrede). Den tolæbede Krone har alm. en tvedeelt Overlæbe,

tredeelt Underlæbe, hvorimod det omvendte Forhold findes hos det læbedannede Bæger.

Tomægtig (didynamus) kaldes Støvdragerne, naar 2 ere længere, 2 kortere (f. Ex. *Lamium*, *Linaria*).

Top (*panicula*), en Blomsterstand med forlænget Hovedaxe og lange, grenede, oftest mangeblomstrede Sideaxer, som aftage i Længde nedefra opefter, hvorfor Blomsterstanden alm. bliver pyramideformet (f. Ex. *Avena*, *Poa*, *Alisma*).

Topskydende eller topspirende (*prolifer*) er en Plante, hvis Blomster heelt eller tildeels omdannes til Blade (hyppigt er det Følge af en Misdannelse, normalt er det Tilfældet hos *Polygonum viviparum*, *Poa bulbosa* var. *vivipara*).

Toradet (*distichus*) ere Blad- eller Blomsterdele, naar de ere regelmæssigt ordnede i 2 Rækker langs en Midtlinie (f. Ex. *Smaaaxene* hos *Hordeum distichum*, Bladene hos *Taxus*, Sporehusene hos *Ophioglossum*).

Tornet (*spinosa* v. *aculeatus*), s. *Vedtorn* og *Barktorn*. *Tornløs* (*inermis*) betegner Mangelen af Torne hos en Plante eller Plantedeel.

Tragtformet (*infundibularis*) kaldes en regelmæssig sambladet Krone, hvis Rør fra en smalere Basis gaaer jævnt og umærkeligt over i en udvidet Krave (f. Ex. *Datura*, *Convolvulus*).

Trekoblet (s. *fingret*).

Trævlerod (*radix fibrosa*) er en af flere, omtrent ligestore Rodtrævler (Birødder) dannet Rod, som udgaaer fra Rodstokken, medens Rodens Hovedaxe ikke er udviklet.

Tueformet (*cæspitosus*) kaldes Planten, naar et stort Antal Stængler (og alm. tillige Rodblade) udgaae fra eet Punkt (f. Ex. *Carex cæspitosa*, *stricta*, *Aira cæspitosa*).

Tungeformet (*lingulatus*) er en sambladet uregelret Krone, hvis Krave er sammenvoxet til eet Stykke næsten til Spidsen og udbredt, oftest vandret, til den ene Side (f. Ex. *Smaablomsterne* hos *Cichoraceæ*, *Randblomsterne* af *Aster*, *Calendula* o. fl.).

Tvebo (*dioecus*), Særkjønplanter med Han- og Hunblomsterne fordeelte paa 2 forskellige Planter.

Tvekjønnet (*hermaphroditus*) er Blomsten, naar Støvdragere og Støvveie findes samlede indenfor eet Blomsterdække.

Tværskillevæg kaldes den Væg, som adskiller Tværrummene i de saakaldte Ledbæller og Ledskulper (f. Ex. *Ornithopus*, *Raphanus Raphanistrum*).

Tværstillet (*transversus*, *versifolius*) er en Plantedeel, som er stillet paa en fra den sædvanlige Stilling afvigende Maade, idet den skarpe Kant vender i den ellers for Pladen almindelige Retning (f. Ex. *Smaaaxene* hos *Lolium*, Bladene af *Lactuca Scariola*, Bladstilken i Forhold til Pladen hos *Populus*).

U.

Udløbere (*stolones*), underjordiske, mere eller mindre vidtkrybende Sidegrene fra Stængelens nedre Deel eller Rodstokken (f. Ex. *Agropyrum repens*, *Epilobium palustre*).

Udrandet (*emarginatus*) er en Plantedeel, som i den forøvrigt afrundede

Spidse har et oftest svagt Indsnit eller Indtryk (f. Ex. Skulpen hos Thlaspi arvense, Smaabladene af Vicia sativa).

Udstraalende (s. *Straaletblomster*).

Ufuldstændig (incompletus) kaldes en Blomst, naar enten et eller begge Blomsterdækker eller et eller begge Kjøn mangle.

Uldhaaret (lanatus, lanuginosus), beklædt med bløde og slappe, oftest meget krusede Haar.

Uligeffnet (s. *finnet*).

Underbæger (hypanthium) kaldes i en oversædlig eller omkringsædlig Blomst den nedre Deel (Røret) af Bægeret, naar dette har lukket sig omkring og omslutter Frugtbladene, saa at det ved Modningen ofte synes at udgjøre en Deel af Frugten (f. Ex. Rosa, Pomaceæ).

Underlæbe (s. *Tolæbet*).

Undersædlig (inferus) kaldes *Blomsten*, naar dens Dele sidde i deres naturlige Stilling, saaledes at Bægeret er nederst (eller yderst), derpaa Krone, Støvdragere og øverst (i Midten) Støvveien. *Frugten* kaldes derimod u., naar det modsatte Forhold finder Sted (s. *oversædlig Blomst*).

Uregelmæssig (s. *regelmæssig*).

Urteagtig (herbaceus) s. *bladagtig*. Bruges desuden om Stængler (mods. træagtig) og betegner da, at Stængelens Dele ere forholdsvis bløde og af kort Varighed.

V.

Vandgreen (flagellum), bladbærende og langs Jorden udstrakte, men ikke rodslaaende Sidegrene (f. Ex. af Ajuga reptans, Hieracium Pileosella).

Vedtorn (spina), en tilspidset, stikkende Green (f. Ex. hos Prunus spinosa, Cratægus Oxyacantha), sjældnere et i Form af en spids Torn omdannet Blad (f. Ex. Berberis, Ulex).

Vinger (alæ) kaldes de 2 midterste, indbyrdes eens og ligeoverfor hinanden stillede Kronblade i en Ærteblomst.

Vingefrugt (samara), en nødagtig, oftest enfrøet Frugt med hindeagtigt eller læderagtigt Frøgjemme, som er udvidet i Form af en Vinge til een eller flere Sider (f. Ex. Acer, Ulmus, Fraxinus).

Vinget (alatus) kaldes Stængelen, naar Bladene ere nedløbende og derved danne en smalere eller bredere, fladt udbredt bladagtig Rand langs nedad Stængelen (f. Ex. Lathyrus silvestris, Onopordon Acanthium).

Vægstillet (parietalis) kaldes Frøstolen i en Frugt, naar den er beliggende i Frugtens Omkreds og ikke i dens Axe.

Vægsom (s. *Søm*).

Y.

Yderbæger (calyculus) s. *Bibæger*.

Yderavne (s. *Avne*).

Æ.

Æblefrugt (pomum), en undersædlig Frugt med kjødfuldt, mod Frugtmodningen tilvoxende Underbæger, i hvilket Frugtbladene ere ind-

sænkte. Ere Frugtens Rum enfrøede, med træ- eller beenhaarde Vægge, kaldes den et *Steenæble* (f. Ex. *Cratægus*, *Mespilus*), ere de fleerfrøede, med læder- eller hindeagtige Vægge, et *Kjerneæble* (f. Ex. *Pyrus*).

Æg (ovulum) er et i Frugtknudens Indre paa Ægstolen udvoxende Legeme, dannet af en Ægkjerne og 1 à 2 Æghinder; efter Befrugtningen udvikles Æ. til Frøet.

Ægformet (ovatus) kaldes en Plantedeel, som er afrundet ved Basis og spids foroven, med den største Brede nedenfor Midten (f. Ex. Bladene af *Pulmonaria officinalis*, Frugten af *Castanea*).

Ægstol (s. *Frugt*).

Ægstræng (funiculus umbilicalis), en smal, oftest traadformet Stræng, ved hvilken Ægene (eller Frøene) ere befæstede til Ægstolen.

Ærteblomst (s. p. 456).

Ø.

Øret eller øreformet (auriculatus) kaldes et Blad, som foruden en større Endeflig eller Endeafsnit har 2 mindre Flige eller Afsnit (ligesom Ører) ved Grunden (f. Ex. *Senecio aquaticus*, *Centaurea Jacea*).

Tabel

over det linnéiske System.

I. Classer.

Tydelig Modsetning mellem ♂ og ♀ (Støvdragere og Støvveie).	Blomsterne tvekjønnede.	Støvdragerne adskilte fra Støvveien.	Støvdragerne indbyrdes frie.	Støvdr. af lige eller ubestemt Længde.	med 1 Støvdr.	1 Cl. <i>Monandria</i> (Enhannede).
					- 2 —	2 — <i>Diandria</i> (Tohannede).
					- 3 —	3 — <i>Triandria</i> (Trehannede).
					- 4 —	4 — <i>Tetrandria</i> (Firehannede).
					- 5 —	5 — <i>Pentandria</i> (Femhannede).
					- 6 —	6 — <i>Hexandria</i> (Sexhannede).
					- 7 —	7 — <i>Heptandria</i> (Syvhannede).
					- 8 —	8 — <i>Octandria</i> (Ottehannede).
					- 9 —	9 — <i>Enneandria</i> (Nihannede).
					- 10 —	10 — <i>Decandria</i> (Tilhannede).
				Støvdr. i bestemte Forh. uligelange.	- 11-20 —	11 — <i>Dodecandria</i> (Tolvhannede).
					- 20 el. flere Støvdr.	
					paa Bæg.	12 — <i>Icosandria</i> (Bægerhannede).
					- 20 el. flere paa Frugt-	
					bunden . .	13 — <i>Polyandria</i> (Mangehannede).
					- 4 Støvdr., de 2 længere, de 2 kortere . .	14 — <i>Didynamia</i> (Tomægtige).
					- 6 Støvdr., de 2 længere, de 2 kortere . .	15 — <i>Tetradynamia</i> (Firemægtige).
					med Støvtraadene i 1 Bundt . .	16 — <i>Monadelphia</i> (Enknippede).
					- Støvtraadene i 2 Bundter .	17 — <i>Diadelphia</i> (Tveknippede).
					- Støvtraadene i flere Bundter	18 — <i>Polyadelphia</i> (Fleerknippede).
			Støvdr. indbyrdes samneuvoxne.	Støvknapp. befæst. til Støvveien	- Støvknapperne i et Rør . . .	19 — <i>Syngenesia</i> (Rørhannede).
					20 — <i>Gynandria</i> (Hunbo).	
					♂ og ♀ Blomster paa samme Pl.	21 — <i>Monoecia</i> (Enbo).
					♂ og ♀ Blomster paa forskj. Pl.	22 — <i>Dioecia</i> (Tvebo).
					♂ og ♀ Blomster paa samme eller forskellige Planter . .	23 — <i>Polygamia</i> (Fleerbo).*)
					24 — <i>Cryptogamia</i> (Lønbo).	

*) Ifølge almindelig Vedtægt bliver denne Classe nu i Almindelighed inddraget og de til denne hørende Slægter fordeelte i andre Classer, hvorved Antallet af linneiske Classer bliver 23 og ikke 24, som i Systemets oprindelige Skikkelse.

II. Ordener.

1. I de første 13 Classer bestemmes Ordenen efter **Støvvelenes Antal**, saaledes at naar *flere Frugtknuder* med særskilte Grifler findes i en Blomst, angiver disses Tal Ordenen; er kun 1 Frugtknude tilstede; tælles *Griflerne*, og hvis Griflerne mangle, *Arrene*, f. Ex.
 1. Orden: *Monogynia* (Enhunnede) med 1 Griffel.
 2. — *Digynia* (Tohunnede) med 2 (Frugtknuder), Grifler (eller Ar).
 - n. — *Polygynia* (Mangehunnede) med ∞ Grifler.
2. I 14de og 15de Classe bestemmes Ordenen efter **Frugtens Beskaffenhed**; enhver af disse Classer har 2 Ordener:
 - a) 14. Kl. 1 Orden: *Gymnospermia* (Spaltefrugtede) med 4, mod Modningen adskilte, enfrøede, uopspringende Smaafrugter.

- - 2 — *Angiospermia* (Kapselfrugtede) med 1 fleerfrøet Kapsel.
 - b) 15. - 1 — *Siliculosa* (Smaaskulpede) Frugten (Skulpen) kort i Forhold til Bredden.

- - 2 — *Siliquosa* (Langskulpede) 'Skulpens Længde betydeligt større end Bredden.
3. I 16—18de Classe angiver **Støvknappernes Antal** Ordenen, f. Ex.:

Tetrandria (Firehannede) med 4 frie Støvknapper.

Hexandria (Sexhannede) med 6 frie Støvknapper.

Polyandria (Mangehannede) med ∞ frie Støvknapper.
4. I 19de Classe bestemmes Ordenen efter **Forholdet mellem Rand- og Skiveblomsterne**. Følgende Ordener findes:
 1. Orden: *Syngenesia æqualis* (Lige Sambo) med alle Blomsterne i Kurven ♂.
 2. — *S. superflua* (Overflødig Sambo). Skiveblomsterne ♂, Randblomsterne ♀.
 3. — *S. frustranea* (Unyttig Sambo) Skiveblomsterne ♂; Randblomsterne kjønsløse.
 4. — *S. necessaria* (Nødvendig Sambo). Skiveblomsterne ♂, Randblomsterne ♀.
 5. — *S. segregata* (Særskilt Sambo). Flere enblomstrede Kurve (med ♀ Blomster) samlede til et Hoved.
 6. — *Monogania* (Særbo). Blomsterne enlige (ikke i Blomsterkurv).

L

5. I 20de til 22de Classe tælles **Støvdragerne** (ligesom i 16—18de Cl.) for at angive Ordenen, f. Ex.:
 1. Orden: *Monandria* (Enhannede), med 1 Støvdrager.
 2. — *Diandria* (Tohannede), med 2 Støvdragere.
 - n. — *Polyandria* (Mangehannede), med ∞ Støvdragere.
 6. I 23de Classe ere Ordenerne følgende naturlige Familier:
 1. *Filices* (Brægner).
 2. *Equisetaceæ* (Padderokker).
 3. *Rhizocarpeæ* (Rodfrugtvæxter).
 4. *Isoëteæ* (Brasenurter).
 5. *Lycopodiaceæ* (Ulvefødder).
 6. *Musci* (Mosser).
 7. *Lichenes* (Lavarter).
 8. *Algæ* (Alger, Vandtarer).
 9. *Fungi* (Svampe).
-

Tabel

over det naturlige Systems Hovedrækker.

I. *Thallophyta* (Løvplanter).

I Regelen ingen Karbundter mellem Cellevævet og ingen Modsætning mellem Stængel og Blade; Formeringsorganerne (Forplantningskorn, Sporer) bestaae kun af een enkelt Celle og mangle Kim. Hos de fleste findes desuden Antheridier med Sædtraade (eller dertil svarende Legemer).

A. *Hysterophyta*.

(Fungi. Svampe.)

B. *Protophyta*.

(Algæ. Vandtarer.)

(Lichenes. Lavarter.)

II. *Cormophyta* (Stængelplanter).

Mere eller mindre fuldkomne Karbundter mellem Cellevævet; Bladene i Regelen tydeligt adskilte fra Stængelen.

A. *Acrobrya* (Bladsporeplanter). Voxe ved Tilsætning af nye Dele i Spidsen af Stængelen. Formeringsorganerne Sporer som hos de foregaaende og Støvkolber (Antheridier), som indeholde Sædtraade.

(Musci. Mosser.)

Lycopodiaceæ, Isoëtæ, Rhizocarpeæ, Filices, Equisetaceæ, Characeæ.

B. *Amphibrya* (Enfrøbladplanter). Stængelen dannet af Cellevæv, som gennemkrydses af Karbundter uden concentrisk Ordning; ingen Adskillelse mellem Bark og Marv; Bladenes Nerver alm. ugrenede; Bladstillingen i Regelen $\frac{1}{3}$ og Blomsten derfor alm. delelig med 3; Frøene udvikles efter forudgaaet Bestøvning ved Pollinarrør; Kimen med 1 udeelt Frøblad.

* Frugten oversædlig.

* Frugten undersædlig.

C. *Acramphibrya* (Tofrøbladplanter). Stængelens Ved dannet af Karbundter og Vedceller i concentriske Aarlag, som adskille det indre Cellevæv (Marven) fra det ydre (Barken); Bladene alm. med forgrenede Nerver, Bladstillingen typisk $\frac{1}{2}$ eller $\frac{2}{5}$ (og Blomstens Tal derfor alm. deleligt med 2 eller 5); Bestøvning og Frøe som foreg. men Kimen deelt i 2 Frøblade.

* Gymnospermæ (Nøgenfrøede).

** Apetalæ (Kronløse).

*** Gamopetalæ (Heelkronede).

**** Eleutheropetalæ (Frikronbladede).

De Planter, der indeholdes i de Afdelinger af Systemet, som her ere indklamrede, ere ikke beskrevne i Haandbogen.

Oversigt

over

de i den danske Flora fundne Planteslægter (med Undtagelse af Svampene), ordnede efter naturlige Familier*).

I. Thallophyta (Løvplanter).

A. Hysterophyta (drage Næring af levende eller døde Organismer).

(*Fungi* (Svampe)).

B. Protophyta (drage Næring af Atmosfæren eller Vandet, ikke af levende eller døde Organismer).

**Algæ* (Alger eller Vandtarer) (*J. G. Agardh*, species, genera et ordines Algarum; *Lyngbye*, hydrophytologia danica; *And.* Atl. tab. 28) Salt- eller Færskvandsplanter, som spire uden forudgaaet Befrugtning eller ved Selvbefrugtning; Forplantningsorganet bestaaer af en enkelt Celle, enten fremkommen parthenogenisk som Produkt af en Celle eller ved flere Cellers Samvirken.

I. *Diatomeæ*. (*Heiberg*, consp. crit. Diat.) Alm. microscopiske Salt- eller Færskvands-Alger, hyppigt encellede, oftest levende i Colonier, samlede i en gleeagtig Masse eller i Traade, frie eller fastsiddende; Cellerne symmetriske, bestaaende af 2 Halvdele, der tilsidst adskilles, oftest incrusterede af Kiseltsyre og omgivne af et Kiselhylster. Forplantningsorganet dannet ved flere Cellers Samvirken (Copulation).

*) Ved Opstillingen af Familierne er i det Væsenlige fulgt *Endlicher's* Genera plantarum. De i () indsluttede Kjendetegn ere i Regelen saadanne, som kun gjælde for de i vor Flora forekommende Slægter, det i [] indsluttede betegner Forhold som kun finde Sted hos udenlandske Slægter. Tallene efter Slægterne angive disses Antal af Arter i Danmark. Saavel Familierne som Slægterne ere betegnede med fortløbende Tal (de første med Romertal, de sidste med alm. Ciffre), men Numereringen er holdt særskilt for Løvplanterne og de Bladsporeplanter, som ikke ere beskrevne i Haandbogen.

1. Melosira	4.	21. Pleurosigma	6.
2. Lysigonium	1.	22. Amphiprora	3.
3. Orthosira	6.	23. Mastogloja	2.
4. Paralia	1.	24. Gomphonema	6.
5. Actinocyclus	1.	25. Cocconeis	2.
6. Biddulphia	1.	26. Surirella	3.
7. Triceratium	1.	27. Campylodiscus	2.
8. Amphitetras	1.	28. Cymatopleura	2.
9. Diatoma	5.	29. Novilla	3.
10. Fragilaria	7.	30. Epithemia	8.
11. Synedra	9.	31. Himantidium	3.
12. Meridion	2.	32. Cymbella	4.
13. Asterionella	3.	33. Amphora	3.
14. Rhabdonema	2.	34. Nitzschia	15.
15. Tabellaria	2.	35. Tryblionella	2.
16. Grammatophora	1.	36. Amphipleura	2.
17. Striatella	2.	37. Achnanthes	1.
18. Podosphenia	1.	38. Achnanthidium	4.
19. Navicula	23.	39. Rhoicosphenia	1.
20. Stauroneis	7.		

II. **Zygnemeæ.** Grønne, ofte microscopiske (Færskvands-) Alger, levende samlede i Colonier, tildeels traadformede, med bløde, cylindriske, prismatiske, sphæriske eller stjerneformede Celler, Forplantningsorganet dannet ved flere Cellers Samvirken (Copulation).

a. *Desmidiæ.* Hyppigst korte, runde eller stjerneformede, med udstaaende Spidser eller Takker, Cellerne symmetriske, bestaaende af 2 Halvdele, som tilsidst adskilles.

40. Euastrum	1.	42. Closterium	1.
41. Cosmarium	1.	43. Desmidium	1.

b. *Conjugatæ.* Oftest traadformede, uden fremstaaende Spidser, Cellerne cylindriske, efter Forlængelsen deelte i 2 Dele, almindeligt sammenhængende efter Delingen.

44. Zygnema	5.	45. Mougeottia	1.
-----------------------	----	--------------------------	----

III. **Oscillatorinæ.** Grønne, traadformede (Salt- eller Færskvands-) Alger, levende i Colonier indeni et geleeagtigt Hylster eller frit, alm. flere samlede, Cellerne (i en vis Periode) med Bevægelsesevne, lange, uledede med en Rad ringformede Celler indenfor en gjennemsigtig Hinde, af hvilken de, flere sammenhængende, glide ud og danne en ny Traad.

- a. *Rivulariaceæ*. Traadene tilspidsede, i et rundagtigt, geleeagtigt Hylster forenede til begrændsede Colonier.

46. *Rivularia* 4.

- b. *Oscillatoriaceæ*. Talrige cylindriske Traade samlede i Hobe eller frie hver for sig, stundom fastsiddende med den ene Ende.

47. *Leiblinia* 3. 51. *Siradium* 1.
 48. *Lyngbyea* 5. 52. *Scytonema* 2.
 49. *Spirulina* 1. 53. *Oscillatoria* 9.
 50. *Calothrix* 2.

IV. **Zoospermeæ**. Alm. grønne (Salt- og Færskvands)-Alger, levende sammen i Colonier indenfor et geleeagtigt Hylster af rund Form eller frie, bestaaende af talrige Celler forenede til en Hinde eller oftere i Traade, ledede, undertiden encellede; Forplantningsorganerne Sværmsporer, dannede parthenogenisk indeni en Celle, eller tillige Coniocyter, der befrugtes ved Paavirkning af en anden Celle og derefter spire.

- a. *Nostochineæ*. Talrige rundagtige, frie eller sammenhængende Celler forenede indeni et rundagtigt, geleeagtigt Hylster.

54. *Protococcus* 1. 56. *Nostoc* 9.
 55. *Palmella* 2.

- b. *Ulvaceæ*. Afrundede eller kantede Celler forenede ved en mere eller mindre tydelig Inter-cellulærsubstans til en Hinde, som kan være flad eller rørformet.

57. *Tetraspora* 6. 60. *Ulva* 3.
 58. *Prasiola* 2. 61. *Porphyra* 2.
 59. *Bangia* 1. 62. *Enteromorpha* 4.

- c. *Hydrodictyeæ*. Afrundet-cylindriske eller kantede Celler, forenede ved Sammenvoxning (nætformigt) til en begrændset Coloni. Sværmsporerne ordnede til en ny Coloni indeni Modercellen.

63. *Hydrodictyon* 1.

- d. *Conferveæ*. Afrundede eller cylindriske Celler, som voxe ved Deling, sammenhængende og danne en enkelt eller grenet Traad. Sværmsporerne udtrænge af Modercellen og spire uden Paavirkning af en anden Celle.

64. *Myxonema* 2. 67. *Conferva* 30.
 65. *Bulbochæte* 1. 68. *Chantransia* 1.
 66. *Oedogonium* 4.

e. *Siphonææ*. En eller fleercellede, udeelte eller grenede, dannede af alm. lange, rørformede Celler.

69. *Vaucheria* 8. 70. *Bryopsis* 1.

f. *Draparnaldieæ*. Stærkt forgrenede, cylindriske, ledede Traade, ligesom indsluttede i et geleeagtigt Overtræk eller uden et saadant, men slibrige. Sværmsporerne stundom indsluttede i særegne Celler.

71. *Chætophora* 2. 73. *Batrachospermum* . . . 2.

72. *Draparnaldia* 1.

g. *Nodularieæ*. Rørformede, tilsyneladende leddede (knudrede) Traade, sammensatte af flere Rækker Cellevæv. Forplantningsorganerne i særegne Celler indeni Traadene.

74. *Nodularia* 1.

V. **Fucoideæ**. Saltvands-Alger, alm. af olivengrøn eller brun Farve og bestaaende af flere Cellelag; tydelige Vegetations- og Forplantningsorganer, disse ere: 1) Sværmsporer, 2) Sporer, enkelte eller flere i et Sporehuus, hos de højere tillige Sædtraade i Antheridier; desuden forekomme hos nogle en Art Yngleknopper, som spire efterat være faldne hele fra Moderplanten.

a. *Løvet leddet.*

75. *Elachista* 3. 78. *Chætopteris* 1.

76. *Ectocarpus* 5. 79. *Cladostephus* 2.

77. *Sphacelaria* 4.

b. *Løvet bestaaende af en Axe og af leddede, fra denne udgaaende Traade.*

80. *Myrionema* 1. 84. *Mesogloja* 2.

81. *Leathesia* 1. 85. *Ralfsia* 1.

82. *Myriocladia* 1. 86. *Chordaria* 4.

83. *Cladosiphon* 1.

c. *Løvet bestaaende af flere Cellelag.*

87. *Punctaria* 2. 95. *Lomentaria* 1.

88. *Asperococcus* 2. 96. *Laminaria* 4.

89. *Striaria* 1. 97. *Alaria* 1.

90. *Dictyosiphon* 1. 98. *Dichloria* 1.

91. *Sitosiphon* 1. 99. *Desmarestia* 1.

92. *Stilophora* 2. 100. *Himanthalia* 1.

93. *Dictyota* 1. 101. *Fucodium* 1.

94. *Chorda* 2. 102. *Fucus* 2.

VI. **Corallineæ**. Alm. røde Saltvands-Alger, Løvet mere

eller mindre haardt af Kalk-Incrustation, oftest skjørt og sammensat af et dobbelt Cellelag; Vegetations- og Forplantnings-Organerne adskilte, de sidste bestaaende af 4 bælteformigt afsondrede Sporer i et Sporehuus.

a. *Løvet leddet.*

103. *Corallina* 1.

b. *Løvet ikke leddet.*

104. *Melobesia* 1.

VII. **Florideæ.** Alm. røde Saltvandsalger, sammensatte af flere Cellelag. Vegetations- og Forplantnings-Organerne stedse adskilte, disse sidste ere dels Sporer, dannede i det periferiske Cellelag (4 i eet Sporehuus), dels Antheridier med Sædtraade, dels Gemmidier: talrige Sporer i et Sporehuus, dannede i Central-Cellelaget.

a. *Gongylospermeæ.* Gemmidiernes Sporehuus omtrent kugleformet, nøgent eller indeni Løvet, sjældent i en Kapsel, enkelt ell. sammensat af flere mindre, indesluttende talrige Gemmidier.

105. <i>Callithamnion</i>	6.	112. <i>Rhizophyllis</i>	1.
106. <i>Griffithsia</i>	1.	113. <i>Cystoclonium</i>	1.
107. <i>Ptilota</i>	1.	114. <i>Ahnfeltia</i>	1.
108. <i>Ceramium</i>	4.	115. <i>Phyllophora</i>	3.
109. <i>Gloiosiphonia</i>	1.	116. <i>Dumontia</i>	1.
110. <i>Schizymenia</i>	1.	117. <i>Rhodymenia</i>	2.
111. <i>Furcellaria</i>	1.	118. <i>Wormskjoldia</i>	1.

b. *Desmiospermeæ.* Gemmidiernes Sporehuus nøgent, indeni Løvet eller i en (saakaldt) Kapsel, bestaaende af leddede Traade i Knipper. Gemmidierne ligge rækkevis langs Traadenes Led eller udvikles kun i det øverste Led.

119. <i>Helminthocladia</i>	1.	125. <i>Polyides</i>	1.
120. <i>Nemalion</i>	1.	126. <i>Laurencia</i>	1.
121. <i>Cruoria</i>	1.	127. <i>Rhodomela</i>	1.
122. <i>Erythroclathrus</i>	1.	128. <i>Odonthalia</i>	1.
123. <i>Gracilaria</i>	1.	129. <i>Polysiphonia</i>	10.
124. <i>Delesseria</i>	2.		

****Lichenes** (Lavarter eller Landtarer) (*E. Fries*, Lichenogr. Europ.; *W. Nylander*, Lichenes Scandin.; *And. Atl.* tab. 28.) Langsomt voxende, hyppigst udviklende sig i Atmosfæren, med oftest centrifugalt, forskelligformet (hinde- eller skorpeagtigt, seigt eller kalkagtigt-skjørt) Løv, bestaaende af et

Barklag og et Mærslag samt et mellemliggende Gonidielag (eller frie Gonidier); Forplantningsorganet Sporer, oftest indsluttede i Sporesække, hvilke tilligemed Saffttraade ere ordnede i et Frugtlag (Sporegjemme), som enten er indsænkt i Løvet eller træder frem paa dettes Overflade i Form af Skaaler, Skjolde eller Kugler o. s. v. I særegne Gjemmer (Sædhuse), som alm. ere vorteformede med en Aabning i Spidsen og nedsænkte i Løvet, findes desuden traadformede Legemer (sterigmata), som synes at repræsentere det andet Kjøn (Antheridier). Spire ved en af traadformede, grenede Celler daunet Forkim.

VIII. **Collemacei** (Slimlav) voxe paa fugtig Grund (nogle endog paa Stene i Vandet); Løvet geleeagtigt, ofte uden Barklag, sort, mørkebruunt eller olivenfarvet, med spredte eller halsbaandformigt sammenhængende Gonidier i det Indre.

- | | | | |
|------------------------|----|------------------------|----|
| 130. Lichina. | 1. | 132. Leptogium | 2. |
| 131. Collema | 7. | | |

IX. **Lichenacei**. (Ægte Lavarter) Løvet fast, af forskellig Form og Farve (kun undtagelsesviis sortagtigt), voxe udenfor Vandet (paa Stene, Jord eller Træbark).

a. *Epiconiodei*. Sporerne 8 i Sporesække, som hurtigt forsvinde, og Sporerne ligge derefter nøgne, i en Masse indenfor kugleformede, stilkede Sporegjemmer.

- | | | | |
|-------------------------|-----|------------------------|----|
| 133. Sphinctrina. . . . | 1. | 136. Trachylia | 3. |
| 134. Calicium | 10. | 137. Sphærophoron . . | 2. |
| 135. Coniocybe | 1. | | |

b. *Cladoniodei*. Sporerne alm. 8, i Sporesække, indenfor alm. hvælvede, stilkede Sporegjemmer, Løvet alm. stærkt grenet, ofte med bladagtige Skjæl ved Grunden og hule eller tragtformede Frugtstilke.

- | | | | |
|-----------------------|-----|-------------------------|----|
| 138. Bæomyces | 3. | 140. Stereocaulon . . . | 5. |
| 139. Cladonia | 22. | | |

c. *Ramalodei*. Sporerne i Sporesække, Sporegjemmerne alm. skaalformede, Løvet bruskagtigt eller traadformig-grenet, uden Skjæl ved Grunden.

- | | | | |
|-------------------------|----|-------------------------|----|
| 141. Usnea | 1. | 144. Ramalina. | 4. |
| 142. Alecatoria | 1. | 145. Cetraria | 2. |
| 143. Evernia | 2. | 146. Platysma. | 5. |

d. *Phyllodei*. Sporegjemmerne skjold- eller skaalformede (hos nogle vorteformede med spiralformede Striber) Løvet fladt, bladagtigt, lappet eller fliget i Omkredsen, alm. med Hæftetraade paa Underfladen.

- | | | | |
|-----------------------|----|-------------------------|----|
| 147. Nephroma | 1. | 148. Peltigera. | 5. |
|-----------------------|----|-------------------------|----|

149. Solorina	1.	153. Parmelia	11.
150. Stictina	1.	154. Physcia	8.
151. Sticta	1.	155. Umbilicaria	2.
152. Ricasolia	2.		

e. *Placodei*. Løvet skorpeformet eller kornet-vortet, alm. fast tilvokset til Underlaget, uden Marvlag, Sporegjemmerne skaalformede eller hvælvede.

156. Psoroma	1.	161. Urceolaria	1.
157. Pannaria	4.	162. Pertusaria	3.
158. Squamaria	1.	163. Phlyctis	2.
159. Placodium	2.	164. Thelotrema	1.
160. Lecanora	21.	165. Lecidea	33.

f. *Graphidei*. Løvet svagt udviklet, ofte skjult under Træernes Bark, Sporegjemmerne stribeformede, aflange, linieformede eller i Bølgelinier, med alm. en Længdespalte i Midten af Skiven.

166. Graphis	1.	168. Arthonia	3.
167. Opegrapha	4.		

g. *Pyrenocarpei*. Løvet af forskjellig Form (stundom skjult under Træbarken eller 0); Sporegjemmerne indsenkede i Løvet eller Underlaget, vorteformede, lukkede eller med en punktformet Aabning i Spidsen, Sporesækkene i et alm. kugleformet Sporeleie indenfor Sporegjemmerne, hurtigt forsvindende, med eller uden Safttraade.

169. Endocarpon	1.	170. Verrucaria	11.
---------------------------	----	---------------------------	-----

II. Cormophyta (Stængelplanter).

A. Acrobrya (Bladsporeplanter).

**Musci* (Mosser). Oftest grønne, befæstede paa Jorden, Stene eller Træbark med eller uden traadformede Hæfterødder; Bladene dannede af et eller flere Lag kortere eller længere Celler (ingen egenlige Kar); Forplantningsorganerne 2 Slags: 1) *Frugtanlæg* (archegonia) som udvikle sig til Sporehuse i Spidsen af en kortere eller længere Stilk, Børsten (seta) og 2) *Støvkolber* (antheridia), kugle- eller kølleformede Legemer, som indeholde Sædtraade. Sporerne udvikle en Forkim, hvoraf den unge Plante fremvoxer.

X. *Hepaticæ* (Levermosser) (*And. Atl. t. 27*) Stængelen med traadformede Hæfterødder, enten sammensmeltet med Bla-

dene til et gaffeldeelt eller straaaleformigt-lappet *Løv*, eller med tydeligt fra Stængelen adskilte Blade i 2 eller 4 Rader, med eller uden Biblade (*amphigastria*); Bladene dannes af eet Lag Parenchymceller og mangle Nerve; Støvkolberne, siddende eller stilkede, indsænkede i eller siddende paa Overfladen af Løvet eller i Bladhjørnerne, Frugtanlægene bestaae af en Kjerne, omgivet af en hindeagtig Hætte; idet Kjærnen voxer ud til en stillet Kapsel, brister Hætten oftest i Spidsen; Kapselen skulpe-, kugle- eller ægformet, opspringende i 2 eller 4 Klapper, indeholdende talrige Sporer mellem Slyngere 3: Traade med spiralformede Fortykningslag.

a. *Ricciæ*. Løvet fladt, straaaleformig-lappet, krybende eller svømmende; Kapselen indsænkt i Løvet, vedblivende omsluttet af Hætten.

Ingen Slyngere.

171. *Riccia* 4.

a. *Anthocerotæ*. Løvet straaaleformig-lappet; Kapselen skulpeformet, toklappet med haarformet Midtsøile.

172. *Anthoceros* 2.

c. *Marchantieæ*. Løvet gaffeldeelt-lappet med porøs Overhud, skjælagtige Smaablade paa Underfladen; Kapslerne næsten siddende, samlede paa Underfladen af en skjold- eller kegleformet, ofte straaaleformet, stillet Frugtholder.

173. *Preissia* 1. 175. *Marchantia* 1.

(? *Rebouillia* 1) 176. *Lunularia* 1.

174. *Fegatella* 1.

d. *Jungermanniæ*. Kapslerne, stilkede, opspringende i 4 Klapper, sidde enkeltviis.

aa, med *Løv*.

177. *Metzgeria* 1. 180. *Pellia* 1.

178. *Aneura* 3. 181. *Blyttia* 1.

179. *Blasia* 1. 182. *Fossombronia* 1.

bb, med adskilte Blade.

183. *Lejeunia* 1. 192. *Chiloscyphus* 2.

184. *Radula* 1. 193. *Lophocolea* 4.

185. *Frullania* 2. 194. *Sphagnoecetis* 1.

186. *Madotheca* 4. 195. *Jungermannia* 24.

187. *Ptilidium* 1. 196. *Scapania* 6.

188. *Trichocolea* 1. 197. *Plagiochila* 1.

189. *Mastigobryum* 1. 198. *Alicularia* 1.

190. *Lepidozia* 1. 199. *Sarcoscyphus* 2.

191. *Calypogeia* 1.

XI. Sphagnaceæ Endl. (Tørvmosser). Bleggrønne, hyppigt rødlig eller næsten farveløse Mosser, uden Rodtraade; Stænglerne sammensatte af et tredobbelt Lag af forskjelligformede Celler, med knippestillede Grene, som ikke udgaar fra Bladhjørnerne; Bladene taglagte, dannede af 2 Slags Celler, af hvilke de indre ere tyndvæggede, forsynede med Porer og ringformede Afleiringslag; Blomsterstanden enbo eller tvebo, Støvkolberne axformigt samlede paa vandrette Smaagrener, stilkede, kugleformede, uden Safttraade; 1—5 Frugtanlæg (af hvilke kun 1 udvikles til Frugt) i Spidsen af sidestillede Frugtgrene fra Stængelens øvre Deel; Børsten kort eller utydelig, nedsænkt i en pæreformet Skede, som ved Frugtmodningen sprænges uregelmæssigt og ikke danner nogen egenlig Hætte; Kapselen tværsoppringende, uden Ring og Tænder i Munden, Sporerne 2 Slags, nogle større, andre mindre, enten i samme eller forskjellige Kapsler. Forkimen flad, løvlignende.

200. *Sphagnum* 12.

XII. Bryaceæ Bartl. (Bladmosses) (T. Jensen, Bryol. dan., And. Atl. t. 27). Ofte grønne, med Rodtraade; Stængelens Celler langstrakte, mod Omkredsen tættere, intet Barklag, Bladene taglagte, alm. omfattende, bestaaende af eet eller flere Cellelag, uden porøse Celler, med eller uden Nerve (længere Celler) i Midten og stundom med tykkere Rand; Blomsterstanden enbo eller tvebo; Støvkolberne alm. kølleformede, omgivne af Safttraade; Frugtanlægene alm. flere samlede (af hvilke 1 eller flere udvikles til Frugt) omgivne af Safttraade og af særegne Frugtsvøbblade, flaskeformede, indesluttende en Kjærne indenfor en Hinde, der, efterat Kjærnen udvoxer til en Kapsel, deler sig paatværs, den øvre Deel kaldes Hætten (calyptra); Kapselen paa en kortere eller længere Børste, opspringende ved Modningen paatværs (Buddike) alm. med 1 å 2 Rækker leddede Tænder af bestemt Antal (delelige med 4) i Munden og en leddet Ring nedenfor Laaget (operculum). Omkring en Midtsoile i Buddikens Indre dannes de ensartede Sporer. Forkimen traadformigt grenet.

a. *Schizocarpæ*. Frugten en endestillet Kapsel, der aabner sig paa langs i 4 Klapper.

201. *Andræa*. 1.

b. *Acrocarpæ*. Frugten en endestillet Kapsel, som deles paatværs eller uregelmæssigt.

aa. *Cleistocarpæ*. Kapslen brister uregelmæssigt.

- | | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|----|
| 202. Ephemerum | 1. | 205. Sphærangium | 1. |
| 203. Physcomitrella | 1. | 206. Phascum | 3. |
| 204. Microbryum | 1. | 207. Pleuridium | 3. |

bb. *Stegocarpæ*. Kapselen tværsopspringende (Buddike).

α. *Weisiaceæ*.

- | | | | |
|-----------------------------|----|---------------------------|----|
| 208. Systegium | 1. | 213. Trematodon | 1. |
| 209. Gymnostomum | 1. | 214. Dicranella | 6. |
| 210. Weisia | 2. | 215. Dicranum | 9. |
| 211. Cynodontium | 1. | 216. Campylopus | 4. |
| 212. Dichodontium | 1. | | |

β. *Leucobryaceæ*.

217. Leucobryum 1.

γ. *Fissidentaceæ*.

218. Fissidens 5.

δ. *Seligeriaceæ*.

219. Seligeria 1.

ε. *Pottiaceæ*.

- | | | | |
|---------------------------|----|-----------------------------|-----|
| 220. Pottia | 4. | 225. Ceratodon | 1. |
| 221. Anacalypta | 1. | 226. Leptotrichum | 3. |
| 222. Didymodon | 1. | 227. Trichostomum | 2. |
| 223. Eucladium | 1. | 228. Barbula | 11. |
| 224. Distichium | 2. | | |

ζ. *Grimmiaceæ*.

- | | | | |
|------------------------------|----|-----------------------------|-----|
| 229. Cinclidotus | 1. | 235. Zygodon | 2. |
| 230. Grimmia | 9. | 236. Ulota | 4. |
| 231. Racomitrium | 8. | 237. Orthotrichum | 18. |
| 232. Hedwigia | 1. | 238. Tetraphis | 1. |
| 233. Ptychomitrium | 1. | 239. Encalypta | 2. |
| 234. Amphoridium | 1. | | |

η. *Splachnaceæ*.

240. Splachnum 1.

θ. *Funariaceæ*.

- | | | | |
|------------------------------|----|------------------------|----|
| 241. Physcomitrium | 1. | 243. Funaria | 1. |
| 242. Entosthodon | 2. | | |

v. *Bryaceæ.*

244. Leptobryum . . .	1.	250. Meesia	3.
245. Webera	5.	251. Paludella	1.
246. Bryum	17.	252. Aulacomnion . . .	2.
247. Mnium	9.	253. Bartramia	2.
248. Cinclidium	1.	254. Philonotis	3.
249. Amblyodon	1.		

x. *Polytrichaceæ.*

255. Atrichum	2.	257. Polytrichum . . .	7.
256. Pogonatum	3.		

λ. *Buxbaumiaceæ.*

258. Diphyseium	1.	259. Buxbaumia	1.
-------------------------	----	------------------------	----

c. *Pleurocarpæ.* Frugten sidestillet, Kapselen tværsopspringende (Buddike).

α. *Fontinaloideæ.*

260. Fontinalis	2.
-------------------------	----

β. *Neckeraceæ.*

261. Cryphæa	1.	264. Leucodon	1.
262. Neckera	3.	265. Antitrichia	1.
263. Homalia	1.		

γ. *Leskeaceæ.*

266. Myurella	1.	269. Heterocladium . .	1.
267. Leskea	2.	270. Thuidium	4.
268. Anomodon	2.		

δ. *Hypnaceæ.*

271. Pterigynandrum .	1.	279. Eurhynchium . . .	7.
272. Pterogonium . . .	1.	280. Rhyncostegium . .	5.
273. Climacium	1.	281. Thamnum	1.
274. Pylaisia	1.	282. Plagiothecium . .	5.
275. Isothecium	1.	283. Amblystegium . .	4.
276. Homalothecium . .	1.	284. Hypnum	27.
277. Campthothecium .	2.	285. Hylocomium . . .	5.
278. Brachythecium . .	10.		

I. **Characeæ** Rich.*) (Krandsnaalvæxter). And. Atl. tab. 21. Vandplanter med leddede *Stængler*, fra Leddene udgaae krandsstillede *Grene*, som enten forgrene sig ensartet med Hovedstængelen eller i Spidsen opløses i Straaler; *Forplantningsorganerne* 2 Slags, som enten findes paa forskellige Planter (Tvebo) eller paa een Plante (Enbo), alm. ved Grenenes Led eller i Straallerne: *Sporehusene* ovale eller kugleformede, indeholdende 1 Spore, omgivet af spiralformigt snoede Celler, der i Spidsen ere frie og danne en Krone; *Antheridierne* kugleformede, alm. hørøde, indeholdende Spiraltraade. (Ofte indhyllede i et Overtræk af Kalk og ildelugtende).

1. Nitella 8. 2. Chara 14.

II. **Equisetaceæ** DC. (Padderokker). And. Atl. t. 21. *Stængelen* leddet, med en tandet Skede ovenfor hvert Led, forøvrigt bladløs, uden eller med krandsstillede, leddede *Grene*; *Sporehusene* kredsformigt stillede paa Underfladen af stilkede, skjoldformede Forgreninger af en fælles forlænget Axe, ordnede til en endestillet, axformet Frugtstand.

3. Equisetum 8.

III. **Filices** (L.) (Brægner.) And. Atl. t. 26. Fra Rodstokken udgaae (oftest) grenede *Løv*; *Sporehusene* kapselagtige, tilligemed leddede Traade samlede i *Frugthobe* (sori) paa Bagsiden af Løvet, nøgne eller bedækkede enten af et hindeagtigt Skjæl (Sløret) eller af Løvets tilbagebøjede Rand.

a. *Polypodiaceæ* R. Br. Løvet i Knoptilstanden sneglehausformigt indrullet; *Sporehusene* omgivne af en leddet Ring, opspringe paatværs.

4. Polypodium	3.	9. Scolopendrium	1.
5. Aspidium	1.	10. Pteris	1.
6. Lastræa	5.	11. Blechnum	1.
7. Cystopteris	2.	12. Struthiopteris	1.
8. Asplenium	5.		

b. *Osmundaceæ* R. Br. Løvet som foreg., *Sporehusene* uden Ring, opspringende paalangs; (Bladkjødet forsvundet paa de med Frugthobe beklædte Endegrene af Løvet).

13. Osmunda 1.

*) De fleste Systematikere anvise denne Familie Plads nærmest ved Algerne. Uden at indlade mig paa dette Spørgsmaals Afgjørelse har jeg opført Familien her, for paa eet Sted at samle alle de i Haandbogen beskrevne Planter.

c. *Løvet* i Knopstilstanden ret, Bladkjødet forsvundet fra de frugtbærende Grene; *Sporehusene* uden Ring, opspringende paatværs.

14. *Botrychium* 2. 15. *Ophioglossum* . . . 1.

IV. **Rhizocarpeæ** Schleid. (Rodfrugtplanter) And. t. 26. Fra Rodstokken udgaar (i Knopstilstanden sneglehuusformigt indrullede) *Blade* og ved Grunden af disse kugleformede (firrummede, ved Modenheden fireklappede) Frugtsamlinger, der indslutte talrige *Sporehuse*, hvoraf de nedre indeholde 1 større, de øvre flere smaa *Sporer*.

16. *Pilularia*. 1.

V. **Isoëteæ** Bartl. (Brasenurter) And. t. 26. Fra en forkortet Rodstok udgaar udeelte, i Knopstilstanden rette *Blade*, som i deres udvidede Basis indslutte rundagtigt-ovale, af en uoppringende Hinde omgivne *Sporehuse*, af hvilke nogle (de ydre Rækker) indeholde større, kantede, andre (den indre Række) mindre, trindt-aflange *Sporer*, befæstede til tværstillede Traade.

17. *Isoëtes* 2.

VI. **Lycopodiaceæ** DC. (Ulvefodsfamilien) And. t. 26. Stængelen beklædt med taglagte *Blade*; *Sporehusene* i Bladhjørnerne eller samlede til Ax og omgivne af Dækblade, enten alle eensartede (indeholdende fine *Sporer*) eller af 2 Slags (nogle toklappede med fine *Sporer*, andre 3—4-klappede med faa, men større *Sporer*).

18. *Lycopodium* 6. 19. *Selaginella* 1.

B. Amphibrya (Monocotyledoneæ). Enfrøbladplanter.

* *Blomsten undersædig, Frugten fri.*

VII. **Gramineæ** Juss. (Græsarter) And. t. 25. *Stængelen* huul, leddet, *Bladene* med omskedende, paalangs spaltet *Skede* og Skedehinde; *Blomsterstanden* sammensat (Ax, Klase eller Top), dens mindste Forgreninger (Smaaax) omgivne af alm. 2 *Yderavner* (glumæ), der indslutte 1—flere Blomster (alm. toradet-taglagte opad en fælles Axstilk); de enkelte Blomster bestaa af 1—2 *Inderavner* (paleæ) og indenfor disse 2—3 (stundom manglende) hindeagtige *Blomsterskjæl* (lodiculæ); *Støvdragerne* i Regeln 3; 1 *Frugtknude*, 2 *Grifler* (undtagen hos Nr. 62); *Frugten* Nød

med hindeagtigt, til Frøet fastvoxet Frøgjemme; *Frøhviden* stor, melet.

a. *Locustifloræ* J. Ag. Den øvre Blomst i Smaaaxet fuldstændig, med 1 eller flere golde Blomster ved Grunden.

20. <i>Setaria</i>	2.	24. <i>Digraphis</i>	1.
21. <i>Echinochloa</i>	1.	25. <i>Hierochloa</i>	1.
22. <i>Digitaria</i>	1.	26. <i>Anthoxanthum</i>	1.
(<i>Panicum</i> .)		27. <i>Leersia</i>	1.
23. <i>Phalaris</i>	1.		

b. *Spiculifloræ* J. Ag. Smaaaxet 1- eller fleerblomstret med alle Blomsterne fuldstændige eller den øvre Blomst ufuldstændig (gold) eller særkjønnet.

28. <i>Alopecurus</i>	4.	47. <i>Glyceria</i>	5.
29. <i>Phleum</i>	3.	48. <i>Briza</i>	1.
30. <i>Psamma</i>	2.	49. <i>Poa</i>	9.
31. <i>Calamagrostis</i>	5.	50. <i>Dactylis</i>	1.
32. <i>Agrostis</i>	4.	51. <i>Cynosurus</i>	1.
33. <i>Milium</i>	1.	52. <i>Vulpia</i>	1.
34. <i>Phragmites</i>	1.	53. <i>Schedonorus</i>	6.
35. <i>Enodium</i>	1.	54. <i>Festuca</i>	8.
36. <i>Melica</i>	2.	55. <i>Bromus</i>	6.
37. <i>Koeleria</i>	2.	56. <i>Brachypodium</i>	3.
38. <i>Trisetum</i>	1.	57. <i>Agropyrum</i>	7.
39. <i>Avena</i>	6.	(<i>Triticum</i> .)	
40. <i>Aiopsis</i>	2.	(<i>Secale</i> .)	
41. <i>Corynephorus</i>	1.	58. <i>Elymus</i>	1.
42. <i>Aira</i>	3.	59. <i>Hordeum</i>	4.
43. <i>Holcus</i>	2.	60. <i>Lolium</i>	3.
44. <i>Triodia</i>	1.	61. <i>Lepturus</i>	1.
45. <i>Fluminia</i>	1.	62. <i>Nardus</i>	1.
46. <i>Catabrosa</i>	1.		

VIII. **Cyperaceæ** Juss. (Halvgræsarter) And. t. 24. *Stængelen* heel; *Bladene* omskedende med heel *Skede* og mere eller mindre tydelig Skedehinde; *Blomsterne* i enlige, endestillede Ax eller flere til en Blomsterstand samlede Smaaax, med adskilt eller samlet Kjon; de enkelte *Blomster* omgivne af (alm. 1) Dækskjæl (palea); *Blomsterdækket* friblad (børsteformet), samblad (krukkeformet) eller 0; *Støvdragerne* alm. 3; 1 *Frugtknude*, 2—3 Ar; *Frugten* nødagtig, med et tørt, til Frøet ikke fastvoxet Frøgjemme.

a. *Monoclines*.

63. <i>Cyperus</i>	2.	67. <i>Eleocharis</i>	4.
64. <i>Schœnus</i>	2.	68. <i>Scirpus</i>	14.
65. <i>Cladium</i>	1.	69. <i>Eriophorum</i>	5.
66. <i>Rhyncospora</i>	2.		

b. *Diclines**).

70. <i>Carex</i>	54.
----------------------------	-----

IX. **Typhaceæ** Juss. (Duunhammerfamilien) And. t. 24.

Blomsterne særkønnede (enbo), i valseformede eller kugleformede *Ax* eller Hoveder, adskilte ved Mellemrum eller omskedende *Blade* (♂ ovenfor ♀); *Blomsterne* af begge *Kjøn* omgivne af skjæl- eller børsteformede *Perigonblade*; *Støvdragere* 3; 1 *Frugtknude* med 1 *Æg*, 1 fladtrykt, tungeformet eller sylformet *Ar*; *Frugten* nød- eller steenfrugtagtig.

71. <i>Typha</i>	2.	72. <i>Sparganium</i>	3.
----------------------------	----	---------------------------------	----

X. **Lemnaceæ** DC. (Andemadfamilien) Svømmende blad-

løse Vandplanter; fra den bladlignende *Stængel* (Løvet) og dettes Forgreninger (Plader) udgaae Trævlerødder, forsynede med en *Rodhætte*; ♂ og ♀ *Blomster* omgivne af et fælles hindeagtigt Hylster uden særegne *Blomsterdækker*; ♂ : 1—2 *Støvdragere*; ♀ : 1 *Frugtknude*; *Frugten* 1—fleerfrøet, uopspringende eller tværsopspringende.

73. <i>Lemna</i>	4.
----------------------------	----

XI. **Aroidææ** Juss. (Kolbeblomstrede) And. t. 24. *Blom-*

sterne i en endestillet eller falsk sidestillet, af et Hylster omgivet *Kolbe*, sær- eller tvekjønnede, med eller uden *Blomsterdække*; *Støvdragere* 6— ∞ ; *Frugt* uopspringende, bær- eller kapselagtig, 1— ∞ -frøet.

74. <i>Arum</i>	1.	76. <i>Acorus</i>	1.
75. <i>Calla</i>	1.		

XII. **Fluviales** Vent. (Vandaxfamilien) And. t. 22 og 24.

Vandplanter med nedentil omskedende *Blade* eller Axelblade; *Blomsterne* enlige, omgivne af Hylster eller samlede til *Ax*

*) Dr. Didrichsen har meddeelt mig den Iagttagelse, at der hos flere *Carices*, og normalt hos *C. maxima*, findes Tvekjønslblomster ved Grunden af ♀ *Axene*.

eller Kolber, særkjønnede eller tvekjønnede; 1—4 *Støvdragere*; 1—4 *Frugtknuder*; *Frugten* enfrøet.

- | | | | |
|---------------------------------|----|------------------------------|-----|
| 77. <i>Zostera</i> | 2. | 80. <i>Ruppia</i> | 3. |
| 78. <i>Najas</i> | 1. | 81. <i>Potamogeton</i> . . . | 23. |
| 79. <i>Zannichellia</i> | 3. | | |

XIII. Alismaceæ R. Br. (Blomstersivene) And. t. 23. Sumpplanter med nedentil omskedende *Blade*; *Blomsterdækket* regelmæssigt, tredeleligt, med en *ydre Kreds* af alm. grønne *Blade* (Bæger) og en *indre*, oftest farvet (Krone); *Støvdragere* 6, 9 eller flere; *Frugtbladene* 3— ∞ ; *Frugten* nød- eller kapselagtig.

a. *Juncagineæ*. *Bladene* linieformede (Blomsterne i Klase), *Blomsterdækket* grønt; *Støvdragere* 6; *Frugtblade* 3, fra Begyndelsen eller ved Modningen sondrede; *Frugterne* enfrøede, uopspringende.

- | | | | |
|---------------------------------|----|-------------------------------|----|
| 82. <i>Triglochin</i> | 2. | 83. <i>Scheuchzeria</i> . . . | 1. |
|---------------------------------|----|-------------------------------|----|

b. *Alismaceæ veræ*. *Bladpladen* med forgrenede Nerver (Blomsterne i krandsblomstret Top); *Bægerbladene* grønne; *Kronbladene* farvede; *Støvdragere* 6— ∞ ; *Frugtbladene* ∞ , adskilte; *Frugterne* enfrøede, uopspringende.

- | | | | |
|-----------------------------|----|---------------------------------|----|
| 84. <i>Alisma</i> | 3. | 85. <i>Sagittaria</i> | 1. |
|-----------------------------|----|---------------------------------|----|

c. *Butomeæ*. *Bladene* linieformede (Blomsterne i Skjærm); *Bæger* og *Krone* som foreg.; *Støvdragere* 9; *Frugtblade* 6 med talrige Æg, befastede paa Klappernes indvendige Overflade; *Frugt* kapselagtig.

- | | |
|------------------------------|----|
| 86. <i>Butomus</i> | 1. |
|------------------------------|----|

XIV. Colchicaceæ DC. (Tidløsfamilien) And. t. 23. Knolleformet Rodstok (ingen overjordisk Stængel); *Blomsterdækket* farvet, sexdeelt; *Støvdragere* 6, tilvoxede til Blomsterdækket, med udadvendte *Støvknapper*; 3 *Grifler*; *Frugten* trerummet Kapsel med ved Modenheden indbyrdes adskilte og i Bugsømmen opspringende Rum; *Frøene* befastede til Bugsømmen.

- | | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| 87. <i>Colchicum</i> | 1. | 88. <i>Narthecium</i> | 1. |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|

XV. Juncaceæ DC. (Sivfamilien) And. t. 23. *Bladene* omskedende; *Blomsterne* omgivne af Dækblade; *Blomsterdækket* sexbladet, med oftest hindeagtige Perigonblade; *Støvdragere* 6 (sjældent 3), med indadvendte *Støvknapper*; 1 *Grif*; 3 *Ar*; *Frugten* treklappet, 3— ∞ -frøet Kapsel med rundelende Opspringning.

- | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|----|
| 89. <i>Juncus</i> | 20. | 90. <i>Luzula</i> | 5. |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|----|

XVI. Liliaceæ Juss. (Liliefamilien) And. t. 23. Ofteſt Løgvæxter; *Blomſterdækket* farvet, ſexbladet eller ſexdeelt; *Støvdragerne* 6, med indadvendte *Støvknapper*; 1 *Griffel* og et tredeelt eller trekantet *Ar*; *Frugten* treklappet Kapsel med rumdelende Opſpringning; *Frøene talrige*, befæſtede til en midtſtillet Frøſtol.

(*Lilium.*)

- | | | | |
|----------------------------------|----|---------------------------------|----|
| 91. <i>Fritillaria</i> | 1. | (<i>Muscari.</i>) | |
| 92. <i>Tulipa</i> | 1. | 94. <i>Ornithogalum</i> | 2. |
| 93. <i>Gagea</i> | 5. | 95. <i>Allium</i> | 7. |
| (<i>Endymion.</i>) | | 96. <i>Anthericum</i> | 2. |

XVII. Smilaceæ R. Br. (Konvalfamilien) And. t. 23. *Blomſterdækket* grønt eller farvet, ſexbladet eller ſexdeelt (ſjeldnere fire- eller ottebladet); *Støvdragerne* i lige Antal med indadvendte *Støvknapper*; *Frugten* bæragtig, 3—4-rummet, uopſpringende.

a. *Asparageæ*. *Blomſterdækket* ſexdeelt; 6 *Støvdragere*, 1 *Griffel*, 3 *Ar*; *Frøenes* Skal haard.

97. *Asparagus* 1.

b. *Convallariææ*. *Blomſterdækket* 4—6-deelt; *Støvdragere* 6, 1 *Griffel*, 3 *Ar*; *Frøenes* Skal hindeagtig.

98. *Convallaria* 4. 99. *Majanthemum* 1.

c. *Parideæ*. (*Blomſterdækket* ottebladet; de ydre *Perigonblade* større end de indre, *Støvdragerne* 8); *Frøenes* Skal hindeagtig.

100. *Paris* 1.

**** *Frugten undersædlig.***

XVIII. Narcissineæ Juss. (Narcisfamilien) And. t. 22. Løgvæxter; *Blomsterne* tvekjønnede, enlige eller i Skjærm, omgivne af et Hylster; *Blomſterdækket* ſexdeelt, i 2 Kredse, farvet, med eller uden Bikrone; *Støvdragere* 6, med indadvendte *Støvknapper*; 1 *Griffel* og udeelt *Ar*; *Frugten* trerummet, mangefrøet Kapsel med rumdelende Opſpringning.

101. *Galanthus* 1. 103. *Narcissus* 2.

102. *Leucojum* 1.

XIX. Irideæ (Sværdlilier) And. t. 22. Rodſtokken knolleformet; *Blomſterdækket* farvet, ſexdeelt, i 2 Kredse, den ydre Kreds ofte forſkjellig fra den indre; *Støvdragerne* 3, ligefor de ydre *Perigonblade*, med udadvendte *Støvknapper*; 1 *Griffel*; 3 (kronbladagtige eller tragtformede) *Ar*; *Frugten* trerummet Kapsel med rumdelende Opſpringning.

104. *Iris* 2. 105. *Crocus* 1.

XX. Orchideæ (Gjøggeblomster) And. t. 22. *Bladene* omskedende; (Blomsterne i Klase eller Ax); *Blomsterdækket* i 2 trebladede Kredse; *Perigonbladene* i *den ydre Kreds* omtrent ligeformede og oftest regelm. stillede; de 2 nedre (ved Blomstens Dreining opadvendte) i *den indre Kreds* ligeformede, det tredie (øvre, tilsyneladende nedadvendte), *Læben*, i Form og Størrelse afvigende fra de øvrige; 1 fuldkommen og 2 uudviklede *Støvdragere*, hiin siddende, tilvoxet til Arret og ved Foreningen med dette dannende en *Griffelstøtte*; *Støvet* i Masser (1—2 i hvert af den torummede Støvknaps Rum); *Frugten* treklappet, enrummet Kapsel med vægstillede Frøstole og talrige smaae *Frøe*. (Ofte Knoller fra Rodstokken).

106. Orchis	8.	114. Neottia	1.
107. Anacamptis	1.	115. Listera	2.
108. Gymnadenia	2.	116. Spiranthes	1.
109. Platanthera	2.	117. Epipactis	4.
110. Coeloglossum	1.	118. Cephalanthera . . .	3.
111. Herminium	1.	119. Corallorhiza	2.
112. Ophrys	1.	120. Malaxis	1.
113. Epipogon	1.	121. Sturmia	1.

XXI. Hydrocharideæ DC. (Frøbidfamilien) And. t. 23. Vandplanter; *Blomsterne* tvebo; *Blomsterdækkets* Blade i 2 trebladede Kredse, *de ydre* (Bæger) grønne, *de indre* kronbladagtige; *Støvdragerne* 9—12, ofte med flere Bistøvdragere; *Grifterne* 3—6, med todeelte *Ar*; *Frugten* fleerrummet, mangefrøet, kjødfuld, uopspringende.

122. Hydrocharis	1.	123. Stratiotes	1.
--------------------------	----	---------------------------	----

C. Amphibrya (Dicotyledoneæ). Tofrøbladplanter.

* **Gymnospermæ** (Nøgenfrøede). Frøene nøgne, i aabne Frugtblade.

XXII. Coniferæ Juss. (Naaletræer) And. t. 20. *Blomsterne* særkønnede, i Rakler, dannede af spiralformigt taglagte *Dækblade*; ♂: *Blomsterne* nøgne, med bladagtigt Knapbaand og 1 eller flere Rum i Støvknappen; ♀: *Frugtbladene* i Vinklerne af Dækbladene, tilsidst læder-, træagtige eller kjødfulde, hvorved fremkommer en *Kogle* eller *Bærkogle*; *Frøbladene* stundom deelte til Grunden i flere Flige. — Træagtige Væxter med punkterede Vedceller (ingen Kar), indeholde Harpik; *Bladene* naaleformede, oftest læderagtige og stedsegrønne, spredte eller ved Grenens Sammendragning knippe stillede og i sidste Tilfælde omgivne af et Naalehuus (2: hindeagtige Knopskjæl).

a. *Abietinæ*. *Støvknapperne* torummede; *Kogleskjællene* (Frugtblade) talrige, træ- eller læderagtige; *Frøene* oprette.

124. *Pinus* 1. (Abies.)
(*Larix*). (Picea.)

b. *Cupressinæ*. *Støvknapperne* fleerrummede; *Kogleskjællene* faa (dannede af Dækblade, de nedre henvisnende, de øvre tilsidst kjødfulde), *Frøene* oprette.

125. *Juniperus* 1.

c. *Taxinæ*. *Støvknapperne* 3—8-rummede, skjoldformede; ingen Kogle, men et enkelt, opret, af en tilsidst kjødfuld Frøkappe omgivet Æg. (*Taxus*.)

**** *Apetalæ* (Kronløse).** Frøene indesluttede i lukkede Frugtblade; Blomsterdækket enkelt eller 0.

XXIII. *Ceratophylleæ* Gray. (Hornbladfamilien) And. t. 21. Vandplanter med krandsstillede, fint deelte *Blade*, uden *Axelblade*; *Blomsterne* særkønnede, siddende i Bladhjørnerne; ♂: *Blomsterdækket* 8—12-fliget; *Støvdragerne* i ubestemt Antal, med siddende, oventil braadspidsede *Støvknapper*; ♀: *Blomsterdækket* som hos ♂; 1 fri *Frugtknude* med 1 Rum og 1 hængende Æg, braadspidset *Griffel*; *Frugt* nødagtig, ofte med udvoxende, tornspidsede Tilhængsler ved Grunden; *Frøene* uden Frøhvide med mangedeelte Frøblade.

126. *Ceratophyllum* . . . 2.

XXIV. *Callitrichinæ* Link (Vandstjerner) And. t. 21. Vandplanter med modsatte, udeelte *Blade* uden *Axelblade*; *Blomsterne* i Bladhjørnerne, særkønnede, alm. omgivne af 2 modsatte, hindeagtige Dækblade; *Blomsterdække* 0; 1 *Støvdrager*; 1 firerummet *Frugtknude* med 1 Æg i hvert Rum; 2 lange, siddende *Ar*; *Frugten* tilsidst deelt i 4 uopspringende, ofte vingede Smaafrugter; *Kimen* ret; *Frøhviden* kjødagtig.

127. *Callitriche* 4.

XXV. *Myricæ* Rich. (Porsfamilien) And. t. 20. Buskvæxter med harpixholdige Punkter i *Bladene*; *Blomsterne* særkønnede (tvebo), i Rakler; ♂: *Blomsterdække* 0; 2—6 *Støvdragere*, befæstede til Grunden af Rakleskjællene; ♀: hver Blomst omgivet af et 2—4-fliget, undersædigt *Blomsterdække*, 1 *Frugtknude* med 2 *Griffler*; *Frugt* enfrøet, nødagtig, ved Grunden sammenvoxet med Blomsterdækket; *Frøhvide* 0.

128. *Myrica* 1.

XXVI. *Betulineæ* Rich. (Birkefamilien) And. t. 20. Træagtige Væxter med affaldende *Axelblade*; *Blomsterne* særkønnede (enbo), i Rakler; ♂: *Rakleskjællene* med Biskjæl, indsluttende 3 enbladede eller firedeelte *Blomsterdækker*; 4 *Støvdragere* inden-

for hvert Blomsterdække. ♀: *Indskjællene* 2—3-bladstæng med eller uden Bladst. *Blomsterdække* 2; 1 *Frøknude* med 2 *Øgler*; *Frugten* Nød eller Vingefrugt; *Frøhvide* 0.

129. *Hemus* 1. 130. *Alnus* 2.

XXVII. *Faguliaceæ* Rich. (Bkaalbarene) And. t. 20. Tre-
agdelte Væxter med afslængende *Årskjællene*; *Blomsterne* storkjennede
(enbo); ♂ i Rakler; indentor Rakleskjællene er 2—3-bladede
Blomsterdække eller 2 *Ringel*; *Stængere* i lige eller dobbelt
Antal med Blomsterdækkets Filge (eller Bladstæng); ♀: *Blom-*
sternen enfilget eller flere skadede id Hovedet eller Rakler, hvor
Bloms. hæng eller flere sammen omgivet af et med Frøsten
tilvoksende *Hjerte* (filge) eller af en kaptformet eller kapselagtig
Udvikelse af Blomsterstilk med flere tagagtige (tænder) *Indskjællene*
(kapsel); *Blomsterdække* overordt, dannet af en svagt laadet,
snart forsvindende Rand; 2—3 *St.* og ligesaa lange *Ringel* i
Frugtknuden; 1—2 *St.* i hvert Rum; den modne *Frugt* en-
enst, enfrøet (nødgagtig); *Frøhvide* 0.

131. *Carpinus* 1. 133. *Fagus* 1.

132. *Corylus* 1. 134. *Quercus* 2.

(Castanea.)

XXVIII. *Ulmaceæ* Ag. (Ålmefamilien) And. t. 19. Træer
med afvædende, ruse (ved træernes øvre Ende) *Blade* og af-
feldende *Årskjællene*; *Blomsterne* i Hoved eller Bloms. på Siderne
af Grene, trækjennede; *Blomsterdække* grønt eller farvet,
4—5-bladet; *Stængere* vedsatte og i lige Antal med Blom-
sterdækkets Filge; 1 fil, formet *Frøknude* med 1 *St.* i
hvert Rum; 2 *Øgler*; *Frugten* en ved Hudenuden enfrøet
Vingefrugt, med ret Kim uden Frøhvide.

135. *Ulmus* 3.

XXIX. *Urticaceæ* Juss. (Nældefamilien) And. t. 18. Urter
med modsatte eller afvædende *Blade*, beklædte med ruse, eller
trængende Hær, vedblivende eller afslængende *Årskjællene*; *Bloms-*
terne storkjennede (ejendelig trækjennede); ♂: *Blomsterdække*
reguleret, 4—5-bladet; *Stængere* i samme Antal som og mod-
satte Blomsterdækkets Blade; ♀: *Blomsterdække* underordt;
Frugten enfrøet, uopspringende.

a. *Urtica*. ♀: *Blomsterdække* 2—4-bladet, Fast opret, Bloms. set,
omgivet af Frøhvide.

136. *Urtica* 2. 137. *Parietaria* 1.

b. *Samolus*. ♀: *Blomsterdække* enbladet, skællormet; Frøet
hængende; *Frugten* enfrøet, Frøhvide 0.

138. *Humulus* 1. (Cannabaceæ)

c. *Moreæ*. ♀: Blomsterdækket firebladet; Frøet opstigende; Kimen bøiet, omgivet af Frøhvide.

(*Morus*).

XXX. Salicineæ Rich. (Pilefamilien) And. t. 20. Træ- eller buskagtige Væxter med vedblivende (eller ingen) *Axelblade*; *Blomsterne* tvebo, i Rakler; *Rakleskjællene* uden Biskjæl, *Blomsterdække* 0, i dets Sted en kirtelformet eller skaalformet Udvidelse af Frugtbunden; ♂: *Støvdragerne* 2—∞; ♀: 1 *Frugtknude*; 2 *Grifler* eller 1 Griffel med 2—4 fligede *Ar*; *Frugten* toklappet Kapsel med talrige *Frøe*, som ved Grunden ere omgivne af Frøuld; *Kimen* ret, *Frøhvide* 0.

139. *Salix*. 25. 140. *Populus*. 7.

XXXI. Salsolaceæ Moq. (Salturter) And. t. 19. Urter eller Halvbuske med afvexlende *Blade* uden *Axelblade*; *Blomsterne* særkønnede eller tvekønnede; *Blomsterdækket* undersædigt, grønt, fembladet eller femtandet (sjældnere 2-3-deelt); *Støvdragerne* i bestemt Tal (typisk 5), modsatte Perigonbladene (sjældent færre og aldrig flere end disse); *Frugtknuden* enkelt; enrummet og enfrøet; *Grifler* 2—4; *Frugten* Hindefrugt eller Nød, ofte omgivet af det vedblivende og tilvoxende Blomsterdække; *Kimen* krum eller spiralformet, uden eller med melet, midtliggende *Frøhvide*. (Voxe hyppigt paa saltholdig Jordbund og indeholde ofte Salt, ofte ere de overtrukne af en løs melet Beklædning).

a. 141. *Salicornia*. 2. 146. *Blitum*. 5.

b. 142. *Chenopodina*. 1. 147. *Beta*. 1.

143. *Salsola*. 1. d. 148. *Atriplex*. 7.

c. 144. *Kochia*. 1. 149. *Halymus*. 2.

145. *Chenopodium*. 7.

XXXII. Amarantaceæ Juss. (Amarantfamilien) And. t. 19. Urter med modsatte eller afvexlende *Blade* uden *Axelblade*; *Blomsterne** tvekønnede eller særkønnede, i Nøgler, Hoveder eller Ax; *Blomsterdækket* 3—5-deelt, hindeagtigt, ofte omgivet af et trebladet Biblomsterdække; *Støvdragerne* i lige Antal med Blomsterdækkets Flige; *Frugtknuden* fri, enrummet, med 1—flere Frøe; *Frugten* uopspringende (Nød) eller opspringende [uregelm. eller paatværs: Hindefrugt].

150. *Amarantus*. 1.

XXXIII. Polygoneæ Juss. (Syrefamilien) And. t. 17. (Urteagtige) Væxter med afvexlende *Blade* og et hindeagtigt *Axelblad* (Kræmmerhuus) indenfor Bladstilkens; *Blomsterne* tvekønnede eller særkønnede; *Blomsterdækket* undersædigt, farvet, 3—5—6-deelt (Perigonbladene i den indre Kreds ofte større); *Støvdragerne* i bestemt Tal, oftest lige med Perigonbladene (typisk 6); 1 *Frugtknude*; 2—3 *Grifler* (eller 1 Griffel og 2—3

Ar); *Frugten* enfrøet Nød (fladtrykt eller trekantet), ofte omgivet af det vedblivende Blomsterdække; *Frøhviden* stor, melet.

151. Polygonum 12. 153. Rumex 15.

152. Fagopyrum 1.

XXXIV. Santalaceæ R. Br. (Sandelfamilien). (Urteagtige) Væxter med afvejlende *Blade* uden Axelblade; *Blomsterne* med Dækblade (tilvoxede til Blomsterstilken), tvekjønnede; *Blomsterdækket* indvendig farvet, sambladet, med 3—5-deelt Krave; *Støvdragerne* i lige Antal med, tilvoxede til og modsatte Kravens Flige; *Frugtknuden* 1, undersædlig; 1 *Griffel*; *Frugten* enfrøet, nød- eller steenfrugtagtig, beklædt med det vedblivende oversædige Blomsterdække; *Frøene* med Frøhvide.

154. Thesium 1.

XXXV. Thymeleæ Adans. (Kjælderhalsfamilien) And. t. 18. (Buskagtige) Væxter med udeelte *Blade* uden Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede; *Blomsterdækket* farvet, sambladet, med firefliget Krave; *Støvdragerne* befæstede til Røret af Blomsterdækket i [lige eller] dobbelt Antal mod dettes Flige; *Frugtknuden* 1, fri, enrummet (og enfrøet); *Frugten* Steenfrugt; *Frø* med ret Kim uden Frøhvide).

155. Daphne 1.

XXXVI. Elæagnæ R. Br. (Sølvbladfamilien) And. t. 18. Buskvæxter (ofte med Vedtorne af tilspidsede Grene); *Bladene* beklædte med søvglindsende, stjerneformede og skjoldformigt tilhæftede Skjæl; *Blomsterne* [tvekjønnede eller] særkjønnede; ♂: *Blomsterne* i korte Ax, hver Blomst omgivet af et Dækblad; *Blomsterdækket* 2—4-bladet; 4 *Støvdrager*; ♀ (og ♀)-*Blomsterne* enlige eller faae samlede; *Blomsterdækket* sambladet, 1 fri *Frugtknude*, 1 *Griffel*; *Frugten* enfrøet, uopspringende, omgivet af det vedblivende og kjødagtigt tilvoxende Blomsterdække (og derved falsk-bæragtig).

156. Hippophaë 1.

XXXVII. Aristolochiæ Juss. (Slangervedfamilien) And. t. 18. Urter (eller slyngende Buske) med afvejlende, brede, fod- eller haandnervede *Blade*; *Blomsterne* tvekjønnede; *Blomsterdækket* oversædigt (skjævt tragtformet eller regelm. tredeelt); *Støvdragerne* 6—12, tilvoxede (med Støvtraaden) til en oversædig Skive eller (med Støvknapperne) til Arret; *Frugtknuden* 3—6-rummet med midtstillet Frøstol, 6 straaleformede Ar; *Frugten* kapselagtig med talrige *Frøe*.

157. Asarum 1. 158. Aristolochia 1.

*** *Cruciferae* (Heelkrone). Blomsterdækket dobbelt, Kronen sambladet.

XXXVIII. *Plantagineæ* Juss. (Vejbredfamilien) And. t. C. Urteagtige Væster; *Blomsterne* i Axl eller endige, trekjønnede eller særkønnede; *Bageret* bredest, vedblivende; *Kronen* fladliget med hindsegtige Flige; 1 *Frugtknude* med 1—2 Rum og 1—2 *Grøder*; *Frugten* hos de særkønnede en enkelt Nød, hos de trekjønnede en torummet Buddike med en—haarfroede Rum; *Frøene* med Frøhvide.

159. *Plantago* 5. 160. *Littorella* 1.

XXXIX. *Plumbaginææ* Juss. (Hindsebjergfamilien) And. t. 6. Vedvarende Urtar med nøgne *Blad*, uden Axlblade; *Blomsterne* trekjønnede, i Hoved eller enslige, pæne Axl; *Bageret* hindsegt, vedblivende, femtaadet, behæd; *Kronen* femtaadt eller sambladet; *Støvdragene* 6, i første Tilstande befestede til Frugtknuden, i sidste til Kronbladens Basis; 1 typisk femrummet *Frugtknude*; *Griffene* (typisk) 5, (*Frugten* enkelt, uoppringende); *Kimen* ret, omgivet af Frøhvide.

161. *Statice* 2. 162. *Armeria* 2.

XI. *Valerianææ* DC. (Haldramfamilien) And. t. 2. Urtar med nøgne *Blad* uden Axlblade; *Blomsterne* i gaffeldelt, kvæstformet Blomsterstand, fidskandige eller uafsluttede; *Bageret* oversædligt, hindsegtigt eller haarformet med indfaldet, med Frugtknuden i næret Blad (Fauk); *Kronen* rør- eller frugtknudet, behæd til Bagerens Ende, med alle færdige Krave; *Støvdragene* 1—6 (hos de danske Artur 3), befestede til Kronrøret; *Frugtknuden* torummet, de 2 Rum tomme og de 3 sidste forvildende; det tredje enkelt; 1 *Griffel*; 2—3 *Ar*; *Frugten* uoppringende (Ståbragt); *Kimen* ret, *Frøhvide* 0.

163. *Valeriana* 0. 164. *Valerianella* 2.

XII. *Bipsacææ* DC. (Kartofelfamilien) And. t. 1. Urtar med nødsatte *Blad* uden Axlblade; *Blomsterne* samlede i Hoved (Blomsterkrans) og omgivet af et fælles Skæd (*Heel-dækket*), dækket af tomme Dækblade, befestede på og fælles Blomsterstængel (*Blomsterblad*), ofte med særegne Dækblade (*Anter*) for hver enkelt Blomst, trekjønnede; *Bageret* dobbelt (et omkringsegtigt *Yndelæg* udenfor det egentlige, oversædige *Bageret*), brede eller kun det indre haar- eller læsteformede, behædende *Frugten* i Form af Fauk; *Kronen* regelm. eller uregelm.; *Støvdragene* 4, fide, befestede til Kronrøret; *Frugtknuden* torummet, enkelt; 1 *Griffel*; 1—2 *Ar*; *Frugten* enderang (Heel-frugt); *Frøet* med mit *Kim*, omgivet af kjødagtig *Frøhvide*.

165. *Omphaleus* 2. 167. *Scabiosa* 9.

166. *Knautia* 1. 168. *Succisa* 1.

XLII. Synantherea Rich. (Kurvblomstrede) And. t. 1.

Urter (eller Buskvæxter) uden Axelblade; *Blomsterne* samlede til en *Blomsterkurv*, befæstede paa et *Blomsterleie*, omgivne af et *Kurvdække* (3: tomme Dækblade), de enkelte Blomster ofte af særlige Dækblade (*Avner*); *Blomsterne* tvekjønnede, særkjønnede eller kjønsløse; *Bægerets* oversædige Krave (Fnok) fjer-, børste- eller haarformet, oftest mangestraalet, eller hindeagtig (sjældnere 0) uden *Yderbæger*; *Kronen* snart regelm. femtandet (rørformet), snart ensidigt udbredt og i Spidsen heel eller 2—5-tandet (tungeformet) eller uregelm. tragtformet [sjældnere tolæbet], alle eens eller de ydre (*Randkronerne*) forskellige fra de indre (*Skivekronerne*); *Støvdragerne* 5, befæstede til Kronrøret, med rørformigt sammenvoxede *Støvknapper*; *Frugtknuden* enkelt, undersædig; 1 *Griffel*, 2 *Ar*; *Frugten* enfrøet, nødagtig, beklædt med den vedblivende Fnok (Skalfrugt); *Kimen* ret, ingen Frøhvide.

a. *Cichoraceæ* Juss. (Løvetandsgruppen). Planten indeholder Mælkesaft, alle Blomsterne i Kurven ♂ med tungeformede Kroner.

169. <i>Lampsana</i>	1.	177. <i>Scorzonera</i>	1.
170. <i>Arnoseris</i>	1.	178. <i>Taraxacum</i>	3.
171. <i>Cichorium</i>	1.	179. <i>Lactuca</i>	2.
172. <i>Thrincia</i>	1.	180. <i>Sonchus</i>	4.
173. <i>Leontodon</i>	2.	181. <i>Crepis</i>	4.
174. <i>Pieris</i>	1.	182. <i>Aracium</i>	1.
175. <i>Hypochoeris</i>	3.	183. <i>Hieracium</i>	15.
176. <i>Tragopogon</i>	3.		

c. *Cynareæ* Less. (Tidselgruppen). Griffelen hos Tvekjønsblomsterne med en opsvulmet (ofte af en Haarkrands omgivet) Ring under Arrets Flige, Kurvdækket alm. kugleformet, med stive, ofte stikkende Blade.

184. <i>Centaurea</i>	5.	189. <i>Carduus</i>	4.
185. <i>Serratula</i>	1.	190. <i>Cirsium</i>	6.
186. <i>Lappa</i>	4.	191. <i>Carlina</i>	1.
187. <i>Onopordon</i>	1.	192. <i>Echinops</i>	1.
188. <i>Silybum</i>	1.	193. <i>Calendula</i>	1.

c. *Eupatoriaceæ* (Malurtgruppen). Kronerne rørformede, i Skiven ♂, i Randen alm. ♀; Griffelen uden opsvulmet Ring (Kurvdækket alm. valseformet, med urteagtige Blade).

194. <i>Bidens</i>	3.	200. <i>Artemisia</i>	4.
195. <i>Eupatorium</i>	1.	201. <i>Antennaria</i>	1.
196. <i>Petasites</i>	3.	202. <i>Gnaphalium</i>	5.
197. <i>Tussilago</i>	1.	203. <i>Filago</i>	4.
198. <i>Cotula</i>	1.	(<i>Senecio vulgaris</i>).	
199. <i>Tanacetum</i>	1.		

d. *Radiatæ* (Straaleblomstrede). Kronerne i Randen tungeformede
♀, i Skiven rørformede, ♂.

204. Aster	2.	214. Doronicum	1.
205. Stenactis	1.	215. Arnica	1.
206. Erigeron	2.	216. Cineraria	2.
207. Solidago	1.	217. Senecio	9.
208. Inula	6.	(Galinsoga).	
209. Bellis	1.	(Rudbeckia).	
210. Achillea	2.	(Helianthus).	
211. Anthemis	3.	(Calendula).	
212. Matricaria	2.	(Tussilago).	
213. Chrysanthemum	3.	(Bidens cernua radiata).	

XLIII. *Ambrosiæ* Link (Braadfrøfamilien) And. t. 1. En-aarige Urter [eller Halvbuske] med Særkjønsblomster; ♂: *Blomsterne* i Hoved, omgivet af et mangebladet *Svøb*, de enkelte Blomster med Dækblade og et sambladet, femtandet *Blomsterdække*; *Støvdragerne* 5 med (frie eller) sammenvoxede Støvtraade; ♀: flere Blomster, hver med 1 *Frugtknude* og 2 *Ar*, indsluttede af et fælles *Svøb*, der udvoxer og forhærdes omkring den modnende, nødagtige Frugt.

218. Xanthium 1.

XLIV. *Lobeliaceæ* Juss. (Lobeliefamilien) And. t. 3. Urter [eller Halvbuske] med Mælkesaft; *Bladene* afvexlende, uden Axelblade; *Blomsterne* fuldstændige, typisk uregelmæssige; *Bægeret* oversædigt eller halvt-oversædigt, regelm. eller uregelm. femfliget; *Kronen* befæstet til Bægerrørets øvre Rand, uregelm. og paa forskjellig Maade femdeelt (ofte med tolæbet Krave og ensidigt spaltet Rør); *Støvdragerne* 5, befæstede til Kronrøret eller en omkringsædig Skive; *Støvknapperne* rørformigt sammenvoxede; *Frugtknuden* 1, 2—3-rummet; 1 *Griffel*, 1 udeelt eller lappet, af en Haarkrands omgivet *Ar*; *Frøstolene* tilvoxede til Skillevæggene; *Frugten* uopspringende eller kapselagtig med rundelende Opspringning.

219. Lobelia 1.

XLV. *Campanulaceæ* Juss. (Klokkefamilien) And. t. 3. Urter med Mælkesaft; *Bladene* afvexlende, uden Axelblade; *Blomsterne* med Dækblade, fuldstændige, regelm. og typisk femdeelte; *Bægeret* oversædigt eller halvt-oversædigt; *Kronrøret* tilhæftet til en oversædig Skive, Kraven mere eller mindre dybt femdeelt; *Støvdragerne* befæstede til den oversædige Skive eller til Basis af Kronen, i lige Antal med Kronfligene, frie eller

med tildeels sammenvoxede *Støvknapper*; (1 Griffel, 2—3 Ar); *Frugtknuden* (2—3-rummet) med fuldstændige Skillevægge og pladedannede *Ægstole* befæstede til Frugtbladene i Midten sammenstødende Vinkler; *Kapselen* (2—3-rummet), mangefrøet, opspringende ved Huller paa Siderne, sjeldnere ved Klapper; *Kimen* ret, i Midten af den kjødede *Frøhvide*.

220. Jasione 1. 222. Campanula 8.
221. Phyteuma 1.

XLVI. Rubiaceæ DC. α, Stellatæ (L.) (Krapfamilien) And. t. 2. Urter med krandsstillede *Blade*, modsatte *Grene*; *Blomsterstandens* mindre Forgreninger oftest gaffeldeelt-qvastformede; *Blomsterne* fuldstændige; *Bægeret* oversædigt, 4—5-tandet, ofte utydeligt; *Kronen* tragt- eller hjulformet, 4—5-fliget; *Støvdragerne* befæstede til Kronrøret, i samme Antal som og afvejlende med Kravens Flige; *Frugtknuden* undersædig, dannet af 2 Frugtblade; 2 *Grifler* eller *Ar*; *Frugten* ved Modenheden todelelig Spaltefrugt, med uopspringende, enfrøede *Smaafrugter* (Nødder eller Steenfrugter); *Kimen* ret, omgivet af en hornagtig *Frøhvide*.

223. Sherardia 1. 225. Galium 12.
224. Asperula 2. (Rubia).

XLVII. Caprifoliaceæ Juss. (Gedebladfamilien) And. t. 2. Buskvæxter med modsatte *Blade*; *Blomsterne* (parviis samlede eller i gaffeldeelt Qvast) fuldstændige eller nogle kjønsløse; *Bægeret* femtandet, oversædigt; *Kronen* regelm. eller uregelm. femdeelt; *Støvdragerne* (5) befæstede til Kronrøret; *Frugtknuden* 2—5-rummet, undersædig; *Frugten* et undersædigt Bær; *Frøene* med ret *Kim* og kjødet *Frøhvide*.

226. Sambucus 3. 228. Lonicera 2.
227. Viburnum 1. 229. Linnæa 1.

XLVIII. Oleineæ Link. (Oliefamilien). Træer eller Buske med modsatte *Blade* uden Axelblade; *Blomsterne* fuldstændige eller ufuldstændige, regelmæssige; *Bægeret* firetandet (eller 0); *Kronen* firefliget eller 0; *Støvdragerne* 2, befæstede til Kronrøret eller til Frugtbunden; *Frugtknuden* 1, torummet, med 1—2 hængende *Æg* i hvert Rum; *Arret* todeelt eller udeelt; *Frugten* 1—2-rummet (Bær, Kapsel eller Vingefrugt).

230. Ligustrum 1. 232. Fraxinus 1.
231. Syringa 1.

XLIX. Apocynæ R. Br. (Snokronede) Contortæ And. t. 5. Halvbuske [eller Træer], indeholdende Mælkesaft; *Bladene* modsatte; *Blomsterne* fuldstændige, regelmæssige, typisk femdeelte; *Kronens Krave* i Knopleiet snoet; *Støvdragerne* befæstede til Kronrøret, i samme Tal som og afvejlende med Kravens Flige; *Støvknapperne* indadvendte, ofte med Tilhængsler; *Frugtknuderne* 2, adskilte eller sammenvoxede, 1—2-rummede; 1 fælles, ofte foroven (i Form af en flad Skive under Arret) udvidet *Griffel*; *Frugterne* 2 Bællekapsler [eller 1 toklappet Kapsel], *Frøene* ofte omgivne af Frøuld.

233. *Vinca* 1.

L. Asclepiadeæ R. Br. (Svalerodfamilien) Contortæ And. t. 5. Urter [eller Buske] med Mælkesaft; *Bladene* modsatte, *Blomsterne* fuldstændige, regelmæssig femdeelte; *Kronens Flige* i Knopleiet taglagt-snoede, med *Bikronblade* i Svælget; *Støvdragerne* 5, befæstede ved Kronrørets Basis og afvejlende med Kronfligene; *Støvknapperne* udadvendte, ofte med Tilhængsler og indbyrdes sammenvoxede; *Støvet* i parviis sammenhængende *Masser* (1 Masse fra hvert af de sammenstødende Støvknappers Naborum) og ved en Kirtel fasthæftede til Arrets Spidse eller Sider; *Frugtknuderne* 2, enrummede; *Griflerne* 2, forenede under det fælles, 5— ∞ -kantede *Ar*; *Frugterne* (typisk) 2 Bællekapsler; *Frøene* omgivne af Frøuld.

234. *Vincetoxicum* . . . 1.

LI. Gentianæ Juss. (Bitterbladfamilien). Urter, indeholdende et bittert Stof, uden Axelblade; *Blomsterne* fuldstændige, regelmæssigt 4—5-deelte; *Bægeret* vedblivende; *Støvdragerne* i lige Tal og afvejlende med Kronfligene, befæstede til Kronrøret; *Støvknapperne* indadvendte, ofte efter Bestøvningen snoede; 1 *Frugtknude* og *Griffel*, todeelt *Ar*; *Frugten* toklappet, opspringende, med *Frøene* befæstede paa Frugtbladenes indbøiede Rand.

a. *G. veræ* (And. t. 5). *Bladene* modsatte; *Kronen* i Knopleiet snoet; *Frugten* med tørt Mellemlag.

235. *Gentiana* 3. 237. *Erythræa* 3.

236. *Cicendia* 1.

b. *Menyantheæ* Fr. (And. t. 4). *Bladene* afvejlende; *Kronen* med foldet Knopleie; *Frugtens* Mellemlag saftigt.

238. *Menyanthes* . . . 1. (*Limnanthemum*).

LII. Labiatæ (Læbeblomstrede) Urter eller Halvbuske med frekantet *Stængel*, modsatte *Blade* uden Axelblade; *Blomsterne* i Qvaster eller Knipper, ved hvis Stilling i de modsatte Blades Hjørner ofte dannes (falske) Krands, ofte, ved disses indbyrdes Tilnærmelse, Ax; *Bægeret* femtandet, regelmæssigt eller tolæbet (Overlæben tre-, Underlæben tofiget); *Kronen* tolæbet (Overlæben todeelt eller udeelt, Underlæben trefliget); *Støvdragerne* 4, tomægtige, sjeldnere 2, befæstede til Kronrøret; *Frugtknuden* befæstet paa en skiveformet Udvidelse af Frugtbunden, tobladet, firerummet, med 1 *Æg* i hvert Rum; *Griffelen* 1, midtstillet, med todeelt *Ar*; *Frugten* firedelelig Spaltefrugt med nødagtige *Smaafrugter*; *Frø* uden eller med sparsom Frøhvide (Ætheriske Olier i Kirtler under Overhuden give dem alm. en aromatisk Lugt).

239. <i>Lycopus</i>	1.	249. <i>Glechoma</i>	1.
240. <i>Mentha</i>	7.	250. <i>Marrubium</i>	1.
241. <i>Elsholzia</i>	1.	251. <i>Ballota</i>	2.
242. <i>Origanum</i>	1.	252. <i>Betonica</i>	1.
243. <i>Thymus</i>	2.	253. <i>Stachys</i>	4.
244. <i>Acinos</i>	1.	254. <i>Galeopsis</i>	6.
(<i>Melissa</i>).		255. <i>Lamium</i>	6.
245. <i>Clinopodium</i>	1.	256. <i>Galeobdolon</i>	1.
246. <i>Brunella</i>	2.	257. <i>Leonurus</i>	2.
247. <i>Scutellaria</i>	2.	258. <i>Teucrium</i>	1.
248. <i>Nepeta</i>	1.	259. <i>Ajuga</i>	2.

LIII. Verbenaceæ Juss. (Jernurtsfamilien) And. t. 5. Urter [eller Buske] med hyppigt frekantet *Stængel* og oftest modsatte *Blade*; *Bægeret* regelmæssigt eller uregelmæssigt femdeelt; *Kronen* med en uregelm. femdeelt, næsten tolæbet Krave; *Støvdragerne* befæstede til Kronrøret, 4, tomægtige, de 2 ofte ufuldkomne, *Frugten* firerummet, med enfrøede [eller tofrøede] Rum, steenfrugtagtig, de enkelte Rum tilsidst som Smaafrugter indbyrdes adskilte; *Frøe* uden Hvide.

260. *Verbena* 1.

LIV. Asperifoliæ L. (Rubladede) (Borraginæ Juss.) And. t. 3. (Urteagtige) alm. hvashaarede Væxter; *Bladene* udeelte, uden Axelblade; *Blomsterstanden* i Spidsen af Stængelen eller Grenene, ofte ved Grunden gaffeldeelt, ensidig og før Udspringningen sneglehuusformigt indrullet, *Blomsterne* fuldstændige; *Bægeret* regelmæssig femdeelt; *Kronen* med regelmæssig eller sjældent uregelmæssig femdeelt Krave og ofte Folder eller Tænder (den saakaldte Bikrone 3: 5 indadvendte Sporer) i Svælget;

Støvdragerne 5, befæstede til Kronrøret; *Frugten* firedelelig Spaltefrugt med enfrøede *Smaafrugter* og midtstillet *Griffel*; *Frøhvide* 0 eller liden.

261. Asperugo	1.	267. Anchusa	2.
262. Echinosperrum . . .	1.	268. Myosotis	8.
263. Cynoglossum	1.	269. Lithosperrum . . .	2.
264. Omphalodes	1.	270. Stenhammaria . . .	1.
265. Symphytum	1.	271. Pulmonaria	2.
266. Borrage	1.	272. Echium	1.

LV. Convolvulaceæ Juss. (Snerlefamilien) And. t. 3. (Urteagtige) slyngende Væxter med Mælkesaft; *Bladene* afvexlende, uden Axelblade; *Blomsterne* med Dækblade, fuldstændige; *Bægeret* regelm. fembladet, vedblivende; *Kronen* i Knopleiet snoet, mere eller mindre tydeligt femdeelt; *Støvdragerne* 5, befæstede ved Kronrørets Basis og afvexlende med Kronfligene; *Frugten* 2—4-rummet, kapselagtig med skillevæggbrydende Opspringning; *Frøene* befæstede ved Grunden af Skillevæggen, med bøiet *Kim* og slimagtig *Frøhvide*.

273. Convolvulus 2.

LVI. Cuscutinæ Link. (Hørsilkefamilien) And. t. 3. Slyngende og ved Sugevorter snyltende bladløse Urter med Mælkesaft og uden grøn Farve; *Blomsterne* sammenhobede i Hoveder [eller Ax], fuldstændige, regelmæssigt 4—5-deelte; *Kronen* med eller uden Bikronskjæl i Svælget; *Støvdragerne* befæstede til Kronrøret, afvexlende med Kronfligene; *Frugten* faafrøet, tværsopspringende; *Frøene* med midtliggende, kjødagtig *Frøhvide* og spiralkrummet *Kim* uden tydelige Frøblade.

274. Cuscuta 4.

† **Polemoniaceæ Vent.** Urter med spredte Blade (eller de nedre modsatte), Blomster i Qvast, Nøgle eller Top, fuldstændige, regelmæssigt femdeelte; *Kronen* tragt- eller hjulformet (sjældnere uregelmæssig), med taglagt, snoet Knopleie, *Støvdragerne* 5, befæstede i Kronrøret og afvexlende med Kronfligene; *Frugtknuden* ved Grunden omgivet af en undersødig Skive, med midtstillet Ægstol, 1 *Griffel* med tredeelt *Ar*; *Frugten* en trerummet Kapsel med rundelende Opspringning, *Frøene* 1 eller flere i hvert Rum, med slimet *Frøskal* og ret *Kim* i Midten af en kjødagtig *Frøhvide*.

(Polemonium).

LVII. Solanææ Juss. (Kartoffelfamilien) And. t. 6. (Urter eller Buske); *Bladene* afvejlende, uden Axelblade; *Blomsterne* uden Dækblade, fuldstændige; *Bøger* og *Krone* typisk regelmæssigt femdeelte; *Støvdragerne* befæstede til Kronrøret, afvejlende og i lige Antal med Kronfligene; *Frugtknuden* torummet med en tyk, midtstillet *Ægstol*, ved hvis Udvidelse Frugten ofte bliver (falsk) firerummet; Bær eller Kapsel opspringende paalangs (skillevægdelende) eller paatværs; *Frøe* med kjødagtig *Frøhvide* og bøiet *Kim*. (Alm. giftige Væxter).

275. <i>Lycium</i>	1.	(<i>Nicandra</i>).	
276. <i>Solanum</i>	5.	279. <i>Datura</i>	1.
277. <i>Physalis</i>	1.	280. <i>Hyoscyamus</i>	1.
278. <i>Atropa</i>	1.		

LVIII. Scrophulariaceæ Lindl. (Maskeblomstrede) And. t. 5. (Urteagtige Væxter) uden Axelblade; *Blomsterne* fuldstændige, uregelrette eller næsten regelrette; *Bægeret* 4—5-deelt; *Kronen* tolæbet, maskeret eller gabende, sjældnere næsten regelmæssigt hjulformet, med eller uden Spore; *Støvdragerne* 4, tomægtige, sjældnere 2 eller 5 uligelange, befæstede til Kronrøret; *Frugtknuden* enkelt; 1 *Griffel*; *Arret* udeelt eller todeelt; *Frugten* torummet, med *Frøstolen* paa Midten af Skillevæggen udvidet til en Plade eller Støtte i begge Rummene, kapselformigt opspringende ved Huller eller i 2, ofte tvedeelte Klapper; *Frøene* talrige, med *Frøhvide*.

a. *Verbasceæ*. Støvdragerne 5 (eller 4 fuldkomne og 1 ufuldkommen), med Støvknapperne opspringende ved en Tværspalte.

281. <i>Verbascum</i>	4.	282. <i>Scrophularia</i>	3.
-------------------------------	----	----------------------------------	----

b. *Antirrhineæ*. Kronens Overlæbe dækker i Knopleiet Underlæben; Støvdragerne 2 eller 4 (tomægtige), Støvknapperne opspringe paalangs, uden Tilhængsler.

283. <i>Limosella</i>	1.	286. <i>Digitalis</i>	1.
284. <i>Veronica</i>	18.	287. <i>Antirrhinum</i>	1.
285. <i>Gratiola</i>	1.	288. <i>Linaria</i>	4.
(Mimulus).			

c. *Rhinanthaceæ*. Kronens Underlæbe dækker i Knopleiet Overlæben. Støvdragerne 4 tomægtige, Støvknapperne med Længdeopspringning, nedentil braadspidsede eller med Tilhængsler.

289. <i>Melampyrum</i>	5.	292. <i>Odontites</i>	2.
290. <i>Pedicularis</i>	3.	293. <i>Euphrasia</i>	3.
291. <i>Rhinanthus</i>	2.		

LIX. Orobanchæ Juss. (Skjælrodfamilien) And. t. 5. Snyltevæxter med skjælformede *Blade* uden grøn Farve; *Blomsterne* (i Klaser eller Ax) omgivne af Dækblade, fuldstændige, uregelmæssige; *Bægeret* 4—5-deelt eller -tandet; *Kronen* tolæbet, Overlæben hvælvet, heel eller tolappet, Underlæben trelappet; *Støvdragerne* 4, tomægtige, befæstede til Kronrøret; 1 enkelt *Frugtknude*; 1 *Griffel* med todeelt eller udeelt *Ar*; *Frugten* kapselagtig, toklappet, enrummet med vægstillede *Frøstole* og talrige *Frøe* med Frøhvide.

294. Orobanche 4. 295. Lathræa 1.

LX. Lentibulariæ Rich. (Blærerodfamilien) And. t. 6. Vand- eller Sumpplanter (ofte med Bladfligene tildeels omdannede til Blærer); *Blomsterne* fuldstændige, uregelmæssige; *Bægeret* tobladet eller femdeelt, tolæbet; *Kronen* hurtigt affaldende, tolæbet eller maskeret, forsynet med en Spore; *Støvdragere* 2, befæstede til Grunden af Kronrøret, med enrummede *Støvknapper*; 1 *Frugtknude*, *Griffelen* kort eller 0; *Arret* tolæbet eller skjævt tragtformet; *Frugten* enrummet kapselagtig, toklappet eller uregelmæssigt opspringende, med fri, kugleformet *Frøstol*; *Frøene* uden Frøhvide.

296. Utricularia 5. 297. Pinguicula 1.

LXI. Primulaceæ Vent. (Kodriverfamilien) And. t. 6. Urter uden Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, typisk femdeelte; *Bægerets* og *Kronens* Flige i lige Antal og indbyrdes afvejlende; *Støvdragerne* i samme Antal, befæstede til Kronrøret og modsatte dettes Flige; 1 *Frugtknude*; 1 enkelt *Griffel* med udeelt *Ar*; *Frugten* enrummet, opspringende paalangs, med Tænder af Kronfligenes Antal, eller paatværs; *Frøene* talrige, befæstede i Gruber paa den frie, midtstillede *Frøstol*.

298. Glaux	1.	302. Lysimachia	4.
299. Trientalis	1.	303. Primula	5. ✓
300. Centunculus	1.	304. Hottonia	1.
301. Anagallis	2.	305. Samolus	1.

LXII. Ericinæ Juss. (Lyngfamilien) And. t. 16. Buske eller Halvbuske, sjældnere vedvarende Urter med alm. stedsegrønne *Blade* uden Axelblade; *Blomsterne* fuldstændige, regelrette, omgivne af Dækblade; *Bægeret* 4—5-deelt eller -tandet, undersædigt eller tilvoxet til Frugtknuden; *Kronen* 4—5-bladet eller -tandet, i Knopleiet taglagt, befæstet til Frugtbunden eller en oversædig Skive; *Støvdragerne* i [lige eller] dobbelt Antal, befæstede til Kronrørets Basis, til Frugtbunden eller til

den oversædige Skive; *Støvknapperne* opspringe ved Huller i Spidsen [sjældnere ved en Længdespalte], ofte med horn- eller børsteformede Tilhængsler; *Frugten* fri eller undersædig, 4—5-rummet, bær- eller kapselagtig; 1— ∞ *Frøe* i hvert Rum med ret Kim, kjødet Frøhvide.

a. *Vacciniæ*. *Frugten* undersædig, bær- eller steenfrugtagtig. **h.**

306. *Vaccinium* 4.

b. *Ericæ*. *Frugten* fri, kapselagtig, med oftest rundelende Opspringning, sjældnere Steenfrugt; *Kronen* sambladet; *Støvdragerne* befæstede til en undersædig Skive. **h.**

307. *Arctostaphylos* . . 1. 309. *Calluna* 1.

308. *Andromeda* 1. 310. *Erica* 1.

**** *Eleutheropetalæ* (Frikronbladede). Blomsterdækket dobbelt, Kronen fribladet.

LXIII. Umbelliferæ Juss. (Skjærmblostmstrede) And. t. 8. Urter med leddet, ofte huul *Stængel*, afvexlende, omskedende, alm. dybt deelte *Blade*; *Blomsterne* tvekjønnede, i enkelt eller sammensat Skjærm, ofte (saavel *Storskjærmen* som *Smaaskjærmene*) omgivne af Dækblade (*Stor-* og *Smaasvøb*); *Bægerets* Krave femdeelt, ofte utydelig eller 0; *Kronbladene* 5, regelmæssige eller uregelmæssige, ofte med tofliget, indrullet Spidse; *Støvdragerne* i lige Tal og afvexlende med *Kronbladene* samt tilligemed disse befæstede til en oversædig Skive, i Knopleiet indrullede; *Frugtknuden* undersædig, torummet, med 1 hængende *Æg* i hvert Rum; 2 *Griffler* med udeelte *Ar*, forneden udvidede og i Forbindelse med Skiven dannende en *Griffelfod* (stylopodium); *Frugten* en todelelig Spaltefrugt, de nødagtige *Smaafrugter* løsne sig fra neden og blive fastholdte ved den fra oven alm. todeelte *Frugtstol* (carpophorum), Frøgjemmet ofte udvendig beklædt med *Ribber* (Hoved- og Biribber), indvendig forsynet med *Oliekanaler*; *Kimen* liden, ret, i Spidsen af den kjødede eller hornagtige *Frøhvide*.

a. *Orthospermæ*. Frøhviden paa den indadvendt Side (Bugfladen) plan.

311. *Hydrocotyle* . . . 1. 315. *Apium* 1.

312. *Sanicula* 1. (Petroselinum).

(*Astrantia*). 316. *Helosciadium* . . . 2.

313. *Eryngium* 1. 317. *Aegopodium* . . . 1.

314. *Cicuta* 1. 318. *Carum* 1.

LXXXIV

319. Pimpinella	2.	329. Selinum	1.
320. Sium	2.	330. Angelica	1.
321. Falcaria	1.	331. Archangelica	1.
322. Bupleurum	2.	332. Peucedanum	2.
323. Oenanthe	3.	333. Imperatoria	1.
324. Aethusa	1.	334. Anethum	1.
325. Libanotis	1.	335. Pastinaca	1.
326. Cnidium	1.	336. Heracleum	2.
327. Haloscias	1.	337. Laserpitium	1.
328. Levisticum	1.	338. Daucus	1.

b. *Campylospermæ*. Frøhviden paa Bugfladen indbøiet i Form af en Fold eller Fure.

339. Caulalis	1.	343. Chærophylum	1.
340. Torilis	2.	344. Myrrhis	1.
341. Scandix	1.	345. Conium	1.
342. Anthriscus	3.		

c. *Coelospermæ*. Frøhviden fra Grunden til Spidsen krumbøiet.

346. Coriandrum 1.

LXIV. Araliaceæ Juss. (Vedbendefamilien) And. t. 7. Vedvarende Urter eller Buskvæxter; *Blomsterne* fuldstændige, regelmæssige; *Blomsten* oversædig eller halvt-oversædig, *Bægerets* Krave svagt 3—5-tandet; *Kronbladene* alm. 5; *Støvdragerne* i lige eller dobbelt Tal, tilligemed *Kronbladene* befæstede til en oversædig Skive; *Frugtknuden* (femrummet) med 1 hængende *Æg* i hvert Rum, 1—5 *Grifler* med udeelte *Ar*; *Frugten* bær-agtig; *Kimen* ret; *Frøhviden* kjødagtig.

347. Hedera	1.	348. Adoxa	1.
-----------------------	----	----------------------	----

LXV. Corneæ DC. (Kornelfamilien) And. t. 7. Træer eller Buske med modsatte *Blade*; *Blomsterne* fuldstændige, regelmæssige, oversædige; *Bægerkraven* firetandet, oversædig; *Kronbladene* 4, affaldende, afvejlende med Bægertænderne og tilvoxede til en oversædig Skive; *Støvdragerne* i lige Antal og afvejlende med *Kronbladene*; *Frugtknuden* 1—3-rummet, med 1 hængende *Æg* i hvert Rum; 1 *Griffel*; *Arret* udeelt; *Frugten* 1—3-rummet med beenhaarde *Vægge* og saftigt *Mellemlag*; *Kimen* ret; *Frøhviden* kjødagtig.

349. Cornus 2.

LXVI. Loranthaceæ Don. (Mistelfamilien) And. t. 2. Snyltende, stedsegrønne Buskvæxter med leddede, gaffeldeelte

Grene og modsatte *Blade*; *Blomsterne* [tvekjønnede eller] særkjønnede; *Blomsterdækket* enkelt eller dobbelt [eller 0], firedeelt; ♂: *Støvdragerne* af lige Antal med Blomsterdækkets Flige og modsatte disse (tilvoxede til samme uden Støvtraade); ♀: *Blomsten* oversædig, en nøgen *Ægkjerne* (ofte med 2 Kime) indsluttet af den kjødfulde Frugtknude; *Frugten* saftig.

350. *Viscum* 1.

LXVII. Crassulaceæ DC. (Steenurtfamilien) And. t. 13. Urter med saftige *Blade*; *Blomsterstanden* alm. gaffeldeelt; *Blomsterne* regelm. (tvekjønnede); *Bægeret* typisk femdeelt; *Kronbladene* i samme Antal som Bægerbladene og befæstede til Bægerets nedre Deel; *Støvdragerne* i lige eller dobbelt Antal, befæstede til Kronbladenes Basis; undersædige *Skjæl* modsatte og af Tal med *Frugtbladene*, der ere krandsstillede, i samme Antal som Kronbladene, indbyrdes adskilte, enrummede; *Frugterne* Bællekapsler; *Frøene* talrige, befæstede til Bugsømmen, med kjødet *Frøhvide* og ret *Kim*.

351. *Bulliarda* 1. 353. *Sempervivum* . . . 1.

352. *Sedum* 7.

LXVIII. Saxifragaceæ Vent. (Steenbrækfamilien) And. t. 13. (Urteagtige Væxter), *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, *Bægeret* 4—5-deelt, undersædigt eller halvt oversædigt; *Kronbladene* i tilsvarende Antal og afvejlende med Bægerets Flige, befæstede tilligemed Støvdragerne til Bægerrøret; *Støvdragerne* i [samme eller] dobbelt Antal; *Frugtknuden* dannet af 2 Frugtblade, med talrige *Æg*; 2 *Grifler* med udeelte *Ar*; *Frugten* kapselagtig, 1—2-rummet, opspringende i Spidsen eller paa langs.

354. *Saxifraga* 3. 355. *Chrysosplenium* . . 2.

LXIX. Ribesiaceæ Rehb. (Ribsfamilien) And. t. 13. Buske med spredte, haandnervede *Blade*; *Blomsterne* regelmæssige, tvekjønnede eller særkjønnede; *Bægeret* femdeelt; *Kronbladene* befæstede til en oversædig Skive i Bægerets Svælg, i tilsvarende Antal til og afvejlende med Bægerfligene; 5 *Støvdragere*; *Frugtknuden* undersædig, tobladet, enrummet, med talrige *Æg* befæstede til vægstillede *Ægstole*; *Griflerne* 2, frie eller tildeels sammenvoxede, *Frugten* bæragtig, med det henvisnede Bæger i Spidsen, fleerfrøet; *Frøene* omgivne af en geleeagtig Frøhud; *Kim*en ret.

356. *Ribes* 4.

LXX. Ranunculaceæ Juss. (Ranunkelfamilien) And. t. 9.
 Urter [eller Halvbuske] med oftest afvejlende, omskedende *Blade* uden *Axelblade*; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige eller uregelmæssige, undersædige; *Bægeret* 3—6-bladet, grønt eller farvet; *Kronbladene* affaldende, i tilsvarende eller større Antal mod Bægerbladene, eller 0; *Støvdragerne* i ubestemt Antal, frie; *Frugtknuderne* [oftest] adskilte, i bestemt eller ubestemt Antal (sjeldnere 1), enrummede, med 1—flere *Æg* befæstede til Bugsømmen; *Griffel* og *Ar* enkelte; *Frugterne* flere Nødder eller Bællekapsler (sjeldnere 1 Bær eller 1 fleerrummet Kapsel); *Frøene* vandrette; *Kimen* ret, liden; *Frøhvide* hornagtig.

a. *Anemoneæ*. Bægeret farvet; Kronen 0; Fr. ∞ Nødder, ofte med vedblivende Griffel (Frøhale).

357. *Thalictrum* 4. 359. *Pulsatilla* 2.
 358. *Anemone* 3.

b. *Ranunculeæ*. Blomsterdækket dobbelt; Frugterne ∞ Nødder.

360. *Myosurus** 1. 362. *Ranunculus* 12.
 361. *Ficaria* 1. 363. *Batrachium* 9.

c. *Helleboreæ*. Bægeret farvet; Kronbladene 0 eller ufuldkomne; Frugterne krandsstillede Bællekapsler.

364. *Caltha* 1. 367. *Aquilegia* 1.
 365. *Trollius* 1. 368. *Aconitum* 1.
 366. *Eranthis* 1. 369. *Delphinium* 1.
 (Helleborus).

d. *Pæoniaceæ*. Bægeret grønt; Kronbladene farvede eller 0; Støvknapperne indadvendte; Frugterne [Bællekapsler eller] Bær.

370. *Actæa* 1.

LXXI. Berberidææ Vent. (Berberisfamilien) And. t. 9.
 Buske [eller Urter] med tornet-tandede *Blade* (de primære Blade ofte omdannede til Torne), og smaae affaldende *Axelblade*; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, undersædige; *Bægeret* farvet, 6 [3—4—9] -bladet, dets Blade i 2 Rækker; *Kronbladene* i tilsvarende Antal i 2 Rækker, modsatte Bægerbladene (den ydre Række af Kronbladene modsat den ydre Række Bægerblade o. s. v.), ofte *Kirtler* ved Grunden af Kronbladene; *Støvdragerne* i samme Antal og modsatte Kronbladene; *Støvknapperne* elastisk opspringende ved Klapper; *Frugtknuden* enkelt, enrummet; *Griffelen* kort eller 0; *Arret* skjoldformet; *Frugten*

(bæragtig) 1—faafroet; *Frøene* med ret *Kim* og kjødagtig eller hornagtig *Frøhvide*.

371. *Berberis* 1.

LXXXII. Papaveraceæ DC. (Valmuefamilien) And. t. 9. (Urter) med (hvid eller guul) Mælkesaft; *Bladene* alm. spredte, uden Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, undersædige; *Bægeret* tobladet, affaldende; *Kronbladene* (4) affaldende; *Støvdragerne* frie, i ubestemt Antal; *Frugtknuden* 2—fleerbladet, ved de indbøiede *Ægstole* ufuldstændigt 2—flerrummet; *Arrene* siddende, vedblivende, med Flige af Frugtbladene Antal; *Frugten* kapselagtig, toklappet, opspringende paalangs eller ved de ufuldstændige Skillevægge falsk flerrummet, opspringende ved Huller i Spidsen under Arret; *Frøene* med liden *Kim*, olieholdig *Frøhvide*.

372. *Papaver* 4. 374. *Chelidonium* 1.

373. *Glaucium* 1.

LXXXIII. Fumariaceæ DC. (Jordrøgfamilien) And. t. 10. Urter med vandagtige Safter; *Bladene* dybt deelte uden Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede, undersædige, med Dækblade; *Bægeret* tobladet, affaldende (eller 0); *Kronbladene* 4, affaldende, de 2 ydre frie, ofte med en Spore, de 2 indre i Spidsen sammenhængende, uligestore med de ydre; *Støvdragerne* 6, med sammenvoxede *Støvtraade* i 2 Bundter (den midterste i hvert Bundt med torummet, de ydre med enrummede Støvknapper); *Frugtknuden* enkelt, med 1—flere *Æg*; *Arret* siddende, heelt eller tofliget; *Frugten* enfroet, uoppringende eller toklappet, kapselagtig med flere *Frøe*; liden *Kim* ved Grunden af *Frøhviden*.

375. *Fumaria* 3. 376. *Corydalis* 5.

LXXXIV. Cruciferæ Juss. (Korsblomstrede) And. t. 10. Urter, alm. indeholdende skarpe Stoffer, med typisk afvexlende, fjernervede *Blade*, uden Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede, undersædige, i (først halvskjærmformede, senere) forlængede Klaser, alm. uden Dækblade; *Bægeret* firebladet, affaldende, de 2 ydre Bægerblade (ligefor Frugtens Klapper) undertiden bredere og med udvidet Basis; *Kronbladene* 4, med Negle, afvexlende med Bægerbladene; *Støvdragerne* 6, de 2 i den ydre Kreds kortere, ligefor de ydre Bægerblade, de 4 i den indre Kreds længere, ligefor Kronbladene; *Kirtler* paa Frugtbunden; *Frugtknuden* tobladet, torummet; 1 *Griffel* med mere eller mindre tydeligt todeelt *Ar*; *Frugten* 1 Skulpe, ved en hinde-

agtig Skillevæg (den udvidede Frøstol) afdeelt paalangs i 2 Rum, med *Frøene* hefæstede i 2 Rækker paa hver Side af Skillevæggen; Klapperne opspringende fra neden (sjældnere Ledskulper med flere Tværrum eller 1—faafrøet og uop-springende); *Frøene* uden *Frøhvide*, med krum *Kim* og olieholdige *Frøblade*.

a. *Pleurorrhizæ* (o =) Frøbladene flade, Rodspidsen indbøiet mod deres sammenstødende Rand.

377. Dentaria	1.	384. Lunaria	1.
378. Cardamine	6.	385. Berteroa	1.
379. Arabis	3.	386. Alyssum	1.
380. Turritis	1.	387. Cochlearia	3.
381. Barbarea	3.	388. Thlaspi	1.
382. Nasturtium	6.	389. Teesdalia	1.
383. Draba	2.	390. Cakile	1.

b. *Notorrhizæ*. (0 ||) Frøbladene flade, Rodspidsen indbøiet mod deres Ryg.

391. Hesperis	1.	396. Capsella	1.
392. Sisymbrium	3.	397. Lepidium	4.
393. Alliaria	1.	398. Neslia	1.
394. Erysimum	2.	399. Isatis	1.
395. Camelina	3.	400. Senebiera	1.

c. *Orthoplocæ* (») Frøbladene foldede paalangs, med Rodspidsen indbøiet mod Folden.

401. Brassica	5.	403. Raphanus	1.
402. Sinapis	2.	404. Subularia	1.
(Diplotaxis).		405. Crambe	1.

d. *Spirolobeæ* (0 ∞) Frøbladene spiralformigt indrullede.

406. Bunias 1.

LXXV. **Resedaceæ** DC. (Resedafamilien) And. t. 8. (Urter) med spredte *Blade*; *Blomsterne* i Klaser eller Ax, tvekjønnede, undersædige; *Bægeret* 4—7-deelt, uregelmæssigt, vedblivende; *Kronbladene* i tilsvarende Antal, fligede (undertiden 0); *Støvdragerne* 12—24, frie, befæstede til en skiveformet Udvidelse af Frugtbunden; *Frugtknuden* enrummet, aaben i Spidsen, dannet af 3—6 Frugtblade med et lige Antal korte *Grifler*; *Frugten* kapselagtig, med Undtagelse af den oprindelige Aabning i

Spidsen uopspringende, enrummet, 3—6-hjørnet, med *Frøstole* i Hjørnerne, talrige *Frøe* med krum *Kim* uden Frøhvide.

407. Reseda 1.

LXXVI. Nymphæaceæ DC. (Aakandefamilien) And. t. 9. Vandplanter med krybende Rodstok, hele, rundagtige, paa Vandfladen svømmende *Blade* med i Knoptilstanden indrullet Rand; *Blomsterne* enlige paa Blomsterstilkene, endestillede uden Dækblade, tvekjønnede, regelmæssige; *Bægeret* 4—5-bladet; *Frugtbunden* udvidet, tildeels omsluttende Frugtknuden og bærende Krone og Støvdragere; *Kronbladene* talrige, i flere Rækker; *Støvdragere* i ubestemt Tal, frie, med fladtrykte, ofte kronbladagtige *Støvtraade* og indadvendte *Støvknapper*; *Frugtknuden* mange-rummet, med talrige, vægstillede *Æg*; *Griffelen* kort, udvidet til et straaaleformet, vedblivende *Ar*; *Frugten* uopspringende, ved den vedblivende, kjødfulde Frugtbund bæragtig; *Frøene* talrige, med ret *Kim* ved Grunden af *Frøhviden*, som er dels melet (Perisperm), dels klar og gjennemsigtig (Endosperm).

408. Nuphar 1. 409. Nymphæa 1.

LXXVII. Cistineæ Juss. (Soløiefamilien) And. t. 11. Halv-buske med (modsatte) hele *Blade*, med [eller uden] *Axelblade*; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, undersædige; *Bægeret* fem-bladet, de 2 ydre Bægerblade ofte mindre end de 3 indre [eller 0]; *Kronbladene* typisk 5, affaldende; *Støvdragerne* i ubestemt Antal, frie; *Frugtknuden* (trebladet), enrummet, med vægstillede *Ægstole*; 1 *Griffel*; *Frugten* kapselagtig, opspringende fra oven i Klapper af Frugtbladenes lige eller dobbelte Antal; *Frøene* (talrige) med melet *Frøhvide* og krum *Kim*.

410. Helianthemum 1.

LXXVIII. Pyrolaceæ Lindl. (Vintergrønfamilien) And. t. 16. Vedvarende Urter med oftest stedsegrønne *Blade*; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, undersædige; *Bægeret* femdeelt, vedblivende; *Kronbladene* 5, affaldende; *Støvdragerne* 10, frie; *Støvknapperne* opspringe ved Huller i Spidsen; *Frugtknuden* femrummet med 5 (vægstillede?, tilsyneladende midtstillede) *Ægstole*, 1 *Griffel* med rundagtigt lappet *Ar*; *Frugten* kapselagtig, femklappet med rumdelende Opspringning; *Frøene* talrige, smaae, omgivne af en løs Frøhud; *Kim*en ret, *Frøhviden* kjødagtig.

411. Pyrola 6.

LXXIX. Monotropeæ Nutt. (Snylterødfamilien) And. t. 16. Snyltevæxter med skjælformede, ikke grønne *Blade*; *Blomsterne*

tvekjønnede, undersædige, med regelret, 4—5-deelt *Bæger*; *Kronbladene* 4—5, vedblivende; *Støvdragerne* i Kronbladenes dobbelte Antal, frie, med Tilhængsler ved Grunden af Støvtraadene; *Støvknapperne* enrummede, opspringende ved Spalter paatværs (eller kalvkredsformigt); *Frugten* 4—5-rummet, med rundelende Opspringning, 1 *Griffel* med fladt, rundtakket *Ar*; *Frøene* talrige, smaae, omgivne af en løs Frøhud; *Frøhviden* kjødagtig.

412. Monotropa 2.

LXXX. Droseraceæ DC. (Soldugfamilien) And. t. 12. Urter med *Bladene* samlede ved Grunden, alm. med kirtelbærende Haar og i Knoptilstanden spiralformigt indrullede; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, undersædige; *Bægeret* fembladet; *Kronbladene* i samme Tal og afvejlende med Bægerbladene (*Støvdragere* 5); *Frugtknuden* enrummet med 3—5 vægstillede *Ægstole*; *Grifler* eller *Ar* 3—5; *Frugten* kapselagtig, opspringende paalangs, med talrige *Frøe* paa Midten af Klapperne; *Kimen* ret; *Frøhviden* kjødagtig.

413. Drosera 3. 414. Parnassia 1.

LXXXI. Violarieæ DC. (Violfamilien) And. t. 12. (Urter) med enkelte *Blade* og *Axelblade*; *Blomsterne* tvekjønnede, undersædige, med 2 *Dækblade* paa Blomsterstilkene; *Bægeret* fembladet, uregelmæssigt; *Kronbladene* 5, uligestore eller uregelmæssige (det øvre ofte større, ved Blomsterstilkenes Dreining nedadvendt og forsynet med en Spore); *Støvdragere* 5, med udvidede *Støvtraade* og indadvendte, sammenstødende eller sammenvoxede *Støvknapper*, Knapbaandet forlænget udenfor Rummene; *Frugtknuden* enkelt, trebladet, enrummet, med vægstillede *Ægstole*; 1 *Griffel*; *Frugten* kapselagtig, treklappet, opspringende paalangs, med talrige *Frøe* paa Midten af Klapperne; *Kimen* ret; *Frøhviden* kjødagtig.

415. Viola 11.

LXXXII. Cucurbitaceæ Juss. (Agurkfamilien) And. t. 13. Urter med safrige, ved Hjælp af *Slyngtraade* klattrende *Stængler*; spredte, haandnervede, hvashaarede *Blade*; *Blomsterne* særkønnede, regelmæssige, typisk femdeelte; ♂: *Støvdragerne* befæstede til Kronrøret, 5, i 3 Bundter (de 4 parviis sammenvoxede, den femte fri) [eller alle i 1 Bundt]; ♀: *Bægeret* femfligt; *Kronbladene* 5, afvejlende med Bægerfligene, frie eller forneden sammenvoxede indbyrdes og med Bægeret; *Frugtknuden* undersædig, 3 [—5]-rummet, med tilbagebøjede Skillevægge og herved

mere eller mindre fuldstændigt 6 [—10]-rummet; *Æggene* be-
fæstede i flere Rækker til Skillevæggens tilbagebøiede Rand;
Frugten bæragtig, 3—5-rummet eller tilsidst enrummet; *Kimen*
ret, *Frøhvide* 0.

416. *Bryonia* 2.

LXXXIII. **Portulacææ** Juss. (Portulakfamilien) And. t. 17.
Urter med heelrandede, kjødfulde *Blade*; *Blomsterne* tvekjøn-
nede; (*Bægeret* tobladet) [eller 2—5-fliget]; *Kronen* 4—6-bladet
(hos *Montia* femfliget) eller 0, befæstet til *Bægeret*; *Støvdragerne*
(3) [eller 5—20], befæstede til Bægerrøret eller Frugtbunden;
Frugtknuden enrummet, med flere *Æg* befæstede til en midt-
stillet *Ægstol*; (3 *Ar*) [eller 1 Griffel med 1—8 *Ar*]; *Frugten*
kapselagtig (treklappet); *Frøene* med krum *Kim* og melet *Frøhvide*.

417. *Montia* 2.

LXXXIV. **Paronychiææ** St. Hil. (Sandurter) And. t. 17.
Urter med heelrandede, modsatte eller sjældnere afvexlende
Blade og typisk hindeagtige *Axelblade*; *Blomsterne* tvekjønnede,
regelmæssige; *Bægeret* typisk femdeelt; *Kronbladene* 5, befæstede
til Bægerets nedre Deel (eller 0); *Støvdragerne* i tilsvarende
eller dobbelt Antal (i sidste Tilfælde ofte hveranden gold);
1 fri, enrummet *Frugtknude* med 1—2 *Æg*; 2 *Grifler* eller
Ar; *Frugten* enfrøet Hindefrugt eller Nød; *Kimen* krummet.

a) *Scleranthææ*. Bladene modsatte, uden *Axelblade*; *Frugten* Nød,
omsluttet af det vedblivende Bæger.

418. *Scleranthus* 2.

b) *Herniarieæ*. Bladene afvexlende eller modsatte, med hindeagtige
Axelblade; *Fr.* en fri Nød eller Hindefrugt.

419. *Corrigiola* 1. 421. *Illecebrum* 1.

420. *Herniaria* 2.

c) *Sperguleæ*. Bladene modsatte eller krandsstillede, med hindeagtige
Axelblade; *Fr.* en flerfrøet Kapsel.

422. *Lepigonum* 4. 423. *Spergula* 3.

LXXXV. **Alsinaeææ** Bartl. (Fladstjernefamilien) And. t. 12.
Urter [eller Halvbuske] med modsatte, heelrandede *Blade*, uden
Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, undersædige,
i qvastformet Blomsterstand; *Bægeret* dybt 4—5-deelt eller
-bladet; *Kronbladene* med kort Negl, i tilsvarende Antal og
afvexlende med Bægerbladene (sjældnere 0); *Støvdragerne* i
dobbelt eller samme Antal; *Frugtknuden* siddende, enrummet,

Æggene befæstede til en fri, grund- eller midtstillet *Ægstol*; 3—5 *Grifler*; *Frugten* kapselagtig, opspringende fra oven i Tænder eller Klapper af Griflernes lige eller dobbelte Antal; *Frøene* talrige, med krum eller spiraldreiet *Kim* og midtliggende, melet eller kjødagtig *Frøhvide*.

424. <i>Sagina</i>	6.	429. <i>Holostium</i>	1.
425. <i>Alsine</i>	1.	430. <i>Stellaria</i>	7.
426. <i>Halianthus</i>	1.	431. <i>Cerastium</i>	7.
427. <i>Arenaria</i>	1.	432. <i>Malachium</i>	1.
428. <i>Moehringia</i>	1.		

LXXXVI. **Silenaceæ** Braun. (Nellikefamilien) And. t. 12. Urter eller Halvbuske med modsatte, hele, ofte ved Grunden sammenvoxede *Blade* uden *Axelblade*; *Blomsterne* tvekjønnede, sjældnere særkjønnede, regelmæssige, undersædige, i en alm. qvastformet Blomsterstand; *Bægeret* sambladet, (5-) tandet; *Kronbladene* (5) med tydelige *Negle* (og ofte *Bikronblade*), tilligemed de i Almindelighed i dobbelt Antal tilstedeværende *Støvdragere* befæstede til Frugtbunden, der ofte er forlænget til en Frugtholder (carpophorum) indenfor Bægeret; *Frugtknuden* enrummet eller ved Grunden ufuldstændigt 3—5-rummet, 2—5 *Grifler*; *Frugten* og *Frøet* som hos foreg. Fam.

433. <i>Gypsophila</i>	1.	437. <i>Melandrium</i>	3.
434. <i>Dianthus</i>	5.	438. <i>Lychnis</i>	1.
435. <i>Saponaria</i>	1.	439. <i>Viscaria</i>	1.
436. <i>Silene</i>	7.	440. <i>Agrostemma</i>	1.

LXXXVII. **Malvaceæ** Juss. (Katostfamilien) And. t. 11. Urteagtige [eller træagtige] Væxter med afvexlende, oftest haandnervede *Blade* og (vedblivende) *Axelblade*; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, undersædige; *Bægeret* fembladet eller femdeelt, omgivet af et *Yderbæger*; *Kronbladene* 5, afvexlende med Bægerbladene, befæstede til Frugtbunden og med *Neglene* sammenvoxede med de til et Bundt forenede, talrige *Støvtraade*; *Frugtknuderne* flere samlede om en fælles *Axe*; flere forneden sammenvoxede *Grifler*; *Frugten* ved Modenheden en mangedelelig Spaltefrugt med enfrøede, uoppringende *Smaafrugter* omkring den vedblivende Griffelbasis [hos flere udenlandske Slægter er Fr. en mangefrøet Kapsel]; *Frøe* med krum *Kim* og sparsom, kjødagtig eller slimet *Frøhvide*.

441. <i>Malva</i>	5.	442. <i>Althæa</i>	1.
-----------------------------	----	------------------------------	----

LXXXVIII. **Tiliaceæ** (Lindefamilien) And. t. 11. Træagtige Væxter med afvexlende, enkelte *Blade* og affaldende [eller vedblivende] *Axelblade*; *Blomsterne* tvekjønnede, regel-

mæssige, undersædige, (med et til Blomsterstilken fastvoxet Dækblad); *Bægeret* 4—5-bladet; *Kronbladene* i tilsvarende Antal og afvejlende med Bægerbladene, og, ligesom disse, affaldende; *Støvdragerne* i ubestemt Antal, indbyrdes frie; *Frugtknuden* 2—10-rummet (hos *Tilia* femrummet med 2 Æg i hvert Rum); *Griffelen* 1; *Arret* med Lapper af Frugtbladenes Antal; *Frugten* kapselagtig eller opspringende (hos *Tilia* enrummet, enfrøet, uopspringende); *Kimen* ret; *Frøhviden* kjødagtig.

443. *Tilia* 3.

LXXXIX. Hypericineæ DC. (Perikonfamilien) And. t. 11. Urter [eller Buske og Træer] med modsatte, hele, fjernervede, af indsænkede Kirtler punkterede *Blade* uden Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, undersædige; *Bægeret* fem-bladet, vedblivende; *Kronbladene* i tilsvarende Antal og afvejlende med Bægerbladene (gule); *Støvdragerne* i ubestemt Tal, tilligemed *Kronbladene* befæstede til Frugtbunden, forneden alm. forenede til Bundter; *Frugtknuden* 3 [—5]-bladet, ved de indbøiede Rande mere eller mindre fuldstændigt 3 [—5]-rummet; *Grifler* af Frugtbladenes Antal; *Frugten* kapselagtig, med skillevægdelende Opspringning fra oven, mangefrøet; *Frøene* uden Frøhvide.

444. *Hypericum* 7.

XC. Elatineæ Juss. (Bækarver) And. t. 12. Enaarige, urteagtige Vandplanter med modsatte *Blade* og *Axelblade*; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, undersædige, i Bladhjørnerne; *Bægeret* 3—5-deelt; *Kronbladene* i samme Antal, afvejlende med Bægerbladene; *Støvdragerne* i tilsvarende eller dobbelt Antal, tilligemed *Kronbladene* befæstede til Frugtbunden; *Frugtbladene* 3—5 med et tilsvarende Antal korte *Grifler* og hovedformede *Ar*; *Frugten* 3—5-klappet med talrige, [rette eller] bøiede *Frøe* uden Frøhvide.

445. *Elatine* 2.

XCI. Acerineæ DC. (Valbirkfamilien) And. t. 8. Træagtige Væxter med modsatte, oftest haandlappede *Blade* uden Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede eller særkjønnede, regelmæssige, undersædige; *Bægeret* 4—5-bladet, affaldende; *Kronbladene* i samme Antal og afvejlende med Bægerbladene (eller 0); *Støvdragerne* typisk i dobbelt Antal, befæstede tilligemed *Kronbladene* til en undersædig Skive; *Frugtknuden* torummet, med 2 hængende Æg i hvert Rum; 1 *Griffel* og et todeelt *Ar*; *Frugten* todelelig Spaltefrugt; *Smaafrugterne* oftest enfrøede Vinge-frugter fasthæftede ved den vedblivende, ofte tokløvede *Frugstol*; *Kimen* med sammenfoldede Frøblade, uden Frøhvide.

446. *Acer* 3.

XCII. Hippocastaneæ DC. (Hestekastaniefamilien). Træagtige Væxter med modsatte, (oftest) fingrede *Blade* uden Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede, uregelmæssige, undersædige; *Bægeret* femdeelt; *Kronbladene* 4—5, uligestore; *Støvdragerne* 6—9, med opstigende, indbyrdes adskilte Støvtraade; *Frugtknuden* trerummet, 2 Æg i hvert Rum, befæstede til Frugtbladenes i Midten sammenstødende Rande; 1 *Griffel*; *Frugten* treklappet Kapsel med rumdelende Opspringning og 1—2-frøede Rum; *Frøene* store, med læderagtig Skal; *Kimen* krummet, med store, kjødagtige Frøblade, Frøhvide 0.

447. *Aesculus* 1.

XCIII. Polygaleæ Juss. (Mælkurtfamilien) And. t. 10. Urter eller Halvbuske med spredte, udeelte *Blade* uden Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede, uregelmæssige, undersædige; *Bægeret* fembladet, de 3 ydre Bægerblade mindre, de 2 indre større, farvede; *Kronbladene* 3—5, forneden sammenvoxede med Støvdragerne, det nedre (bageste) læbe- eller kjølformet; *Støvdragerne* 8; *Støvtraadene* sammenvoxede i 2 Bundter; *Støvknapperne* enrummede; *Frugtknuden* torummet, med 1 hængende Æg i hvert Rum; 1 *Griffel*; (*Frugten* torummet Kapsel med rumdelende Opspringning; *Frøene* omgivne af Frøhud); *Kimen* ret.

448. *Polygala* 3.

XCIV. Frangulaceæ (Endl.) (Beenvedfamilien) And. t. 7. Buske eller Træer med afvexlende eller modsatte, fjernervede *Blade*; *Blomsterne* tvekjønnede eller særkjønnede, regelmæssig 4—5-deelte; *Bægeret* under- eller omkringsædigt; *Kronbladene* afvexlende med og i samme Tal som Bægerbladene, frie eller forneden sammenvoxede, befæstede til Bægeret eller en omkringsædig Skive (undertiden 0); *Støvdragerne* i samme Antal, afvexlende med eller modsatte Kronbladene og befæstede til disses nedre Deel eller den omkringsædige Skive; *Frugtknuden* fri, 2—5-rummet, med 1 Æg i hvert Rum; *Frugten* bæragtig med forhærdede Skillevægge eller kapselagtig opspringende; *Kimen* ret; *Frøhviden* kjødagtig. .

a. *Ilicineæ*. Kronen sambladet. Frugten bæragtig.

449. *Ilex* 1.

b. *Rhamneæ*. Kronen fribladet; Støvdragerne modsatte imod Kronbladene; Frugt bæragtig.

450. *Rhamnus* 2.

c. *Celastrineæ*. Kronen fribladet, afvejlende med Støvdr., Frugten kapselagtig, Frøe med Frøhud.

451. *Euonymus* 1.

XCV. *Empetrea* Nutt. (Kræklingfamilien) And. t. 16. Buskvæxter med smale, læderagtige, stedsegrønne *Blade*; *Blomsterne* tveboe, enlige i Bladhjørnerne; *Bæger* og *Krone* trebladede; ♂: *Støvdragerne* 4, afvejlende med Kronbladene; ♀: 1 fri, 5—6-rummet *Frugtknude* med enfrøede Rum; 1 *Griffel* med straaleformet lappet *Ar*; *Frugten* et Steenbær med 3—6 Stene.

452. *Empetrum* 1.

XCVI. *Euphorbiaceæ* Juss. (Vortemælkfamilien) And. t. 16. Urter [i varmere Lande hyppigt Træer] ofte med Mælkesaft; *Blomsterne* særkønnede, (♂: *Støvdragerne* frie;) ♀: *Blomsterdækket* undersædigt eller 0; 2—3 *Grifler*; *Frugtknuden* 2—3-rummet, med 1—2 Æg i hvert Rum; *Frugten* ved Modningen 2—3-delelig Spaltefrugt (med toklappet opspringende enfrøede *Smaafrugter*); *Kimen* ret; *Frøhviden* kjødagtig.

a. *Euphorbiææ*. ♂ og ♀ *Blomsterne* samlede til en *Blomsterkop* 3: omgivne af et fælles fembladet Hylster (*Kopdække*); talrige, nøgne, enhannede ♂ *Blomster* paa en leddet Stilk, med særegne Dækblade ved Grunden; 1 midtstillet ♀ *Blomst*; uden eller med utydeligt *Blomsterdække*, 3 *Grifler* med tolappede eller udrandede *Ar*; *Frugten* tredelelig.

453. *Euphorbia* 4.

b. *Acalypheæ*. Tvebo; ♂: *Blomsterdækket* tredeelt; *Støvdragere* 9-12; ♀: *Blomsterdækket* tredeelt, 2 *Grifler*; todelelig *Spaltefrugt*.

454. *Mercurialis* 2.

† (*Juglandææ* DC. (Valnødfamilien) And. t. 20. Træer med finnede *Blade*; *Blomsterne* særkønnede: ♂ *Blomsterne* i Rakler, med fliget *Blomsterdække*, ∞ *Støvdragere*; ♀ *Blomsterne* i Nøgler med firedeelt, oversædigt *Bæger*, *Frugten* undersædigt *Steenfrugt*; Frøet uden Frøhvide, med store, lappede Frøblade).

(Juglans.)

XCVII. *Geraniaceæ* DC. (Storkenæbfamilien) And. t. 11. (Urter) med *Bladene* ofte forneden modsatte og *Axelblade*; *Blomsterne* tvekønnede, undersædige, alm. parvise paa *Blomsterstilkene* eller i Skjærm, omgivne af *Dækblade*; *Bægeret* fembladet, vedblivende, *Kronbladene* afvejlende med og i samme Tal som *Bæg.*, affaldende; *Støvdragerne* alm. dobbelt saa mange som

Kronbladene, og tilligemed disse befæstede til Frugtbunden; *Støvtraadene* stundom ved Grunden sammenvoxede eller i den ydre Kreds golde; 5 *Frugtknuder* omkring en midtstillet *Frugtstol*, med hvis sølleformede Forlængelse de 5 *Grifler* ere sammenhængende; *Frugten* femdelelig Spaltefrugt; *Smaafrugterne* enfrøede, i Bugsømmen opspringende Hindefrugter, der adskille sig fra Frugtstolen ved de nedenfra spiralformigt tilbagerullede *Grifler*; *Kimen* krum; *Frøhvide* 0.

455. *Geranium* 12. 456. *Erodium* 1.

XCVIII. Lineæ DC. (Hørfamilien) And. t. 11. Urter [eller Halsbuske] med heelrandede *Blade* uden Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, undersædige; *Bægeret* vedblivende, 4—5-bladet; *Støvdragerne* i samme Antal (eller undertiden Spor til en anden Kreds i Form af tandformede Bistøvdragere), tilligemed de affaldende Kronblade befæstede til Frugtbunden; *Frugtknuden* 1—5-rummet, med 2 Æg i hvert Rum; *Griflerne* 4—5; *Frugten* kapselagtig, 4—5-rummet med skillevægdelende Opspringning eller ved en ufuldstændig Ryg-Skillevæg deelt i et dobbelt Antal Rum; *Frøene* fladtrykte; *Frøhvide* 0; *Kimen* ret.

457. *Linum* 1. 458. *Radiola* 1.

XCIX. Oxalidæ DC. (Suurkløverfamilien) And. t. 11. (Urteagtige) Væxter med sammensatte, i Knopstilstanden spiralformigt indrullede *Blade*; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, undersædige; *Bægeret* fembladet; *Kronbladene* 5, paa Frugtbunden, afvexlende med Bægerbladene; *Støvdragerne* 10, ved Grunden sammenvoxede, de 5 (mindre) modsatte Kronbladene, de 5 (større) modsatte Bægerbladene; *Frugtknuden* femrummet; *Grifler* 5; *Frugten* femrummet Kapsel, opspringende ved Længderidser i Midten [eller uoppringende]; *Frøene* (omgivne af Frøhud) med kjødagtig *Frøhvide*.

459. *Oxalis* 3.

C. Balsamineæ A. Rich. (Balsaminefamilien) And. t. 10. Saftige Urter med fjernervede *Blade* uden Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede, typisk femdeelte; *Bægeret* uregelm., affaldende, det bageste Bægerblad forlænget til en Spore, de 2 forreste smaae eller 0; *Kronen* uregelret, dens *Blade* afvexlende med Bægerbl., det forreste størst, de bageste og Sidebladene alle sammenvoxede, hvorved Kronen synes trebladet); *Støvdragerne* 5 med i Randen sammenhængende *Støvknapper*; *Frugtknuden* 5-rummet,

fri, med siddende *Ar*; (*Frugten* alm. kapselagtig, elastisk opspringende i 5 Klapper med rumdelende Opspringning); *Frøstolen* midtstillet; *Frø* med ret *Kim* uden *Frøhvide*.

460. *Impatiens* 1.

† (*Philadelphæa* Don. Buske med modsatte *Blade* uden Axelblade, *Blomsterne* tvekjønnede, regelm., modsatte i Bladhjørnerne eller i en endestillet Qvast, oversædige, *Bægerets* Krave firedeelt; 4 affaldende *Kronblade* afvejlende med *Bægerfligene*; *Støvdragere* i ubestemt Antal; 1 *Griffel* med 4—5 deelt *Ar* eller flere ved Grunden sammenvoxede Grifler, *Frugtknuden* 3—10-rummet, undersædig, med vægstillede *Ægstole*; *Frugten* en i Spidsen opspringende *Kapsel* med talrige, smaae *Frøe* omgivne af en løs hindeagtig *Frøhud*, *Kim*en ret i Midten af en kjødfuld *Frøhvide*).

(*Philadelphus*).

CI. *Onagraricæ* Juss. (Natlysfamilien) And. t. 14. (Urter) med fjernervede, spredte eller modsatte *Blade* uden Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede, typisk regelrette, oversædige; *Bægeret* to- eller firefliget; *Kronbladene* i samme Antal, afvejlende med og befæstede til *Bægeret*; *Støvdragerne* i samme eller dobbelt Tal paa *Bægeret*; *Frugtknuden* undersædig, fire-, sjeldnere torummet; Rummene 1—∞-frøede med midtstillet *Ægstol*; 1 *Griffel* med fliget *Ar*; *Frugten* firerummet *Kapsel*, opspringende fraoven eller torummet uoppringende, *Kim* ret; *Frøhvide* 0.

461. *Epilobium* 8. 463. *Oenothera* 1.

462. *Chamænerium* . . 1. 464. *Circæa* 3.

CII. *Halorrhagæa* R. Br. (Vandspirene) And. t. 14. Vandplanter med modsatte eller krandsstillede *Blade* uden Axelblade, *Blomsterne* krandsstillede (ufuldstændige); *Bægerets* Krave oversædig, typisk firedeelt, undertiden mangetandet, utydelig eller 0; *Kronbladene* 0 eller af Antal og afvejlende med *Bægerfligene*; *Støvdragerne* typisk af lige eller dobbelt Antal med *Bægeret*, sjeldent kun 1; *Frugtknuden* undersædig, 1—4-rummet, med 1 *Æg* i hvert Rum; *Frugten* nød- eller steenfrugtagtig, enfrøet eller ved Modenheden adskilt i 4, enfrøede *Smaafrugter*; *Kim*en ret, indsluttet af en kjødfuld *Frøhvide*.

465. *Myriophyllum* . . 3. 466. *Hippuris* 1.

CIII. *Lythraricæ* Juss. (Kattehalerne) And. t. 13. (Urteagtige) Væxter med modsatte (heelrandede) *Blade* uden Axelblade; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige; *Bægeret* omkring-

sædigt, sambladet, deelt i 6 ydre og 6 indre Tænder; *Kronbladene* befæstede til Bægerets Svælg, af samme Antal som og afvejlende med dettes indre Tænder; *Støvdragerne* i lige eller dobbelt Antal mod Kronbladene, befæstede til Bægerrøret; *Frugtknuden* fri, 2- [—6-] rummet, med talrige *Æg* befæstede til en midtstillet, med Skillevæggen sammenvoxet *Ægstol*; 1 *Griffel*, udeelt *Ar*; *Frugten* (torummet, toklappet) Kapsel omgivet af det vedblivende Bæger; *Kimen* ret; *Frøhvide* 0.

467. Peplis 1. 468. Lythrum 1.

CIV. **Pomaceæ** Lindl. (Kjærnefrugtfamilien) And. t. 14. Træer eller Buske med afvejlende *Blade* og affaldende eller vedblivende *Axelblade*; *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige, oversædige; *Bægerets* Krave femdeelt; *Kronbladene* i tilsvarende Antal og afvejlende med Bægerfligene, befæstede til disses Svælg og oversædige Ring; *Støvdragerne* (befæstede paa samme Maade) i ubestemt Antal; *Frugtknuden* 1—5-rummet, med midtstillet *Ægstol* og 1 eller flere *Æg* i hvert Rum; *Griflerne* i samme Antal som Frugtknudens Rum; *Frugten* Æblefrugt o: Frøgjemmet med hindeagtige, bruskagtige eller beenhaarde Vægge, indsenkt i det kjødfulde, udhulede Bægerrør (Underbægeret); *Frøene* med ret Kim uden Frøhvide.

469. Cotoneaster . . . 1. 472. Pyrus 2.
470. Cratægus 2. 473. Cydonia 1.
471. Sorbus 5.

CV. **Rosaceæ** Juss. (part.) (Rosefamilien) And. t. 15. Urter eller Buske med afvejlende, oftest sammensatte eller dybt deelte *Blade* og vedblivende *Axelblade*; *Blomsterne* typisk tvekjønnede, regelmæssige; *Bægeret* omkringsædigt eller undersædigt, typisk fembladet eller -fliget, ofte med et *Yderbæger* af et tilsvarende Antal Flige; *Kronbladene* befæstede til Bægeret, af samme Antal som og afvejlende med Bægerfligene; *Støvdragerne* i ubestemt Antal, sjeldnere af lige Antal med Kronbladene, befæstede til Bægeret; *Frugtknuderne* oftest talrige, indbyrdes adskilte, sjeldnere i bestemt Antal; 1 *Griffel* for hver Frugtknude; *Frugterne* frie paa Frugtbunden eller indsluttede af Bægerrøret, alm. dannende en *Fleerfoldfrugt*, hvis enkelte Smaafrugter ere Nødder, Steenfrugter eller Bællekapsler; *Frøene* uden Frøhvide.

a. *Sanguisorbeæ*. Bægeret firefliget; *Frugtknuderne* i bestemt Tal; Fr. nødagtig, indsluttet af det forhærdede *Underbæger*.

474. Poterium. 1. 476. Alchemilla 2.
475. Sanguisorba . . . 1. 477. Agrimonia 2.

b. *Rosææ*. *Bægeret* femfliget, *Frugterne* i ubestemt Antal, nødagtige, omgivne af det kjødfulde *Underbæger* (Hyben). (Buske med Barktorne).

478. *Rosa* 9.

c. *Rubææ*. *Bægeret* fembladet, undersædigt, *Frugterne* i ubestemt Antal, Steenfrugter paa den frie *Frugtbund*. (Buske med Barktorne.)

479. *Rubus* 20.

d. *Dryadææ*. *Bægeret* fembladet, undersædigt (med femfliget Yderbæger); *Frugterne* i ubestemt Antal, Nødder paa den frie *Frugtbund* (Urter).

480. *Potentilla* 12. 482. *Comarum* 1.

481. *Fragaria* 3. 483. *Geum* 3.

e. *Spiræaceæ*. *Bægeret* femfliget, *Frugterne* frie, typisk 5 (sjældent flere eller færre) Bællekapsler.

484. *Spiræa* 3.

CVI. *Drupaceæ* DC. (Steenfrugtfamilien) And. t. 14. Buske eller Træer med afvejlende, hele, fjernervede *Blade* og affaldende *Axelblade* (Grenene ofte tilspidsede til Vedtorne); *Blomsterne* tvekjønnede, regelmæssige; *Bægeret* omkringsædigt, femfliget, tilligemed de i sammes Svælg befæstede 5 *Kronblade* og talrige *Støvdragere* affaldende; 1 enkelt, enrummet *Frugtknude*, med 1—2 hængende *Æg*; 1 *Griffel*; udeelt *Ar*; *Frugten* Steenfrugt med kjødagtigt Mellemlag og beenhaard Steen; 1 *Frø* med ret *Kim* uden Frøhvide. (Indeholde Blaasyre i Frøet, Barken og stundom i Bladene, og tillige Gummi).

485. *Prunus* 6.

CVII. *Papilionaceæ* L. (Ærteblomstrede) And. t. 15. (Urter eller Buske) med afvejlende, oftest sammensatte *Blade* og vedblivende *Axelblade*; *Blomsterne* tvekjønnede; *Bægeret* omkringsædigt, tolæbet eller uregelmæssigt femtandet; *Kronbladene* 5 uligestore; det øvre større (*Fanen*) i Knoplet yderst, de 2 mellemste ligestore (*Vingerne*), de 2 nedre (*Kjøl*) mere eller mindre sammenvoxede; *Støvdragerne* (10, med *Støvtraadene* forenede til 1 eller 2 (9 + 1) Bundter) tilligemed *Kronbladene* befæstede til Grunden af *Bægeret*; 1 *Frugtknude* med oftest talrige *Æg* befæstede til Bugsømmen; 1 *Griffel* med udeelt *Ar*; *Frugten* enrummet, fleerfrøet (sjældnere enfrøet) Bælle, opspringende paalangs i Bug- og Rygsømmen, sjældnere afdeelt paatværs eller uoppringende; *Frøene* med ingen eller liden *Frøhvide*; *Frøbladene* oftest kjødfulde.

a. *Loteæ*. *Frøbladene* bladagtige, ved Spiringen ovenfor Jorden; *Bladene* typisk fingrede, sjeldnere udeelte eller uligefinnede; *Bællen* opspringer paalangs.

486. Ulex	1.	493. Trigonella	1.
487. Sarothamnus	1.	494. Melilotus	4.
488. Genista	4.	495. Trifolium	13.
489. Cytisus	1.	496. Lotus	3.
490. Ononis	3.	497. Tetragonolobus	1.
491. Anthyllis	1.	498. Astragalus	3.
492. Medicago	4.	(Phaseolus).	

b. *Vicieæ*. *Frøbladene* kjødfulde, ved Spiringen under Jorden; *Bladene* typisk ligefinnede med Slynghtraade; *Bællen* opspringer paalangs.

499. Pisum	1.	502. Lathyrus	7.
500. Ervum	2.	503. Orobus	3.
501. Vicia	11.		

c. *Hedysareæ*. *Bællen* uopspringende, enfrøet eller afdeelt paatværs i enfrøede Led (*Bladene* uligefinnede uden Slynghtraad).

504. Onobrychis	1.	505. Ornithopus	1.
---------------------------	----	---------------------------	----

Antallet af de naturlige Familier, som ere repræsenterede i den danske Flora er altsaa (med Undtagelse af de lavere Cryptogamer), fordeelt i 3 større Hovedrækker, følgende:

Tofrøbladplanter	86 Familier,	382 Slægter,	975 Arter.
Enfrøbladplanter	15 —	104 —	339 —
Sporeplanter	6 —	19 —	64 —

Ialt . . . 107 Familier, 505 Slægter, 1378 Arter.

Antallet af de lavere Cryptogamers Familier, Slægter og Arter (med Undtagelse af Svampene) er omtrent følgende:

Alger	7 Familier,	129 Slægter,	371 Arter.
Lavarter	2 —	41 —	193 —
Mosser	3 —	115 —	357 —

Ialt . . . 12 Familier, 285 Slægter, 921 Arter.

Ordnete efter deres Antal af Arter komme de danske Familier i følgende Orden:

Familiens Navn.	Antal af Arter i Danmark.	Forholdstal til alle de her be- skrevne danske Planter.
Synanthereæ	128	9,3 p. c.
(Cichoraceæ 43).		
(Cynareæ 25).		
(Eupatoriaceæ 24).		
(Radiatæ 36).		
Gramineæ	110	8,0
Cyperaceæ	84	6,1
Papilionaceæ	66	4,8
Cruciferæ	60	4,4
Rosaceæ	57	4,1
Scrophulariaceæ	50	3,6
Umbelliferæ	48	3,5
Labiataæ	46	3,3
Ranunculaceæ	39	2,8
Fluviales }	32	2,3
Orchideæ }		
Salicineæ }		
Polygoneæ	28	2,0
Salsolaceæ	27	2,0
Alsinaceæ	26	1,9
Juncaceæ	25	1,8
Filices	24	1,8
Characeæ }	22	1,6
Asperifoliæ }		
Silenaceæ	20	1,5
Liliaceæ	18	1,3
Primulaceæ }	15	1,1
Rubiaceæ }		

Familiens Navn.	Antal af Arter i Danmark.	Forholdstal til alle de her be- skrevne danske Planter.
Paronychiææ	13	0,9 p. c.
Geraniaceæ		
Onagrariææ		
Violariææ	11	0,8
Pomaceæ		
Campanulaceæ	10	0,7
Solaneæ		
Crassulaceæ	9	0,7
Equisetaceæ	8	0,6
Alismaceæ		
Gentianeæ		
Ericineæ		
Fumariaceæ		
Lycopodiaceæ	7	0,5
Smilaceæ		
Caprifoliaceæ		
Hypericineæ		
Plantagineæ	6	0,4
Dispaceæ		
Lentibulariææ		
Pyrolaceæ		
Papaveraceæ		
Malvaceæ		
Drupaceæ	5	0,4
Typhaceæ		
Urticaceæ		
Cupuliferæ		
Valerianeæ		
Orobancheæ		
Saxifragaceæ		
Euphorbiaceæ		

Familiens Navn.	Antal af Arter i Danmark.	Forholdstal til alle de her be- skrevne danske Planter.
Narcissineæ Lemnaceæ Betulineæ Ulmaceæ Callitrichineæ Plumbagineæ Cuscutineæ Ribesiaceæ Droseraceæ Frangulaceæ Halorrhageæ	4	0,3 p. c.
Irideæ Aroideæ Coniferæ Oleineæ Polygaleæ Acerineæ Tiliaceæ Oxalideæ	3	0,2
Isoëteæ Hydrocharideæ Colchicaceæ Ceratophylleæ Aristolochieæ Convolvulaceæ Araliaceæ Corneæ Monotropeæ Nymphæaceæ Cucurbitaceæ Portulaceæ	2	0,2

Familiens Navn.	Antal af Arter i Danmark.	Forholdstal til alle de her be- skrevne danske Planter.
Elatineæ	2	0,2 p. c.
Lineæ		
Lytharieæ	1	0,1
Rhizocarpeæ		
Myricaceæ		
Thymeleæ		
Santalaceæ		
Elæagneæ		
Amarantaceæ		
Ambrosieæ		
Lobeliaceæ		
Apocyneæ		
Asclepiadeæ		
Verbenaceæ		
Loranthaceæ		
Berberideæ		
Resedaceæ		
Cistineæ		
Hippocastaneæ		
Empetreeæ		
Balsamineæ		

1^{ste} Klasse. Monandria (Enhannede).

1. Orden. Monogynia (Enhunnede).

A. Blomsterne hylsterløse.

1. **Hippuris** L. Stængelen bærer krandsstillede Blade; Bægeret oversædigt, i Form af en (utydelig) hindeagtig Rand; Krone 0; Arret sylformet, udeelt; Frugten nødagtig, beklædt af den vedblivende Bægerrand. (Naturl. Fam. Halorrhageæ.)

Salicornia L. Stængelen leddet, bladløs; (2, 1).

Alchemilla Aphanes L. (4, 1).

B. Blomsterne indsluttede af et Hylster.

Zostera L. Bladene flade, baandformede; Blomsterne nøgne, i ensidig, linieformet Kolbe. (21, 1).

Eriophorum alpinum L. (3, 1).

2. Orden. Digynia (Tohunnede).

Vulpia Gmel. Græsart med skjællignende Blomster; Frugten Græsfrugt. (3, 2).

Blitum capitatum og *virgatum* L. Frugten nødagtig, omgivet af det vedblivende, kjødfulde Blomsterdække. Blomster i Ax. (5, 2).

Callitriche L. Vandplante med Blomster i Bladhjørnerne; Frugten 4-delelig Spaltefrugt. (21, 1).

3. Orden. Tetragynia (Firehunnede).

Zanichellia L. (21, 1).

I. Monogynia.

1. Hippuris. Vandspirr.

1. *H. vulgaris* L. (Almindelig V.) H. p. 5; Drej. n. 1; F. D. t. 87.

Stængelen rank, udeelt, leddet, porøs; Bladkrandsene 8—12-bladede; *Bladene* linieformede, med bruskagtig Spids; *Blomsterne* siddende i Bladhjørnerne.

1' høi. Støvdrageren mangler undertiden. 6—8. 4.

β, *fluitans* Liljebl. Stængelen beelt nedsænkt under Vandskorpen; Bladene lange og slappe, ikke bruskagtige i Spidsen.

I Aaer og Bække, ikke sjelden i Danmark. *β*, i dybere Vand, f. Ex. Sj. i Leersøen ved Kjøbenhavn! Jonstrup Mølleaa (14); *Falst.* i en Aa mellem Lidstrup og Tingsted (14); *F.* ved Nakkebølle (12).

2^{den} Klasse. Diandria (Tohannede).

1. Orden. Monogynia (Enhunnede).

A. Blomsterne ufuldstændige.

1. *Fraxinus* L. Træagtig; Blomsterne nøgne; Frugtknuden torummet, 1 Griffel med tokløvet Ar; Frugten enfrøet Vingefrugt. (N. F. Oleineæ.)

2. *Salicornia* L. Stængelen kødfuld, leddet, bladløs; Blomsterne axformigt samlede i Stængelens og Grenenes øvre Led, 3 og 3 indsænkede i Gruber ovenfor Leddene, hver omgivet af et enbladet, kødfuldt Blomsterdække; Arret kløvet; Frugten nødagtig. (N. F. Salsolaceæ.)

Lemna L. Stængelløs, svømmende Plante. (21, 2).

Cladium P. Br. Bladene i Randen og paa Kjølen hvast saugtakkede. (3, 1).

Rhynchospora Vahl. Bladene i Randen rue. (3, 1).

Scirpus setaceus L. Bladene glatte. (3, 1).

Lepidium ruderale L. Bægeret 4-bladet (Krone 0); Frugten Skulpe. (15, 1).

B. Blomsterne fuldstændige.

a. Frugten undersædig.

3. *Circaea* L. Bæger og Krone tobladede, affaldende; Kronbladene dybt tokløvede; Frugten nødagtig, uopspringende

1—2-rummet med enfrøede Rum, beklædt med Hagebørster. (Urter med krybende Udløbere og modsatte Blade.) (N. F. *Onagraceæ*.)

b. Frugten oversædig,

α. firedelelig Spaltefrugt. 4.

4. **Lycopus** L. Bægeret regelmæssig femtandet, vedblivende; Kronen budt- firekløvet, næsten læbedannet; Støvknappernes Rum parallelle, tæt samlede, 2 gølge Støvdragere; Smaafrugterne nødagtige. (N. F. *Labiatae*.)

† *Salvia* L. Bægeret tolæbet, vedblivende; Kronen læbedannet, med fladtrykt, hvælvet Overlæbe og trelappet Underlæbe; Støvknappbaandet traadformet, forlænget i en Bue, hvorved Rummene (det ene ofte goldt) fjernes fra hinanden; Fr. som foreg. (N. F. *Labiatae*.)

β. Frugten uopspringende Heelfrugt. 2.

5. **Ligustrum** L. Bægeret svagt firetandet; Kronen tragtformet med firefliget Krave; Fr. et torummet, 2—4-frøet Bær. (N. F. *Oleineæ*.)

γ. Frugten kapselagtig, opspringende.

* Kronen regelret, Kapselen torummet. 2.

6. **Syringa** L. Bægeret firetandet; Kronen fladkravet, med firefliget Krave; Kapselen toklappet med rundelende Opspringning, faafrøet. (N. F. *Oleineæ*.)

** Kronen uregelret, uden Spore, Kapselen torummet.

7. **Veronica** L. Kronen med kort Rør, firedeelt Krave; den nedre Flig mindst; Arret udeelt.

8. **Gratiola** L. Kronen tolæbet ($\frac{2}{3}$), med langt Rør; 2—3 gølge Støvdragere; Arret tokløvet. (7—8. N. F. *Scrophularineæ*.)

*** Kronen læbedannet, med Spore, Kapselen eorummet. 4.

9. **Pinguicula** L. Bægeret femdeelt; Kronen gabende; Støvknapperne aabne sig paatværs; Kapselen opspringer paa langs fraoven. (Sumplante med hele Blade.)

10. **Utricularia** L. Bægeret tobladet; Kronen maskeret, Støvknapperne aabne sig paalangs; Kapselen tværsopspringende. (Vandplante med fiindeelte Blade, der tildeels ere omdannede til Blærer forsynede med et Laag.) (9—10. N. F. *Lenticulariæ*.)

2. Orden. *Digynia* (Tohunnede).

Blitum L. (5, 2).

Anthoxanthum L. Græsart. Smaaaxene enblomstrede med 2 Skjæl (ufuldstændige Blomster). (3, 2).

Hierochloa Gmel. Græsart. Smaaaxene treblomstrede. (3, 2).

3. Orden. *Tetragynia* (Firehunnede).

Ruppia L. Blomsterdække 0; Frugterne 4 langstilkede Nødder. (4, 3).

I. *Monogynia*.

1. *Fraxinus*. Ask.

2. **F. excelsior** L. (Almindelig A.) H. 13; Drej. n. 3; F. D. 969; Rehb. ic. fl. germ. XVII, tab. 1072.

Bladene modsatte, uligefinnede med 3—6 Par lancetformede, saugtakke Smaablade; *Blomsterne* i grenede Klaser, tvekjønnede og særkjønnede enten paa samme eller forskellige Planter; *Vingefrugten* oval, i Spidsen udrandet.

Høit Træ med glat Bark; Knopperne tykke, omgivne af sorte Knopskjæl; Blomsterne udvikles før Bladene. 5. *h*.

Almindelig som plantet Træ omkring beboede Steder; i Skove forekommer den sjældnere, dels plantet, dels oprindelig vildvoxende, f. Ex. *Bornh.* ikke sjelden i Østkystens Skove; *Sj.* Kulaas Skov i Odsherred! Skove ved Tiissø (28), Bognæs (20); *Loll.* ikke sjelden i Skovene (19); *F.* Hofmansgave! Dalby paa Hindsholm, i det sydlige F. hyppig (12), Thorseng! *Als* hyppig (28); *Sl.* v. Aabenraa!

2. *Salicornia*. Salturt.

3. **S. herbacea** L. (Enaarig S.) H. 4; Drej. n. 2; F. D. 303 og 1621.

Stængelen urteagtig, saftig; *Grenene* korsviis modsatte, oprette (α , *erecta* F. D. 303) eller aabent udstaaende (β , *patula* F. D. 1621), ligesom *Stængelen* leddede; *Æene* valseformede; *Arret* svagt kløvet.

$\frac{1}{4}$ —1' høi; var. opret og nedliggende, med 1 og 2 Støvdragere. 8—9. ☉.

Paa leret, dyndfuld Grund, som overskylles af Havet, almindelig i Danmark, især paa nys inddæmmed Land og udenfor Digerne i Marskegnene paa Halvøens Vestkyst, sjældnere paa saltholdige Steder inde i Landet, f. Ex. Saltkilde ved Toftegaard i Vildmosen i *Jylland*!

* 4. **S. radicans** [Sm. i E. B. 1691]. (Rodslaaende S.) H. II, 107; Nolt. nov. p. 1; S. biennis—*radicans* Fr. S. Veg. Sc. p. 55 og 201.

Stængelen ved Grunden rodslaaende, næsten træagtig; *Æene* tykkere og mere budte end hos foregaaende; *Arret* dybt deelt.

Større end foregaaende. 9. ☉ eller 7. Om den er en fra hin virkelig adskilt Art, synes endnu ikke at være tilstrækkeligt beviist. Jeg har ikke seet levende Exemplarer. (S. biennis Afz., Fr. H. N. X, 58, som af Fr. ansees for Hovedarten til denne, er ikke rodslaaende).

Strandbredder: J. Ydre Bjerrum ved Ribe (16). ☞

3. **Circæa. Steffensurt.**

5. **C. alpina** L. (Glat S.) H. 32; Drej. n. 8; F. D. 1321.

Bladene hjerteformede, kort tilspidsede, grovt-tandede, med vinget Bladstilk; *Dækbladene* smaae, sylformede; *Blomsterstilkene* glatte, efter Afblomstringen udstaaende, *Bægerbladene* glatte, hindeagtige, hvide, i Spidsen røde, *Frugten* aflang-kølleformet, enrummet, tilligemed Blomsterstilkene tidligt affaldende.

Stængelen saftig, rød, 3—8" høi, fra Grunden grenet, de nedre Grene ere underjordiske, forlængede, traadformede Udløbere, i hvis Spidse der om Eftersommeren dannes en aflang-kølleformet, kjødfult opsvulmet Knop med 2—4 Par korsviis stillede, skjælformede Blade; *Bladene* randhaarede, forøvrigt, ligesom *Stængelen*, glatte og glindsende; *Kronbld.* hvide, med tydelig Negl. 6—7. 7. *

I Skove, især paa fugtige Steder ved raadne Træstubber o. s. v.; sporadisk: paa *Halvøen* ikke sjelden; F. Ravnholt Hestehave (25), Brøbygaard (24), Skjoldemose, Nielstrup (12); Sj. hist og her! *Moens* Klint (H); *Falst.* Donnemose (Rasm.), Corselitze og Hanenov Skove (14).

6. **C. intermedia** [Ebrh. Beitr. 4, 42]. (Spidsbladet S.) Drej. n. 9; H. N. II, 47; *C. alpina* major H. 33; F. D. 256 (ikke god); *C. lutetiana intermedia* Wahlenb.

Bladene hjerteformede, langt tilspidsede og nedenfor Spidsen indknebne, grovt-tandede med rendet, uvinget Bladstilk; *Dækbladene* smaae, sylformede; *Blomsterstilkene* næsten glatte, efter Afblomstringen udstaaende; *Bægerbl.* glatte, hindeagtige med rødlig Spidse; *Frugten* omvendt-ægformet.

8—12" høi. Udløbere som hos foreg., men med større Endeknop og flere Par Skjælblade; Stængelen oventil samt Bladene i Randen og paa Nerverne duunhaarede, forøvrigt næsten glat. Kronbladene som hos foreg. 7—8. 4.

I fugtige Skove, sporadisk og ikke almindelig: *Sj.* Helsingør (21), Hellebæk! Steenholt's Mølle (27), Fredensborg (Weilbach), Frederiksborg (14), Folehaveskov v. Hørsholm (7), Kulhuus (14), Dronninggaard (9), Hareskoven (Schum.), Sparresholm (16); *F.* Ulriksholm, Svendborg (H); *J.* Bangshø v. Fladstrand (H), Haven og Sæbygaard i Vendsyssel (12), Volstrupgaard ved Struer (16), Skoven ved Klaus-holm, Silkeborg! Veile (15), Kolding (28); *Sl.* Gram (1), Gelting (16), Adserballe p. Als (10); *Bornh.* Tillehøi- ved Rønne (Hoff), Grødby Aa ved Boderne (Hjorth), Røe, Klause Mølle!

Anm. Ansees af flere Forff. for en Bastard, og forekommer under 2 Former, den ene (*C. alpino-lutetiana* Mey. Chl. Hanov.), mere lig følgende, den anden (*C. lutetiano-alpina* Mey.), mere lig foregaaende. Ofte forekommer den dog hvor ingen af de andre Arter findes i Nærheden, og efter Prof. Fries's Meddelelse er den f. Ex. i den nord-amerikanske Stat Wisconsin den eneste forekommende Art.

7. **C. lutetiana** L. (Dunet S.) H. 32; Drej. n. 10; F. D. 210; H. N. 1, 44.

Bladene ægformede eller æg-hjerteformede, langt, men jævnt tilspidsede, utydeligt tandede, med uvinget Bladstilk; *Dækbladene* 0; *) *Blomsterstilkene* haarede, efter Afblomstringen nedbøiede; *Bægerbladene* paa Yderfladen svagthaarede, grønne, i Spidsen farvede; *Frugten* omvendt-ægformet, torummet.

$1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi. Udløberne tykkere end hos de 2 foregaaende, i Spidsen neppe opsvulmede. Hele Planten mere eller mindre duunhaaret; Bladene fastere og mindre gjennemsigtige og glindsende end de foregaaende Arters. Kronbladene hvide, uden Negl. 7—8. 4.

I Skove, almindelig udbredt.

*) Kun de nederste Blomster i Klasen have sylformede Dækblade (bracteæ), som hos foreg., men disse falde af før Udspringningen. Blomsterstilkene hos denne Art ere mere vedblivende end hos de foreg., hvor de falde meget tidligt af.

4. *Lycopus*. Sværtevæld.

8. *L. europæus* L. (Almindelig S.) H. 31; Drej. n. 11; F. D. 1081; Rchb. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1291.

Stængelen firekantet, furet; *Bladene* modsatte, æg-lancetformede eller elliptiske, saugtakket-fligede eller fjersnitdeelte; *Blomsterne* talrige, siddende og tæt krandsformigt samlede i Bladhjørnerne; *Bægertænderne* sylspidsede, randhaaret-rue; *Kronens* Overlæbe udrandet, Underlæben trekløvet, den midterste Flig bredere end de øvrige.

1—2' høi. Var. mere eller mindre haaret eller næsten glat, Bladenes Indskjæringer aftage almindelig i Dybde fra Grunden mod Spidsen; de nederste, under Vandet eller Jordskorpen skjulte Blade kamformigt fjersnitdeelte med linie-børsteformede Afsnit, fra disse Blades Hjørner udgaae Udløbere. Kr. hvid med rødprykket Svælg. 7—8. 4.

Ved Grøfter, Sø- og Aabredder, almindelig.

† *Salvia*. *Salvie*.

† *S. pratensis* L. (Eng-S.) Rchb. ic. XVIII, tab. 1252.

Stængelen opret, *Bladene* ægformede eller ovale med hjerteformet Basis, rundtakkede, nætformigt rynkede, Rodbladene talrige, stilkede, Stængelbladene 1—2 Par, næsten siddende; *Krandsene* omtr. 6-blomstrede, de nedre adskilte, de øvre axformigt samlede; *Dækblade* og *Bægertænder* sylspidsede, kirtelhaarede; *Kronens* Overlæbe halvmaaneformigt hvælvet.

1—1½' høi. Bld. paa Underfladen duunhaarede. Kr. i Almindelighed mørkeblaa. 6—7. 4.

Angivet fra Slesvig (Esmarch).

5. *Ligustrum*. Liguster.

† 9. *L. vulgare* L. (Almindelig L.) H. 11; F. D. 1141; Rchb. ic. fl. germ. XVII, tab. 1074.

Bladene modsatte, lancetformede, heelrandede, glatte; *Blomsterstanden* en tætblomstret Top i Spidsen af Grenene.

Kr. hvide, have en sød Lugt. Bær sort med violet Kjød. 6—7. 4.

Ikke sjelden plantet ved Gjærder, og opmindelig indført, men findes undertiden forvildet: Sj. mellem Helsingør og Hellebæk (12),

ved Lyngby Sø (H); *F.* Hofmangave (1), mellem Svendborg og Nyborg! *Sl.* Augustenborg, Sundved, Aabenraa (Rafn), hist og her ved Gjærder i Angel! Egernførde, Husum (H).

6. Syringa. Siren.

† 10. *S. vulgaris* L. (Almindelig S.) H. 12; *Rechb. ic. fl. germ.* XVII, tab. 1073.

Bladene modsatte, æg-hjerteformede, heelrandede, glatte; *Blomsterstanden* en endestillet, pyramideformet Top.

Kr. violet eller hvid, af behagelig Lugt. 5—6. $\frac{1}{2}$.

Oprindelig fra Orienten, almindelig plantet som Siirbusk i Haver, forekommer hist og her forvildet, f. Ex. ved Gjærder i det østlige og sydlige Fyen! *Sl.* ved Gjærder i Angel! Husum og Egernførde (H).

7. Veronica. Ærenpriis*).

a. *Cochliosperma* *Rechb.* Blomsterne enlige i Bladhjørnerne. ☉.

(Frøene paa den ene Side hvævede, paa den anden udhulede.)

aa. *Bægerfligene spidse.*

11. *V. hederæfolia* L. (Vedbendbladet Æ.) H. 23; *Drej. n.* 16; *F. D.* 428 (ikke god).

Stængelen fremliggende; *Bladene* hjerteformet-nyreformede, haandnervet-3—5-lappede; *Blomsterstilkene* af Længde med eller kortere end *Bladene*, ensidigt haarede; *Bægerfligene* hjerteformede, randhaarede; *Kapselen* firelappet, næsten firekantet, i Spidsen indtrykt.

Kr. lila eller skident bleggrød; Støvdragerne blaae. Paa dyrkede Agre i god Jord har den større og kjødfulde Blade, i Skygge blive *Bladene* mindre, *Stængelen* mere opret, *Blomsterne* mindre og Støvdragerne blegere (β , *umbrosa* Mort.)! 4—5. ☉.

Almindeligt Ukrud i Haver og paa dyrkede Marker.

*) Det gjensidige Forhold mellem Blomsterstilke, Dæklade og Bæger i denne Slægt er, (ligesom i *Regelen* i det Følgende, naar intet Andet udtrykkeligt er bemærket, bestemt under Blomstringen, mellem Frugten og de øvrige Dele derimod ved dennes fuldstændige Udvikling.

† 12. **V. persica** [Poir. enc. 8, 542] (Storkronet Æ.) H. N. IV, 23; V. Buxbaumii Ten., H. II, 109; F. D. 1982; Rehb. ic. pl. crit. III, 430—31.

Stængelen fremliggende eller opstigende; *Bladene* æg-hjerteformede, dybt saugtakke; *Blomsterstilkene* længere end *Bladene*, alsidigt duunhaarede; *Bægeret* ved Basis og i Randen haaret, med æg-lancetformede, spidse Flige; *Kapselen* fladtrykt, omvendt-nyreformet, budt udrandet, med ophøiede, nætformede Aarer og langt fremragende *Griffel*.

Kr. himmelblaa, større end hos de øvrige Arter af samme Gruppe. 4—5. ☉.

Oprindelig indført, forekommer nu forvildet paa dyrkede Steder, f. Ex. *Sj.* Ordrup! Lyngby, Kløvermark ved Gladsaxe (14), almindelig i Haver i Sorø! *Loll.* Engestofte (Kherrinde Wichfeld); *F.* Ollerup (12), Skaarup (19); *Sl.* Rylskov i Angel! Slotshaven i Slesvig (16); *Bornh.* Rønne (Hoff). *

13. **V. polita** [Fr. nov. ed. 2 p. 1] (Glandsbladet Æ.) Drej. n. 17; H. N. IV, 25; Rehb. ic. pl. crit. III, 304—5; V. agrestis F. D. 449.

Stængelen fremliggende; *Bladene* fjernervede, æg-hjerteformede, dybt-saugtakke; *Blomsterstilkene* omtrent af Længde med *Bladene*, alsidigt haarede; *Bægerfligene* ægformede med puklede Tilhængsler ved Basis, randhaarede, spidse, tydeligt (3) nervede; *Støvdragerne* befæstede til den nedre Rand af Kronrøret; *Kapselen* omvendt-hjerteformet, spidst udrandet (med *Griffelen* fremragende af Indskjæringen), utydeligt aaret, opblæst, kirtelhaaret, Rummene omtrent 10-frøede. *)

Bladene noget kjødfulde, glindsende, svagthaarede og især paa

*) Baade denne og foregaaende Art forekomme hos os under 2 Former: α , *gracilis*, med smaae Blade, mange Gange kortere end Ledstykke, traadformede Blomsterstilke, (der hos 13 ere længere end *Bladene*) og β , *robustior*, med større Blade ($\frac{1}{2}$ Gang kortere end Ledstykke). Reichenbach bemærker (Fl. exc. p. 365) at Høstformen af *V. polita* er mere haaret og derfor mindre glindsende end Vaarformen, hvilket jeg ogsaa har iagttaget i vor Flora. Den første kan derfor ved overfladisk Betragtning forveksles med *V. opaca*, fra hvilken den dog forøvrigt er vel adskilt.

Underfladen blaagrønne. Kr. himmelblaa, omtrent halvt saa stor som hos foregaaende. 4—5 og 8—9. ☉.

Paa dyrkede Steder, ikke sjelden paa Øerne (f. Ex. i Kjøbenhavns Omegn! ved Sorø) og sandsynligviis udbredt over hele Danmark (*Jyll.* v. Dybdals Kalkbakker (Dr.), Lyngby pr. Aarhus (16); *Slesv.* (16), men mindre hyppig end de 2 følgende Arter.. ☞

bb. Bægerfligene budte.

14. **V. opaca** [Fr. l. c. p. 3] (Matbladet *Æ.*) Drej. n. 19; H. N. II, 28; Rchb. ic. crit. III, 441; V. *agrestis* H. 32 (ifølge Beskr.).

Stængelen fremliggende; *Bladene* rundagtigt-hjerteformede, grovt rundtakkede; *Blomsterstilkene* kortere end *Bladene*; *Bægerfligene* omtrent af *Kronens* Længde, ovale eller spatelformede (bredest i Midten), tæthaarede, tydeligt (3)-nervede; *Støvdragerne* befæstede til Svælget; *Kapselen* omvendt nyreformet, dybt og spidst udrandet (*Griffelen* ligelang med eller lidet længere end *Indskjæringen*), tæt- og kruset-haaret, med 3—5-frøede Rum.

Hele Planten tæt haaret; *Bladene* af mørkere og mattere Farve end hos foregaaende og følgende; Kr. himmelblaa. 4—5 og 6—9. ☉.

Paa dyrkede Marker og i Haver, især i feed Muldjord, ikke sjelden i de danske Provindser. !*.

15. **V. agrestis** L. (Fr.!) (Fleerfarvet *Æ.*) H. N. IV, 24; Rchb. ic. III. 440; V. *versicolor* (Fr.), Drej. n. 18; F. D. 2221.

Stængelen opstigende; *Bladene* hjerteformet-ægformede, ovale eller elliptiske, saugtakkede; *Blomsterstilkene* omtrent af *Bladenes* Længde; *Bægerfligene* ovale (bredest i Midten), af Længde med eller længere end *Kronen*, imod *Frugtmodningen* snoede, utydeligt (3)nervede, beklædte med faae lange Haar; *Støvdragerne* befæstede til *Kronrørets* Basis; *Kapselen* kirtelhaaret, opsvulmet, omvendt-hjerteformet, dybt og spidst udrandet (*Griffelen* kortere end *Indskjæringen*), Rummene 4—5-frøede.

Planten af en lysere grøn Farve end de 2 foregaaende. Kr. bleg-rød eller mælkeblaa, den nedre Flig hvid. 4—5 og 8—9. ☉.

β, calycida Fr. Væksten finere og mindre, Bægeret ofte femfligt med indskaarne Flige.

Paa dyrket Jord i Mark og Have meget almindelig. *β*, træffes ofte mellem Hovedarten, især tidligt paa Foraaret.

16. **V. triphyllos** L. (Trefliget Æ.) H. 24; Drej. n. 20; F. D. 627; H. N. IV, 22.

Stængelen opret, med udspærrede eller opstigende Grene og Blomsterstilke; de nedre *Blade* ægformede, rundtakkede, Stængelbladene dybt haandfligede, *Bladene ved Blomsterne* hele eller trefingrede med linieformede Flige; *Kapselen* kirtelhaaret, omvendt-hjerteformet, udrandet, *Griffelen* længere end Indskjæringen.

Hele Planten kirtelhaaret, mørkfarvet, ved Tørring sort; Kr. mørkblaa. 4—5. ☉.

Paa tørre Marker mellem Vintersæden, sporadisk og ikke almindelig; forekommer i alle Provindser, men sjeldnere paa Halvøen end paa Øerne. ☛

b. *Veronicastrum* Benth. Blomsterne i endestillede, spredtblomstrede Klaser (eller Ax); *Kapselen* fladtrykt.

(Kronrøret meget kort, Frøene flade, skjoldformede.)

aa. *Planten* haaret. ☉.

17. **V. verna** L. (Vaar-Æ.) H. 25; Drej. n. 27; F. D. 252.

Stængel og Grene oprette; de nedre *Blade* ægformede, saugtakkede, de øvre dybt 3—5-fligede; *Dækbladene* lancetformede, af Bægerfligenes Længde; *Blomsterne* tætsiddende; *Blomsterstilkene* oprette, kortere end Bægeret; *Kapselen* fladtrykt, omvendt-nyreformet, overalt haaret, bredere end Bægeret, *Griffelen* af Længde med Indskjæringen.

1—4" høi. Kr. blaa, kortere end Bægeret. 4—5.

Paa tørre, udyrkede, især sandige Marker, forekommer i alle danske Provindser, men sporadisk og ikke almindelig.

18. **V. arvensis** L. (Mark-Æ.) H. 23; Drej. n. 28; F. D. 515 (slet Fig.).

Stængel og Grene opstigende; *Bladene* æg-hjerteformede, rundtakkede; *Dækbladene* lancetformede, heclrandede eller svagt takkede, af Længde med eller længere end Bægeret; *Kapselen* fladtrykt, omvendt-hjerteformet, randhaaret, af Bægerets Brede, *Griffelen* af Længde med Indskjæringen.

1—6" høi. Kr. blaa (meget liden), kortere end Bægeret. Var. med heelrandede Blade (Drej.). 4—6.

Paa dyrkede og udyrkede Marker, ved Gjærder o. s. v. almindelig.

bb. Planten glat eller meget svagt haaret. 4.

† 19. **V. peregrina** L. (Fremmed Æ.) H. 25; F. D. 407.

Stængelen fra Grunden af grenet; de nedre *Blade* kortstilkede, elliptiske, svagt rundtakkede; *Dækbladene* siddende, smalt lancetformede, heelrandede, længere end Blomsterne; *Kapselen* næsten kredsround, svagt udrandet, glat eller kirtelhaaret; *Griffelen* af Længde med Indskjæringen.

3—6" høi, glat eller svagt haaret; Bld. noget kjødfulde; Kr. hvid eller blegblaa, kortere end Bægeret. 5—7. ☉.

En i Amerika oprindelig hjemmehørende Ukrudsplante. Angives med Tvivl fra Amager (Oeder); *Sjæll.* uden Angivelse af Voxested (J. Vahls Herb.)! *Sl.* Coldenbüttel pr. Frederikstad (F. Müller i Flora 1853 p. 492).

20. **V. serpyllifolia** L. (Glat Æ.) H. 18; Drej. n. 29; F. D. 492.

Stængelen buelformigt opstigende, ved Grunden rodslaaende; *Bladene* modsatte, ovale, heelrandede eller utydeligt rundbugtede; *Blomstertilkene* oprette, kortere end de elliptisk-ovale *Dækblade*, af Længde med *Bægerets* længste Flige; *Kapselen* randhaaret, omvendt-nyreformet, bredt, men svagt udrandet; *Griffelen* af lige Længde med *Kapselen*.

Bladene glatte, *Stængelen* (seet under Lupen) fiint- og tiltrykt-haaret. Kr. lysblaa. 5—7.

Paa grusede og lerede Steder, høie Enge, Græsmarker o. s. v. almindelig udbredt.

c. **Pseudolysimachium** Koch. Blomsterne i endestillede, tæt blomstrede Klaser (eller Ax). *Kapselen* trind, svagt sammentrykt.

(Kronrørets Længde større end dets Tværsnit. 4.*)

21. **V. spicata** L. (Axblomstret Æ.) H. 16; Drej. n. 30; F. D. 52.

*) Bladene hos Arterne i denne Afdeling ere modsatte, almindelig af-tagende i Størrelse nedenfra opad. Nogle have tillige Klaser fra

Stængelen opstigende; *Bladene* modsatte, æg-lancetformede, elliptiske eller ovale, rundtakkede eller saugtakkede, i Spidsen og ved Grunden heelrandede; *Blomsterstanden* tætblomstret, ax-formet (Blomsterstilkene utydelige); *Dækbladene* lancet-sylformede, længere end de indbyrdes omtrent ligestore Bægerflige; *Støvdragerne* længere end Kronen; *Kapselen* rundagtig, udrandet, opblæst, flere Gange kortere end *Griffelen*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kr. blaa. 7—8. Var. betydeligt i Henseende til Bladenes Form, Indskjæring og Beklædning (almindelig tæt- og tiltrykt-haarede, sjældnere graafiltede eller næsten glatte), Bladstilkens Længde o. s. v. De hos os forekommende Variationer synes mig dog ikke constante og afvigende nok for at kunne henføres til de talrige Former (eller egne Arter) som flere Forfattere have opstillet. Den meest iøinefaldende Form (— *integrifolia*) har alle Bladene lancetformede, spidse, heelrandede, meget kort- og svagthaarede, Stængelen kirtlet-duunhaaret.

Paa tørre Steder saavel med Kalk- som Granit-Underlag: *Jyll.* i Kalkterrainet mod N.: Thorup, Løgstør (12), Nørbjerg i V. Hanherred (16), Aalborg, Daastrup (H), Gjedsted mellem Viborg og Løgstør (12), Hodal Mølle ved Hobro (16), Boeslum Strand ved Ebeltoft (Ørting); *Sj.* i en Linie fra NV. mod SO.: Refsnæs (21), Nykjøbing, Kongsøre, Adellersborg (H), Kalundborg (23), Jægerspriis, Skulleløv, Selsø (15), Holmene i Isefjorden (H), Frederiksbund (Schum.), Ledreborg (Weilbach), ved gl. Kjøgekro og fra Prambroen langs Stranden til Stevns Klint (H); *Bornh.* paa flere Steder i Granit-Terrainet, f. Ex. S. for Aakirkeby! Clemensker, Hammeren (Hjorth), St. Jons Kapel (Baagøe), Gudhjem (var.)!

22. *V. longifolia* L. (Langbladet Æ.) H. 15; H. N. III, 12; *V. maritima* F. D. 374.

Stængelen opret; *Bladene* krandsstillede (2—4 i Krandsene), fra bredere Basis lancetformede, tilspidsede, indtil Spidsen skarpt og ofte dobbelt saugtakkede; *Blomsterne* i tætblomstrede Klaser fra Enden af Stænglerne og de øvre Bladhjørner; *Blomsterstilkene* af Længde med eller kortere end de indbyrdes uligestore Bægerflige, kortere end de linie-sylformede *Dækblade*; *Støvdragerne* længere end Kronen; *Kapselen* opblæst, rundagtig, udrandet, af Længde med eller længere end Bægerfligene, flere Gange kortere end *Griffelen*.

de øvre Bladhjørner, af hvilke da de øverste udvikles først, efter den begrændsede Stængels Typus.

2—3' høi. Stgl. nedentil næsten glat, oventil duunhaaret; Bladenes Overflade næsten glat, Underfladen duunhaaret (Var. i Form og Indskjæring). Bliver sort ved Tørring. Kr. blaa. 7—8.

Paa fugtige Steder sjelden; *J.* Overklitgaards Mark ved Hjørring (Schjønning), Nørholm (H); *St.* Farrisbæk ved Rødning (20), Gjærder mellem Nykro og Huusby i Angel! Treya Holm ved Trenefloden (16). [*].

d. *Pleurobotrys* Fr. Blomsterne i Klaser fra
Bladhjørnerne. *)

aa. *Bægeret femfliget. (Pentasepalæ Ledeb.)*

† *V. latifolia* L. (Bredbladet Æ.) *V. pseudo-chamædrys* Jacq. fl. austr. tab. 60.

Stængelen opret eller bueformigt opstigende; *Bladene* modsatte, siddende, ægformet-elliptiske, grovt saugtakkelede eller halvfinnede; *Klasestilkene* mange Gange længere end *Bladene*; *Blomsterstilkene* oprette; *Bægerfligene* uligelange.

Kr. store, blaae med mørkere Striber. 6—7. 4.

Forvildet i Charlottenlund! Fredriksdal (19).

bb. *Bægeret firefliget.*

α. Kapselen omvendt-hjereteformet, svagt udrandet og næsten tresidet. Klasen mangeblomstret (*Chamædrys*).

23. *V. officinalis* L. (Læge-Æ.) H. 21; Drej. n. 26; F. D. 248.

Stængelen nedliggende eller opstigende, ved Grunden rodslaaende, alsidigt haaret; *Bladene* kortstilkede, elliptiske eller omvendt-ægformede, fiint saugtakkelede; *Klaserne* mangeblomstrede; *Blomsterstilkene* oprette, kortere end de linie-lancetformede *Dækblade* og de budt-lancetformede *Bægerflige*; *Kapselen* fladtrykt, overalt klæbrig-haaret, længere end *Bægeret*, neppe saa lang som *Griffelen*.

*) Arterne i denne Afdeling have modsatte Blade (almindelig aftagende i Størrelse ovenfra nedad) og derfor ogsaa typisk modsatte Klaser, men undertiden kommer kun Klasen i det ene Bladhjørne (alm. afvexlende) til Udvikling. Nr. 25 og 26 have saaledes hyppigst afvexlende Klaser. Da *Stængelens* Væxt er ube-grændset, udvikles de nedre Klaser først.

Var. mere eller mindre tæt haaret. Kr. lila eller blegblaa. 6—7. 4.

β, *decolorans*! Fr. S. Veg. Sc. p. 18. Stgl. meget grenet, med korte Ledstykker og sammentrængte Blade. Kronen guulgrøn med violette Aarer.

I Skove og paa solaabne, tørre Steder, almindelig i Danmark. *β*, paa Lyngbakker ved Haraldslund i Jylland!

24. **V. Chamædrys** L. (Tveskjægget Æ.) H. 21; Drej. n. 24; F. D. 448.

Rodstokken krybende; *Stængelen* opret, tvesidigt haaret; *Bladene* æg-hjerteformede, dybt og grovt saugtakkede, de øvre siddende, de nedre kortstilkede; *Blomsterstilkene* oprette, efter Afblomstringen længere end de lancetformede Dækblade og de linie-lancetformede *Bægerflige*; *Kapselen* kortere end Bægeret og *Griffelen*.

Bladene rynkede, paa Underfladen duunhaarede; Kr. stor, mørk himmelblaa (sjældnere rødlig-lila), Støvdragerne hvide. 5—6. 4.

β, *parviflora*! Bladene mindre, svagere haarede, Kronen liden, hvidagtig-blegblaa.

Paa høie Enge, ved Gjørder, i Krat o. s. v. almindelig. *β*, en Skyggeform, funden i Sønderskoven ved Sorø! *Falst.* Næsgaard (14).

β. Kapselen omvendt-nyreformet, vinget-fladtrykt. Klasen fjernt- og faablomstret (*Parmularia*).

25. **V. montana** L. (Bjerg-Æ.) H. 22; Drej. n. 25; F. D. 1201; H. N. II, 29.

Rodstokken krybende, grenet; *Stænglerne* opstigende eller krybende, alsidigt langhaarede; *Bladene* ægformede, grovt saugtakkede, alle langstilkede; *Blomsterstilkene* længere end Dækbladene og de omvendt-ægformede *Bægerflige*; *Kapselen* i Randen bølget og haaret, længere end Bægeret, omtrent af Længde med *Griffelen*.

Kr. blegblaa eller lila med mørkere Aarer, mindre end hos foreg. 5—7. 4.

Paa fugtige Steder i Skove, forekommer i alle danske Provindser og i flere Egne ikke sjelden, men sporadisk. ^{W.}

26. **V. scutellata** L. (Smalbladet Æ.) H. 20; Drej. n. 21; F. D. 209.

Stængelen svag, opstigende, med Udløbere fra Grunden;

Bladene linie-lancetformede, spidse, heelrandede eller fjernt og utydeligt tandede, med nedadvendte Tænder; *Blomsterstilkene* udspærrede eller (imod Frugtmodningen) tilbagebøiede, omtrent dobbelt saa lange som de linieformede *Dækblade*, 3—4 Gange længere end de lancetformede *Bægerflige*; *Kapselen* dybt udrandet, længere end Bægeret, omtrent ligelang med *Griffelen*.

Hele Planten (hos Hovedarten) glat, Kr. hvid med lysblaa eller blegrøde Aarer. 6—7. 4.

β, villosa (Schum.) F. D. 1561; V. *parmularia* Poit. & Turp. Alm. mindre og finere end Hovedarten; Stgl. og Bld. duunhaarede.

Paa vaade og oversvømmede Steder ikke sjelden. *β*, paa lig-nende Steder som Hovedarten, især paa Tørvgrund, f. Ex. hist og her i Nordsjælland!

γ. *Kapselen* kredsround, svagt udrandet, noget opblæst. Klasen mangeblomstret (*Beccabunga Grisebach*).

27. **V. Anagallis** L. (Lancetbladet *Æ.*) H. 19; Drej. n. 22; F. D. 903.

Stængelen opret; *Bladene* alle stilkløse, lancetformede, spidse, med halvomfattende Basis, saugtakkede; *Klaserne* forlængede, mangeblomstrede; *Blomsterstilkene* efter Afblostringen udstaaende eller opstigende, længere end de linie-lancetformede *Dækblade* og de lancetformede *Bægerflige*; *Kapselen* af Længde med *Bægeret* og længere end *Griffelen*.

Hele Planten glat. Var. med næsten heelrandede Blade. Kr. blegblaa eller blegrød. 6—8. 4. (eller ☉).

I Moser, Grøfter og Bække, almindelig udbredt.

28. **V. Beccabunga** L. (Tykbladet *Æ.*) H. 19; Drej. n. 23; F. D. 511.

Stængelen opstigende, ved Grunden rodslaaende; alle *Bladene* kortstilkede, ægformet-ovale, budte, svagt saugtakkede; *Blomsterstilkene* efter Afblostringen udstaaende, omtrent lige-lange med de linie-lancetformede *Dækblade*, længere end *Bægeret*; *Kapselen* omtrent af Længde med *Bægeret*, lidet længere end *Griffelen*.

Hele Planten glat, *Bladene* kødfulde, var. næsten heelrandede. Kr. mørkblaa. 6—8. 4.

I Dynd, ved Kildevæld og paa andre fugtige Steder almindelig.

8. Gratiola. Naadesurt.

29. **G. officinalis** L. (Lancetbladet N.) H. 26; F. D. 363.

Rodstokken horizontal, leddet; *Stængelen* opstigende, foroven, tilligemed *Grenene*, firekantet; *Bladene* modsatte, trenervede, linie-lancetformede med afrundet, halvt-omfattende Basis, fra Midten til Spidsen saugtakke; *Blomsterstilkene* enblomstrede i Bladhjørnerne; *Bægeret* femdeelt med 2 *Dækblade* ved Grunden.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi. Kr. hvide eller blegegrøde med guult, indvendig haaret Rør. 7—8. 4.

Ved Flodbredder og paa fugtige Enge. Opbevares i Heerforths Lolland-falsterske Herbarium, men uden Angivelse af Voxestedet; J. Ribe (6).

9. Pinguicula. Vibefedt.

30. **P. vulgaris** L. (Almindelig V.) H. 27; Drej. n. 12; F. D. 93; Rchb. ic. fl. germ. XX, tab. 1819.

Alle *Bladene* samlede ved Roden og tiltrykte til Jorden, ægformet-ovale, budte, i Randen indrullede; *Blomsterstilkene* 1 eller flere fra Grunden, bladløse, enblomstrede; *Blomsten* nikkende; *Sporen* sylformet; *Kapselen* ægformet.

Hele Planten fædtagtig af klæbrige Kirtler. Kr. violet med hvide Haar i Svælget. 5—6. 4.

I fugtige Enge og Tørvmoser, almindelig i de fleste Egne af Danmark (paa *Loll.* sjelden og kun bemærket ved Engestofte 19).

10. Utricularia. Blærerod *).

a. *Bladene* gjentaget-kamdeelte, med haarformede Flige.

31. **U. vulgaris** L. (Almindelig B.) H. 29; Drej. n. 13; F. D. 138; Rchb. ic. fl. germ. XX, tab. 1822—23.

Bladenes Flige med fjerntsiddende, fine Smaapigge i Randen og Blærer ved Basis; *Klasen* 6—10-blomstret; *Blomsterstilkene*

*) Arterne i denne Slægt overvintre ved kugleformede Knopper med tæt sammenhobede Blade, som udvikles i Spidsen af Hoved-axen og tilsidst løsrives fra Moderplanten. De svømmende, blad-bærende Stængler udskyde opadtil et blomstrende Skaft. Alle ere forsynede med Blærer, som enten findes mellem Bladfligene eller paa særegne, bladløse Grene.

efter Afblomstringen tilbagebøiede eller udstaaende; *Ganen* oppustet, omtrent af den heelrandede *Overlæbes* Længde; *Sporen* budt, kegleformet, noget udstaaende fra *Underlæben* og lige lang med eller lidet kortere end denne; »*Støvknapperne* sammenhængende«.

Skaftet bruunagtigt. Kraftigere af Væxt og med større Blærer end de følgende. Kr. æggeguul med mørkere Striber paa *Ganen*. 6—8. 4.

I Kjær og Tørvgrave almindelig, især paa Øerne. I flere Egne af Halvøen er den sjældnere end følgende Art.

32. **U. neglecta** [Lehm. ind. schol. Hamburg. 1828]. H. II, 11; F. D. 1981; H. N. VIII, 11; U. major Schmid., Rehb. l. c. tab. 1824, fig. 1—3.

Bladene som foregaaende, men fjernere fra hinanden og med finere Flige; *Klasen* 5—8-blomstret; *Blomsterstilkene* opret-udstaaende; *Ganen* oppustet, halvt saa lang som den heelrandede *Overlæbe*; *Sporen* budt-kegleformet, noget bøiet, tiltrykt til *Underlæben* og af dennes halve Længde; »*Støvknapperne* frie«.

Af Høide med foreg., men noget finere, Bægeret og Blærerne mindre. Kronens Farve lidt lysere guul end hos foreg. 7—8. 4.

Paa samme Localiteter som foreg., bemærket flere Steder paa den jyske Halvø, hvor den synes at være alm. udbredt, f. Ex. J. Eveldrup Præstegaard (Dr.), Randers (7), Tolstrup og Brøndsted v. Fredericia! Kolding (28), V. for Varde almindelig (30); Sl. Aabenraa (N.), Satrup Mose i Angel! Lyrskov v. Slesvig (Jessen), Seemühle og Carlshütte v. Rendsburg! *Bornh.* Aamyre Mose i Almindingen (Hjorth), Vallensgaards Mose! (Paa de andre Øer er det mig ikke bekjendt at den er funden). [3]

b. *Bladene* gjentaget-tvedeelte, med børsteformet-tilspidsede, noget fladtrykte Flige.

33. **U. intermedia** [Hayne i Schrad. Journ. 1, p. 18] (Storlæbet B.) H. 30; Drej. n. 14; F. D. 1262.

Bladenes Flige med Midtnerve og talrige Smaapigge i Randen, uden Blærer; de blærebærende Grene bladløse; *Klasen* 3—4-blomstret; *Blomsterstilkene* efter Afblomstringen opadrettede; *Ganen* oppustet, halvt saa lang som den heelrandede *Overlæbe*; *Sporen* ret, spidst kegleformet, tiltrykt til og omtrent halvt saa lang som den brede, nyreformede, fladtrykte *Underlæbe*.

Hele Planten grøn, noget mindre og finere end de foreg. Vinterknopperne, som findes i Spidsen af saavel de bladbærende som de blærebærende Axer, ere omtrent af en Ærts Størrelse. Kr. forholdsvis stor, svovlgul med røde Striber paa Gane og Overlæbe. 6—7. 4.

Paa samme Steder som de foregaaende, sporadisk; *Sj.* mellem Birkerød og Rudergaard (Schum.), Lyngby Mose! Holmegaardsmosen (16); *J.* Gravens Mose i V. Hanherred (16), Viborg (Feddersen), Skjern Aa ved Lønborg og Petersminde! i Egnen omkring Varde alm., Bækbølling (30), Ribe (16); *Sl.* Aabenraa o. fl. St. (16); *Bornh.* Vallensgaards Mose!

34. **U. Bremii** [Heer Fl. der Schweiz. p. 984]. (Bruun-
sribet B.) Koch Syn. II, p. 666; Rehb. ic. fl. germ. XX,
tab. 1826, fig. 2; U. pulchella C. A. Lehm., Fr. S. Veg. Sc. p. 20.

Bladenes Flige uden Midtnerve og Smaapigge, med faae (eller ingen) Blærer, de blærebærende Grene bladløse; *Klasen* 3—5-blomstret, *Blomsterstilkene* efter Afblomstringen tilbagebøiede; »*Bægerbladene* rundagtigt-nyreformede med en kort Spids«; *Ganen* nedtrykt, af Længde med den udrandede *Overlæbe*; *Sporen* meget kort, budt; *Underlæben* næsten kredsrund, fladtrykt.

Fiin som følgende, men med større, lys-svovlgul Krone og bruun-sribet Gane. 7—8. 4.

Voxested som de øvrige Arter, men hidtil kun funden paa faae Steder: *Sj.* Lyngby Mose! *J.* Søerne ved Bordrup Sande pr. Varde (30). ¹³

35. **U. minor** L. (Liden B.) H. 30; Drej. n. 15; F. D. 128; Rehb. l. c. fig. 1.

Bladenes Flige uden Midtnerve og Smaapigge, med Blærer ved Basis; *Klasen* 3—6-blomstret, *Blomsterstilkene* efter Afblomstringen tilbagebøiede; *Bægerbladene* ægformet-ovale; *Ganen* nedtrykt, af Længde med den udrandede *Overlæbe*; *Sporen* meget kort, budt; *Underlæben* ægformet med tilbagerullet Rand.

Liden og spæd, Knopperne meget smaae. Kr. liden, skident-bleggul. 6—8. 4.

Voxested som foreg., bemærket i alle Provindser, men sporadisk. Da denne Art og foreg. let kunne forvexles, maa de enkelte for denne Art angivne Voxesteder paany eftersees, ligesom overhovedet disse 2 Arter maa anbefales til nærmere Undersøgelse.

3^{die} Klasse. Triandria (Trehannede).

1. Orden. Monogynia (Enhunnede).

A. Blomsterdækket dobbelt.

1. **Valeriana** L. Bægerets Rør sammenvoxet med Frugtknuden, dets Krave under Blomstringen indrullet; Kronen tragtformet, uregelm. femfliget, ved Grunden puklet; Frugten enrummet Skalfrugt, oventil beklædt med fjeret Fnok (den tilsidst udfoldede Bægerkrave).

2. **Valerianella** Poll. Bægeret sammenvoxet med Frugtknuden, dets Krave 3—4-tandet eller 0; Kronen tragtformet, regelm. femfliget, ikke puklet; Fr. trerummet Skalfrugt (med to tomme Rum), oventil beklædt med den vedblivende, hindeagtige Bægerkrave. (1—2. Bladene modsatte, Blomsterne i Qvast. N. F. Valerianeæ.)

3. **Montia** L. Bægeret undersædigt, tobladet; Kronen tragtformet med kløvet Rør og uregelm. femfliget Krave; Fr. treklappet, trefrøet Kapsel. (Lave, glatte Sumpplanter med kjødfulde, modsatte Blade. N. F. Portulacaceæ.)

Asperula tinctoria (4, 1).

B. Blomsterdækket enkelt eller 0,

a. oversædigt, kronbladagtigt-farvet. (Frugten kapselagtig).

4. **Crocus** L. Blomsterdækket med langt Rør og regelret sexdeelt, klokkeformet Krave; Griffelen forlænget, Arret trefliget med tragtformede, i Spidsen tandede eller fryndsede Flige; Kapselen treklappet. (Urt med Løgknol og linieformede Blade. N. F. Irideæ).

5. **Iris** L. Blomsterdækket med kort Rør og sexdeelt Krave, hvis ydre Flige ere tilbagebøiede og af anden Form end de indre, oprette; Griffelen kort, med 3 kronbladagtige Ar; Kapselen treklappet. (Urter med knolleformigt forgrenet Rodstok og sværdformede Blade. N. F. Irideæ.)

**b. Blomsterdækket undersædigt, børsteformet
eller 0. (Fr. nødagtig).**

(Græslignende Væxter med omskedende Blade og heel Bladskede; Blomsterne i enlige Ax eller flere, til en sammensat begrændset Blomsterstand forenede, Smaaax; de enkelte Blomster omgivne af [oftest] 1 Dækskjæl [gluma]; Arret 2—3-deelt. 6—12. N. F. Cyperaceæ, a).

aa. Smaaaxene med toradede Dækskjæl.

6. **Cypérus** L. Smaaaxene fladtrykte, mangeblomstrede; alle Dækskjællene blomsterbærende, ligestore eller de nedre størst; Blomsterdækket 0. (Smaaaxene sammenhobede til en hoved- eller skjærmformet, endestillet Blomsterqvast, omgivet af 5 uligelange Svøbblade).

7. **Schoenus** L. Smaaaxene med 5—6 Dækskjæl, hvoraf de 3—4 nederste (mindre) ere blomsterløse; Blomsterdækket børsteformet eller 0. (Blomsterstanden et Hoved, omgivet af 1—2 Svøbblade).

bb. Dækskjællene alsidigt taglagte.

a. Griffelen tilleddet, dens nedre Deel vedblivende.

8. **Rhynchospora** Vahl. Smaaaxene flere, faablomstrede, samlede til ax- eller hovedformede Nøgler; de nedre 3—4 Dækskjæl mindre og blomsterløse; Blomsterdækket dannet af 3—12 Børster.

9. **Eleocharis** R. Br. Eet mangeblomstret Endeax; de nedre 1—2 Dækskjæl bredere og blomsterløse; Blomsterdækket 5—6 Børster.

β. Griffelen ikke tilleddet til Frugtknuden.

10. **Scirpus** L. Eet eller flere endestillede (stundom falsk sidestillede) Smaaax; de nedre 1—2 Dækskjæl bredere og (med Undtagelse af Nr. 57) blomsterløse; Blomsterdækket 0 eller børsteformet, kortere end Dækskjællene.

11. **Eriophorum** L. Eet eller flere endestillede Smaaax; de nedre 1—2 Dækskjæl bredere og blomsterløse; Blomster-

dækket haarformet, tilvoxende efter Afblostringen, under Frugtmodningen meget længere end Dækskjællene.

12. **Cladium** P. Browne. Blomsterstanden en Top, dannet af sammensatte Qvaster, i Spidsen af Stængelen og Grenene; Smaaaxene faablomstrede, de 3 nedre Dækskjæl mindre og blomsterløse; 2 Støvdragere; Blomsterdække 0; Frøgjemmet haardt og skjørt, løst omsluttende Frøet.

Nardus L. Blomsterne i ensidige Ax. (3, 2).

Juncus sp. (6, 1).

2. Orden. *Digynia* (Tohunnede).

(Græsarter med omskedende Blade og kløvet Bladskede; Blomsterstanden dannet af flere [til sammensat Ax eller Top samlede] *Smaaax*, omgivne af [oftest] 2 *Yderavner* [glumæ], hver Blomst af 1—2 *Inderavner* [paleæ], af hvilke den nedre ofte har *Stak*, den øvre sædvanligt hindeagtig, tonervet, i Spidsen totandet*). Frugten en *Græsfrugt*.)
(13—58. N. F. Gramineæ.)

A. Blomsterstanden et sammensat Ax.**)

a. Eet *Smaaax* i hvert af Axens Led.

aa. *Eet Ar, som udtræder i Blomstens Spidse.*

13. **Nardus** L. Axet ensidigt; Smaaaxene enblomstrede, omgivne af en meget liden, totandet (eller ingen) *Yderavne*; *Inderavnerne* 2, uligelange; Arret forlænget.

bb. *To Ar, som udtræde ved Grunden af Blomsten.*

α. Smaaaxene enblomstrede, indsenkede i Fordybninger af Axen.

14. **Lepturus** R. Br. Smaaaxene omgivne af 1—2 læderagtige *Yderavner*; *Inderavnerne* hindeagtige; Griflerne korte, Arrene fjerdede.

β. Smaaaxene fleerblomstrede, fritsiddende.

15. **Lolium** L. Smaaaxene fladtrykte, vende Ryggen (den smale Side) mod Axen, 3—mangeblomstrede; 1 *Yder-*

*) Naar i det Følgende *Inderavnerne* nævnes uden særskilt Angivelse af hvilken der menes, er dette sædvanligt den nedre.

**) Et ægte Ax er lettest kjendeligt paa den regelmæssigt leddede Axe, i hvis Led 1 eller flere *Smaaax* ere befæstede.

avne (undtagen i Endesmaaaxet, som har 2 Yderavner); Frugten tilvoxet til den øvre Inderavne.

16. **Brachypodium** Beauv. Smaaaxene mangeblomstrede, kortstilkede, før Blomstringen næsten trinde, vende Fladen mod Axen; 2 uligestore Yderavner; Frugten ikke tilvoxet til Inderavnerne.

17. **Agropyrum** Beauv. Smaaaxene 3—mangeblomstrede, fladtrykte, vende Fladen mod Axen; Yderavnerne 2, lancetformede, omtrent ligestore, 5—mangenervede; Frugten tilvoxet til Inderavnerne.

† 18. **Triticum** L. (part.) Smaaaxene hvælvede, 3—5-blomstrede (de øvre Blomster ofte ♂ eller golde), vende Fladen mod Axen; Yderavnerne 2, ægformede, bugformigt hvælvede, fleernervede; Frugten fri eller tilvoxet til Inderavnerne.

† 19. **Secale** L. Smaaaxene toblomstrede med Ansats til en tredie Blomst foroven, vende Fladen mod Axen; Yderavnerne 2, sylformede, 1-nervede; Frugten fri.

b. Flere Smaaax i hvert af Axens Led.

20. **Hordeum** L. Smaaaxene (3 i hvert Led) enblomstrede med eller uden Ansats til en anden Blomst; Yderavnerne tilspidsede i en lang Stak.

21. **Elymus** L. Smaaaxene (2—3 i hvert Led) 3—fleerblomstrede (eller toblomstrede med Ansats til en tredie Blomst); Yderavnerne sylspidsede.

B. Blomsterstanden en Dusk*) eller Top.

a. Smaaaxene enblomstrede eller med Ansats til en anden Blomst.

aa. Yderavner 0. .

22. **Léersia** Soland. Inderavnerne 2, pergamentagtige, fladtrykt-kjølformede.

*) Naar Blomsterstanden er en Dusk, ere Blomsterne ofte saa kortstilkede, at de synes at danne et Ax, men kjendes da paa den ikke regelmæssigt leddede Axe.

bb. 1—2 Yderavner.

a. Blomsten under Blomstringen lukket, Griflerne forlængede, Arrene udtræde i Blomstens Top.

aa. Ved Grunden af den frugt bærende 1 gold Blomst (dannet af 1—2 Inderavner).

23. **Setaria** Beauv. Smaaaxene med et børsteformet Svøb ved Grunden, samlede til en alsidig Dusk; Yderavnerne uligestore: den nedre liden, den øvre af Smaaaxets Længde, stakløs, 5—7-nervet; den golde Blomst (stundom ♂) dannet af 1—2 stakløse Inderavner, der ere ligelange med Smaaaxet.

24. **Digitaria** Scop. Smaaaxene uden Svøb, samlede til en fingerformet Halvskjærm, dannet af ensidige Ax; Yderavnerne uligestore: den nedre liden eller 0, den øvre tre-nervet, stakløs, kortere end Smaaaxet; den golde Blomst dannet af 1 stakløs Inderavne af Smaaaxets Længde.

† 25. **Panicum** L. (part.) Smaaaxene uden Svøb, samlede til en alsidig Top med forlængede Grene; Yderavnerne tilspidsede i en kort Braad, uligestore: den nedre kortere end Smaaaxet, femnervet, den øvre af Smaaaxets Længde, 9—11-nervet; den golde Blomst dannet af 2 Inderavner, af hvilke den nedre er tilspidset, omtrent ligelang med den øvre Yderavne.

26. **Echinochloa** Beauv. Smaaaxene uden Svøb, samlede til en Top, dannet af ensidige Ax; Yderavnerne uligestore: den nedre kortere end Smaaaxet, den øvre af Smaaaxets Længde, femnervet, endende i en Stak eller Braad; den golde Blomst dannet af 2 Inderavner, af hvilke den nedre er ligelang med Smaaaxet, stakbærende.

ββ. Blomsten paa hver Side omgivet af et hindeagtigt Skjæl
(*o:* 2 ufuldkomne, golde Blomster).

27. **Digraphis** Trinius. Smaaaxene paa begge Sider hvælvede; Yderavnerne omtrent ligestore, paa Ryggen kjølformede, uvingede; de golde Blomster skjægghaarede, kortere end den frugtb.; Inderavnerne 2, læderagtige, kortere end Yderavnerne. (Blomsterstanden en sammentrængt Top.)

† 28. **Phalaris** L. Smaaaxene udadtil hvælvede, indadtil hule, Yderavnerne omtr. ligestore, paa Ryggen vingede; de golde Blomster ikke skjæggede, kortere end den frugtb.; Inderavnerne som foreg. (Blomsterstanden et rundagtigt Hoved.)

29. **Anthoxanthum** L. Yderavnerne uligestore: den nedre kortere, den øvre længere end Blomsterne, paa Ryggen uvingede; de golde Blomster stakbærende, haarede, længere end den frugtb.; Inderavnerne 2, stakløse, hindeagtige; 2 Støvdragere. (Blomsterstanden en aflang Dusk.)

*γγ. Ingen golde Blomster ved Grunden af de frugtbærende.
(Blomsterstanden en valseformet Dusk).*

30. **Alopecurus** L. 2 nedentil sammenvoxne, omtrent ligestore Yderavner uden Stak; 1 Inderavne med en nederfor Midten befæstet Stak.

31. **Phleum** L. 2 frie, omtrent ligestore, i en Stak eller Braad tilspidsede Yderavner; 2 Inderavner uden Stak.

β. Blomsten under Blomstringen aaben, Grifterne korte, Arrene udtræde ved Grunden af Blomsten.

αα. Inderavnerne ved Grunden omgivne af lange Haar.

32. **Psamma** Beauv. Blomsterstanden sammenkneben, duskformet; Yderavnerne længere end de læderagtige, kort stakbærende Inderavner, den nedre Yderavne mindre, ennervet, den øvre større, trenervet (eller indbyrdes ligelange).

33. **Calamagrostis** Adans. Blomsterne i en Top; Yderavnerne længere end de hindeagtige, med en kortere eller længere Stak forsynede Inderavner; den nedre Yderavne længere end den øvre.

Phragmites communis β, repens. (Nr. 47).

ββ. Inderavnerne uden eller med meget korte Haar ved Grunden.

34. **Agrostis** L. Yderavnerne kjølformigt sammentrykte, længere end Blomsten og indbyrdes lidt uligelange; Inderavnerne (1—2) hindeagtige. (Blomsterstanden en Top.)

35. **Milium** L. Yderavnerne bugformigt hvælvede, indbyrdes ligelange og af Længde med Blomsten; Inderavnerne tilsidst læderagtige. (Blomsterstanden en Top.)

Melica uniflora. (Nr. 36).

Catabrosa aquatica β , *subtilis*. (Nr. 50).

b. Smaaaxene med 2 eller flere fuldt udviklede Blomster.

aa. Yderavnerne (idetmindste den ene) længere end eller ligelange med Smaaaxet.

α . Nogle af Blomsterne særkønnede eller gølge

36. **Mélica** L. Smaaaxene 2—fleerblomstrede, de nedre (1—2) Blomster tvekjønnede, den øvre gold, alle stakløse; Yderavnerne hvælvede, omtrent af Blomsternes Længde; Arrene udtræde ved Grunden af Blomsten.

37. **Hieráchlœa** Gmelin. Smaaaxene treblomstrede, de 2 nedre Blomster σ trehannede, den øvre φ tohannet, alle stakløse (eller med en kort Stak); Yderavnerne kjølformigt sammentrykte, omtrent af Blomsternes Længde; Arrene udtræde i Spidsen af Blomsten.

38. **Holcus** L. Smaaaxene toblomstrede, den nedre Blomst φ stakløs, den øvre σ med en Stak fra Ryggen; Yderavnerne kjølformigt sammentrykte, længere end Blomsterne; Arrene udtræde ved Grunden af Blomsten.

Avena elatior. (Nr. 46).

Setaria glauca. (Nr. 23).

β . Alle Blomsterne φ .

39. **Flumínia** Fr. Yderavnerne bugformigt hvælvede, den nedre 3-, den øvre 5-nervet; Inderavnerne ved Grunden omgivne af Haar, den nedre 5-nervet, i Spidsen trefliget, stakløs; Frugtknuden i Spidsen haaret.

40. **Triódia** R. Br. Yderavnerne bugformigt hvælvede, begge ved Grunden 5-nervede; den nedre Inderavne læderagtig, 7-nervet, ved Grunden og i Randen haaret, i Spidsen tretaundet,

(eller totandet med en kort Braad i Indskjæringen); Frugtknuden glat.

41. **Koeléria** Pers. Yderavnerne kjølformigt sammentrykte, den nedre 1-, den øvre 3-nervet; den nedre Inderavne udeelt, stakløs eller med en kort Braad fra Spidsen; Frugtknuden glat, fri. (Blomsterne i Dusk.)

42. **Aira** L. (part.) Yderavnerne kjølformigt sammentrykte; Inderavnerne med Haar ved Grunden, den nedre i Spidsen udrandet eller gnavet, med en Stak udgaaende fra Ryggen eller Grunden; Frugtknuden glat, fri, uden Længdefure. (Blomsterstanden en Top.)

43. **Corynéphorus** Beauv. Yderavnerne kjølformigt sammentrykte; Inderavnerne med Haar ved Grunden, den nedre udeelt, spids, med en Stak udgaaende fra Grunden; Stakken paa Midten leddet og ved Leddet haaret, dens øvre Ledstykke opadtil kølleformet; Frugtknuden glat, med en Længdefure paa den indre Side.

44. **Airópsis** Desv. (Fr. mant. 3). Yderavnerne kjølformede; den nedre Inderavne trind, utydeligt 3—5-nervet, i Spidsen tokløvet med en knæbøiet Stak fra Ryggen; Frugten glat, tilvoxet til Inderavnen.

45. **Trisétum** Pers. (Fr. mant. 3). Yderavnerne kjølformede; den nedre Inderavne hindeagtig, i Spidsen tobørstet, 3—5-nervet med en kjølformet Midtnerve og en knæbøiet Stak fra Ryggen; Frugten glat (eller i Spidsen skjægget), fri, uden Længdefure.

46. **Avéna** L. (part.) Yderavnerne bugformede; den nedre Inderavne ved Grunden læderagtig, 5—11-nervet, paa Ryggen trind med tokløvet eller tandet Spidse og en knæbøiet eller snoet Stak fra Ryggen; Frugten i Spidsen eller overalt haaret, fri, med en Længdefure paa den indre Side.

Holcus L. (n. 38).

bb. Yderavnerne kortere end Smaaaxet (af Længde med eller kortere end den nedre Blomsts Inderavner).

α. En af Blomsterne i Smaaaxet ♂ eller gold.

47. **Phragmites** Trin. Blomsterne 2—7, ved Grunden omgivne af lange Haar (den nedre, ♂ eller golde Blomst undtagen); Yderavnerne uligelange (den øvre størst); den nedre Inderavne sylspidset, trenervet, den øvre meget kortere.

48. **Enóidium** Gaudin. Smaaaxene ægformet-aflange, 2—3-blomstrede; Blomsterne uden Haar ved Grunden, den øvre gold; Yderavnerne uligelange (den øvre størst); den nedre Inderavne spids, æg-lancetformet, femnervet, stakløs. (Straaet har kun eet enkelt Led ved Grunden).

Melica nutans (den øvre Blomst gold, Nr. 36).

β. Alle Blomsterne fuldt udviklede.

αα. Den nedre Inderavne stakløs, med parallelle, i Spidsen ikke sammenløbende Nerver,

** bugformigt hvælvet.*

49. **Briza** L. Smaaaxene før Blomstringen bredt-ægformede, efter samme hjerteformede, 6—10-blomstrede, Blomsterne toradet-taglagte; Yderavnerne ligelange; Inderavnerne i Spidsen afrundede, den nedre ved Grunden hjerteformet-øret, svagt 7—9-nervet.

50. **Catabrosa** Beauv. (Fr. mant. 3). Smaaaxene ægformede, 1—3-blomstrede; Yderavnerne uligelange (den øvre størst); den nedre Inderavne tværhugget, budt, i Spidsen gnavet, trenervet.

51. **Glycéria** R. Br. (Fr. mant. 2, 3). Smaaaxene linieformede eller aflange, 4—12-blomstrede; Yderavnerne uligelange (den øvre størst); den nedre Inderavne 5—7-nervet, i Spidsen bindeagtig.

*** Den nedre Inderavne kjølformigt sammentrykt.*

52. **Poa** L. Smaaaxene ægformede eller elliptiske, fladtrykte, 2—8-blomstrede; Blomsterne tæt taglagte, ved Grunden frie eller løst sammenhængende formedelst en fiin, kruset Uld.

ββ. Den nedre Inderavnes Nerver (idetmindste de midterste) sammenlobende i Spidsen, Midtnerven (som oftest) i eller nedenfor Spidsen udløbende i en Stak.

* Smaaaxene uden Hylster ved Grunden.

+ Inderavnerne bugformigt-hvælvede.

53. **Festuca** L. (part.) Yderavnerne uligelange (den nedre ennervet, over halvt saa lang som den 3—5-nervede øvre) eller næsten ligelange; den nedre Inderavne 3—5-nervet, stakløs eller med Midtnerven udløbende i en Stak fra Spidsen, den øvre fint-randhaaret; Griflerne befæstede i Spidsen af Frugtknuden. (Bladskeden heelt kløvet.)

54. **Vulpia** Gmel. Yderavnerne uligelange: den nedre meget kort (ikke halvt saa lang som den øvre) eller 0; den nedre Inderavne femnervet, med en lang Stak befæstet i Spidsen, den øvre fint-randhaaret; Griflerne befæstede i Spidsen af Frugtknuden (Blomsterstanden sammentrængt; Bladskederne heelt kløvede; Smaagrenene imod Grunden af Smaaaxene kølleformede; Støvdragerne ofte 1.)

55. **Bromus** L. (part.) Yderavnerne uligelange: den nedre 3—5-nervet, over halvt saa lang som den øvre 5—∞-nervede); den nedre Inderavne 5—7-nervet, med en Stak befæstet nedenfor den tokløvede Spidse, den øvre i Randen kamformigt-børstehaaret; Griflerne befæstede paa Siden (ovenfor Midten) af den haarede Frugtknude. (Bladskederne neppe i deres halve Længde kløvede.)

++ Inderavnerne sammentrykte, med kjølformet Midtnerve.

56. **Schedonorus** Beauv. (Fr. bot. not. 1843). Yderavnerne ligesidede, uligelange: den nedre ennervet, over halvt saa lang som den øvre, trenervede; den nedre Inderavne femnervet, med en Stak i eller lidet nedenfor Spidsen; Griflerne befæstede paa Siden (ovenfor Midten) af den haarede Frugtknude; Bladskederne neppe i deres halve Længde kløvede.

57. **Dactylis** L. Yderavnerne uligesidede, den ene (breddere) Side hvælvet, den anden flad eller indtrykt, uligelange: den nedre kortere, ennervet, den øvre trenervet; den nedre

Inderavne femnervet med stivt-randhaaret Kjøl og en kort Staklidet nedenfor Spidsen; Griflerne endestillede, Frugtknuden glat. (Bladskederne kløvede i næsten hele deres Længde; Smaaaxene sammenhobede til eensidige Nøgler.)

** Smaaaxene ved Grouden omgivne af et kamformigt-ligel Hylster (et udviklet Smaaax).

58. **Cynosurus** L. Blomsterstanden en Dusk, dannet af toradet stillede, ensidigt vendte Nøgler; Smaaaxene 2—5-blomstrede.

3. Orden. *Trigynia* (Trehunnede).

59. **Holosteum** L. Bæger og Krone fembladede; Kronbladene i Spidsen tandede; Frugten en med 6 Tænder opspringende, mangefrøet Kapsel. Frøene skjoldformede (Støvdragerne undertiden 4 eller 5). (Enaarig Urt med modsatte Blade. N. F. Alsinaceæ.)

Montia L. (3, 1).

Stellaria media. (10, 3).

I. Monogynia.

1. Valeriana. Baldrian.

a. Stængelen firekantet med sribede Sider.
Blomsterne tvebo.

36. **V. dioeca** L. (Tvebo-B.) H. 42; Drej. n. 31; F. D. 687; Rehb. ic. fl. germ. XII, 1428.

Bladene paa Rodstokken og de overjordiske Vandgrene heelrandede, ægformet-ovale; Stængelbladene lyreformet-snitdeelte med linieformet-ovale, budte, næsten heelrandede Afsnit.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. ♂ Planten lavere og spædere end ♀, men med større, kjødfarvede, sjældnere hvide Kroner og mere udsprede Qvast; ♀ Kr. smaae, hvide. 5. (6—7. fr.) 4.

I fugtige Enge, hyppig paa Øerne; i Halvøens sydlige Deel bemærket paa flere Steder, mod N. sjældnere eller maaskee aldeles forsvindende (mangler f. Ex. i Eggen ved Randers (7) og Haraldslund!).

b. Stængelen furet. Blomsterne ♀.

37. **V. sambucifolia** Mikan [Pohl. fl. boëm. I, 41] Hyld-bladet B.) Rchb. ic. fl. germ. XII, 1431; Fr. mant. 3, p. 1; H. N. XI, 16.

Alle *Bladene* fjersnitdeelte, med 3—5 Par lancetformede eller elliptiske, grovt og fjernt-tandede Afsnit; *Rodstokken* skyder over- eller underjordiske Udløbere.

Qvasten efter Aflomstringen meget udspredd med fjerntsiddende Blomster. Skalfrugterne omtrent dobbelt saa store som hos følg.; Kr. hvid eller kjødfarvet. Blomstringstid hos os mindst 8—14 Dage tidligere end følg. 6—7. ♀.

Ann. Synes at være en naturlig og vel adskilt Art, om der end kunde ønskes mere bestemte Characterer for at begrunde Adskillelsen. Dyrket i meget tør Jord, har den i 6 Aar vedligeholdt sine Udløbere og særegne Habitus (12). De til hver Art hørende Afændringsformer maa nærmere iagttages.

Ved Randen af Bække og Grøfter og paa andre sumpige Steder især i Skove, almindeligt udbredt over hele Landet.

38. **V. officinalis** L. (Læge-B.) H. 43; Drej. n. 32 (undt. Voxest.) F. D. 570! Rchb. ic. fl. germ. XII, 1432.

Alle *Bladene* fjersnitdeelte, med 6—9 Par lancetformede, heelrandede eller tandet-saugtakkeede Afsnit; *Rodstokken* med eller uden underjordiske Udløbere.

Qvasten med talrige og mere tætsiddende Blomster, Kr. blegrød, kjødfarvet eller hvid, Roden stærktlugtende (som hos den foreg.) 7. ♀.

β, angustifolia (V. angustifolia Tausch, Rchb. fl. germ. XII, 1433); H. N. XI, 15; V. off. *β, minor* Koch Syn. II, 369.) Bladafsnittene linie-lancetformede, næsten alle heelrandede.

Ann. Denne Form forekommer hyppigt med Udløbere, hvis Mangel eller Nærværelse fortrinsviis turde rette sig efter Voxestedet. Var. desuden i Henseende til Beklædningen, Stængelens Høide o. s. v. (Adskillelsen mellem *α, major* og *β, minor*, saaledes som den er fremstillet hos Koch, forekommer mig ikke begrundet i Naturen, da Stængelens Høide og Bladenes Indskjæring neppe staae i Afhængighedsforhold til hinanden).

I Grøfter, paa Enge, mellem Krat, ikke sjelden, men mindre hyppig end foreg., meest udmærket og i stor Mængde har jeg fundet den paa Kalkgrund (Møens Klint! Alindelille!)

2. Valerianella. Krop.

39. **V. olitoria** [Poll. palat. 1, p. 30]. (Tandfri K.) Rehb. ic. fl. germ. XII, 1398; H. N. XII, 33; Fedia Vahl, H. 44; Drej. n. 33; F. D. 1681; Valeriana Locusta α olitoria L.

Stængelen kantet-furet, paa Kanterne svaghaaret af nedadvendte Haar; *Stængelbladene* lancetformede, i Spidsen og ved Grunden afrundede; *Dækbladene* udstaaende, omvendt ægformet—lancetformede, budte, randhaaret-rue; *Skalfrugten* oftest glat, ægformet-rundagtig, fladtrykt fra Siderne, trerummet, de 2 tomme Rum større end det frøbærende, adskilte ved en ufuldstændig Skillevæg; den oversædige *Bægerkrave* utydeligt 2—3-tandet.

Plantens Farve blaagrøn, Rodbladene omvendt-ægformede, de øvre Stængelblade ved Grunden ofte svagt-tandede. Kr. blegblaa, næsten hvid. Frøgjemmet paa Ryggen af det frøbærende Rum tykt, svampagtigt. 5. (6 fr.) ☉.

β , *lasiocarpa* Rehb. ic. crit. I, tab. 60. Skalfrugten duunhaaret.

Paa Diger og dyrkede, især tørre, Marker ikke sjelden, og bemærket i alle danske Provindser, men paa Halvøen mindre hyppig. β , paa lignende Steder, men mindre hyppig end Hovedarten, f. Ex. Sj. Sorø! J. Hjarbæk ved Viborg (Feddersen)! *Bornh.* (20)!

40. **V. Morisonii** [(DC.) Koch Syn. 1, p. 446]. (Tandbægret K.) *V. dentata* Poll. l. c. (part.), Lge. Haandb. 2 Udg. p. 29, Rehb. fl. germ. XII, 1402; Fedia dentata Wallr., H. 44; Drej. n. 34; H. N. IV, 8; Valeriana olitoria F. D. 738.

Stængelen (især under Leddene) ru; *Stængelbladene* linie-lancetformede; *Dækbladene* tiltrykte, linie-lancetformede, spidse, randhaarede; *Skalfrugten* ægformet-kegleformet, fladtrykt fra Ryggen, enrummet med Spor til 2 tomme Rum i Form af linieformede Striber, indsluttende et ægformet Mellemrum; det oversædige *Bæger* omtrent $\frac{1}{4}$ af Skalfrugtens Længde, skraat afskaaret, faatandet, med uligestore, nerveløse Tænder.

Rodbladene spadeformede, Kr. blegrød eller hvid. 6—7. ☉.

α , *lejocarpa* Koch; Rehb. l. c. f. 1402. Frugten glat.

β , *dasyocarpa* Rehb. l. c. f. 1403. Frugten beklædt af udstaaende, i Spidsen indbøiede Haar.

Paa dyrkede Marker som Ukrud i Vintersæden, især paa de *sydlige Øer*: Bornholm, Møen, Falster, Lolland og Langeland; i det sydlige Fyen alm. (12), Odense (19); *Sj.* v. Høvdingsgaard og Præstø (Dr.)! Stubberup og Sipperup v. Skjelskør (Nielsen), mellem Stillinge og Kjeldstrup; *Sl.* Dyttbøl ved Gelting (Lund). I de nordligere Egne ikke bemærket.

Anm. Navnet *V. dentata*, som af flere Forff. tillægges denne Art, er mindre heldigt, da efter Amanuensis *Kroks* Undersøgelser Linnés *Valeriana Locusta* ♂, *dentata* betegner *V. Auricula* DC.

† *V. eriocarpa* (Desv. journ. bot. 2 p. 314 t. 11, f. 2.)
Fedia Rchb. ic. crit. I, f. 132. Det oversædige Bæger omtrent ligelangt med Skalfrugten, 5—6-tandet med skraat afskaarne, uligestore, nætformigt-nervede Tænder, de tomme Rum indslutte et ovalt Melleumrum, forøvrigt som foreg.

Forvildet i Rosendals Have paa Østerbro, og tidligere paa Pladsen ved Thorvaldsens Museum!

3. Montia. Vandarve.

41. *M. rivularis* [Gmel. Fl. bad. I, p. 302] (Stor V.) Koch Syn. II, 445; H. N. XIV, 58; *M. fontana major* F. D. 1926; *M. lamprosperma* Chamisso (Linnæa VI, p. 564 t. 7.).

Stængelen langstrakt (2—8" høi), flydende; *Bladene* omvendt-ægformede; *Blomsterne* i faablomstrede Qvaster fra Hjørnerne af de modsatte Blade; *Blomsterstilkene* efter Afblomstringen nikkende; Frøene med fiint punkteret, glindsende Skal.

Bladene af en frisk grøn Farve, safrige, Kr. hvide, kun aabne i Solskin. 7—8. ♀.

I Kildevæld og Bække, almindelig paa *Halvøen*, synes at være mindre hyppig paa Øerne: *Sj.* Strandmøllen (15), Nymølle! *F.* Kirkeby; Thurø (12); *Bornh.* v. Sandvig! Snogebæk (Baagøe).

42. *M. minor* [Gmel. l. c. p. 301] (Liden V.) Koch syn. II, 445; *M. fontana* L., Cham. (l. c.); F. D. 131 (?)

Stængelen (1½—2" høi) opret eller opstigende; *Bladene* elliptiske eller omvendt-ægformede; *Blomsterne* i fleerblomstret, endestillet Qvast eller paa enblomstrede, efter Afblomstringen nikkende Blomsterstilke fra Hjørnerne af de modsatte Blade; *Frøenes* Skal grovt punkteret, glandsløs.

Bladene mere guulgrønne, mindre saftige. Kr. som foreg. 5—6 og 9. ♂.

Ved Bredderne af stillestaaende Vand; paa fugtig, af og til oversvømmet, især sandig Grund: i *Sjæll.* og paa *Bornh.* ikke sjelden,

og, som det synes, ogsaa udbredt over de andre danske Øer (jeg har seet Expl. fra Møen, Falster, Lolland, Fyen); paa Halvøen er den sjeldnere: *J.* Dronninglund i Vendsyssel (12), Harboøre (Andresen), Agger, Lemvig! Hansted Mose (2), Hjortlund ved Ribe (12); *Sl.* Rosendal, Østerhusum (F. Müll.).

4. *Crocus.* Safran.

43. *C. vernus* L. (Vaar-S.) H. II, 112; F. D. 2042; Rchb. ic. fl. germ. IX, tab. 355.

Hovedaxen en fladtrykt-kugleformet *Knol*, beklædt med brune, trævlede Hinder (det foreg. Aars henvisnede Bladskeder); *Bladene* smalt-linieformede, mørkgrønne med hvid Midtnerve og tilbagerullet Rand, ved Grunden omgivne af 4—5 hvide Bladskeder uden Plade, Blomsterstilken af et enbladet Hylster.

$\frac{1}{2}$ ' høi. Blomsterne blaae, aabne sig kun i Solskin. Frugtknuden under Blomstringen skjult langt nede i Hylsteret. 3—4. 4.

Paa Enge, meget sjelden og hidtil kun funden i *Slesvig*: Hammemark NO. for Egernførde (N), Nyværk ved Slesvig, Slotsengen ved Husum (16).

5. *Iris.* Sværdlilie.

44. *I. Pseudacorus* L. (Guul S.) H. 45; Drej. n. 35; F. D. 494; Rchb. ic. fl. germ. IX, tab. 344.

Bladene sværdformede, af Stængelens Længde; *Dækbladene* af Længde med eller længere end Blomsterne; *Blomsterdækkets* ydre Flige store, elliptiske, gule med brune Striber ved Basis, de indre lancetformede med bredere, foldet Basis, mindre end Arrets Flige; *Kapselen* trekantet.

2—3' høi. Blomsterne gule. 6—7. 4.

I Kjær, ved Aa- og Søbredder, almindeligt udbredt i Danmark.

45. *I. spuria* L. (Blaa S.) H. 46; Drej. n. 36; F. D. 734; Rchb. l. c. IX, tab. 345; H. N. XII, 70.

Bladene sværdformede, kortere end Stængelen; *Dækbladene* kortere end Blomsterne; *Blomsterdækkets* ydre Flige med ægformet, blaa Plade og smalere, rødtribet, Negl, de indre omvendt-ægformede, lila, længere end Arrets Flige; *Kapselen* sexkantet.

1—2' høi. Blomsterne blaae. 6. 4.

Ved Strandbredder af Øer i Øresundet og Østersøen: hyppig ved Nordkysten af Saltholm (!), i Nakskov Fjord paa Øerne Steensø! Stubbeland (19) og Dueholm (9), Iholm mellem Fyen og Thorseng (Bredsdorff 1778, nu forsvunden, 12). ☒

Ann. *I. germanica* L., som af Kylling angives fra Lolland, er ikke funden der senere, og hvis Citatet forøvrigt er rigtigt, maa den vel antages at have været forvildet fra Haver, eller ialtfald forlængst ophørt at være vildvoxende i vor Flora. Fries (Bot. not. 1845 p. 123) antager forøvrigt, at de ældre Angivelser om denne sigte til *I. squalens*.

6. *Cyperus. Fladax.*

46. *C. fuscus* L. (Bruunt F.) H. 50; Drej. n. 38; F. D. 179; And. Cyp. Scand. t. I, f. 2; Rehb. ic. fl. g. VIII, tab. 280; H. N. XII, 79.

Stængelen skarpt-trekantet, med hule Sider; *Smaaaxene* fladtrykte, linieformede, med taglagte, tilsidst udspærrede Dækskjæl; 3 *Ar*; *Frugten* elliptisk, skarpt trekantet.

Smaaaxene samlede til 1 eller (hos kraftigere Expl.) flere, i en halvskjærmeformet Qvast stillede Hoveder i Enden af Stængelen, omgivne af oftest 3 Svøbblade, der ere længere end Blomsterstanden; Dækskjællene sortbrune, med grøn, i en kort Spids udløbende Midtnerve. 7—8. ☉. (Synes ikke i ethvert Aar at komme til Udvikling.)

I udtørrede Søer og paa fugtige, af og til oversvømmede Steder, ikke almindelig: *Sj.* Hellebæk (12), Skjæremøllen ved Fredensborg (Dr.), Frederiksborg, Lyngby, Frue Skov ved Bagsværd, Fortunen (H), Ermelund (26), mellem Christiansholm og Bellevue (Dr.); *Falst.* Horbeløv (Koch); *Loll.* ved Steensgaard (19), *Thorseng* i en Skov mellem Lundby og Thaersminde! *

47. *C. flavescens* L. (Guult F.) H. 50; F. D. 1682; And. l. c. I, 1; Rehb. VIII, tab. 278.

Stængelen budt-trekantet, *Smaaaxene* linie-lancetformede, fladtrykte, med taglagte, tiltrykte, budte Dækskjæl; 2 *Ar*; *Frugten* rundagtig, fladtrykt.

Blomsterstand og Svøbblade som hos foregaaende. Dækskjællene gulbrune med grøn Midtnerve. 7—8. ☉ (4? I Frankerig har jeg fundet Expl. med i Spidsen knolleformigt fortykkede Udløbere. Maa nærmere undersøges).

Paa fugtige Steder. Efter *H.* funden i *Slesvig* af Lehmann. ☒

7. *Schoenus. Skjæne.*

48. *S. ferrugineus* L. (Rustfarvet S.) H. 47; Drej. n. 37; F. D. 1503; And. I, 3; H. N. I, 72; Chætospora Rehb. VIII, tab. 285.

Stænglerne tueformigt samlede, mange Gange længere end Bladene; *Smaaaxene* 2—4, samlede i et elliptisk, endestillet Hoved; *det ydre Svøbblad* opret, lidet længere end Hovedet; *Dækskjællene* glatte; *Blomsterdækket* dannet af 3—5 Børster.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Dækskjællene og Bladskederne glindsende og sortagtigt kastaniebrune. 6. 4.

I Tørvmoser, sjelden i Danmark: *Sj.* Bidstrupgaards Mose (!) og Svogerslev Mose (20) ved Roeskilde; *Moen* i Enggrøfterne ved Grønsund (11); *J.* Bjørnsholm, Vissegaards Mose ved Aalborg (23), Moser Ø. for S. Tranders (12). 1*

49. **S. nigricans** L. (Sortagtig S.) H. 47; F. D. 2281; And. I, 4; Rchb. VIII, tab. 286; H. N. IV, 89.

Stænglerne og *Rodbladene* tueformigt samlede; Bladene omtrent halvt saa lange som *Stænglerne*; *Smaaaxene* 5—8, samlede i et rundagtigt, endestillet Hoved; *det ydre Svøbblad* skraat opstigende, meget længere end Hovedet; *Dækskjællenes* Rygnerveru; *Børster* 0 (eller 6).

$\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ ' høi. Dækskjællene og Bladskederne glindsende sortbrune. 6. 4.

I Tørvmoser, meget sjelden og kun bemærket paa Halvøen: *J.* Gravens Mose i V. Hanherred (Dr.), Fjerritslev i V. Hanherred, Østerild! Jensby og Hillerslev Moser i Thy (Dr.), Vildsted pr. Løgstør (8)!

8. Rhyncospora. Næbfrø.

50. **R. fusca** [Roem. & Schult. Syst. II, 88]. (Bruun N.) And. I, 7; Rchb. VIII, 285; H. N. XIV, 80; Schoenus L., H. 49; F. D. 1562.

Rodstokken krybende; den blomsterbærende *Stængel* opret, med (i Spidsen af *Stængelen* og fra de øvre Bladhjørner) *Smaaaxene* sammenhobede til elliptiske, axformede Nøgler, der ere meget kortere end *det ydre Svøbblad*; *Blomsterdækkets* Børster 3, dobbelt saa lange som Frugten; *Støvdragere* 3; *Arrene* 2, længere end Griffelen.

$\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ ' høi. Bladene gulgrønne, Dækskjællene brune. 7—8. 4.

I Tørvmoser paa Hedegrund, kun funden paa *Halvøen*: *J.* Vildsted ved Løgstør (8)! Viborg (H.), Stockholm Mose V. for Skive (16); *Sl.* Oxager i Angel (28); i Vesteregnene almindelig (H.)!

51. **R. alba** [Vahl Enum. II, 236] (Hvid N.) Drej. n. 39; And. I, 6; Rehb. VIII, 285; Schoenus L., H. 49; F. D. 320; L. Herb. IV, 71.

Stænglerne tueformigt samlede, opstigende, med (i Spidsen af Stængelen og fra de øvre Bladhjørner) Smaaaxene sammenhobede til rundagtige, halvskjærmformede Nøgler, omtrent af det ydre Svøbblads Længde; *Blomsterdækkets* Børster omtrent 10, af Længde med Frugten; *Støvdragere* 2; *Arrene* 2, kortere end Griffelen.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Bladene mere blaagrønne, Dækskjællene hvidgule, imod Frugtmodningen blegbrune. 6—8. 4.

I Kjær og Hedemoser, især i Hængedynd: paa *Halvøen* alm. især i den midterste og vestlige Deel; sjældnere paa Øerne: *F. Langelensø* (13), *Rødskebølle* (12); *Loll.* Karleby ved Nysted (19); *Falst.* i Horreby Lyng! *Sj.* Holmegaardsmosen, Tepri og Lyngby Mose (H.), Erlandsens Mølle ved Hillerød (7), Helsingør (H.), *Bornh.* i Høilyngen (8).

9. Eleocharis. Sumpstraa.

a. Frugten jævn.

52. **E. palustris** [R. Br. prodr. fl. nov. holl. I, 80.] (Almindeligt S.) Drej. n. 43; Scirpus L., H. 51; F. D. 273; And. II, 22; Rehb. VIII, 297; H. N. II, 68; L. Herb. VII, 137.

Rodstokken krybende; *Stængelen* trind, noget fladtrykt, med to lige afskaarne, bladløse Skeder ved Basis; *Axet* linie-lancetformet eller ovalt; *Dækskjællene* næsten spidse, de 2 nedre (blomsterløse) budte, omfattende hver Halvdelen af Axet; 2 *Ar*; *Frugten* omvendt-ægformet, noget fladtrykt med afrundet Rand.

Var. efter Voxestedet i Høide ($\frac{1}{3}$ —1'), Axets Form o. s. v. 6—8. 4.

Almindelig paa fugtige Euge, i Moser, ved Søbredder og i selve Vandet (alm. den større Form).

53. **E. uniglumis** [Link i Jahrb. d. Gew. K. I, 3, 77] (Enskjællat S.) Scirpus Fr. mant. 2, 45; Rehb. VIII, 296; And. II, 23; H. N. II, 69; *S. palustris* β , minor H. 51; *S. acicularis* F. D. 167 (?)

Stængelen trind; *Axet* æg-lancetformet; *det nedre* (blomsterløse) *Dækskjæl* rundagtig-ægformet, heelt omfattende Axet, (forøvrigt som foreg.)

Ansees af Mange for en Form af foreg., fra hvilken den, foruden de angivne Kjendetegn, er forskjellig ved mere glindsende, mørk-rødbrunne Bladskeder og finere Stængler. 6—8. 4.

Paa Enge og andre fugtige Steder, især ved Strandkanterne, forekommer i alle Provindser, men ikke saa hyppig som foreg.

54. **E. multicaulis** [Smith fl. britt. I, 48. Scirpus] (Mangestænglet S.) H. II, 113; F. D. 1923; Rchb. VIII, 296; And. II, 24; Fr. mant. I, 3; H. N. II, 67.

Stænglerne tueformigt-samlede, trinde, med to bladløse, skraat afskaarne Skeder ved Grunden; *Axet* æg-lancetformet eller ovalt; *Dækskjællene* budte, det nedre udrandet, heelt omfattende Axet; 3 *Ar*; *Frugten* omvendt-ægformet, skarpt trekantet.

De nederste Blomster i Axet ere stundom topskydende; Bladskederne blegbrune. Hos Rchb. (anf. St.) er den afbildet med 2 *Ar*, og maaskee altsaa disses Antal er forskjelligt; paa alle de af mig undersøgte Expl. har jeg fundet 3 *Ar*. 6—8. 4.

Ved Søbredder og paa oversvømmet, sandig Grund, hidtil kun bekjendt fra *Halvøen*: J. Karlsmærsk Hede ved Blaavandshuk (30!); Sl. Huushy (28) og Oxager i Angel (16), Læk (Heiberg); Romø (N.) i smaa Sumper udenfor den vestlige Klitrække (16). ³

b. *Frugten* stribet.

55. **E. acicularis** [R. Br. l. c.] (Naaleformet S.) Drej. n. 44; Scirpus L., H. 53; F. D. 287; Rchb. VIII, 294; And. II, 26; H. N. XV. 90.

Stængelen traadformet, furet-firekantet; *Axet* ægformet-elliptisk, faablomstret; *Dækskjællene* ægformede; 3 *Ar*; *Frugten* omvendt-ægformet, med omtrent 8 Striber paalangs.

Rodstokken alm. krybende, stundom sammentrængt, med tueformigt samlede Stgl. Hele Planten meget spædere og finere end de foreg. 6—8. ☉ (efter Koch), 4 (Horn. o. Fl.)

Ved Sø- og Aabredder, (paa sandig og leret Bund) alm. i Sjøland og paa Bornholm og savnes neppe i nogen af de danske Provindser (fra Fyen har jeg ikke endnu seet Expl.)

10. Scirpus. Kogleax.

a. *Bæothryon* N. E. Eet endestillet enkelt Ax,
6 Børster i Blomsterdækket, 3 Ar.

56. *S. parvulus* [R. & S. Syst. Veg. II, 124.] (Lav K.)
F. D. 2161; Rehb. VIII, 299; And. I, 20; H. N. X, 68; *S.*
nanus Spreng., H. II, 113.

Stænglerne trinde, med indvendige Tværrum, ved Grunden omgivne af tyndhindede Bladskeder uden Plade; *Dækskjællene* ovale, budte; hveranden af Børsterne længere end den trekantede, jævne Frugt.

Rodstokken krybende, udsender traadfine Udløbere med en opsvulmet Knop i Spidsen; Planten liden som *Eleocharis acicularis*, men mere robust. 7—8. 4.

Ved Sø- og Flodbredder: *Sl.* ved Bredderne af Slien i Mængde (16), Halvmaanen ved Husum (F. Müll., 20!); *Loll.* i stor Mængde paa inddæmmede Strækninger af Nakskov Fjord, f. Ex. ved Holeby (19). Maa nærmere eftersøges, da dens Lighed med foreg. let kan skjule den for en flygtig Betragtning.

57. *S. pauciflorus* [Lightf. fl. Scot. p. 1078.] (Faablomstret K.) F. D. 1862 (høire Fig.); Rehb. VIII, 299; And. I, 21; *S. Bæothryon* Ehrh., H. 52; H. N. II, 66; *Heleocharis Bæothryon* Drej. n. 45.

Stænglerne tueformigt samlede, trinde, ved Grunden omgivne af Bladskeder uden Plade; *Æxene* rundagtigt-ægformede, 4—6-blomstrede; *Dækskjællene* ægformede, budte, alle blomsterbærende, det nedre større og omfattende, kortere end Axet, *Børsterne* lidt kortere end den trekantede, paalangs stribede Frugt.

4—8" høi. 6—8. 4.

β, minor (Blytt) F. D. 1862 (venstre Fig.) *Straaene* lavere (omtr. 2" høie), opstigende.

I Hedemoser, ved Søbredder og paa fugtige Overdrev, alm. udbredt paa *Halvøen*, mindre hyppig og kun sporadisk paa *Øerne*. *β*, paa mere tør Grund, f. Ex. Amager Fæled! Vaalse Vig paa Fælster (Koch)! Hullebæk (14)! *J.* Overdrev ved Støvringgaard i Jylland!

58. *S. caespitosus* L. (Tue-K.) H. 52; F. D. 1861; Rehb. VIII, 300; And. I, 19; H. N. XV, 89; *Limnochloa caespitosa* Drej. n. 47.

Stænglerne tueformigt samlede, trinde, sribede, ved Grunden omgivne af tæt-taglagte Bladskeder, af hvilke de øvre ende i en kort, sylformet Plade; *Axet* 3—5-blomstret; *Dækskjællene* ægformede, budte, det nedre tomt, af Længde med og omfattende Axet, tilspidset i en tyk, bladagtig Braad; *Børsterne* længere end den trekantede, jævne Frugt.

2—8" høi. Straaene meget stive og tæt sammenhobede. Skederne glindsende og løst omsluttende. 5—7. 4.

I Lyngmoser, almindelig i *Halvøens* Hedeegne, paa Øerne ikke alm.; *F.* i Mængde paa Hals Overdrev v. Hofmansgave (18); *Langel.* ved Tranekjær (19); *Falst.* Horreby Lyng (14); *Sj.* Gurre (14), gl. Kjøgekro (H.), Holmegaardsmosen! *Bornh.* i Høilyngen alm.!

b. *Heleogiton* Link. Stængelen flydende, leddet, fra Leddene (Bladhjørnerne) udgaae Blomsterstilke med eet enkelt, endestillet Ax. Børster 0. Ar 2.

59. *S. fluitans* L. (Flydende K.) H. 54; F. D. 1082; Rehb. VIII, 298; And. I, 18; H. N. II, 70; *Dichostylis* Beauv., Drej. n. 46.

Stængelen grenet, ved Grunden rodslaaende; *Bladenes* Plade linieformet, længere end Skeden; *Axene* faablomstrede; *Frugten* tveægget-fladtrykt.

De meget tynde, flydende Stængler ere eensbetydende med beslægtede Arters krybende Rodstok, de fra Bladhjørnerne udgaaende Blomsterstilke med hines overjordiske »Stængler«. Dækskjællene lysgrønne, i Randen hindeagtigt blegbrune. 7—8. 4.

I rindende og stillestaaende Vand: paa *Halvøen* hist og her: Koustrup i Thy (Dr.), Hasselholt mellem Skive og Struer (16), Aarslev ved Aarhus, Lille og Store Ring ved Skanderborg (H.), Borris! Tange (3 Mile N. O. for Ribe, 30) og derfra mod S. i *Slesv.* ikke sjelden (N.), Amrom (herb. Drej.); paa *Øerne* kun angivet fra (*Sj.*) en Dam i Hareskoven og (*Bornh.*) ved Vallensgaarden (H.). *

c. Blomsterstanden tilsyneladende sidestillet, idet det større Svøbblad udvikler sig i Retning af Stængelen og ligner en Fortsættelse af denne. Smaa-axene alm. 2 eller flere, i siddende eller til en sammensat, halvskjærmformet Qvast forenede
Nøgler.

aa. *Isolepis* R. Br. Dækskjællene i Spidsen hele, med en Braad. Børster 0.

60. *S. setaceus* L. (Børsteformet K.) H. 55; Drej. n. 53; F. D. 311; Rchb. VIII, 301; And. 1, 17; H. N. I, 74.

Stængelen trind, ved Grunden beklædt med Bladskeder, af hvilke de øvre have Plade; Axene 1—3, siddende, ægformede, kortere end det tilsidst tilbagebøiede Svøbblad; 3 Ar; Frugten omvendt-ægformet, noget fladtrykt, stribet paalangs.

1—6" høi. Var. med krybende eller tueformigt sammentrængt Rodstok, Stænglerne oprette eller bueformet nedbøiede, med kortere eller længere Svøbblad, 2 og 3 Støvdr.; Bladskederne rødlig. 7—8. ☉.

Ved Søbredder, paa fugtige Overdrev, især paa sandig eller tørvholdig Bund, sporadisk og ikke almindelig, men bemærket i alle danske Provindser, hyppigst paa Halvøen og i Nordsjælland. *

bb. *Schoenoplectus* Rchb. Dækskjællene fryndset-randhaarede, i Spidsen udrandede med en Braad i Indskjæringen. Blomsterdækket børsteformet.

α. Straaet trindt.

61. *S. lacustris* L. (Sø-K.) H. 54; Drej. n. 54; F. D. 1142; Rchb. VIII, 306; And. 1, 13.

Stængelen ved Grunden med Bladskeder uden eller med en kort Plade; Blomsterstandens Grene uddragne; Dækskjællene jævne; Støvknapperne i Spidsen haarede; 3 Ar; Frugten budt-trekantet.

Stgl. 3—6' høi, af grøn Farve. (En Form i riudende Vand med forlængede Bladplader anføres fra Sydeuropa og maa eftersøges hos os.) 6—7. 4.

I Bække, Aaer og Indsøer, alm. udbredt i Danmark.

62. *S. Tabernæmontani* [Gmel. Fl. Bad. p. 101.] (Blaagrøn K.) Rchb. VIII, 307; *S. glaucus* Sm., H. II, 114; Drej.

n. 55; F. D. 1922 og 454 (S. Holoschoenus); H. N. II, 65; S. lacustris β glaucus Fr. nov. p. 6; And. 1, 13.

Blomsterstandens Grene korte; *Dækskjællene* rødbrunagtigtpunkterede; *Støvknapperne* alm. glatte; 2 *Ar*; *Frugten* i Gjennemsnit fladtrykt-halvtrind (mere hvælvet udad- end indadtil), forøvrigt som foreg., men lavere (omtr. 2' høi) og mere blaa-grøn. 6—7. 4.

Flere Forfattere antage denne paa Grund af Overgangsformer og flere af de angivne Kjendetegns Foranderlighed for en Afart af foreg., frembragt ved Forskjellighed af Voxested; men saavel paa Grund af de anførte Kjendetegn som et særeget Habitus, forekommer mig dog Adskillelsen af denne og foreg. ligesaa naturlig som flere andre almindeligt antagne Arter.

Ved Bredderne af Salt- og Brakvand, ikke sjelden, bemærket i alle Provindser, især hyppig ved Halvøens Fjorde og Marskenge.

β . Straaet tresidigt.

63. *S. carinatus* [Sm. i E. B. 1983.] (Budtkantet K.) H. N. XII, 81; And. 1, 14; S. Duvalii Hopp., H. II, 114; F. D. 1743; Rehb. 724; S. trigonus Nolt. nov. p. 9.

Stængelen forneden trind, fra Midten opad budt-trekantet (med 2 hvælvede og 1 flad Side); *Smaaaxene* samlede i flere, stilkede eller siddende Nøgler; *Dækskjællene* spidst-udrandede; *Støvknapperne* glatte; 2 *Ar*; *Blomsterdækkets Børster* ligelange med den fladtrykte, paa Ryggen hvælvede *Frugt*.

Stgl. 2—4' høi, af grøn Farve, ved Grunden tyk og opblæst, de øvre Bladskeder med længere Plade, Svøbladet længere og mere opret end hos foreg. 6—7. 4.

Ved Flodbredder, kun funden ved Bredderne af Eideren (N.)! ☞

64. *S. triquetus* L. (Trekantet K.) H. 56; F. D. 1983; Rehb. 719; And. 1, 15; H. N. XII, 82; S. Pollichii Godr. & Gr.

Stængelen overalt skarpt-trekantet; det øvre Blad med en Plade kortere end Skeden; *Smaaaxene* samlede i eet siddende eller flere kortstilkede Nøgler; *Dækskjællene* budt-udrandede; *Støvknapperne* glatte; 2 *Ar*; *Børsterne* som foreg.; *Frugten* trekantet, paa Ryggen hvælvet.

2—4' høi, frisk grøn (ogsaa i tørret Tilstand); Bladpladen bred, trekantet, Svøbbladet opret, længere og bredere end hos foreg. 7—8. 4.

Ved Bredderne af Eideren (N.)! ☞

65. **S. pungens** Vahl [ms., herb! enum. II, 255.] (Stikkende K.) H. II, 114; Nolt. nov. p. 9; And. I, 16; H. N. XIII, 79; S. Rothii Hopp., Rehb. 717—18; S. triquetus F. D. 1563.

Stængelen overalt skarpt trekantet; de 2 øvre *Blade* med Plade længere end Skeden; *Smaaaxene* enlige eller flere samlede til et siddende Nøgle; *Dækskjællene* spidst-udrandede; *Støvknapperne* i Spidsen randhaarede; 2 *Ar*; *Børsterne* neppe halvt saa lange som den budt-trekantede, paa Ryggen hvælvede *Frugt*.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi. Bliver gulbruun ved Tørring. Bladpladerne og det oprette, sylspidsede Svøbblad omtr. dobbelt saa lange, men meget smalere og finere end hos foreg. *Var.* med 3 *Ar* (Vahls Herb. og Mscr., Exemplarer fra Frankerig!). 7—8. 4.

Paa lignende Steder som de to foreg. Arter, og ligesom disse, hidtil kun funden i *Slesvig*: ved Slien (Jessen), Ulsnæs (16), St. Peter i Eidersted (F. Müll.). ☞

d. *Phyllanthella* Fr. Blomsterstanden endestillet, med flere stærkt udviklede Svøbblade. (3 *Ar*.)

66. **S. maritimus** L. (Strand-K.) H. 56; Drej. n. 56; F. D. 937; Rehb. 726—28; And. I, 11; L. Herb. IX, 164.

Stængelen overalt skarpt trekantet, mangebladet; *Smaaaxene* samlede i eet siddende og flere stilkede Nøgler; *Dækskjællene* spidst-udrandede med en Braad i Indskjæringen; *Blomsterdækkets Børster* 3—6, kortere end Frugten; *Støvknapperne* i Spidsen randhaarede; *Frugten* omvendt-ægformet, budt-trekantet, i Gjennemsnit næsten halvtrind.

1—3' høi. Rodstokken krybende, ofte knolleformigt opsvulmet. *Dækskjællene* kastaniebrune. *Var.* med 2 *Ar*. 7—8. 4.

β , *monostachys*, med eet enkelt rundagtigt-ovalt *Ax*.

γ , *macrostachys* Koch. *Smaaaxene* lancetformede, næsten 1" lange.

δ , *sphaerostachys*! *Smaaaxene* æg-kugleformede.

Ved Strandbredder, meget alm. Formerne paa samme Steder, men sjældnere: *β*, *Sj.* Kalundborg Fjordenge (Baagøe!); *F.* Hofmangsgave (4); Vresen i Storebælt (19); *Loll.* ved Bjerremark (19), *Falst.* Kippinge Nor, Vaalse (14), Hesnæs (Koch); *SL.* v. Haderslev Fjord (Grønlund!), Flensborg Fjord! *γ*, Marienborg paa *Møen* (9), *Loll.* ved Torpe (19); *F.* mellem Nyborg og Holkenhavn (Lund); *δ*, Tørvmoser paa Lyø (12).

67. *S. silvaticus* L. (Skov-K.) H. 57; Drej. n. 57; F. D. 307; Rehb. 731; And. I, 10.

Stængelen forneden budt-, foroven skarpt-trekantet, mangebladet; *Blomsterstanden* flere Gange sammensat, qvastformet, med forlængede Smaagrener; *Dækskjællene* budte med en kort Braad; *Børsterne* 3—6, længere end den trekantede *Frugt*.

2—3' høi. Hele Planten frisk grøn, Bld. brede; *Dækskjællene* sortgrønne med bleggrøn Midtnerve. Smaaaxene mange Gange mindre end hos foreg. 6—7. 4.

Paa sumpige Steder i Skove, ved Grøfter, Vandhuller o. s. v., forekommer i alle Provindser, men i enkelte Egne sparsom (f. Ex. i det sydvestl. *Sjæll.* (17), paa *Lolland* og i det nordl. *Jyll.*; ikke bemærket i V. Hanherred (12)).

e. *Blysmus* (Panzer). Smaaaxene toradet ordnede til et sammensat, endestillet Ax. (2 Ar).

68. *S. Caricis* [Retz. Prodr. ed. II, p. 16.] (Fladtrykt K.) *Schoenus compressus* L., H. 48; F. D. 1622; *Blysmus* compr. Panz., Drej. n. 41; Rehb. 693; And. I, 9.

Stængelen utydeligt og budt-trekantet; *Bladene* flade med kjølformet Midtnerve paa Underfladen; *Smaaaxene* 6—8-blomstrede; *Blomsterdækkets Børster* med nedadvendte Smaatorne, vedblivende, længere end den lindseformet-fladtrykte, glindsende *Frugt*; *Støvknapperne* i Spidsen randhaarede.

Svøbbladet oftest længere end Axet. *Dækskjællene* lys-kastaniebrune. 6—7. 4.

Paa Enge (saavel Færskvands- som Strandenge) alm. udbredt. 4

69. *S. rufus* [Schrud. fl. germ. I, 133.] (Rødbrun K.) *Schoenus* Huds., H. 48; F. D. 1504; *Blysmus* Link., Drej. n. 42; Rehb. 694; And. I, 8; H. N. XII, 80; L. Herb. VII, 139.

Stængelen trind; *Bladene* halvtrinde, paa Overfladen røddede; *Smaaaxene* 2—5-blomstrede; *Børsterne* 0 eller hurtigt affaldende, »med opadrettede Smaatorne«, kortere end den fladtrykt-halvtrinde, glandsløse *Frugt*.

Svøbbladet ofte kortere, sjældent længere end Axet; Dækskjællene mørkere og mere rødligt-kastaniebrune, Frugterne større end hos foreg. 6—7. 4.

* — *bifolius* (S. *bifolius* Wallr. Sched. crit. p. 27; S. *Tabernæmontani* β, *monostachys* Lge. Haandb. 1 Udg. p. 38), med høiere og kraftigere Stængler, bredere Blade af glindsende mørkgrøn Farve; Axet omgivet af 2 Svøbblade, det ene omtrent af Axets Længde, det andet meget længere. Bliver ikke guul ved Tørring som Hovedarten og blomstrer senere ($\frac{7}{2}$ —8).

Paa Syltunge og Strandfælder, sporadisk og ikke almindelig: *Sj.* Holbæk (15), Jægerspris (19), Boserup (20), Saltholm (!) Vesterfæled, Kjøge (Dr.); *Moen* v. Grønsund (14), Ulfshale (17); *Falst.* v. Hesnæs (14), Ulsøv Sø (Koch), Grønsund (9); *Loll.* Strogneæs (5); *F.* Hofmansgave (4), Knudshoved (19), Rødkilde, Lyø (12), Thurø (19); *J.* mellem Fjerritslev og Klim i V. Hanherred, Agger i Thy (Dr.), Fjaltring! Mariager Fjord (7); *Sl.* Flensborg Fjord, Slien ved Slesvig (16), Sylt (N.). * *Sj.* Strandenge ved Flaskekroen (19); *J.* indenfor Klitterne ved Fjaltring (i Selskab med Hovedarten)! *Sl.* St. Peter i Eidersted (F. Müll.).

Anm. Formen * er i Udseende meget forskellig fra Hovedarten og ligner ved flygtig Betragtning langt mere *S. pungens*, saa at jeg ikke vilde betænke mig paa at ansee den for en egen Art, dersom den ikke i de væsenligere Kjendetegn stemte aldeles overens med *S. rufus*. Den anbefales til nærmere Undersøgelse!

11. *Eriophorum*. Kjæruld.

a. *Polystachya*. Smaaaxene flere (3—10), i halvskjærmformet Qvast, omgivne af Svøbblade; det indre Smaaax siddende, de ydre stilkede, paa tilsidst nikkende Axstilke.

70. *E. gracile* [Koch i Roth. Cat. bot. 2. p. 259.] (Fiin K.) H. 61; Drej. n. 52; Rehb. 687—88; And. II, 29; L. Herb. III, 51; H. N. XIV, 79; *E. triquetrum* Hopp., F. D. 1441; *E. polystachyon* γ, L. fl. Suec.

Rodstokken med Udløbere; *Stængelen* budt-trekantet; *Bladene* overalt trekantede, det øvre Stængelblad naaer ikke Blomsterstanden; *Åxstilkene* duunhaaret-rue; *Dækskjællene* budte; *Støvknapperne* kortere end Støvtraadene.

Finere og med smalere Blade end de 2 følgende; Ulden (det haarformede Blomsterdække) kortere og finere, bestaaende af 1—2 Cellerækker, (hos de 2 følgende af flere, omtr. 7 Cellerækker (12). 5—6. 4.

I Hængedynd eg dybe Moser, sporadisk og ikke almindelig: *Sj.* Bagsværd (H.), Dronninggaard (Puerary), Frederiksdal (14), Lyngby Mose (!) og Viintappergaarden (Dr.), Lundehusmosen! *F.* Hofmangave (H.), Norup Mose (18), Ollerup, Nielstrup, Egense (12), *J.* Moser Ø. for Tostum Sø, Hobro (16), Karlslund ved Randers (7), Bredstrup ved Fredericia (12); *Sl.* Haderslev (16), Aabenraa (Rafn), Huusby i Angel (16).

71. *E. latifolium* [Hoppe Taschenb. 1800, p. 108.] (Fladbladet K.) Drej. n. 50; Rehb. 691—92; And. II, 28; L. Herb. III, 50; *E. polystachyon* β , L. fl. Suec., F. D. 1381; H. 59.

Rodstokken uden Udløbere; *Stængelen* oventil budt-trekantet; *Bladene* flade med kjølformet Midtnerve paa Underfladen, i Spidsen trekantede, det øvre Stængelblad ikke naaende Blomsterstanden; *Åxstilkene* rue; *Dækskjællene* spidse; *Støvknapperne* kortere end Støvtraadene.

Frisk grøn, Bld. aftage jævnt i Brede mod Spidsen, de øvre have alm. en sort Plet ved Grunden; Ulden kortere end hos den følgende. 5—6. 4.

Paa fugtige Enge, i alle Provindser, men ikke saa almindeligt udbredt som følgende og som oftest ikke i Selskab med denne. I enkelte Egne mangler den aldeles, f. Ex. ikke bemærket paa Lolland (19).

72. *E. angustifolium* [Roth. tent. 1, 24.] (Smalbladet K.) H. 60; Drej. n. 51; F. D. 1442; And. II, 27; L. Herb. VII, 138; *E. polystachyon* α , L. fl. Suec., Rehb. 689—90.

Rodstokken med Udløbere; *Stængelen* trind; *Bladene* rendeformede, omtrent fra Midten til Spidsen trekantede, længere end Ledstykkerne (det øverste Stængelblad naaer under Blomstringen op over Blomsterstanden); *Åxstilkene* jævne og glatte; *Dækskjællene* spidse; *Støvknapperne* længere end Støvtraadene.

Bladene blaagrønne, mere ligebrede overalt end hos foreg., var. iøvrigt i Henseende til Bladenes Brede, Stængelens Høide, Axenes Antal o. s. v. Ulden meget lang. 4—5. 4.

I Sumper, Kjær og Grøfter overalt i de danske Provindser.

b. *Monostachya*. Eet enkelt, endestillet Ax.

73. *E. vaginatum* L. (Skedestraaet K.) H. 58; Drej. n. 49; F. D. 236; Rchb. 686; And. II, 30; L. Herb. III, 52.

Stængelen glat, oventil budt-trekantet, med 1—2 bladløse, opblæste Skeder; Rodbladene lange, børsteformede, i Randen rue; Børsterne talrige, forlængede til en ret Uld.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi, Rodstokken sammentrængt, danner tætte Tuer, omgivne af Trævlenæt (de ældre Bladskeders Rester). 4—5. 4.

I Tørv- og Hedemoser, alm. paa Halvøen og i Sjælland, sjeldnere i Fyen og paa Lolland.

74. *E. alpinum* L. (Liden K.) H. 59; F. D. 620; Rchb. 683—84; And. II, 33; L. Herb. V, 89; *Limnochloa alpina* Drej. n. 48.

Rodstokken skjævt krybende, udsender med korte Mellemrum flere, 6—8" lange, trekantede, rue Stængler, som kun ved Grunden ere forsynede med Blade, af hvilke de øvre have en meget kort, i Randen ru, de nedre ingen Plade; Børsterne 4—6, forlængede til en kruset Uld.

Hele Planten, og især Axene, meget mindre end foreg., Dæk-skjællene gulbrune med grøn Rygnerve. (Ligner under Blomstringen meget *Scirpus cæspitosus*). 4—6. 4,

I Moser, især med Hængedynd, sporadisk og hidtil bemærket hyppigere i Sjælland end i de andre Provindser: *Sj.* Jonstrup Vang, Ruderhegn (14), Dronninggaard, Tepri og Lyngby Moser (H.), Viintappermosen (Dr.), Holmegaardsmosen (H.)! Kongsted Mose (9), Sorø (Hoffmeyer), Antvorskov (H.); *Moen* (H.); *F.* Langeskovs Kro (16); *J.* Vildmosen (16), Svenstrup Eng ved Aalborg (Branth), Stokholm Mose mellem Skive og Struer (16), Fusing Vasehuus (7), Kalbygaard! Gjedved, Satrup, Riis Mose (2), Kolding (28); *Sl.* Broager (28).

12. *Cladium*. Avnknippe.

75. *C. Mariscus* [R. Br. Prodr. fl. N. Holl. I, 92.] (Hvasbladet A.) Drej. n. 40; Rchb. 682; And. I, 5; H. N. IV,

88; *C. germanicum* Schrad., H. 33; Schoenus Mariscus L., F. D. 1202.

Stængelen trind, glat, mangebladet; *Bladene* i Randen og paa den kjølformede Rygnerve hvast-saugtakke; *Smaaaxene* knippeformigt samlede i stilkede, qvastformede Blomsterstande i Spidsen af Stængelen og Grene fra de øvre Bladhjørner.

Stgl. 3—4' høi og stiv, med tydelige Led. 7—8. 4.

I dybe Kjær og Tørvgrave ikke almindelig: *Sj.* Slangerup (H.), Ørholm (20), Nymølle, Lyngby Mose (H.)! Langholmsmosen ved Dronninggaard (14), Leerbæks Mose ved Roeskilde! Holmegaardsmosen (Dr.), Munkebjergby (Lund); *Falst.* Liselund v. Stubbekjøbing (Rasm.), Borup Sø (14); *Langeland* i Freimose (H.); *F.* Schelenborg! Øxemose ved Hofnangsgave (18); *J.* Skanderborg (H.); *Sl.* Langsø ved Midsunde (16).

13. *Nardus*. Katteskjæg.

76. *N. stricta* L. (Stivt K.) H. 61; Drej. n. 143; F. D. 1022; Rehb. ic. fl. germ. I, tab. 110; And. Gramin. Scand. XII, 141.

Straaene og de stive Bladknipper tæt tueformigt sammenhobede; *Smaaaxene* indsænkede i Axen; *den nedre Inderavne* læderagtig, sylformet, randhaaret-ru; *Griffelen* traadformet, *Arret* forlænget udenfor Blomstens Spidse.

6—8" høi, blaagraa. 6—7. 4.

Paa slette Enge og Lyngheder, almindelig i Landets magrere Egne, sjældnere i de frugtbare (f. Ex. ikke bemærket paa Lolland (19), sjelden paa Falster (Koch).

II. Digynia.

14. *Lepturus*. Spidshale.

77. *L. filiformis* [Trin. Fund. agrost. 121] (Traadstænglet S.) Rehb. ic. fl. g. I, tab. 2; And. Gram. I, 12; H. N. XI, 94; L. Herb. VI, 112; (*L. incurvatus* Drej. n. 142 og *Rottboellia incurvata* H. 125 tildeels: efter Voxestederne); *Rottboellia filiformis* Roth Cat. bot. 1, p. 21.

Straaet fra Grunden af grenet, med knæbøiet-opstigende Grene; *Axet* ret eller svagt bøiet, efter Afblostringen fjernet fra det øvre Stængelblad; *Axen* skjør.

4—10" høi, blaa-grøn. 6—7. ☉. Forekommer under 2 Former:

α, strictus Lge. Haandb. 2 Udg. p. 44 (*Rottboellia incurvata* E. B. tab. 760). Axene stivt oprette.

β, subcurvatus Lge. l. c. (*R. incurvata* F. D. 938; H. og Drej. tildeels; *Lepturus incurvatus* (?) Lge. Haandb. 1. Udg. p. 42). Axene i Spidsen noget bøiede.

Paa Strandenge og Strandfælleder, sjelden og sporadisk: *Sj.* Vesterfælle (Blytt), Reersø (13); *Møen* p. Grønsund Eng (14); *F.* Hofmangsgave (H.); *J.* Limfjorden V. for Aalborg (H.); *Sl.* Gelting (Stisgaard!), Beenshallig (N.). *β*, Amager ved Limfabriken (Schum., F. D.); *Loll.* hyppig paa Øerne og det inddæmmede Land ved Nakskov Fjord (19); Sylt (Spicker), Amrom (N.). ☞

Anm. Den i Sydeuropa (f. Ex. ved Kysterne af Middelhavet og paa Spaniens Saltstepper) voxende *L. incurvatus* (Trin.) Koch. Syn. II, p. 958; Rehb. fl. germ. I, tab. 2 (*Rottboellia incurvata* Cav. ic. 3, tab. 213!) er i Udseende saare forskjellig fra vor Art og adskilles let ved lavere Væxt, nedliggende Grene, Axet under og efter Blomstringen stærkt seglformigt indbøiet, dets nedre Deel indsluttet i det øvre Stængelblad, hvis Plade er bredere og kortere. (Det fra Inder- og Yderavnerne gjensidige Længde hentede Kjendetegn forekommer mig foranderligt). Til denne havde jeg tidligere med Tvivl henført Formen *β*, som da kun var mig bekjendt fra F. D. og et Expl. fra Nolte i Poulsens Herb., men efterat jeg har samlet og sammenlignet begge Arter i Sydeuropa, og efterat Prof. Nolte har havt den Godhed at meddele mig den Bemærkning, at efter hans Anskuelse Alt hvad her i Landet forekommer, hører til een Art, har jeg udslettet *L. incurvatus* af Haandbogen. Sandsynligviis er den fra Skåne angivne *L. incurvatus* (Fr. mant. 2, And. Gram. Scand. p. 10) og overhovedet den af flere Forff. under dette Navn anførte Plante ligeledes den her angivne *L. filiformis β*. — *Rottboellia incurvata* L. fil. (*Ægilops incurvata* L. Sp.) synes efter Beskr. og Citater at indbefatte begge Arter.

15. Lolium. Raigræs.

78. *L. perenne* L. (Almindeligt R.) H. 133; Drej. n. 136; F. D. 747; Rehb. ic. fl. germ. I, tab. 6; And. Gram. II, 15; L. Heib. III, 49.

Fra Roden udgaar saavel blomsterbærende Straa som blomsterløse Bladknipper; *Bladene* glatte, de yngre foldede; *Smaaaxene* under Blomstringen tiltrykte til Axen eller kun lidet udstaaende; *Yderavnen* omtrent af Smaaaxets halve Længde; *Inderavnerne* stakløse, hindeagtige, den nedre bredere end den øvre.

Straaene glatte, ved Grunden knæbøiet-opstigende. 6—8. 4.

α , *vulgare*. Smaaaxene 6—9-blomstrede.

β , *tenue* H. l. c. (*L. tenue* L.) Smaaaxene 3—4-blomstrede, Straa og Blade finere.

γ , *aristatum* (Schum. p. 36). Yderavnerne stakbærende.

Paa Græsmarker, høie Enge, ved Veigrøfter o. s. v., meget alm. β , paa tørre Steder, dyrkes ofte paa kunstige Græsplainer; γ , anføres af Schum. som sjællandsk. Desuden forekomme følgende Misdannelser: — 1, (*abbreviatum*) med kort Ax (sammentrængt Axe), 2, (*ramosum*) med grenede og 3, (*viviparum*) med topskydende Smaaax.

† *L. italicum* [A. Braun, Flora 1834 p. 241] (Italiensk R.)
L. Bouchéanum Kth., Rchb. ic. fl. germ. VII, 238—39.

De yngre *Blade* indrullede i Randen, tilligemed Bladskederne lidet rue; *Smaaaxene* under Blomstringen stærkt udspærrede; *den nedre Inderavne* med en kort Stak nedenfor Spidsen; forøvrigt som foreg. ☺ eller 4.

Dyrkes i de senere Aar hist og her som Fodervæxt og forekommer stundom forvildet, f. Ex. *Sj* ved Jagtveien udenfor Kjøbenhavn! Rolighedsveien; *Falst.* Stubbekjøbing; *Loll.* Nakskov; *F.* Nyborg, Klingstrup (19).

79. **L. Linicola** Sonder [Koch syn. II, 957] (Hør-R.) And. II, 14; *L. arvense* H. 134; F. D. 1864; Rchb. ic. fl. germ. I, tab. 4, f. 1337—39; H. N. II, 78; *L. Herb.* II, 33 (ikke Wither).

Straaene oprette, glatte eller foroven lidet rue, ingen blomsterløse Bladknipper; *Yderavnen* lidet kortere end Smaaaxet; *den nedre Inderavne* nedenfor Midten læderagtig, uden eller med en bøiet, affaldende Stak; *den øvre Inderavne* naaer (ved Frugtmodningen) med Randen udenfor den nedre.

Finere end de øvrige Arter. Smaaaxene alm. 5—8-blomstrede, sjældnere forekommer den med færre (2—5) Blomster i Smaaaxet (β , *minus* Koch, *Falst. Veg.*, *L. Halleri* Gmel.) eller med flere (10—11) Blomster i Smaaaxet (γ , *majus* Koch l. c.). 7. ☺.

Almindeligt Ukrud i Hørsæden, og har udbredt sig med Hørculturen, som det synes, til alle Egne af Landet. β , Lommeløv, γ , Riserup p. *Falst.* (Koch)!

80. **L. temulentum** L. (Svingel-R.) H. 134; Drej. n. 137; F. D. 160; Rchb. I, tab. 5, fig. 1342—44; And. II, 13; *L. Herb.* II, 32.

Straaene oprette, rue, ingen blomsterløse Bladknipper; *Yderavnen* af Længde med eller længere end *Smaaaxet*; *den nedre Inderavne* nedenfor Midten læderagtig, med en 3—4''' lang, oftest ret Stak; *den øvre Inderavne* naaer (ved Frugtmodningen) med Randen udenfor den nedre.

Kraftigere end foreg., *Smaaaxstilken* skjør og Blomsterne derfor (med Undtagelse af *Yderavnen*) hurtigt affaldende. Var. med en meget kort og noget bøiet Stak, *Yderavnerne* alm. større, *Smaaaxene* 6—8-blomstrede (β , *leptochaeton* A. Br.) En Form med jævnt *Straa* (γ , *speciosum* Koch Syn., L., arvense With.) har jeg ikke bemærket i vor Flora. 6—7. ☉.

Ikke sjelden paa dyrkede Marker, især blandt *Vaarsæden*. I enkelte Egne (f. Ex. i Fyen) sparsom. Formen β , paa Ryddepladser og ved Møddinger, sjeldnere end Hovedarten, f. Ex. Kjøbenhavn, Svendborg (19).

16. *Brachypodium*. *Stilkax*.

a. *Inderavnerne* stakløse, *den øvre* i Randen fiinhaaret.

81. **B. loliaceum** [Fr. mant. 3, p. 15] (Raigræsagtig S.) And. II, 16; H. N. VIII, 96; *Lolium festucaceum* Link, Rehb. I, tab. 6; *Festuca loliacea* Huds. fl. angl. 38; Koch. Syn. II, 443; *Glyceria lol.* Godr. fl. Lorr. 3, 168.

Bladene linieformede, slappe, glatte, paa Underfladen rue; *Axet* nikkende; *Smaaaxene* fladtrykte, de nedre kortstilkede, de øvre siddende; *den nedre Inderavne* stakløs.

Væksten ligner *Festuca pratensis*, Blomsterstanden *Lolium perenne*, men den er let kjendelig fra den første ved det toradede Ax, fra den sidste ved *Smaaaxenes* Stilling og 2 *Yderavner*. De tidligere for *Festuca loliacea* anførte danske Voxesteder (F. D., Drej.) høre ikke til denne Art, men til *F. pratensis* β , *pseudololiacea* (sml. Lange i Krøy. Tidsskr. IV, 462). 6—7. 4.

Paa høie Enge og ved Veigrøfter, sporadisk og sjelden: *Sj.* Bredderne af Peblingsøen ved Kjøbenhavn (i Mængde 1841—42)! Skovsborg (15); *J.* Spørring og Haldum ved Aarhus! 3]

b. *Den nedre Inderavne* stakbærende, *den øvre* i Randen stivhaaret.

82. **B. gracile** [Beauv. agrostogr. p. 101] (Langstakket S.) Drej. n. 129; Rehb. l. c. tab. 16, f. 1373—75; L. Herb. VI, 108;

B. silvaticum R. & S., And. II, 17; H. N. XII, 94; *Festuca gracilis* Moench, H. 120; *Bromus pinnatus* β , L. sp., F. D. 164; *B. silvaticus* Juss., Rafn. I, 560; Schum. 39.

Rodstokken sammentrængt, ikke krybende; *Bladene* linie-lancetformede, slappe, tilligemed Bladskederne haarede og paa begge Flader rue; *Åxet* nikkende, med fjerntsiddende *Smaaax*; *Stakken* af Længde med eller længere end *Inderavnerne*.

Plantens Farve frisk grøn. 7—8. 7.

β , *majus*! (*B. pinnatum* β , Rchb. 1376?) *Smaaaxene* tættere samlede, 10—12-blomstrede, omtr. 1" lange. Planten større.

I Skove og Krat, ikke sjelden i de danske Provindser. β , paa mere aabne Steder: *Falst.* Guldberg (Koch); *Loll.* Lungholm! *F.* Dyrupgaard! *J.* Nebbegaard! Riis Skov ved Aarhus!

83. ***B. pinnatum*** [Beauv. l. c.] (Kortstakket S.) Drej. n. 130; F. D. 2525; Rchb. l. c. tab. 17, fig. 1377—78; And. II, 18; H. N. XII, 93; L. Herb. VI, 107; *Bromus* L., *Festuca* Moench, H. 121; *Bromus gracilis* Schum. 39.

Rodstokken krybende; *Bladene* lancet-linieformede, stive, paa begge Flader rue og haarede, *Åxet* opret, med tætsiddende *Smaaax*; *Stakken* kortere end *Inderavnerne*.

Af mere guulgrøn Farve end foreg. Bladskederne alm. glatte. De nedre *Smaaax* komme ofte ikke til Udvikling. Var. med grenede *Smaaax*. 6—7. 7.

I Kratskove, paa Bakker og Skrænter, sporadisk og ikke almindelig: *Sj.* Fuglevad Mølle (Dr.), Bagsværd (Schum.), Hareskoven mod Ballerup (H.), Frederiksdal (9), Jonstrup Vang (14), Enrum ved Vedbæk (19), Boserup Skov (20), Kjøge Aas (9)! Magleby Dyrehave paa Stevns (Visby)! Alindelille Fredskov! *Møen* (Dr.); *J.* Dybdals Bakke v. Aalborg (Dr.)

17. *Agropyrum*. Qvik.

- a. Nerverne paa Bladenes Overflade beklædte med flere Rækker af fine Børster*).

84. ***A. junceum*** [Beauv. l. c. p. 102] (Sivbladet Q.)

*) Til at erkjende denne Forskjel er en temmelig stærk Forstørrelse med Lupen nødvendig.

Drej. n. 135; Rehb. I, tab. 22, f. 1394; Triticum L., H. 139; F. D. 916; And. I, 1; H. N. VI, 91; L. Herb. II, 30.

Rodstokken krybende; *Bladene* stive, tilsidst sammenrullede, paa Overfladen blødt-fløielshaarede; *Axen* skjør, glat; *Smaaaxene* fjerntsiddende, 5—8-blomstrede; *Yderavnerne* budte, 9—11-nervede, omtrent af Længde med Halvdelen af Smaaaxet; *Inderavnerne* budte, glatte.

Hele Planten blegt blaagraa, lavere, men mere robust end Nr. 86—87, fra hvilke den strax kjendes ved den meget skjøre Axe. Fra den følgende Art adskilles den let ved glatte Inderavner og ikke ru Axe. Saavel denne som alle de følgende Arter af Qvik forekomme under 2 Former, som synes at være afhængige af Voxestedet: α , *microstachyum* og β , *macrostachyum* (Fr.). 6—7. 4.

Paa den yngre Havstok, ikke sjelden i Danmark og bemærket i alle Provindser. *

85. **A. strictum** [Dethard. consp. fl. Megapol. p. 11, under Triticum], (Stiv Q.) Rehb. l. c. tab. 23, f. 1395.

Rodstokken krybende; *Bladene* paa Overfladen fløielshaarede, stive, forholdsviis smale, tilsidst sammenrullede, med stikkende Spidse og store bugformede Bladskeder; *Axen* noget skjør, ru; *Smaaaxene* fjerntsiddende, 4—5-blomstrede, *Yderavnerne* spidse, glatte, femnervede, over $\frac{2}{3}$ af Smaaaxets Længde; den nedre *Inderavne* budt, fra Grunden til Midten duunhaaret.

Straaet tykt, stivt opret, høiere end foreg. 6—7. 4.

Sandige Strandkyster. Ourehoved paa Ærø (12).

86. **A. obtusiusculum** Lge. Haandb. 2 Udgave (1856). (Budtklappet Q.) Triticum acutum Fr. S. veg. Sc. p. 249; H. N. VI, 94 (forma macrostachya) And. I, 2; Rehb. l. c. tab. 22, f. 1393; Lge. Haandb. 1 Udg. S. 46; A. adfne (3) Drej. p. 49? F. D. 1986? Triticum hebestachyum Fr. Bot. not. 1857 p. 69 og 1858 p. 129.

Rodstokken krybende, *Bladene* stive, kjølformede, tilsidst sammenrullede, paa Overfladen fløielshaarede, rue; *Axet* opret, med lidet skjør Axe; *Smaaaxene* tætsiddende, 4—7-blomstrede; *Yderavnerne* budte, 5—7-nervede, mere end halvt saa lange som Smaaaxet; *Inderavnerne* budte med en kort Braad.

Blaagrøn. Axen alm. glat, sjeldnere haaret. 6—7. 4.

Ved Strandbredder, meget sjeldnere end den følgende; jeg har kun seet Expl. fra *Halvøens* Vestkyst, f. Ex. Øen Langlig Bjerger i Hjerting Bugt, Ballum, Høier (16), Wyk paa Føhr (20), og *Loll.* Strandbredder mellem Rødby og Nakskov, Vresen i Storebælt (19), som aldeles stemme overeens med Beskr. hos Fries og Fig. hos Rchb. [§]

87. *A. acutum* [DC. cat. hort. monsp. p. 153 (under *Triticum*)] (Slapbladet Q.) Gren. & Godr. fl. Fr. III, p. 605; L. Herb. VI, 109; *A. adfine* Dethard. consp. fl. Megap. p. 11, (*Triticum*); Lge. Haandb. 1 Udg. p. 46; Drej. n. 13+ (1—2!); Rchb. l. c. tab. 21, f. 1391; *Triticum laxum* Fr. mant. 3, p. 13; H. N. VI, 94.

Rodstokken krybende; *Bladene* slappe, flade, paa Overfladen rue; *Axet* i Spidsen bøiet, med seig, glat eller i Randen ru *Axe*; *Smaaaxene* fjerntsiddende, 4—7-blomstrede; *Yderavnerne* 7-nervede, spidse, $\frac{2}{3}$ af *Smaaaxets* Længde; *Inderavnerne* spidse.

Var. mere eller mindre blaagrøn. Fra *Rodstokken* udgaae talrige *Bladknipper*. 6—7. 4.

α , *microstachyum* (Fr. m. 3; *T. acutum* DC. herb.!). *Axet* kort, med mindre *Smaaax*, *Bladene* paa de blomsterløse *Stængler* indrullede.

β , *megastachyum* (Fr. l. c.: *A. adfine* Deth. i Rchb. fl. g. exs. n. 403). *Axet* forlænget, *Smaaaxene* større, alle *Bladene* flade.

Ved Strandbredderne i Sandet, begge Former ikke sjeldne ved de danske Kyster: α , paa den yngre, β , paa den ældre Havstok. [§]

Anm. Grenier og Godron (l. c.) have gjort opmærksom paa, hvad der ogsaa bekræftes ved Decandolles Original-Expl. i Pariser-Musæet), at den ved Montpellier voxende og af DC. beskrevne *Triticum acutum* er den samme som af Rchb. er afbildet under Navn af *Agropyrum adfine* og af Fries benævnt *T. laxum*. Decandolles Navn maa altsaa, som det ældste, beholdes for denne Art, til hvilken det ogsaa passer bedre end til foregaaende, hvor saavel *Yder-* som *Inderavner* ere budte. Af Formen β , har jeg ved Lappesteen pr. Helsingør fundet Exemplarer med frisk grøn Farve og stakbærende *Smaaax*. *Trit. littoreum* Schum. F. D. 1863 er vistnok kun et meget ung Exemplar af samme Form.

b. Nerverne paa Bladenes Overflade beklædte med en enkelt Række af Børster eller længere Haar.

88. **A. pungens** [Roem. & Sch. Syst. II, p. 753 ex part.] (Stikkende Q.) Gren. & Godr. fl. Fr. III, p. 606.

Rodstokken krybende; *Bladene* blaagraa, paa Overfladen rue, i Randen indrullede med stikkende Spidse; *Axet* opret, med glat eller ru Axe; *Smaaaxene* tætsiddende, 3—4 Gange længere end Ledstykkerne, fladtrykte, skjævt tiltrykte til Axen, 6—10-blomstrede, under Blomstringen lancetformede; *Yderavnerne* omtrent af Smaaaxets halve Længde, 5—7-nervede, spidst lancetformede med kjølformet Ryg og smal hindeagtig Rand; *Inderavnerne* spidse eller budte med en Braad.

Ved Strandbredder: Beenshallig (Nolte i Kamphøv. Herb.) *Sj.* Rødvig Skandse paa Stevns (Visby!). ☞

Anm. Expl. fra Beenshallig ere mindre af Væxt, have glat Axe og 6—7-blomstrede Smaaax, de fra Rødvig ere højere og kraftigere, med ru Axe og bredere, 8—10-blomstrede Smaaax, hiin minder om *A. obtusiusculum*, denne om Former af *A. repens*, men forøvrigt ere de ved flere Eiendommeligheder (f. Ex. den blaagraa Farve, stikkende Blade, meget fladtrykte, tæt- og skjævtstiddende Smaaax o. s. v.) saa nøie forbundne med hinanden og forskjellige fra de øvrige Arter, at jeg maa antage dem for at høre sammen til een Art. Den af Godr. og Gren. (fl. Fr. III, 606) beskrevne *A. pycnanthum* stemmer i flere Kjendetegn overeens med vor Art, men efter Beskrivelsen formaaer jeg ikke at skjelne denne tilstrækkeligt fra *A. pungens*. Jeg har paa dyrkede Expl. i botanisk Have (fra Stevns) stedse fundet Frugterne golde.

89. **A. repens** [Beauv. l. c.] (Almindelig Q.) Drej. n. 132; Rehb. l. c. tab. 20, f. 1383—88; Triticum L., H. 140; F. D. 748; And. 1, 4; L. Herb. IX, 163.

Rodstokken krybende; *Bladene* flade, paa Overfladen haa-rede og rue; *Axet* opret, med ru Axe, *Smaaaxene* tætsiddende, omtrent femblomstrede; *Yderavnerne* tilspidsede, femnervede, med bred hindeagtig Rand; *Inderavnerne* tilspidsede eller budte med en Braad.

Stakken paa Inderavnerne var. betydeligt i Længde; ogsaa Yderavnerne forekomme stakbærende. 6—8. 2.

Anm. Af de talrige Former, hvorunder denne i Henseende til Størrelse, Farve, Beklædning o. s. v. yderst foranderlige Art ogsaa i vor Flora fremtræder, maa nævnes som de meest udmærkede:

β, *arundinaceum* (Fr. S. Veg. Sc. p. 250). Høi og kraftig (omtrent 2'); Bladene brede, glatte, rue; Axen glat med rue Kanter; Smaaaxene omtrent 30, tæt forenede til et næsten $1\frac{1}{2}'$ langt Ax; Yderavnerne 7—9-nervede, stakbærende.

γ, *firmum* (Presl?, Rchb. 1383). Som foreg., men med baarede Blade, færre, men større (7—9-blomstrede) Smaaax, 7-nervede Yderavner.

δ, *littorale* Bab. man. p. 400. Stængelen lavere og finere, tilligemed de smale, i Randen indrullede og jævne Blade blaa-graa; Smaaaxene faa- (3—5) blomstrede. *A. littoreum* Drej. n. 133 (efter Beskr., ikke F. D.); *T. rep. β*, *maritimum* Koch Syn. II, p. 953.

Et almindeligt og besværligt Ukrud i Haver, Marker, ved Gjærder o. s. v. *β*, *Sj.* Frederiksværk (herb. Drej.); *Falst.* Grønsund, Usløv (Koch); *F.* St. Jørgensgaard (12); *Sl.* i Strandsandet ved Frederiksort i Slesvig (16), *γ*, *Sj.* Helsingør (herb. Drej.); *J.* Strandbredder ved Aarhus! *δ*, ved Bredderne af Tiissø i Sjælland! Avernakø (12).

90. *A. caninum* [Roem. & S. Syst. II, 756] (Hunde-Q.) Drej. n. 131; Rchb. l. c. tab. 19, f. 1381; *Triticum* Schreb., H. 141; F. D. 1447; And. I, 5; H. N. VI, 97; L. Herb. VI, 110; *Elymus* L., Schum. p. 44.

Rodstokken sammentrængt, uden Udløbere; *Bladene* paa begge Flader rue og haarede; *Axet* nikkende, med ru Axe; *Smaaaxene* 3—5-blomstrede; *Yderavnerne* tilspidsede, 3—5-nervede; *Indervnerne* tilspidsede, kortere end den rue og noget bøiede Stak.

Mørk og frisk grøn. 6—8. 4.

β, *gracilius* (cfr. Fr. S. Veg. Sc. p. 250). Finere, med smalere Blade, toblomstrede Smaaax.

I Skove, især paa Muldjord, ikke sjelden og forekommer i alle danske Provindser. *β*, med Hovedarten, f. Ex. i Skovene ved Sorø!

18. *Triticum*. Hvede.

† *T. vulgare* Vill., Metzger Cereal. tab. 1—2. Axet firekantet, med tæt taglagte, omtrent fireblomstrede Smaaax; Yder-

avnerne hvælvede, med fremstaaende Rygnerve i Spidsen. 6—7. ☉ og ☉.

α , *æstivum* (Vaar-H.) T. *æstivum* L. Inderavnerne stakbærende.

β , *hibernum* (Vinter-H.) T. *hibernum* L. Inderavnerne uden Stak.

Dyrkes almindeligt i Landets frugtbare Egne.

Ann. De fra Stakken hentede Skjelnemærker mellem de to Former, saaledes som de af Linné ere angivne, ere ikke bestandige, idet f. Ex. Vinterhveden, som hos os hyppigst dyrkes, findes saavel med som uden Stak.

† T. *turgidum* L. (Engelsk H.) Metzger. l. c. tab. 3. Axet firekantet, med tæt taglagte, omtrent fireblomstrede Smaaax; Yderavnerne længere, med en kjølformet, vinget Rygnerve, som naaer fra Grunden til Spidsen. 6—7. ☉ og ☉.

Dyrkes sjeldnere end foregaaende.

19. Secale. Rug.

† S. *cereale* L., Metzger, l. c. t. 9. Smaaaxene tæt taglagte, længere end Yderavnerne; Inderavnerne kamformigt-randhaarede, tilspidsede i en lang Stak. 6. ☉.

Dyrkes overalt i Landet, som vor vigtigste Kornsort.

20. Hordeum. Byg.

a. *Crithe* Doell, Fl. Bad. p. 118. Alle Smaaaxene enblomstrede, med langstakkede Trekjønnsblomster, eller Side-Smaaaxene med stakløse ♂ Blomster.

Axen seig.

† H. *polystichum* Doell, l. c. p. 119. Axet mere eller mindre tydeligt sextandet; alle Smaaaxene ♀, stakbærende.

— α , *vulgare* Doell (H. *vulgare* L.) (Alm. Byg.) Axet nikkende; Smaaaxene imod Modningen stillede i 6 Rader, de to midterste Rader mindre fremragende end de øvrige. ☉ og ☉.

Dyrket.

— β , *hexastichon* Doell (H. *hexastichon* L.) (Sexradet B.) Axet opret; Smaaaxene $\text{\textcircled{X}}$, imod Modningen regelmæssigt ordnede i 6 Rader. $\text{\textcircled{O}}$.

Dyrket.

† *H. distichon* L. (Toradet B.) De midterste Smaaax $\text{\textcircled{X}}$, Side-Smaaaxene $\text{\textcircled{J}}$ stakløse (Axet toradet-fladtrykt). $\text{\textcircled{O}}$.

Den hyppigst dyrkede Bygart i Danmark.

b. *Hordeastrum* Doell, l. c. p. 117. Alle Smaaaxene enblomstrede, stakbærende, de midterste $\text{\textcircled{X}}$, de ydre $\text{\textcircled{J}}$ eller kjønsløse. Axen skjør.

91. *H. maritimum* [Wither. arr. 172] (Strand-B.) H. 139; F. D. 1632; Rchb. I, tab. 11, fig. 1364; And. I, 11; H. N. XII, 95; L. Herb. VII, 135.

Bladene haarede paa begge Flader; med glatte, bugformigt oppustede *Skeder*; *Yderavnerne* alle børsteformede, rue, de indre i Side-Smaaaxene indadtil vingede; *Sideblomsterne* $\text{\textcircled{J}}$.

4—8" høi. $\text{\textcircled{J}}$ Straaene talrige, ved alle Ledene knæbøiede, det øverste Blads Skede meget længere end sammes Plade, af Længde med eller lidet kortere end Ledstykket ovenfor. Axen mindre skjør end hos de følgende. 6—7. $\text{\textcircled{O}}$.

Paa Digerne ved Vesterhavet i *Slesvig*: Dagebøl, Juliane-Marieskoog (H.), Husum! Pellworm (N.). $\text{\textcircled{X}}$

92. *H. pratense* [Huds. fl. angl. ed. 2, p. 56] (Eng-B.) Rchb. l. c. fig. 1363; H. *secalinum* Schreb., H. 138; Drej. n. 141; And. I, 10; H. N. VI, 98; L. Herb. I, 14; H. *maritimum* F. D. 630.

Bladene haarede paa begge Flader; *Skederne* ikke oppustede, de øvre glatte, de nedre haarede; *Yderavnerne* i alle Smaaaxene børsteformede, rue; *Sideblomsterne* kjønsløse.

Straaene 1—1½' høie, opstigende, ved de nedre Led knæbøiede, det øvre Ledstykke mange Gange længere end den øvre Bladskede. 6—7. $\text{\textcircled{X}}$.

Paa Strandenge, kun bemærket (og ikke almindelig) i den sydligere Deel af Landet, meest udbredt paa de sydlige Øer: *Møen* (Dr.), *Falster* og *Lolland*! *Ærø* (10), Strynø, Lyø (12), og i Marskegnene ved Vesterhavet, sjældnere mod N. ved Bælterne og Katte-

gattet, f. Ex. **J.** Horsens Fjord Nørrestrand (2), Kolding (28); **F.** Hofmansgave (18), Nyborg (Jørgensen), Svendborg! **Sj.** Helsingør (Dr.), mellem Vedbæk og København, Amager (Schum.), Avedøre (Broager), Vordingborg (2), Stubberup v. Skjelskør (Nielsen), Korsør (Drej.); **Bornh.** Skibsbreen ved Rønne (8). \overline{w}

93. **H. murium** L. (Gold B.) H. 138; Drej. n. 140; F. D. 629; Rehb. l. c. fig. 1362; And. I, 9; L. Herb. I, 13.

Bladene haarede paa begge Flader, med glatte, bugformigt oppustede *Skeder*; *Yderavnerne* af det midterste Smaaax linie-lancetformede, randhaarede, den indre i Side-Smaaaxene linie-formet, mod Basis randhaaret, den ydre børsteformet, uden Randhaar; *Sideblomsterne* ♂ eller kjønsløse.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Straaene ved Grunden knæbøiet-opstigende. 7—8. ☉.

Ved Mure og Veie, især omkring Kjøbstæder: i Københavns Omegn meget almindelig og forekommer ved de fleste andre Kjøbstæder paa **Øerne**. Paa **Halvøen** sjeldnere: Aarhus! Skanderborg, Fredericia (12), Slesvig! Husum (16). \overline{w}

c. *Pseudelymus*! Alle Smaaaxene stakbærende, de yderste ♀, de midterste ofte golde. Axen seig.

(Elymus L.).

94. **H. silvaticum** [Huds. l. c. p. 57] (Skov-B.) Elymus europæus L., H. 137; Drej. n. 138; F. D. 1631; Rehb. l. c. tab. 9, fig. 1359; And. I, 8; H. N. IV, 99; L. Herb. VII, 136.

Bladene glatte (eller paa Overfladen svagthaarede), paa begge Flader rue, med haarede *Skeder*; *Yderavnerne* linie-sylformede, rue, stakbærende; den *nedre Inderavne* med en Stak, dobbelt saa lang som Avnen.

$1\frac{1}{2}$ —3' høi og stiv, frisk grøn. Det midterste (ofte golde) Smaaax har kortere og smalere Yderavner end de øvrige. Smaaaxene hyppigst enblomstrede med en børsteformet Ansats til den anden Blomst. Da saaledes ingen væsenlig Character adskiller den fra Slægten Hordeum, med hvilken den i Habitus har saamegen Lighed, synes den rigtigere at finde sin Plads i denne end i følgende Slægt, til hvilken de Fleste henhøre den). 6—7. 4.

I høitliggende, skyggefulde Løvskove, hist og her paa **Halvøens** Østkyst; **F.** sjelden: Kjerteminde (Heiberg), Næsbyhoved Skov (13), Hvidkilde, Faaborg (12); **Loll.** Ugleholt, Nøbbølle (19); **Falst.** i Hanenov, Oustrup og Bangsebro Skove (14), Ravnstrup Skov (Koch), **Sj.** sporadisk og især i den sydlige og vestlige Deel; ikke bemærket paa **Bornh.** \overline{w}

21. Elymus. Marehalm.

95. *E. arenarius* L. (Sand-M.) H. 136; Drej. n. 139; F. D. 847 (slet); Rehb. I, tab. 10, f. 1360; And. I, 7; L. Herb. VI, 111.

Bladene brede, stive og spidse, tilsidst indrullede; *Smaa-axene* 3—4-blomstrede; *Yderavnerne* lancet-sylformede, paa Ryggen kamformigt-haarede, omtrent af Længde med Smaa-axet; *Inderavnerne* duunhaarede; 2 spidse, randhaarede *Blomster-skjæl**).

Stort (3—4' høit) Græs af blaagraa Farve, Axet $1\frac{1}{2}$ —1' langt. 6—8. 4.

β , *minor*! Straaet lavere (omtr. 1'), ved Grunden knæbøiet; Bladene meget smale; Axet kort (3'').

Ved sandige Strandbredder, i Flyvesandsklitter, almindelig udbredt, sjældnere ved Bredden af Færskvand, f. Ex. *Sj.* den østlige Bred af Tiissø! *J.* Tange ved Gudena (16). β , Bredderne af Øresund ved Vedbæk!

22. Léersia. Riisgræs.

96. *L. oryzoides* [Sw. fl. ind. occ. I, 132] (Vand-R.) H. 63; F. D. 1744; Rehb. I, tab. 52, fig. 1495; And. X, 116; *Phalaris* L.; *Asprella* Lam., Rafn I, 504.

Den øvre Deel af *Toppen* udbredt med bølgede Grene, den nedre indsluttet i Bladskeden**); *Inderavnerne* (altid lukkede) ovale, stakløse, i Randen og paa den kjølformede Rygnerve stivt-randhaarede (med ofte ved Grunden grenede Haar).

1—2' høi. Topgrenene og Bladene meget rue; Skedehinden meget kort. Kommer ikke i alle Sommere til Udvikling. 8—9. 4.

Paa fugtige Steder, ved Bredder af Søer og Aaer, meget sjelden. *Sj.* Hellebæk ved Hammerdammen, Umacks Dam o. fl. St. (12)!; *Sl.* ved Eideren paa den slesvigske Side (16). ☞

*) Ved Blomsterskjæl (lodiculæ) forstaaes Blomsterdækket hos Græsarterne, som dannes af 2—3 hindeagtige, fine, for det blotte Øie ofte usynlige Skjæl indenfor Inderavnerne og udenfor Støvdragerne.

**) Dette gjælder dog kun for vort Clima, hvor den blomstrer saa seent paa Aaret, at Toppen i Regelen ikke naaer sin fulde Udvikling. Den bærer heller ikke moden Frugt hos os.

23. Setaria. Skjærmax.

97. **S. viridis** [Beauv. l. c. 52] (Grønt S.) Drej. n. 58; Rehb. I, tab. 47, fig. 1467; And. XI, 123; H. N. XV, 92; L. Herb. II, 28; Panicum L., H. 65; F. D. 852.

Straaet jævnt, *Bladene* i Randen rue; *Skedehinden* dannet af en Haarkrands; *Dusken* valseformet; Svøbets Børster med opadvendte Smaatorne; *Blomsterne* glatte; *Tvekjønsblomstens Inderavner* jævne, af Længde med den øvre Yderavne.

Hele Planten (ogsaa Blomsterne) grøn, var. med bruunviolette Børster. 7—8. ☉.

Paa dyrkede, tørre, især sandige Marker, funden i alle Provindser, men sporadisk og ikke almindelig.

† *S. verticillata* [Beauv. l. c. 51] (Krandtblomstret S.) Panicum verticillatum L.; H. II, 116; F. D. 2163.

Straaet foroven og *Bladene* rue; *Dusken* forneden afbrudt ved Mellemrum mellem de halvkrandsstillede *Smaaax*; Svøbets Børster kortere, med nedadvendte Smaatorne, hvorved Dusken bliver meget ru naar man stryger opad; forøvrigt som foreg. 7—8. ☉.

Forvildet ved Ollerup i Fyen.

98. **S. glauca** [Beauv. l. c. 51] (Blaagraat S.) F. D. 2162, Rehb. l. c. fig. 1466; Panicum glaucum L., H. II, 117 (Blaagraa Hirse).

Hele Planten blaagrøn, Svøbets Børster brandgule; *Tvekjønsblomstens Inderavner* paatværs rynkede, dobbelt saa lange som den øvre Yderavne, forøvrigt som Nr. 97, men Smaaaxene dobbelt saa store som hos hiin.

(De her i Landet fundne Expl. have (2) Støvdragere i den ufrugtbare Blomst.) 7—8. ☉.

Paa lignende Steder som foreg., men hidtil kun funden paa faa Steder: Høragre ved N. Ørslev og i en Havremark ved S. Kirkeby paa **Falster** (Koch)! **Fyen?** (Bruun). ☞

24. Digitaria. Fingerax.

99. **D. glabra** (Fremliggende F.) D. humifusa Pers., H. 66; And. XI, 120; H. N. I, 76; L. Herb. IV, 68; D. filiformis Koel., Rehb. I, tab. 27, fig. 1406; Panicum sangvinale Poll. (ikke L.),

F. D. 388 (slet) og 2641; *P. glabrum* Gaud., Lge. Haandb. 1 Udg. S. 51.

Blade og *Skeder* glatte; *Skedehinden* kort; *Axene* linieformede, 3—4 fingerformigt sammenhobede; *Smaaaxene* ægformede, alm. 2 samlede, det ene siddende, det andet kortstillet; *Blomsterne* stakløse, duunhaarede; den øvre Yderavne korthaaret, næsten af Længde med Smaaaxet; *Inderavnerne af Tvekjønsblomsten* budte, glatte, glindsende.

Straaene oftest fremliggende, røde. Blst. brunnagtige. 7—9. ☉.

Paa sandige Marker og Veie, temmelig sjelden i Danmark: *Sj.* Hellebæk! Fredensborg Slotsgaard (12), Stiftsbjergby (Weilbach); *Falst.* alm. (14); *F.* Dalby paa Hindsholm! *Sl.* Bommerlund (16), Handeved Skovkro! Isted (16), i det sydlige (f. Ex. ved Rendsborg!) hyppigere. *

† *D. sanguinalis* [Scop. Carn. I, p. 52] (Blodhirse). Rchb. I, tab. 27, fig. 1407—8; *Panicum sangvinale* L.

Blade og *Skeder* stivhaarede; *Axene* 5—7 fingerformigt sammenhobede, længere end hos foreg., Smaaaxene elliptiske, forøvrigt som foreg. men Straaene høiere og kraftigere, oprette eller opstigende; *Blomsterne* stærkt rødviollet anløbne. 7—9. ☉.

α, genuina. Den golde Blomsts Inderavne i Randen svagt duunhaaret.

β, ciliaris Gren. & Godr. (*D. ciliaris* Koel., *Panicum ciliare* Retz.) H. N. XIII, 88. Den golde Blomsts Inderavne paa Sidenervenerne langt randhaaret.

Indført med fremmed Sæd: *Sj.* Snedkersteen ved Helsingør (Heiberg, *β*), Ukrud i Haver ved Jonstrup (14, *α*!).

25. *Panicum.* Hirse.

† *P. miliaceum* L., Metzg. Cereal. t. 18 (Hirse).

Bladene linie-lancetformede, tilligemed Bladskederne stivhaarede; *Skedehinden* kort, langhaaret-fryndset; *Toppen* rigt-blomstret, med oprette, imod Frugtmodningen nikkende Grene; *Smaaaxene* ægformede, glatte; *Inderavnerne af Tvekjønsblomsten* budte, glatte, glindsende.

Straaene oprette. *Toppen* alm. rødligt anløben. 7. ☉.

Oprindelig fra Orienten, dyrkes hyppigt i Sydeuropa, sjældent i Danmark. Funden forvildet paa en Hørager ved N. Ørslev paa *Falster* (Koch).

26. Echinochloa. Hanespore.

100. *E. crus galli* [Beauv. agr. 53] (Kantet H.) Rehb. I, tab. 29, fig. 1411--12; L. Herb. IV, 69; Panicum L., H. 65; F. D. 1564; And. XI, 119; H. N. I, 75.

Bladene rue, uden Skedehinde; *Axen* forlænget, femkantet; *Yderavnerne* og *den nedre Inderavne* i *den gølge Blomst* stivhaarede; *Inderavnerne af den tvekjønnede Blomst* glatte, glindsende.

Straaene snart opstigende, snart fremliggende, Blomsterne oftest røddigt anløbne, var. med kortere eller længere Stak. 7—8. ☉.

Paa dyrket, saavel sandig som leret Jord, sporadisk: *Sj. Karise* (Kyll.); *Falst. Moseby* (14); *Loll. Søholt* (H.), *Maribo* (5); *Als* (H.); *Sl. Bredsted* (16). *

27. Digraphis. Rørgræs.

101. *D. arundinacea* [Trin. Fund. agr. p. 127] (Almindeligt R.) Drej. n. 66; And. XII, 135; L. Herb. VII, 122; Phalaris L., H. 64; F. D. 259 (slet); Baldingera Dumort., Rehb. I, tab. 52, fig. 1494.

Toppen med korte, under Blomstringen aabne Grene og knippeformigt sammenhobede *Smaaax*; *Yderavnerne* tilspidsede; *Blomsterne* stakløse, de gølge meget smaae; *Bladene* brede, rue; *Skedehinden* forlænget.

3—5' høit, stift Græs. *Yderavnerne* alm. rødviolette med grønne Nerver. Frugten tæt omgivet af de glatte, glindsende *Inderavner*. 6—7. 4.

Ved Bredderne af Søer, Aaer og Bække, alm. udbredt i Danmark.

28. Phalaris. Glandsfrø.

† 102. *P. canariensis* L. (Kanariegræs). H. 63; Drej. p. 25; Rehb. I, tab. 52, fig. 1492; And. XII, 134; L. H. II, 26.

De øvre *Blades Skeder* bugformigt oppustede; *Skedehinden* lang; *Dusken* axformigt sammentrængt, oval; *Smaaaxene* omvendtæggede; *Yderavnerne* spidse, udadtil med en bred, bue-

formet, grøn Nerve indenfor den hvidvingede Kjøl, indadtil med en ret Nerve, parallel med de næsten ret afskaarne Rande; *de golve Blomster* af Tvekjønsblomstens halve Længde. 7—8. ☉.

Dyrkes paa flere Steder og forekommer hist og her forvildet paa Marker og ved Veie.

29. Anthoxanthum. Guulax.

103. *A. odoratum* L. (Vellugtende G.) H. 34; Drej. n. 79; F. D. 666; Rchb. I, tab. 106, fig. 1722—25; Anl. XII, 136; L. Herb. II, 27.

Skedehinden forlænget, forneden skjæghaaret; *Dusken* lancetformet, før og efter Blomstringen axformigt sammentrængt; *Yderavnerne* spidse; *de golve Blomster* beklædte med (alm.) brune Haar, den ene med en ret, den anden med en længere, knæbøiet *Stak*.

Ved Tørringen vellugtende Græs, som tidligt antager en guul Farve. Var. efter Voxestedet i Henseende til Størrelse, Beklædning, Bladenes Brede, Blomsterstanden o. s. v. 5—6. 7.

Følgende Former kunne særligt fremhæves:

α , *vulgare*, lavere af Væxt (6—8" høi), ofte mangelstænglet, Dusken tætblomstret, bred-lancetformet eller elliptisk, Blomsterne alm. brunligt anløbne.

β , *majus*! (Rchb. l. c. fig. 1724), høi og kraftig (1 $\frac{1}{2}$ —2' høi), Dusken rigblomstret, tæt eller forneden mellembrudt, forlænget, næsten pyramideformet; Bladene bredere.

γ , *laxiflorum*! Stænglerne faa, langstrakte (1—1 $\frac{1}{2}$ ' høie) men meget fine, Bladene meget smale, Dusken smalt lancetformet, alm. grøn, Smaaaxene færre og fjernere fra hinanden, nogle stundom golve.

Paa Græsmarker, Enge, i Skove meget almindelig. Formen α forekommer især paa solaabne Steder, γ , i Skygge; β , sjældnere, f. Ex. Brøndsted i Jylland!

30. Alopecurus. Rævehale.

a. Yderavnerne spidse, indtil Midten sammenvoxne. Straaet opret (eller kun med et Knæ ved det nedre Led).

104. **A. pratensis** L. (Eng-R.) H. 69; Drej. n. 62; F. D. 1985; Reh. I, 1479; And. XI, 127; H. N. X, 88.

Straaet jævnt; *Dusken* valseformet, foroven og forneden afrundet, med 4—5 Smaaax paa hver Green; *Yderavnerne* tæt og stift haarede, længere end *Inderavnen*.

1½—3' høi. Stakken ret, var. i Længde. Blomsterne snart grønne, snart farvede. 5—6. 4.

Paa Enge og lavtliggende Græsmarker, ved Veigrøfter, i de østlige Egne af *Sjæll.* alm., sjeldnere mod V.; *F.* sporadisk: Holstenshuus, Rødkilde, Ollerup, Svendborg! *Bornh.* Rønne, Hasle (20); synes at mangle paa de øvrige Øer samt i de fleste Egne af *Halvøen*; de eneste mig bekendte Voxesteder, ere: *J.* Hurup Kirkegaard (Andresen), Rydhave ved Holstebro (Schmidt), Veile, Kolding (7), Ribe (6); *Sl.* Haderslev (7), Syderhøft i Eidersted (F. Müll.).

Anm. *A. nigricans* H., som adskilles ved krybende Udløbere og kortere, tilsidst sortagtig Dusk, er endnu ikke funden i vor Flora.

105. **A. agrestis** L. (Ager-R.) H. 70; Drej. n. 61; F. D. 697; Reh. I, tab. 49, fig. 1473; And. XI, 125; H. N. IV, 85; L. Herb. I, 12.

Straaet oventil ru; *Dusken* valseformet, i begge Ender tilspidset, med 1—2 Smaaax paa hver Green; *Yderavnerne* svagt randhaarede, lidet kortere end *Inderavnen*.

1—2' høi. Stakken bøiet, udgaaer nærvæd Grunden af Inderavnen og er dobbelt saa lang som denne. 7—8. ☉.

Paa dyrkede Marker, især mellem Sæden og hyppigst paa Leergrund: *Sl.* hyppig mellem Rapssæden i Marskegnene (H.) samt ved Veie og i Agerrene i Eidersted (N.), Schauendal (16); *Als* (19); paa *Loll.* et alm. Ukrud i Vaarsæden omkring Maribo (14), Rødby og Nakskov! *Falst.* Ourupgaard (Koch), Næsgaard; *Møen* Stege (14); *Sj.* Farimagsvæien ved København! Amager ved Kastrup o. fl. St.! (I mange Egne af Landet (især mod N.) forekommer den aldeles ikke. 3)

b. Yderavnerne budte, ved Grunden sammenvoxne. Straaet knæbøiet, ved Grunden nedliggende.

106. **A. geniculatus** L. (Knæbøiet R.) H. 71; Drej.

n. 60; F. D. 861; Rchb. I, tab. 49, fig. 1477; And. XI, 128; H. N. X, 89; L. Herb. III, 47.

Yderavnerne randhaarede; *Inderavnerne* med en bøiet Stak befæstet nedenfor Midten og ragende udenfor Smaaaxet, (omtrent af *Yderavnerne*s dobbelte Længde).

Smaaaxene mørkviolet anløbne, Støvknapperne violette eller skidenbrune. 5—8. ☉.

Paa fugtige, oversvømmede Steder almindelig udbredt.

107. **A. fulvus** [Sm. Engl. Bot. 1467] (Guul R.) H. II, 117; Drej. n. 59; F. D. 1804; Rchb. I, tab. 49, fig. 1476; And. XI, 129; H. N. X, 90; L. Herb. III, 48.

Yderavnerne randhaarede; *Inderavnerne* paa Midten stakbærende; *Stakken* ret, af Længde med *Yderavnerne* og indsluttet i Smaaaxet.

Planten har en mere blaa grøn Farve end foreg., Smaaaxene grønne, Støvknapperne brandgule. 5—8. ☉.

Paa lignende Steder som foreg., bemærket i alle Provindser, men mindre hyppig.

31. Phleum. Rottehale.

a. *Yderavnerne* afstumpede med en Braad, intet Spor til en anden Blomst i Smaaaxet.
(*Phleum* Beauv.).

108. **P. pratense** L. (Eng-R.) H. 67; Drej. n. 63; F. D. 1984; Rchb. I, tab. 50, fig. 1483; And. XI, 130; L. Herb. V, 98.

Dusken foroven og forneden afrundet; *Smaaaxene* stilkløse; *Yderavnerne* paa Ryggen randhaarede, 3 Gange længere end den i Spidsen befæstede Braad.

1—3' høi. Straaet sribet. 6—9. ☉.

β, *nodosum* (P. *nodosum* L., F. D. 380). Straaet ved Grunden knolleformigt opsvulmet; *Dusken* kortere.

Paa Enge og Græsmarker almindelig vildvoxende og dyrket (under Navn af *Timotheigræs*). β, paa tørrere Steder.

b. Yderavnerne tilspidsede, Ansats til en anden Blomst. (Chilochloa Beauv.)

109. **P. Borchmeri** [Wib. fl. Werth. p. 125] (Glat R.) H. 68; Drej. n. 64; L. Herb. I, 11; Chilochloa Beauv., Rchb. I, tab. 51, fig. 1488; Phalaris phleoides L., F. D. 531; Phleum phalaroides Koel., And. XII, 132; H. N. XI, 84.

Dusken foroven noget tilspidset; *Smaaaxene* stilkede, paa halvt-krandsstillede, tiltrykte Grene; *Yderavnerne* paa Ryggen rue eller svagt randhaarede.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi. Frembringer blomsterløse Bladknipper fra Rodstokken; Straaet glat, glindsende, svagt stribet, ofte rødagtigt. Let kjendelig ved den smale, og naar den bøies, tydeligt grenede Dusk. 6—7. 4.

Paa tørre, sandige eller kalkholdige Bakker, sporadisk i det nordlige og nordøstlige *Jyll.* (til Aarhus); i *Nordsjælland!* paa *Moen* (Dr.); *Bornh.* ved Hammershuus (20). (I Fyen, Lolland og Falster er den hidtil ikke bemærket.)

110. **P. arenarium** L. (Sand-R.) H. 69; Drej. n. 65; F. D. 915; Rchb. I, tab. 50, fig. 1482; And. XII, 133; H. N. II, 72; L. Herb. III, 46.

De øvre *Bladskeder* oppustede; *Dusken* valseformet eller omvendt-ægformet, forneden smalere; *Smaaaxene* stilkløse; *Yderavnerne* lancetformede, paa Ryggen stivt randhaarede.

2—6" høi. Stænglerne talrige; ingen golde Bladknipper. Dusken almindelig kort. 5—6. 4.

Paa Havstokken og sandige Overdrev nær Havet: paa *Halvoen* alm. i Kliterne mod V. (H.) og paa Øerne i Vesterhavet, f. Ex. Fanø, Romø (16); paa *Øerne* sporadisk: *Sj.* Kongsøre i Odsherred (15), Adserbo Overdrev! Frederiksværk (H.), Lappesteen ved Helsingør (21), Havstokken S. for Kjøge! Feddet ved Lindersvold; *Moen*: Ulfshale (H.) og Budsemark (9); *Falst.* Grønsund (9); *Loll.* Kramnitze (H.) o. fl. St. paa Havstokken mellem Rødby og Nakskov Fjord; *Langeland* v. Spodsbjerg (19); *Bornh.* ved Hammershuus (2). *

32. Psamma. Hjelme.

111. **P. arenaria** [R. & S. syst. 2 p. 845] (Sand-H.) *Ammophila* Link; Drej. n. 76; Lge. Haandb. 1. Udg. p. 55; Rchb. I, tab. 44, fig. 1454; L. Herb. V, 81; *Arundo* L.,

H. 85; F. D. 917; *Calamagrostis* Roth, And. VIII, 92; H. N. XIII, 90.

Dusken valseformet, foroven tilspidset; *Yderavnerne* lancetformede, spidse; den *nedre Inderavne* over dobbelt saa lang som *Haarene*, med en kort sylformet Braad nedenfor den tokløvede Spidse.

2—3' høi. Hele Planten, *Dusken* indbefattet, blegt blaagraa. Bladene indrullede, med forlænget, spids Skedehinde. 7—8. 4.

Paa Flyvesand ved Havet, almindelig, især paa Halvøen og i Nordsjælland; sjeldnere paa sandige Bakker inde i Landet (f. Ex. Ø. Nykirke i *Jyll.*; Rendsborg!)

112. **P. baltica** [R. & S. l. c.] (Østersøisk H.) *Amphila* Link; Lge. Haandb. 1. Udg. p. 56; Rehb. l. c. fig. 1455; *Arundo* Flügge, H. 86; F. D. 1684 (ikke god); *Calamagrostis* Hartm., And. VIII, 93; Fr. H. N. I, 74.

Dusken smalere og mere tilspidset, med længere Grene og derved lappet; *Yderavnerne* sylspidsede; den *nedre Inderavne* neppe dobbelt saa lang som *Haarene*, i Spidsen fint tokløvet, med en haarformet *Stak* nedenfor Spidsen, af Længde med eller lidet længere end Indskjæringen.

2—3' høi, mindre blaagraa; *Dusken* rødviollet; Bladene tilsidst indrullede, forøvrigt som foreg. 7—8. 4.

Paa sandige Strandbredder ved Kysterne af Vesterhavet og Østersøen: *Sl.* Klitterne ved Eidersted (N.), Frederiksort, Bæverør, Holdnæs (16); *Als* (N.); *Langelands* Østkyst (19); *Loll.* Bredfjed (5); *Falst.* Tromnæs! Grønsund (14), Bøtø (5); *Sj.* Havstokken (Jædderen) N. for Kjøge (9); *Bornh.* Nebberodde ved Rønne! Hasle (11). (I Kattegatpartiet forekommer den neppe.) [2]

33. *Calamagrostis*. Rør.

a. *Yderavnerne* læderagtige; *Haarene* længere end *Inderavnerne*; *Stakken* ret. (Stive, bredbladede Græsser: *Orophilæ* Fr.)

113. **C. Epigejos** [Roth tent. fl. germ. I, 34] (Bjerg-R.) Drej. n. 73; Rehb. I, tab. 43, fig. (1451 og) 53; And. VIII, 85, H. N. VIII, 85, *Arundo* L., H. 81; F. D. 2165.

Toppen stivt opret, sammenhobet-lappet; *Yderavnerne* lan-

cetformede, sylspidsede, efter Blomstringen lukkede; *Stakken* befæstet paa Midten af den i Spidsen tokløvede *Inderavne*; kortere end *Haarene*.

1—3' høi. Straae og Blade røe. Toppen paa aabne Steder rød-violet; i Skygge mere grøn. Var. (efter Fr.) med *Stakken* befæstet i Indskjæringen. 7—8. 4.

β, glauca (Blytt, Norsk Fl. p. 134; Rchb. l. c. fig. 1452; *C. glauca* M. Bieb.) Blaagrøn, med længere og mere aabne Topgrene, *Stakken* længere end hos Hovedarten.

Ikke sjelden paa lerede og sandige Skrænter ved Strandbredder, mindre hyppig i Skove; *β*, paa mere fugtig Grund, men sjeldnere: Folehave Skov ved Hørsholm, Københavns Omegn! Flyng (8), Magleby Dyrehave p. Stevns (Visby), Stokkebjerg Skov (Weilbach); *Falst.* Guldborg (Koch); *F.* Hofmansgave (18).

b. *Yderavnerne* hindeagtige, *Stakken* ret, indsluttet i *Smaaaxet* (Straaet tilsidst grenet:

Helophilæ Fr.)

114. *C. Langsdorfii* [Trin. diss. de Gram. 1824 p. 225]? H. N. XIII, 89; *C. phragmitoides* Lge. Haandb. 1 Udg. (ikke Hartm.); *C. rubicunda* Blytt., Norges Fl. p. 91 (?); *C. nutans* Saut., Rchb. I, tab. 40, fig. 1446 (?) en større Form; *Arundo Pseudophragmites* Nolt. nov. p. 11.

Toppen opret eller noget nikkende, med under Blomstringen udbredte, senere oprette Grene; *Yderavnerne* under Blomstringen aabne, lancetformet-tilspidsede; *Stakken* omtrent ligelang med og befæstet ovenfor Midten af *Inderavnen*; *Haarene* omtrent af lige Længde med *Inderavnen*.

2—3' høi; Bladene 3—5''' brede, Skedehinden forlænget. Toppen hos mit Expl. blaagrøn med svagt rødligt Anstrøg. 7. 4.

Paa fugtige Steder, i Skove: *Sj.* Sjæl-Sø (7); *J.* Vesterengene og Tøihuushaven ved Randers (7). A

Anm. Det Expl. jeg har for mig til Beskrivelse, meddeelt af Apotheker Jensen under Navn af *C. Halleriana*, afviger fra *C. phragmitoides* Hn. ved en bleggrøn Top, mindre stive Blade og *Inderavnen* længere end *Haarene*. Fra Expl. af *C. gracilescens* Blytt (*C. Halleriana* Fr. i H. N. VIII, 85 og X, 93) afviger den mere ved Toppens Form og Bladenes Brede. *C. Pseudophragmites* (Schrud.) Rchb. synes forskjellig fra vor Art ved kortere, tværsafskaaren Skedehinde, mørkere (violet)

Top, større Smaaax og Haarene længere end Inderavnen. Bedst stemmer den overens med saavel Beskrivelse som Afbildning af *C. Langsdorfi*, hvortil jeg derfor troer at maatte henhøre den. Expl. i H. N. fra St. Petersborg ere aldeles lignende det jydske, med Undtagelse af at Haarene hos hiin ere noget længere end hos denne. Blytt (l. c.) antager imidlertid ikke den i H. N. VIII fremstillede Plante for den ægte *C. Langsdorfi* Trin., men henfører saavel H. N. XIII, 89 som *C. nutans* Saut. med Tvivl til sin *C. rubicunda*. Da Stakkens Tilhæftningspunkt og relative Længde til Inderavnen og Haarene varierer hos denne og nærstaaende Arter, er det vanskeligt at henhøre et tørret Exemplar med Bestemthed til nogen af de talrige Arter, der ere opstillede i denne Slægt, og af hvilke endeel synes endnu ikke at være aldeles fast begrundede. En nøiagtig Undersøgelse af de danske Calamagrostis-Arter maa særdeles anbefales Botanikerne, og vigtige Hjælpemidler hertil ville findes hos *Fries* (mant. 3, S. Veg. Sc., H. N.) og *Blytt* (l. c.)

115. *C. lanceolata* Roth. [l. c.] (Eng.-R.) Drej. n. 72; Blytt, Norg. Fl. p. 93; Rchb. l. c. fig. 1448; And. IX, 96; H. N. X, 92; *Arundo Calamagrostis* L., H. 82; F. D. 280 (slet), 1624.

Toppen noget nikkende, med udbredte Grene; *Yderavnerne* smalt lancetformede, tilspidsede, efter Blomstringen aabne; *Stakken* meget kort, befæstet i Spidsen af den udrandede *Inderavne*; *Haarene* længere end *Inderavnerne* og næsten lige-lange med *Yderavnerne*.

3—4' høi. Straaet jævnt, Skederne jævne eller oventil rue. Bladene smalere end hos foreg., Toppen alm. rødt anløben, men var. efter Voxestedet mere grøn. 6—7. 4.

Anm. Stakken alm. lidet længere end Indsnittet, men var. i Længde (*C. gracilis* Schum. I, 35; H. 85; Drej. n. 71, er kun en spæd Form af denne Art med ingen eller meget utydelig Stak).

Paa Enge mellem Krat, i Skove, ikke sjelden i Danmark. (Formen *gracilis* paa Strandklinerne mellem Taarbæk og Springforbi, Schum.)

116. *C. neglecta* [Ehrh. Beitr. 6, 137 under *Arundo*] (Stivtoppet R.) And. IX, 100; H. N. VIII, 87; *Arundo stricta* Timm, H. 83; F. D. 1803; L. H. IV, 62; *Calamagrostis str.* Hartm., Drej. n. 74; Blytt, Norges Fl. p. 85; Rchb. I, tab. 37, fig. 1439; *Agrostis coarctata* Schum. I, p. 24.

Toppen stivt opret, med korte, under Blomstringen aabne, før og efter samme smalt sammenknebne Grene; *Yderavnerne* æg-lancetformede, spidse, efter Blomstringen lukkede; *den nedre*

Inderavne længere end *Haarene*, med en *Stak*, som udgaaer lidet nedenfor eller ovenfor Midten og naaer omtrent til Spidsen; Ansats til en anden Blomst (i Form af et fint Haar-knippe ved Grunden af den øvre *Inderavne*).

1—3' høit, stivt Græs med jævne eller lidet rue Skeder, kort Skedehinde; Bladene paa Grenene indrullede. Toppen i yngre Tilstand mørkviolet, blaagraat anløben. 6—8. 4.

β, *geniculata* Fr. H. N. VIII, 88. Straaene ved Grunden knæbøiet-opstigende.

I Moser og paa fugtige Skovenge, hidtil kun funden paa Halvøen og i Nordsjælland og ikke almindelig: *Sj.* Adserbo Overdrev! Lille Værlose, Hesttangs Mølle (Dr.), Lundehuusmosen! Boserup (20), Dronninggaards store Mose (9), Jonstrup Vang (15); *J.* Gravens Mose i V. Hanherred (16), Fjerritslev (Grønlund), Skjærring Hovkjær, Tandrup i Thy, Kjærs Mølle ved Aalborg (Dr.), Ranum ved Løgstør (8), Hornbæk (16) og Vesterengene ved Randers (7); *Slesvig* (Rehb.). *δ*, med Hovedarten i Lundehuusmosen!

c. Ugrenede Græsser med knæbøiet *Stak* ragende udenfor de hindeagtige *Yderavner*.

(*Nemophilæ* Fr.)

117. *C. arundinacea* [Roth. fl. germ. II, 1, p. 89] (Skov-R.) Blytt, Norg. Fl. p. 82; *C. silvatica* DC., Drej. n. 75; Rehb. I, tab. 38, fig. 1440; And. IX, 104; H. N. VIII, 90; *Arundo* Schrad., H. 84; F. D. 1683; L. Herb. V. 82; *Agrostis arundinacea* L.

Toppen opret, med korte, stivhaarede, under Blomstringen aabne, før og efter denne sammenknebne Grene; *Yderavnerne* lancetformede, tilspidsede, efter Blomstringen lukkede, den øvre neppe længere end *Inderavnerne*; *Stakken* nedenfor Knæbøiningen snoet, udgaaende fra Grunden af den nedre *Inderavne* og næsten dobbelt saa lang som denne; *Haarene* meget korte ($\frac{1}{4}$ af Blomstens Længde); Ansats til en anden Blomst.

1—4' høi, stiv; Skederne jævne eller lidet rue, de nedre ofte haarede! Skedehinden forlænget. 7—8. 4.

I høitliggende Skove og paa Bakker mellem Krat, forekommer paa mager Jordbund: i *Jyllands* Hedeegne hist og her; sjelden paa Øerne: *Sj.* Marienlyst ved Helsingør! Næsgaard ved Dronninggaard

(14), Naaleskoven i Gjelskov mod Søllerød! Bisserup ved Skjelskør (Nielsen); *Bornh.* i Almindingen (H.). [*

34. *Agrostis*. *Hvene*.

a. *Apera* Adans. Den nedre Yderavne mindst, 2' Inderavner, den nedre med en forlænget Stak;
Ansats til en anden Blomst.

118. *A. Spica venti* L. (Langstakket H.) H. 73; F. D. 853; And. X, 108; *Apera* Beauv., Drej. n. 70; Rchb. I, tab. 32, fig. 1421; L. Herb. II, 22.

Toppen pyramideformet, med talrige udspærrede Grene, før Blomstringen nikkende, under og efter samme opret; *Stakken* lige eller svagt bøiet, fæstet tæt under Spidsen af *Inderavnen* og 3—4 Gange længere end denne.

1—3' høi. *Toppen* grøn eller violet anløben. 6—7. ☉.

Paa dyrkede Marker, saavel paa leret som sandig Grund, ikke sjelden, men forekommer ikke i alle Egne, hyppigst (og et besværligt Ukrud mellem Sæden) paa *Bornholm*, *Lolland* og *Falster* samt i flere Egne af *Jylland*.

b. *Trichodium* Michaux. Den nedre Yderavne størst; 1 Inderavne med en knæbøiet Stak.
Ingen Ansats til en anden Blomst.

119. *A. canina* L. (Hunde-H.) H. 75; Drej. n. 67; F. D. 1443; Rchb. l. c. fig. 1424; And. X, 112; H. N. IX, 87; L. Herb. II, 21; *A. rubra* H. 74 (efter de danske Voxesteder).

Rodstokken sammentrængt, udskyder tueformigt samlede *Straa* og golde *Bladknipper* eller tillige krybende *Udløbere*; *Rodbladene* børsteformede; *Stængelbladene* flade; *Skedehinden* aflang; *Toppen* under Blomstringen aaben, før og efter samme sammenkneben; *Stakken* befastet nedenfor Midten af *Inderavnen*, (almindelig fremragende udenfor Smaaaxet).

Toppen mørk violet-røddruun, undertiden af blegere, endog straa-gul Farve (β, pallida Rchb. 1425). Var. desuden med kortere eller længere, tæt- eller faablomstrede Topgrene, bredere eller smalere Stængelblade og med kort eller aldeles ingen Stak. 6—8. ♀.

Paa tørvholdige Enge, i Hedemoser, ikke sjelden, især hyppig paa Halvøen og i Nordsjælland. β , Strandbredden ved V. Skjerninge i Fyen!

Ann. Fig. i F. D. viser ikke de børsteformede Rodblade.

c. *Vilfa* Beauv. Yderavnerne omtrent ligestore eller den nedre størst, 2 Inderavner uden (eller med meget kort) Stak. Ingen Ansats til en anden Blomst.

120. *A. vulgaris* [With. arr. p. 132] (Almindelig H.) H. 76; Drej. n. 68; Rchb. l. c. fig. 1427; And. X, 110; H. N. XI, 83; L. Herb. VII, 123; *A. capillaris* F. D. 163; Rafn I, 523.

Alle *Bladene* flade; *Skedehinden* kort, afstumpet; *Toppen* i Omkreds pyramideformet eller ægformet, med under og efter Blomstringen udspærrede Grene.

Smaaaxene fine, rødagtige, sjældnere grønne. 6—8. 4.

β , *stolonifera* (*A. stolonifera* α , L.) med Udløbere og fremliggende Bladknipper.

γ , *tenella* (*A. tenella* Hoffm.) Topgrenene haarfine, Smaaaxene bleggrønne, meget smaae.

δ , *pumila* F. D. 1802 (*A. pumila* L.) Dværgform (1—2'' høi) med rundagtige Smaaax (er en ved Brandsvampe i Blomsten frembragt sygelig Form).

ϵ , *vivipara* Schrad. (Rchb. 1429) med topspirende Smaaax (den nedre Inderavne grøn, 5-nervet, dobbelt saa lang som Yderavnerne).

Paa Græsmarker, høie Enge, ved Veie, i Skove o. s. v. meget alm. over hele Landet: β , paa frugtbar Jord, γ , i Skove, δ , paa tørre, sandige Bakker, ϵ , *Sj.* Skjelskør (Nielsen); *J.* paa Skovenge ved Brøndsted!

121. *A. alba* L. (Krybende H.) H. 79; Rafn I, 529; F. D. 1623; *A. stolonifera* Drej. n. 69; H. 77, Rchb. l. c. fig. 1430; And. X, 109, L. Herb. IV, 61.

Alle *Bladene* flade; *Skedehinden* aflang; *Toppen* langagtig-oval, med efter Blomstringen sammenknebne Grene.

Smaaaxene større end hos foreg., grønne eller blege, sjældnere rødtligt anløbne; har undertiden en kort, ret Stak nedenfor Spidsen

af Inderavnerne, Rodstokken udsender alm. vidtkrybende Udløbere og opstigende Bladknipper. 7—8. 4.

Ann. Af de talrige Former, hvorunder denne Art efter Voxestedets Forskjellighed fremtræder, nævnes som de meest udmærkede:

β , *coarctata* Blytt. 149; (A. flava F. D. 751; Rafn I, 525) Toppen forlænget, med korte Grene, Smaaaxene ofte bleggule.

γ , *maritima* Mey. Chl. han. (A. maritima Lam., Rchb. l. c. fig. 1436; A. stolonif. β , L. sp., F. D. 564? (slet). A. stol. decumbens Rafn. I, 522). Bladene stive, blaagrønne, Toppen axformigt sammentrængt.

δ , *gigantea* Rchb. l. c. fig. 1433; L. Herb. VII, 124; (A. gigantea Roth) 2—3' høi, med talrige, lange og mangeblomstrede Grene.

ϵ , *vivipara* Rchb. l. c. fig. 1434 (A. silvatica L., Rafn. I, 524; A. alba silvatica H. 71)? Smaaaxene topspirende.

Meget almindelig i Danmark, forekommer baade paa tørre og fugtige, skyggefulde og aabne Steder. β , ved Strandbredder, f. Ex. i det sydlige Lolland, Flatø (Koch); *Sl.* Dyttebøl Strand ved Gelting (Lund); γ , i Flyvesandet f. Ex. Vendsyssel (26), Thy (7), alm. i Klitterne V. for Lemvig! Blaavands Huk (28), *Sl.* Eidersted (F. Müll.); δ , ikke sjelden paa fugtig Leergrund; ϵ , (efter Hornem.) i Skove. (Saavel denne som foreg. benævnes alm. *Fioringræs*).

35. *Milium. Miliegræs.*

122. *M. effusum* L. (Udspredd M.) H. 72; Drej. n. 77; F. D. 1143; Rchb. I, tab. 45, fig. 1456; And. X, 115; L. Herb. VII, 121.

Toppgrenene haarfine, under Blomstringen horizontalt udsperrede, efter samme nedhængende; *Smaaaxene* ægformede; *Inderavnerne* stakløse.

2—3' høit, glat, lysgrønt Græs med brede, slappe Blade, lang Skedehinde. 6. 4.

Paa Muldjord i Løvskove almindelig.

36. *Melica. Flitterax.*

123. *M. uniflora* [Retz. obs. I, 10] (Enblomstret F.) H. 98; Drej. n. 96; F. D. 1144; Rchb. I, tab. 72, fig. 1576; And. VIII, 89; H. N. XIV, 89; L. Herb. VII, 125.

Skedehinden spids, hindeagtig med grøn Midtnerve, modsat Bladet; *Toppen* ensidigt grenet med oprette, toblomstrede *Smaaax*; *den nedre Blomst* tvekjønnet, *den øvre* ufuldkommen.

Skeder og Straae jævne, Topgrenene med 1—4 *Smaaax*, Yderavnerne mørkrøde. 5—6. 4.

I skyggefulde Skove paa Muldjord almindelig i Danmark.

124. **M. nutans** L. (Nikkende F.) H. 98; Drej. n. 97; F. D. 962; Rchb. l. c. fig. 1577; And. VIII, 90; L. Herb. IV, 63.

Skedehinden utydelig; *Toppen* klaseformigt sammentrængt, ensidig, med korte Grene og nikkende, treblomstrede *Smaaax*; de 2 *nedre Blomster* ♀, *den øvre* ufuldkommen.

Straet oventil firekantet, tilligemed Skederne rue, Topgrenene alm. med 1 *Smaaax*, Yderavnerne som foreg. 5—6. 4.

I Kratskove, især paa fugtig Grund, sporadisk paa *Halvøens* Østkyst, i *Sjælland* og paa *Bornholm*; i *Fyen* sjeldnere: Lange-skovs Kro (16). Voxesteder fra Lolland og Falster ere mig hidtil ikke bekjendte).

37. **Hierochloa. Festgræs.**

125. **H. borealis** [R. & S. syst. II, 513] (Vellugtende F.) Drej. n. 80; Rchb. I, tab. 107, fig. 1728; And. XII, 137; H. N. VIII, 92; L. Herb. III, 41; *Holcus odoratus* L., H. 96; F. D. 963.

Rodstokken krybende; *Straet* med meget faa (1—2) Led ved Grunden; *Straabladenes* Plade kort; *Toppen* udbredt, med glatte Grene; *Smaaaxene* bredt ægformede; *den nedre Inderavne* tæt randhaaret.

Vellugtende Græs, med brune, gliidsende *Smaaax*. ♂ Blomsterne have undertiden en meget kort Stak. 4—5. 4.

I Enge og Moser, hist og her i *Nordsjælland*, sjeldnere paa de andre Øer og paa *Halvøen*: *Sj.* ved Ladegaardsaaen udenfor Kjøbenhavn (19), Lundehusmosen, Ordруп Mose! Jonstrup Vang (20), Leerbæks Mose ved Roeskilde! mellem Hove og Vexø (14), Tiis Sø, Munkebjergby (Lund); *Thorseng* ved Bukkehøve (12); *J.* Kjølbysgaard og Tandrup i Thy (Carst.), Ranum v. Løgstør (8), Hobro Skov (16), Grenaa (Meyer), Moesgaard ved Aarhus (2), Horsens (16), Stenderup S. for Kolding (Andersen), Engene ved Lønborg (16); *Sl.* Cluesriis ved Flensborg (12) og Kobbermølleskoven (16), Quellenthal ved Lyksborg, Klensby Eng ved Slesvig, Møledammen ved Husum (16).

38. Holcus. Hestegræs.

126. *H. lanatus* L. (Uldbladet H., Fløielsgræs). H. 95; Drej. n. 81; F. D. 1181; Rchb. I, tab. 105, fig. 1718—20; And. VIII, 85; L. Herb. VII, 126.

Straa og *Blade* fløielshaarede; *Toppen* under og efter Blomstringen aaben; *den nedre Yderavne* budt med en kort Braad; ♂ *Blomsten* med en tilsidst hageformigt indbøiet, i Smaaaxet indsluttet *Stak*.

Hele Planten, formedelst den fløielshaarede Beklædning, graa-agtig; Smaaaxene rødligt-anløbne, var. (*argenteus* R. & S.), med sølv-hvide Smaaax.

Paa Enge og i Skove meget almindelig. 6—7. 7.

127. *H. mollis* L. (Blødt H.) H. 96; Drej. n. 82; F. D. 1059; Rchb. l. c. fig. 1721; And. VIII, 86; H. N. XIII, 91; L. Herb. V, 84.

Rodstokken krybende; *Straaet* og de øvre *Bladskeder* glatte, de nedre *Skeder* og *Bladpladerne* duunhaarede; *Toppen* under Blomstringen aaben, senere sammentrængt; *den nedre Yderavne* tilspidset; ♂ *Blomsten* med en knæbøiet, udenfor Smaaaxet fremragende *Stak*.

Blaagrøn; Smaaaxene oftest gulbrune. Var. med begge Blomster ♀, den nedre stakløs, den øvre med en langt udtrædende, snoet, ikke knæbøiet, *Stak*. 7—8. 7.

I Kratskove, paa dyrkede, især sandige Marker ikke sjelden. Var. i Rudehegn (F. Schmidt), Hellebæk, Nakkehoved (Heiberg).

39. Fluminia. Rørsvingel.

128. *F. arundinacea* [Fr. S. Veg. Sc. I, p. 247] (Vand-R.) And. VI, 66; Festuca Liljebl.; Glyceria Fr. mant. 2, p. 8; H. N. III, 93; Festuca borealis M. & K.; Scolochloa festuacea Link, Rchb. I, tab. 71, fig. 1573.

Rodstokken ved Leddene rodslaaende; *Toppen* i Spidsen nikkende, med forlængede, opret-aabne, rue *Grene*; *Smaaaxene* 3—5-blomstrede; *den nedre Inderavne* 5-nervet, med 3 spidse Tænder.

Høit (omtr. 4') og stærkt Græs, de nedre Ledstykker nedsænkte i Vandet og udsendende krandsstillede Rodtrævler. Skedehinden forlænget, en bruun Plet ved Grunden af Bladpladen. 6—7. 4.

Ved Flodbredder, hidtil kun fundet i *Sl.* ved Steinschleuse Ø. for Süderstapel (N.). ^{1a}

40. *Triodia*. Tandbælg.

129. *T. decumbens* [Beauv. agr. p. 76] (Nedliggende T.) Drej. n. 95; Rehb. I, tab. 71, fig. 1572; And. VI, 67; H. N. IX, 97 (var.); L. Herb. VI, 101; Poa Scop., H. 112; Festuca L., F. D. 172.

Straaene ved Grunden knæbøjede, nedliggende, under Blomstringen opstigende; *Blade og Skeder* haarede, en Haarkrands i Skedehindens Sted; *Blomsterstanden* klaseformet, med korte, 1—3-blomstrede, før og efter Blomstringen opret-tiltrykte *Grene*; *Smaaaxene* 3—5-blomstrede; *Inderavnerne* læderagtige, den nedre 7—9-nervet, ved Grunden og i Randen haaret.

$\frac{1}{2}$ —1' høit, stivt Græs. 6—7. 4.

Paa høie Enge, Bakker, Lyngheder og aabne Steder i Skove, almindelig, især i Jylland, Nordsjælland, Lolland-Falster og paa Bornholm.

41. *Koeleria*. Kambunke.

130. *K. cristata* [Pers. syn. I, 97] (Randhaaret K.) Drej. n. 94; F. D. 2223; Rehb. I, tab. 93, fig. 1668—70; And. VII, 82; H. N. XIV, 88; L. Herb. II, 29; Aira L., H. 87.

Bladene (især de nedre) i Randen og undertiden overalt langhaarede, jævne eller i Randen og paa Overfladens Nerver rue af en enkelt Række korte Børster; *Skedehinden* utydelig; *den nedre Inderavne* tilspidset.

Var. i Høide, Bladenes Brede, Smaaaxenes Farve o. s. v. 6—7. 4.

Paa tørre Bakker, sjelden: *Sj.* en lyngklædt Bakke ved Jægerspris (9); *J.* ved Veien over Øbjergbakker fra Langsted Kro (Beck), Dybdals Bakker! og Sandgraven ved Aalborg (Dr.), Godthaab ved Aalborg (Strandgaard). ^a

131. *K. glauca* (DC. hort. monsp. 116] (Blaagrøn K.) Rehb. l. c. fig. 1672; And. VII, 83; H. N. I, 72; L. Herb. IV, 70; Aira Schrad., H. 88; F. D. 1566.

Blade og Skeder overalt fint fløielshaarede (Overfladens Nerver med flere Rækker af meget fine Haar); *Skedehinden* kort afskaaren; *den nedre Inderavne* budt, stakløs eller med en kort Braad.

Tueformet, ved Grunden omgivet af de henvisnede, men vedblivende Skeder. Bladene ved Tørring indrullede. Hele Planten paa Grund af Beklædningen blaagrøn. 6—7. 4.

I Sandklitter, hidtil kun bemærket i Klitterne mod Vesterhavet paa *Halvøen* og de vestlige Øer (Horne (Dr.) og Tornby i Vendsyssel (12); Thorsted pr. Ringkjøbing! Blaavand, Fanø (H.), Romø (16). [x]

42. Aira. Bunke.

132. *A. flexuosa* L. (Bølgestænglet B.) H. 89; And. VI, 71; F. D. 157 (slet); Reh. I, tab. 95, fig. 1678—79; Avenella Bluff, Drej. n. 91; Avena M. K., L. Herb. VI, 106.

Bladene smale, børsteformede; *Skedehinden* toøret, paa de nedre Blade budt, paa de øvre spids; *Toppen* udbredt, nikkende, med bølgeformigt bugtet Axe og Grene; *Smaaaxene* toblomstrede; *Yderavnerne* uligelange; de 2 *Blomster* i *Smaaaxet* tæt samlede, omtrent ligelange med den øvre *Yderavne*, flere Gange længere end Haarkrandsen ved Grunden af *Inderavnerne*; *Stakken* knæbøiet, udgaaende ovenfor Grunden af *Inderavnerne* og fremragende udenfor *Smaaaxet*.

Var. paa forskellige Voxesteder i Henseende til *Smaaaxenes* Farve og Størrelse o. s. v. 1—1½' høj. 6—7. 4.

Paa Lyngheder, Bakker, i aabne Skove meget almindelig.

133. *A. uliginosa* [Whe. i Boenningh. fl. Monast. p. 25, (Sump-B.) F. D. Suppl. tab. 3; Reh. l. c. fig. 1681; Deschampsia Thuillieri Godr. & Gren. fl. Fr. III, 508.

Rodbladene i tætte Tuer, meget fine, næsten haarformede; *Skedehinden* forlænget, tilspidset; *Toppen* opret, med haarfine, kun lidet bølgede og efter Blomstringen ikke udspærrede Grene; *Yderavnerne* næsten ligelange; *Smaaaxets* øvre Ledstykke forlænget og *den øvre Blomst* derved fjernet fra den *nedre*; *Stakken* noget længere, *Smaaaxene* mindre, forøvrigt som foreg. 7—8. 4.

I Hedemoser og Klitsumper: synes at være udbredt over hele den nordlige og vestlige Deel af Halvøen, f. E. J. Hjallerup i Vend-

syssel, Fjerritslev i V. Hanherred, Agger og Blissø i Thy, Thorsted pr. Ringkjøbing, Neiberg i Hammerumherred! Karlsmærsk Hede i Oxby Sogn (30), Hjortlund (12); *SL* Syderhøft i Eidersted (F. Müll.).

134. *A. cæspitosa* L. (Mose-B.) H. 89; Drej. n. 92; F. D. 240; Rchb. l. c. fig. 1682; And. VI, 69; L. Herb. VII, 133; *Deschampsia* Beauv.

Bladene flade, paa Overfladen og i Randen rue; *Skedehinden* forlænget; *Toppen* under Blomstringen udbredt, pyramideformet, opret; *Smaaaxene* toblomstrede med Ansats til en tredie Blomst; *Inderavnerne* med Haar af Blomsternes halve Længde; en knæbøiet eller næsten ret *Stak* ovenfor Grunden omtrent af Inderavnens Længde, indsluttet i *Smaaaxet*.

Yderavnerne violette med bruunglindsende Rand, hvorved *Smaaaxet* faaer et broget Udseende. 2' høi, danner tætte Tuer. 6—7. 4.

β, *pallida* Koch. (ochroleuca Rchb. l. c. fig. 1685). Yderavnerne uligelange; hvidgule med grøn Rygnerve, Inderavnerne blege (sølv- eller guldglindsende), Stakken ragende udenfor *Smaaaxet*.

γ, *vivipara*, med topspirende *Smaaax*.

δ, *stolonifera*, med Udløbere fra Rodstokken, Yderavnerne meget kortere end *Smaaaxet*.

Paa Enge og ved Grøfter meget almindelig. *β*, (en meget afvigende Form) *Sj.* Hellebæk! Liselund paa *Møen*! *J.* Sæbygaards Skov (8), Vestervig (Andresen), *γ*, Søllested p. Lolland (19); *δ*, Ollerup i Fyen (12).

Anm. Den ved Elbbredden udenfor Altona forekommende *A. Wibeliana* Sonder, F. D. 2461, som afviger ved Udløbere fra Rodstokken, mindre rue Blade, større *Smaaax* af guulagtig Farve, tidligere Blomstringstid o. s. v. maa eftersøges i vor Flora, hvor den sandsynligviis forekommer ved Bredderne af de større Aaer.

43. *Corynephorus*. Sandskjæg.

135. *C. canescens* [Beauv. agr. p. 90] (Graat S.) Drej. n. 93; Rchb. I, tab. 94, fig. 1674; And. VIII, 84; L. Herb. III, 45; Aira L., H. 92; F. D. 1023; H. N. I, 77.

Roden fintrævlet; *Straaene* talrige, tueformigt samlede; *Bladene* stive, børsteformigt sammenrullede; *Toppen* med korte, under Blomstringen aabne Grene.

4—8" høit, stivt Græs af blaagraa Farve, Toppen violetagtigt anløben, sjeldnere bleg. 7—8. 4.

β , *maritimus* Gren. & Godr. fl. Fr. III, 502. Straaene lavere, knæbøiede og mere udbredte, Toppen mindre.

Paa tørre, sandige Marker, i de magrere Enge af Landet almindelig og i Mængde. β , Strandbredder mellem Rødby og Nakskov Fjord (19).

44. *Airopsis*. **Dværgbunke.**

136. *A. præcox* [Fr. mant. 3, 180] (Tidlig D.) And. VII, 78; Aira L., H. 93; F. D. 383; H. N. II, 75; Rehb. I, tab. 94, fig. 1675; Avena Beauv., Drej. n. 90; L. Herb. IV, 67.

Bladene børsteformede; *Toppen* sammenkneben, oval eller elliptisk, kortgrenet; *Smaaaxene* sammenhobede; *Yderavnerne* omtrent af lige Længde med *Inderavnerne*.

1—4" høi. Smaaaxene bruunglindsende. 4—6. ☉.

Paa tørre, især sandige Marker, Bakker og Lyngheder almindelig udbredt.

137. *A. caryophylla* [Fr. l. c.] (Udspærret D.) And. VII, 77; Aira L., H. 93; F. D. 382; Rehb. l. c. fig. 1676; H. N. II. 74; Avena Web., Drej. n. 89; L. Herb. III, 44.

Bladene børsteformede; *Toppen* under og efter Blomstringen pyramideformet, med længere, udspærrede Grene; *Smaaaxene* adskilte; *Inderavnerne* kortere end *Yderavnerne*.

4—10" høi. Smaaaxene sølvglindsende, Straæet og Skederne forneden violette. 5—6. ☉.

Paa lignende Localiteter som foreg., ikke sjelden. $\frac{8}{8}$

45. *Trisetum*. **Guldhavre.**

138. *T. flavescens* [Beauv. agr. 88] (Glindsende G.) And. VII, 79; Avena L., H. 132; Drej. n. 88; F. D. 1507; Rehb. I, tab. 99, fig. 1694—96; H. N. III, 91; L. Herb. V, 87.

Bladene flade, med kort *Skedehinde*; *Toppen* under Blomstringen udspreddt; 2—3 fuldkomne og 1 gold Blomst i hvert

Smaaax; *den øvre Yderavne* dobbelt saa lang som *den nedre*; *Stakken* af **Smaaaxets** dobbelte Længde.

1—1½' høi. Bladene og de nedre Skeder haarede; **Smaaaxene** guldglindsende, var. i Henseende til Størrelsen, men altid mindre end hos **Arterne** af følg. Slægt, som den iøvrigt ligner. 6—8. 4.

Paa Græsmarker og ved Veie, sporadisk og ikke alm.: **Sj.** i Kjøbenhavns Omegn bemærket paa flere Steder, f. Ex. bag Kastellet, ved Leersøen, Ordrup, Sorgenfri, Dronninggaard, Jonstrup! Sparresholm (Lund), hist og her i Egnen om Skjelskør (Nielsen); **Hesseløen** (Lgby); **F. Sørup** (12)! **Jyll.** Tøihuushaven ved Randers (7)!

46. **Avena. Havre.**

a. Avena s. s. Alle Blomsterne ♂, **Smaaaxene** nedhængende, *Yderavnerne* 5—9-nervede. ☉.

aa. (Agrestes Coss. & DR.) Blomsterne tilfældede til Blomster-*axen* og ved Modenheden affaldende.

139. **A. fatua** L. (Flyve-H.) H. 129; Drej. n. 85; F. D. 1629; Rchb. I, tab. 103, fig. 1712; And. VII, 72; L. Herb. II, 25.

Toppen alsidig; **Smaaaxene** alm. treblomstrede; *Yderavnerne* længere end Blomsterne, *Axen* skjør, haaret, Blomsterne stakbærende; *den nedre Inderavne* ved Grunden stivhaaret, i Spidsen tofliget, med hindeagtige Flige.

Inderavnerne Haar rødbrune. 7—8.

I flere Egne et almindeligt Ukrud mellem Vaarsæden, især paa **Bornholm**.

* 140. **A. hybrida** [Peterm. i Rchb. fl. saxon. p. 17] Koch Syn. II, 917; F. D. 2642; (*A. intermedia* Lindgr. Bot. not. 1841; H. N. VII, 89.)

Toppen alsidig; **Smaaaxene** 2(—3)-blomstrede; *Yderavnerne* længere end Blomsterne, begge Blomsterne stakbærende; *den nedre Inderavne* glat, i Spidsen hindeagtigt tofliget, Blomster-*axen* skjør, haaret.

Ukrud mellem Sæden: **Sj.** mellem Valdby og Flaskekroen hyppig (med *A. fatua*)! Utterslev (19); **Sl.** ved Tønder (Koch).

Anm. De af mig i Sjælland samlede Expl. stemme overeens med den af Lindgr. (l. c.) beskrevne Art. Da jeg ikke har seet Expl. af *A. hybrida*, er det kun af den hos Koch givne Beskrivelse at jeg har

troet at kunne antage denne for at være den samme som den svenske Art. Muligviis er denne kun en Var. af foreg. Art.

bb. (Sativa Coss. & DR.) Blomsterne fastsiddende paa Axen, ikke affaldende.

† *A. sativa* L. (Almindelig H.) Metzg. Cereal. t. 12. Toppen alsidig, med aabne Grene, Smaaaxene aabne, alm. toblomstrede, Yderavnerne længere end Blomsterne, den nedre Inderavne glat, i Spidsen hindeagtigt tofliget, den øvre Blomst stakløs, Blomsteraxen seig, glat.

Var. med alle Blomsterne stakløse, og med hvide og sorte Inderavner. 7—8.

Dyrkes almindeligt i flere Afarter.

† *A. orientalis* [Schreb. Spicil. 52] (Sværd-H.) Metzg. l. c. tab. 12. Toppen ensidig, med oprette Grene, Smaaaxene alm. toblomstrede, lukkede; Inderavnerne alm. bruunagtige, forøvrigt som foreg. 7—8.

Dyrkes mindre alm. end foreg.

141. *A. strigosa* [Schreb. spicil. 52] (Pur-H.) H. 129; Drej. n. 84; F. D. 2528; And. VII, 73; Rchb. l. c. fig. 1710; H. N. II, 76.

Toppen ensidig; Smaaaxene toblomstrede; begge Blomsterne stakbærende; Yderavnerne af Længde med Smaaaxet; den nedre Inderavne glat, i Spidsen tofliget, med stakformigt tilspidsede Flige.

Stakken og Inderavnerne imod Modenheden sorte. Undertiden Ansats til en tredie Blomst. 7—8.

Forekommer hist og her forvildet mellem Vaarsæden, dyrkes i de magre Egne af *Halvøen* under Navn af sort Havre. $\frac{w}{w}$

b. (*Avenastrum* Koch.) Alle Blomsterne ♂, Smaaaxene oprette, Yderavnerne 1—3-nervede. 4.

142. *A. pratensis* L. (Eng-H.) H. 131; Drej. n. 87; F. D. 1083; Rchb. l. c. tab. 99, fig. 1697; And. VII, 76; L. Herb. I, 10.

Bladene stive, glatte, smale, paa Overfladen og Skederne

rue; *Toppen* klaseformigt sammentrængt med meget korte Grene (1—2 i hver Krands); *Smaaaxene* 4—5-blomstrede; begge *Yderavnerne* trenervede.

Rodbladene ofte sammenrullede. *Smaaaxene* oventil sølvglindsende. 6—7.

Paa høie Enge og græsklædte Bakker, i mange Egne af Landet (f. Ex. Møen, Nordsjælland, det nordl. Jylland) alm. I andre Egne sjældnere og sporadisk, eller (f. Ex. det sydlige Fyen), ikke tilstede.

143. **A. pubescens** L. (Dunet H.) H. 131; Drej. n. 86; F. D. 1203; Rchb. l. c. tab. 100, fig. 1700; And. VII, 75; L. Herb. I, 9.

Bladene slappe, tilligemed de nedre Skeder haarede; *Toppen* aaben, med længere Grene (4—5 i de nedre Krands); *Smaaaxene* 2—3-blomstrede; *den nedre Yderavne* alm. 1-nervet, *den øvre* større, trenervet.

Bladene bredere, alle flade, *Smaaaxene* sølvglindsende. 5—6.

Paa Enge og Græsmarker, alm. udbredt.

c. (*Arrhenatherum* Beauv.) Den nedre Blomst ♂ stakbærende, den øvre ♀ stakløs. 4.

144. **A. elatior** L. (Høi H.) F. D. 165; Fr. mant. 3, p. 4; And. VII, 74; H. N. IX, 88; *Arrhenatherum elatius* M. & K.; Drej. n. 83; L. Herb. I, 8; *A. avenaceum* Beauv., Rchb. l. c. tab. 104, fig. 1715; *Holcus avenaceus* Scop., H. 94.

Bladene flade, rue; *Toppen* alsidig, udbredt; *den øvre Yderavne* trenervet, dobbelt saa lang som *den nedre* (1-nervede), den øvre Blomst haaret.

2—3' høi. Den øvre Blomst har undertiden en kort, ret Stak. I den nedre Blomst findes alm. en uudviklet Frugtknude uden Grifler. 6—7.

α, vulgaris. *Smaaaxene* toblomstrede, den nedre (♂) Blomst med, den øvre (♀) uden Stak.

β, typica Fr. (hermaphrodita). F. D. 2643, *Smaaaxene* 2—3-blomstrede, alle Blomsterne tvekjønnede.

Paa Enge mellem Buske, ved Veie, i Krat, alm. udbredt. Formen *β*, er meget sjelden: *Sj. Klinerne* ved Taarbæk!

47. Phragmites. Tagrør.

145. *P. communis* [Trin. fund. agrost. p. 134] (Almindeligt T.) Drej. n. 78; F. D. 2464; Rchb. I, tab. 108, fig. 1729; And. VIII, 91; L. Herb. V, 83; *Arundo Phragmites* L., H. 80.

Bladene brede, næsten lancetformede; *Skedehinden* randhaaret; *Toppen* rigtblomstret, udbredt; *Smaaaxene* 4—5-blomstrede.

Det største danske Græs (4—6'), Rodstok og Udløbere tykke; *Smaaaxene* mørkt violetbrune, efter Blomstringen formedelst de lange Haar søvglindsende. 8—9. 4.

β , *repens* Mey. Chl. hanov.; F. D. 2164. Lav, med talrige, nedliggende og krybende Grene, 1—2-blomstrede *Smaaax*.

γ , *flavescens* Cust. i Gaud. fl. helv. 6, p. 341. *Smaaaxene* guulbrune, 3—fleerblomstrede.

Ved Søbredder og i Kjær hyppig. β , i Strandsandet, f. Ex. *J.* ved Harboøre (H.), meget alm. i Klitterne fra Agger til Fjaltring! Handbjerg Strand (Schmidt); *Sl.* ved Aabenraa Fjord! Dyttbøl ved Gelting (Lund); Avernakø (12); *F.* Nyborg; *Falst.* (Koch); *Sj.* Bekkeskov v. Præstø (Lund). γ , Stadsgravene ved Kjøbenhavn og Christianshavns Voldgrave, med Hovedarten, men tydeligt adskilt fra denne!

48. Enodium. Blaatop.

146. *E. coeruleum* [Gaud. agr. I, 145] (Almindelig B.) And. V, 55; *Aira L. sp.*, F. D. 239; *Melica L. mant.*, H. 99; *Molinia Moench*, Drej. n. 117; Rchb. I, tab. 78, fig. 1606; L. Herb. VII, 131.

Roden stærkt- og langtrævlet; *Straaene* ved Grunden tykke, 1—2-leddede, foroven uleddede; *Bladene* brede, langt tilspidsede; paa Overfladen haarede; *Skedehinden* dannet af en Haarkrands; *Topgrenene* korte, opret-tiltrykte.

Smaaaxene og Støvknapperne mørk-violette. 7—8. 4.

β , *altissima* Link. (*Molinia littoralis* Host, Rchb. 1607). Høiere, med længere Topgrene, svagere farvede *Smaaax*.

γ , *vivipara*, med topspirende *Smaaax*.

Paa tørvholdige Enge, i høie Skove og mellem Krat, alm. især paa *Halvøen* og *Bornholm*. β , paa skyggefulde Steder; γ , *Loll.* ved Maribo Sø (19).

49. Briza. Bævregræs.

147. *B. media* L. (Almindeligt B.) H. 112; Drej. n. 98; F. D. 258; Rehb. I, tab. 92, fig. 1665; And. V, 52; L. Herb. VII, 127.

Toppen alsidigt udbredt; med haarfine *Topgrene*; *Smaa-axene* hængende; *Skedehinden* kort, afstumpet.

Yder- og Inderavnerne violetbrune, med hvid, hindeagtig Rand. Let kjendelig ved de hjerteformede Smaaax med taglagte Avner. 6—7. 4.

Paa Enge og Græsmarker alm. udbredt.

50. Catabrosa. Tæppegræs.

148. *C. aquatica* [Beauv. agr. 97] (Dynd-T.) Fr. mant. 3, 174; Drej. n. 112; And. VI, 64; H. N. IX, 89; Aira aqu. L., H. 86; F. D. 381 (slet); Glyceria aqu. Presl; G. airoides Rehb. I, tab. 78, fig. 1608; G. Catabrosa Kl. & R., L. Herb. I, 2.

Rodstokken krybende og forsynet med Udløbere; *Bladene* korte og budte; *Skedehinden* forlænget og afrundet; *Toppen* alsidigt udbredt, med talrige og fine Grene i Halvkrandsene; *Yderavnerne* budte, gnavede eller udrandede.

Blødt, aldeles glat Græs. Yderavnerne violette, Inderavnerne brune med hvid hindeagtig Rand, Støvknapperne hvidgule, hvorved Toppen faaer et broget Udseende. (Former med indtil 5 Blomster i Smaaaxet, som angives af H. og Rafn, har jeg ikke fundet; den forekommer hyppigst toblomstret, undertiden med Ansats til en tredie Blomst). 6—7. 4.

β , *subtilis* Hook. Liden, med enblomstrede Smaaax.

I Dynd, ved Kildevæld og paa oversvømmede Steder ikke sjelden og forekommer i alle danske Provindser. β , paa fugtig Sandgrund; f. Ex. *Falst.* ved Øverup (14); *Sl.* Seemühle ved Rendsborg!

51. Glyceria. Sødgræs.

a. Inderavnerne utydeligt 5-nervede.

(*Halophilæ* Duval-Jouve.)

149. *G. maritima* (M. & K. D. Fl. I, 588] (Strand-S.)

Drej. n. 116; Rehb. I, tab. 79, fig. 1612; And. VI, 60; H. N. V. 94; L. Herb. I, 4; Poa Huds., H. 103.

Rodstokken udsender krybende Udløbere og nedliggende, forlængede Bladknipper; Rodbladene tilsidst sammenrullede; *Straaet* opstigende; *Topgrenene* i de nedre Halvkrandse alm. 2, under Blomstringen udstaaende, efter samme opret-tiltrykte; *Smaaaxene* 5—8-blomstrede (meget større end hos den følgende). 6—7. 4.

β, *anomala*! Alm. lavere end Hovedarten, med enlige, meget kortstilkede, større, stundom topskydende Smaaax, forlænget-tilspidsede Inderavner.

Ved Strandbredder, ikke saa almindelig som den følgende: *Sj.* Helsingør, Vesterfælle, Saltholm, Bognæs ved Roeskilde! Eskildsø i Isefjorden (14), Bisserup ved Skjelskør! Korsør (H.), Veirhøj! *Falst.* Grønsunds Nor (Koch); *Loll.* Nebbelunde (5), Naksø Fjord, Ravnsby (19); *F.* Hofmangsgave! St. Jørgensgaard o. fl. St. mod S.; Drejø, Strynø (12); *J.* Saltkilde ved Toftegaard i Vildmosen! Agger (herb. Drej.), Limfjorden v. Aalborg (9), Randers Fjord (7), Kalø, Hobro (16). I Marskegnene danner den, uden at blomstre, Hovedbestanddelen af Græsvæxten paa Forlandene, men ikke indenfor Digerne (Bruun). Formen *β* (som maaskee rettest er at betragte som en Misdannelse) er funden ved Vaarsaa Strand i Vendsyssel (12)! Ribe (Hornem. Herb.)! Amrom (Nolt.!).

Ann. F. D. 1626, som benævnes *Poa maritima*, hører ikke til denne Art. Blomsterstanden ligner meest den følgende, Plantens nedre Deel er aldeles som foreg. Prof. Nolte har meddeelt mig den Bemærkning, at den er tegnet efter et stort Expl. af *Catabrosa aquatica*, men Tegningen er i ethvert Tilfælde saa slet at den ikke kan tjene til Oplysning om nogen Arts typiske Udseende.

150. *G. distans* [Wahlenb. fl. upsal. p. 36] (Udspærret S.) F. D. 251 (*Poa maritima*) og 2222; Rehb. l. c. fig. 1609; And. VI, 62; H. N. VI, 87; L. Herb. I, 3; *Poa distans* L., H. 103; *Heleochloa* Drej. n. 113.

Straaene talrige, tueformigt samlede, knæbøiet-opstigende, ingen krybende Udløbere; *Bladene* flade; *Topgrenene* i de nedre Halvkrandse alm. 5, efter Blomstringen udspilede eller tilbagebøiede; *Smaaaxene* 3—7-blomstrede, dets Blomster tidligt af-faldende.

Var. meget i Henseende til Topgrenenes Antal og Retning, Antallet af Blomster i Smaaaxet og dettes Farve o. s. v. 6—7. 4.

β, *pulvinata* Fr. mant. 3; H. N. V, 90. Straaene fine, danne tætte Tuer, de nedre Topgrene 2, korte og mindre udspærrede.

Ved Strandbredder, især paa leret, af Havet ofte overskyttet Grund, sjældnere inde i Landet paa Gader ved Rendestene (f. Ex. Ringsted!) *β*, Tømmerpladserne paa Christianshavn, Bredderne af Tiissø! J. Ottesund paa Thyholm!

Ann. *Poa arenaria* Rafn I, 540, synes efter Beskrivelsen at høre til foregaaende, efter Synonymerne til denne Art.

b. Inderavnerne tydeligt 7-nervede. (*Hydrochloa* Hartm.)

151. *G. spectabilis* [M. & K. D. fl. I, 586] (Høit S.) L. Herb. IX, 161; *Poa aquatica* L., H. 100; F. D. 920; *Glyceria aqu.* Wahlb., Rchb. l. c. tab. 80, fig. 1614; H. N. IX, 91; *Heleochoa aqu.* Fr. fl. scan., Drej. n. 114.

Rodstokken krybende; *Straaet* opret; *Skedehinden* kort, af skaaren; *Toppen* rigtblomstret, under Blomstringen udbredt, tilligemed Axen ru; *Grenene* oprette, 6—10 i de nedre Halvkrandse; *Smaaaxene* æg-lancetformede, 6—9-blomstrede (meget mindre end hos de følgende).

4—6' høit, bredbladet Græs, Blomsterne fastsiddende længe efter Modningen. 7—8. 4.

Ved Randen af Søer og Aaer, findes i alle de danske Provindser, men ikke overalt lige hyppig, f. Ex. meget sjelden i det sydlige Fyen og paa Øerne S. for Fyen (12), samt paa Lolland (19).

152. *G. plicata* [Fr. mant. 2, p. 7] (Foldbladet S.) H. N. V. 91; Rchb. Suppl. Agr. f. 381; And. V, 55; F. D. 237 (*Festuca fluitans* L.)? og 2465; *G. fluitans* ♂, obtusiflora Sond. fl. hamburg. p. 57.

Rodstokken tyk, krybende; *Straaet* ved Grunden nedliggende; *Skedehinden* kort; *Toppen* næsten alsidig, med jævn Axe og ensidigt rue, under Blomstringen vandret udspilede *Grene*, alm. 4—5 i de nedre Halvkrandse; *Smaaaxene* linieformede, 7—12-blomstrede; Blomsterne tæt taglagte; *den nedre Inder-
arne* budt afrundet.

De ældre Bladskeder opløses i et trævlet Næt; Støvknapperne (oftest) gule. 6—7. 4.

β, triticea (M. Lange). Toppen sammenkneben, med enlige, korte Grene.

I flydende og stillestaaende Vand, bemærket i alle danske Provindser, og som det synes, ligesaa hyppig som følgende. *β*, ved Nielstrup i Fyen (12).

153. *G. fluitans* [R. Br. prodr. I, 179] (Manna-S.) Drej. n. 115; F. D. 2403; Rchb. l. c. tab. 80, fig. 1615; And. V, 54; L. Herb. VII, 130; *G. fluitans α, acutiflora* Doell, Fl. Bad. p. 170; *Festuca fluitans* L., *Poa Scop.*, H. 101.

Rodstokken krybende; *Straaet* ved Grunden nedliggende; *Skedehinden* forlænget; *Toppen* ensidig, med jævn Axe og ensidigt rue, under Blomstringen vandret udspilede *Grene*, 1—3 i de nedre Halvkrandse; *Smaaaxene* linieformede, 7—12-blomstrede, med løst taglagte Blomster; *den nedre Inderavne* spids.

Støvknapperne længere end hos foreg., violette, tilsidst bleggule. Blomsterne større end hos hiin, hvorved Smaaaxene blive længere. Hos begge de sidste Arter affalde Blomsterne hurtigt efter Blomstringen. 6—7. 4.

β, triticea Fr. (H. N. V, 92). Toppen axformigt sammenkneben, med enlige, meget korte Grene.

Paa lignende Voxsteder som den foreg., alm. i Danmark. *β*, paa mere tør Grund end Hovedarten, f. Ex. *Sj. Leersøen!* Birkerød! Sorø! *F. Hofmansgave* (18); *J. Eveldrup* (Dr.)

Anm. De 2 sidstnævnte Arter forekomme mig vel adskilte ved flere væsentlige Kjendetegn, om end enkelte Former kunne være vanskelige at bestemme, hvorfor flere Forfattere ansee dem for at henhøre til een Art. Det fra de unge Blade hentede Mærke, hvorefter disse skulde være flere Gange foldede hos *Glyceria plicata*, (deraf Navnet) har imidlertid ikke viist sig holdbart.

52. *Poa. Rapgræs.*

a. Enaarige, med imod Frugtmodningen nedbøiede Topgrene.

154. *P. annua* L. (Enaarigt R.) H. 111; Drej. n. 99; And. V, 51; F. D. 1686; Rchb. I, tab. 82, fig. 1621; L. Herb. II, 23.

Straaet fladtrykt; *Bladene* kjølformigt sammenlagte, paa tværs bølgede; de øvre *Skedehinder* forlængede, de nedre kortere, afstumpede; *Topgrenene* alm. 2 i hver Halvkrands; *Smaaaxene* 3—7-blomstrede; *Inderavnerne* Nerver tydelige.

4—8" høj, frisk grøn, danner tætte Tuer. De frugtbærende *Topgrene* forekomme undtagelsesviis vandret-udstaaende eller opret-aabne (ikke tilbagebøjede). 4—9 (eller i frostfrie Aar hele Vinteren igjennem).

Paa dyrket Jord, f. Ex. i Haver, paa Veie og Gader et yderst almindeligt Ukrud.

b. Vedvarende, med efter Blomstringen oprette eller udstaaende *Topgrene*.

aa. *Cæspitosæ* Fr. *Rodstokken* uden Udløbere. *Inderavnerne* i *Randen* og paa *Ryggen* duunhaarede, utydeligt (ikke ophøiet) *nervede*.

155. **P. nemoralis** L. (Lund-R.) H. 109; Drej. n. 100; And. IV, 46; F. D. 749 og 750 (*P. palustris*, slet); Rchb. l. c. tab. 86, fig. 1638—43; L. Herb. VII, 129.

Straaet trindt, jævnt; *Bladskederne* kortere end de tilsvarende *Ledstykker*, den øverste kortere end sin *Bladplade*; *Skedehinden* kort, afstumpet; *Toppen* smal, med rue, efter Blomstringen oprette *Grene* (3—5 i de nedre Halvkrandse); *Smaaaxene* 2—5-blomstrede; *Inderavnerne* spidse.

Straaene fine, alm. tueformigt samlede, *Leddene* brune, *Bladpladen* ved *Grunden* tørt. Var. i Henseende til *Smaaaxenes* Form og Antal af Blomster, Farven o. s. v. 7—8. 4.

β , *subuniflora* Rchb. l. c. fig. 1638 (α , vulgaris Koch Syn.) Hele Planten grøn, *Straaene* fine, slappe, *Smaaaxene* 1—2-blomstrede, meget smaae.

γ , *firmita* Gaud. Rchb. l. c. fig. 1643. *Straaet* stivt, *Smaaaxene* 3—5-blomstrede.

Alm. i Skove og Krat, ved Gjærder o. s. v. β , i Skygge, γ , paa solaabne Steder.

156. **P. fertilis** [Host. gram. 3, t. 14] (Stortoppet R.) Drej. n. 101; L. Herb. III, 42; *P. serotina* Ehrh., H. 108;

And. IV, 45; F. D. 2166, H. N. VI, 83; *P. angustifolia* L. Fr. fl. hall. p. 26; Rehb. l. c. fig. 1645—47; *P. palustris* Roth, Schum. p. 32.

Straaet trindt, jævnt; *Bladskederne* ligelange med *Ledstykkerne*, den øverste af lige Længde med sin Plade; *Skedehinden* forlænget; *Toppen* udbredt, med rue, efter Blomstringen oprette *Grene*, (omtrent 5 i Halvkrandsene); *Smaaaxene* 2—5-blomstrede; *Inderavnerne* budte.

Større og mere rigblomstret end foreg., *Straaet* ofte forneden grenet, Bladpladen ved Grunden tørt, *Inderavnerne* i Spidsen brunplettede, ofte violet-anløbne. 7—8. 4.

I fugtige Enge og Moser, sporadisk og ikke almindelig: *Sj.* ved et Kjær S. for Hørsholm! ved Søerne i Rudehegn! Bagsværd, Lunde-
huset (Schum.), Vesterfælle (19); *Loll* Søllested, Stensgaard, Søholt (19); *F.* Æbelø, Hofmangave (1); *Sl.* Oxager i Angel (16). 1*

Anm. *P. adspersa* [Drej. n. 202], som beskrives med »Skeder kortere end Ledstykkerne og Bladpladerne, forlænget Skedehinde, efter Blomstringen udstaaende Topgrene og spidse, tydeligt nervede *Inderavner*«, er neppe nogen særskilt Art, men (efter de Expl. jeg har seet i Drejers Herbarium og den derefter til Fl. dan. af Liebmann tegnede Figur) kun en local Form af foregaaende, hos hvilken *Nerverne* i tørret Tilstand ogsaa ofte træde tydeligt frem.

bb. Subbulbosæ Fr. Flere Straae og golve Bladknipper tæt og tueformigt samlede; ingen Udlobere, Straaene ved Grunden løgformigt opsvulmede, tæt omgivne af de henvisnede Blades Skeder.

157. ***P. bulbosa* L.** (Løgbærende R.) Rehb. l. c. tab. 81, fig. 1619; F. D. 2606; And. V, 50; H. N. II, 77.

Bladene korte, smalt linieformede, med stærkt udviklede *Skeder* og spidse, forlængede *Skedehinder*; *Toppen* kort og sammentrængt, med 1—3 opret-aabne, rue *Grene* i hver Halvkrands; *Smaaaxene* ægformede, 4—6-blomstrede; *Inderavnerne* (i frisk Tilstand utydeligt, tørrede tydeligt) femnervede, paa Ryggen og i Randen duunhaarede, ved Grunden omgivne af lang, kruset Uld.

6—8" høi. Efter A blomstringen hurtigt henvisnende. 5—6. 4.

β, vivipara L., Rehb. l. c. fig. 1620; *Smaaaxene* topspirende

med forlænget-tilspidsede, ved Grunden og i Randen glatte Inderavner.

Hovedarten er ikke funden i Danmark. Var. β , *Bornh.* Klippetien V. for Hammershuus og ved Hammeren (8), Havegjærder ved Rønne (Hjorth), Listed Fiskerleie (Baagøe). *

cc. *Fasciculiferæ* Fr. Rodstokken udskyder golde Bladknipper, men ingen Udlobere, Inderavnerne i Randen glatte, med tydelige (*ophøjede*) Nerver.

158. **P. trivialis** L. (Almindeligt R.) H. 106; Drej. n. 103; F. D. 1685; Rchb. l. c. tab. 89, fig. 1653—54; And. IV, 44; H. N. VII, 92 (var.); L. Herb. IV, 64.

Straaet og *Topgrenene* oventil rue; *Skederne* noget fladtrykte, rue; *Skedehinden* forlænget, spids; *Toppen* aaben, udbredt; *Smaaaxene* ægformede, omtrent treblomstrede; *Inderavnerne* spidse, paa Ryggen forneden randhaarede, ved Grunden omgivne af kruset Uld. 6—7. γ .

β , *multiflora* Rchb. l. c. fig. 1655. Bladene bredere, tilligemed Skederne haarede, Topgrenene 7—9 i de nedre Halvkrandse, Smaaaxene femblomstrede.

I Grøfter, paa Enge og andre fugtige Steder alm. β , paa frodig Havejord mellem Buske ved V. Skjerninge i Fyen!

159. **P. sudetica** [Hänke Sudet. 120] (Sudetisk R.) H. II, 120; F. D. 1924; P. (*sudetica*)* *remota* Fr. nov. ed. 2 p. 11; H. N. VI, 83; And. IV, 43; Lge. Haandb. 2 Udg. S. 81; P. *hybrida* (Gaud.?) Koch Syn. ed. 1, Rchb. l. c. tab. 90, fig. 1656.

Bladskederne tveægget-fladtrykte, de øvre rue; *Bladene* fra bred Basis efterhaanden smalere og langt tilspidsede, kjølformigt sammenlagte, med kappeformigt sammendragen Spidse; *Skedehinden* kort; *Topgrenene* rue, lange og ved Grunden nøgne, i Spidsen nikkende, udbredte (alm. 5 i de nedre Halvkrandse); *Smaaaxene* ægformet-elliptiske, 3—5-blomstrede; *Inderavnerne* lancetformede, spidse, glatte, ved Grunden omgivne af løs Uld.

2—4' høi. Let kjendelig fra foreg. ved de haarfine, et langt Stykke nøgne Topgrene, tveæggede Bladskeder o. s. v. Ved længere

Stængelblade, en større, pyramideformet Top med længere Ledstykker, mindre Smaaax og finere, længere, tilsidst nikkende Topgrene er den forskjellig fra *P. Chaixi* Vill. Fl. delph. p. 7; (*P. sudetica* Schrad., Koch etc., non Hänke, Rchb. l. c. fig. 1657). Jeg finder ingen Kjendtegn, hvorved vore Expl. afvige fra Beskr. af *P. hybrida* Gaud., men da jeg hverken har seet Afbildning eller Expl. af denne Art, og da den hos os fundne Form er aldeles lig den i Sverige og Norge forekommende Art, som efter Fries (bot. not. 1858 p. 130) er den ægte *P. sudetica* Hänke, har jeg beholdt dette Navn. For den sydeuropæiske Art, som af de fleste Forff. benævnes *P. sudetica*, vil det da være rigtigst at gjenoptage Villars's i 1785 givne Navn *P. Chaixi* (cf. Bull. Soc. bot. Fr. X, 77). 6—7.

I fugtige Skove: *Sj.* ved Rungsted (11), Lunden ved Flakkebjerg pr. Skjelskør (Nielsen); *J.* Rydhave ved Holstebro (Schmidt); andre Voxesteder ere mig hidtil ikke bekendte (Holsteen N.). !*

dd. Stolonifera Fr. Rodstokken krybende, med forlængede Udløbere.

160. *P. pratensis* L. (Eng-R.) H. 107; Drej. n. 104; Rchb. l. c. tab. 88, fig. 1648—52; And. IV, 40; L. Herb. VII, 128; *P. trivialis* F. D. 1444.

Straaet trindt; tilligemed *Bladskederne* jævnt; *Skedehinden* kort afskaaren; *Toppen* udbredt, alsidig, med 3—5 Grene i de nedre Halvkrandse; *Smaaaxene* ægformede; 3—5-blomstrede; *Inderavnerne* tydeligt femnervede, med kruset Uld paa Ryggen og ved Grunden. 5—6. 4.

Aum. Var. betydeligt paa forskellige Voxesteder i Henseende til Bladenes Brede, Smaaaxenes Størrelse og Farve, Plantens Høide o. s. v. De meest afvigende Former ere:

β, humilis Rchb. l. c. fig. 1651; H. N. IX, 91. Alle Bladene korte og brede, Smaaaxene violet anløbne og tilligemed hele Planten af en blaagrøn Farve.

γ, angustifolia Rchb. l. c. fig. 1648. Rodbladene meget lange, traadsmale og sammenrullede, Plantens Farve grøn.

Paa Enge, Græsmarker og ved Veie meget alm. *β*, paa tør (leret eller gruset) Jordbund; *γ*, paa Bakker og aabne Steder i Skove.

* 161. *P. costata* [Schum. enum. p. 38] (Klapribbet R.) Drej. n. 105; F. D. 2402.

Straaet trindt, tilligemed *Bladskederne* jævnt; *Skedehinden* kort afskaaren; *Toppen* kort, efter Blomstringen sammenkneben, med meget korte *Grene* (alm. 2 i de nedre Halvkrandse); *Smaaaxene* ægformet-elliptiske, omtrent treblomstrede; *Yderavnerne* og *Inderavnerne* ophøiet-nervede, tilspidsede og imod Spidsen indbøiede.

Omtrent 1' høi, blaagrøn. 6—7. 4.

Paa Strandbredden mellem Springforbi og Papirmøllen (Schum.) gjenfunden af G. Jensen 1843; en Skov ved Bagsværd! Nyrup Hegn ved Helsingør (Heiberg), Hellebæk!

Anm. Hornem. anseer den for en Var. af følgende, fra hvilken den dog er vel adskilt; langt nærmere staaer den ved foreg., til hvilken den af Fries henføres, men hvorfra den dog ved de angivne Kjendetegn og et eiendommeligt Habitus er ikke lidet forskjellig.

162. **P. compressa** L. (Fladstraaet R.) H. 110; Drej. n. 106; F. D. 742; Rehb. l. c. tab. 85, fig. 1636; And. IV, 42; H. N. XIII, 98, L. Herb. I, 1.

Straaet fladtrykt, ved Ledene knæbøiet, jævnt; *Skedehinden* kort, afrundet; *Toppen* noget ensidigt sammentrykt med 2—5 efter Blomstringen tiltrykte *Grene* i de nedre Halvkrandse; *Smaaaxene* elliptiske, 3—7-blomstrede, med tæt taglagte Blomster; *Inderavnerne* budte, med utydelige Nerver, paa Ryggen og i Randen duunhaarede.

$\frac{1}{2}$ —1' høi, mat- og blaaagtig-grøn; *Inderavnerne* i Spidsen brunplettede. 7—8. 4.

Paa tørre, især lerede Marker, forekommer i alle danske Provinde, hyppigst paa *Lolland-Falster*, sjeldnere i *Jylland*.

53. **Festuca. Svingel.**

a. *Ovinæ* Fr. Rodbladene børsteformigt sammenrullede, *Skedehinden* tørt.

163. **F. ovina** L. (Faare-S.) H. 115; Drej. n. 118; F. D. 2462; Rehb. I, tab. 61, fig. 1530; And. III, 27; H. N. VIII, 93; L. Herb. III, 43.

Roden fintrævlet; *Straaene* talrige, tueformigt samlede, jævne og glatte, foroven firekantede; alle *Bladene* traadformigt sammenrullede; *Toppen* smal, ensidigt sammenkneben, med

korte, under Blomstringen udspærrede eller opret-aabne *Grene*; *Smaaaxene* 4—6-blomstrede; *Blomsterne* stakbærende. 5—6. 4.

β, *tenuifolia* (F. *tenuifolia* Sibth.; Rehb. l. c. fig. 1532).
Bladene frisk grønne, haarfine, Stakken kort eller 0.

γ, *glauca* Fr. nov. p. 13. Bladene blaagraae.

Paa Bakker, Lyngheder og andre magre Steder alm., *β*, i Skove,
γ, paa aabne Steder med Hovedarten.

Ann. Var. *γ*, maa ikke forvexles med *F. glauca* Lam. (Fr. nov. p. 14, mant. 3, p. 6; H. N. V, 96), en Art, som Fries (skjøndt ikke uden Tvivl) adskiller fra foreg. ved Straaene, som ikke ere samlede i en Tue, men tilligemed de samme omgivende Blade og brede Bladskeder adskilte i flere Smaatuer. Om dens Forekomst i vor Flora kan jeg Intet angive med Sikkerhed.

164. **F. duriuscula** L. [Fr. nov. p. 12; mant. 3 p. 9]
(Stivbladet S.) H. 117; Rehb. l. c. tab. 62, fig. 1538; And.
III, 26; H. N. VIII, 94.

Roden trævlet; *Straaene* talrige, tueformigt samlede, trinde;
Stængelbladene smale, rendede (snart indrullede): *Toppen* opret,
under Blomstringen udspærret, noget ensidig; *Smaaaxene* 3—5-
blomstrede, stakbærende; den *nedre Inderavnes* Nerver utydelige.

Straaene forneden tæt omgivne af de visne Bladskeder. Det
nederste Stængelblads Skede ofte haaret. *Smaaaxene* større end hos
foreg., rødligt anløbne. 6. 4.

β, *cæsia* Fr., *F. rubra* — *cæsia* H. N. V, 98; med blaa-
graae, tykke og haarde, ofte krummede Blade.

Paa Enge og Græsmarker, ikke sjelden.

Ann. Staar i Kjendetegn og Udseende midt imellem foreg. og
følg. Art; Voxemaaden og Toppens Form ligner meest hiin, Bladene,
Straaer og *Smaaaxenes* Størrelse meest denne. Mellemløbere ere ofte
vanskelige at bestemme, men de typiske Former synes vel adskilte.

165. **F. rubra** L. (Rød S.) H. 118; Drej. n. 119 (til-
deels); Rehb. l. c. tab. 67, fig. 1557; And. III, 25; H. N.
XII, 92 (var.); L. Herb. VI, 102.

Rodstokken udskyder Udløbere; *Straaene* trinde, med flade
Stængelblade, af hvilke det øvre er langt kortere end Ledstykket

ovenfor; *Toppen* under Blomstringen udbredt, næsten alsidig, med 5—7-blomstrede, (hos Hovedarten) glatte *Smaaax*; *den nedre Inderavne* dobbelt saa lang som den i sammes Spidse befæstede Stak; dens Nerver tydelige.

Straaene paa Grund af den krybende Rodstok fjernede fra hinanden; Toppen ofte lidet nikkende, var. med rødlige eller blegere *Smaaax*. 6—7.

α, *genuina*, Udløberne underjordiske, alle Bladene flade, Toppen rigt blomstret, udbredt.

β, *dumetorum* (L.) Fr. mant. 3 p. 7; H. N. V, 97; Rodstokken forgrenet i flere, overjordiske Rodskud, Stængelbladene flade og rendede eller indrullede, Toppen smal, under Blomstringen aaben.

1, — *nemorum* Fr., høi og bleggrøn, Toppen nikkende. (F. *nemorum* Leyss., Rechb. 1558)?

2, — *scopulorum* Fr. Lavere, blaagrøn, Toppen opret. (F. *glauca* F. D. 1628.)*

Paa Enge, ved Veigrøfter o. s. v., meget alm. *β*, (1) i Skove og paa Skovenge, (2) Klipper ved Stranden mellem Allinge og Sandvig paa Bornholm (H).

* 166. **F. arenaria** [Osbeck i Retz. Suppl. 1 fl. Scand. p. 4] (Sand-S.) F. *hirsuta* F. D. 1627; F. *sabulicola* L. Duf.; F. *dumetorum* Rafn I, 349; F. *rubra* *β*, *arenaria* Fr. fl. Hall. p. 28; Drej. n. 119 *γ*; Lge. Haandb. 1 Udg. p. 77.

Rodstokken krybende, forgrenet i lange og stærke Udløbere; de nedre *Bladskeder* store, bugede, violetbrune; *Straaene*

*) Jeg har søgt i Korthed at gjengive de vigtigste af Prof. Fries angivne Kjendetegn mellem de ovenstaaende, i høi Grad foranderlige Arter (og Former) som vistnok alle forekomme i vor Flora, men hvis rette Begrændsning jeg hidtil forgjæves har søgt i alle enkelte Tilfælde at erkjende. En nøiagtig Undersøgelse af levende Planter og Iagttagelse af de analoge Udviklingsrækker, under hvilke enhver Art efter Voxestedet fremtræder, maa højlig anbefales de danske Botanikere, og den bedste Veiledning hertil vil findes indeholdt i den ovenanførte berømte Forfatters kritiske Behandling af disse Arter.

knæbøiede; *Bladene* tilsidst indrullede, det øvre Stængelblad næsten ligelangt med Ledstykket ovenfor, *Toppen* noget ensidig; *Smaaaxene* større end hos foreg., graaagtige, oftest tæt duunhaarede, 7—9 blomstrede, *den nedre Inderavne* svagt nervet; forøvrigt som foreg. 6—7. 4.

Sandige Strandbredder og Klitter: hyppig i det nordlige og vestlige *Jylland* (H., Drej.!) *Bornh.* ved Rønne (8), Boderne! *Sj.* Hornbæks Plantage!

b. *Bovinæ* Fr. Alle *Bladene* flade, *Skedehinden* afstumpet eller aflang, (ikke toøret).

aa. *Stakken* ret, kortere end *Inderavnen* (eller 0).

167. **F. pratensis** [Huds. fl. angl. ed. I, p. 37] (Eng.-S.) H. 119; Drej. n. 121; F. D. 1323 (slet, hører snarere til følg.); Rchb. l. c. tab. 80, fig. 1565; And. II, 24; L. Herb. V, 86; F. elatior L. (tildeels).

Rodstokken udskyder opstigende *Straae* og *Bladknipper*; *Bladene* bredt linieformede, med meget kort *Skedehinde*: *Toppen* noget ensidig, sammenkneben, under Blomstringen aaben, med 2 *Grene* fra hver Halvkrands, den ene længere, med flere, den anden meget kort, med kun et enkelt *Smaaax*; *Smaaaxene* linie-lancetformede, 5—10-blomstrede; *den nedre Inderavne* jævn, stakløs eller med en kort, ret *Stak*; *Frugtknuden* glat.

1—2' høi. 6—7. 4.

β , *pseudololiacea* Fr. (F. loliacea F. D. 1925; Drej. n. 120; Rchb. l. c. fig. 1566). *Grenene* korte, med faa *Smaaax*, de øvre næsten siddende.

Paa Enge, ved Randen af Veie o. s. v., meget alm., β , en paa mager Jordbund ikke sjældent forekommende Form (som ikke maa forvexles med F. loliacea Huds. α : *Brachypodium* Fr.).

168. **F. littorea** Wahlenb. [Bromus Retz. prodr.] (Strand.-S.) H. N. IX, 94; F. arundinacea Schreb., Drej. n. 122; And. II, 23; F. D. 2163; Rchb. l. c. fig. 1568; L. Herb. VI, 103; F. elatior Sm., H. 119.

Rodstokken udskyder krybende Udløbere; *Bladene* bredt-linieformede, med meget kort *Skedehinde*; *Toppen* alsidig, i

Spidsen nikkende, med parvise, under og efter Blomstringen udstaaende, næsten ligelange *Grene*, begge med flere, æglancetformede, 4—5-blomstrede *Smaaax*; *den nedre Inderavne* jævn, stakløs eller med en kort, ret Stak; *Frugtknuden* glat.

2—5' høi. *Smaaaxene* ofte brunnagtige; var. med en Stak halvt saa lang som *Inderavnen* (β , *pauciflora* Hartm.) 6—8. 4.

Paa Strandenge og Skrænter i Nærheden af Havet, sporadisk og sjældnere end foreg., findes sjældent paa Enge inde i Landet (Raa-vaddam! Lundehuset! Flakkebjerg ved Skjelskør (Nielsen). β , Marselisborg ved Aarhus!

Ann. Af de talrige Navne, som ere blevne denne Plante tildeel, forekommer det valgte mig heldigst for at betegne dens Forskjellighed i Forekomst fra foreg. Det Schreberske Navn er vel ældre, men har af Liljeblad været anvendt paa *Fluminia arundinacea*.

169. **F. silvatica** [Vill. delph. II, 105] (Skov-S.) H. 120; Rchb. I, tab. 68, fig. 1562; And. II, 22; H. N. IX, 95; L. Herb. IV, 65; *Poa silvatica* Poll., F. D. 1145.

Straae og *Bladknipper* stivt oprette, forneden beklædte med bladløse Skeder; *Bladene* brede; langt tilspidsede, paa Overfladen blegere, paa Underfladen mørkere grønne, glatte, i Randen rue; *Skedehinden* forlænget; *Toppen* opret, med udspærrede *Grene* (2—4 i de nedre Halvkrandse); *Smaaaxene* 3—5-blomstrede; *den nedre Inderavne* tilspidset, stakløs, kort-haaret-rue; *Frugtknuden* i Spidsen haaret.

2—3' høi. De bladløse Skeder bugformigt oppustede, glindsende, glatte, de bladbærende punkteret-rue. 6—7. (Blomsterne meget hurtigt affaldende). 4.

I Skove: *Sj.* »den dybe Rende» i Hæsedø Skov ved Gissselfeld! forøvrigt kun bemærket paa *Halvøen*, især i de østlige Skove: *J.* Saltum 2 Mile fra Silkeborg (16), Kollerup Skov (2), Veile! *Sl.* hyppigere, f. Ex. Tørning Skov ved Haderslev (Grønlund), Hjelm ved Aabenraa! Kobbermølleskoven ved Flensborg! Dyrehaven ved Slesvig (20).

bb. *Stakken* bølget, dobbelt saa lang som *Inderavnen*.

170. **F. gigantea** [Vill. delph. II, 110] (Kjæmpe-S.) Drej. n. 125; And. II, 21; L. Herb. VI, 105; *Bromus* L., H. 126; F. D. 1630; Rchb. I, tab. 76, fig. 1602.

Bladskederne glatte, sribede, foroven tilligemed de brede, mørkgrønne *Blades* Rand og Overflade lidet rue; *Skedehinden* meget kort; *Toppen* alsidigt udbredt, med lange, i Spidsen nikkende, under og efter Blomstringen udspærrede *Grene*; *Smaaaxene* 5—8-blomstrede; *Stakken* befæstet lidet nedenfor Inderavnerens Spidse; *Frugtknuden* glat.

3—4' høi, næsten aldeles glat. Blomsterne korthaaret-rue, Bladene ved Grunden toørede. Paa Grund af Stakkens Tilhæftning danner denne Art et Mellemlid til Slægten *Schedonorus*. 7. 4.

β, *triflora* (B. triflorus L., F. D. 440). *Smaaaxene* tre-blomstrede.

Alm. i Skove og Krat, især paa Muldjord eller fugtig Grund, *β*, med Hovedarten, sjeldnere.

54. *Vulpia*. Væselhale.

171. *V. sciuroides* [Gmel. Bad. I, p. 8] (Langstakket V.) Drej. n. 127; *Festuca* Roth, And. III, 28; H. N. XIII, 93; *F. bromoides* Sm., H. 116; F. D. 1445; *Vulpia bromoides* Link., Rchb. I, tab. 60, fig. 1529.

Straaene tueformigt samlede, ingen golde Bladknipper; *Bladene* smale, det øvre fjernet fra Blomsterstanden; *Skedehinden* toøret; *Toppen* ensidig, axformigt sammenkneben, opret; *Grenene* under Blomstringen opret-aabne, de nedre $\frac{1}{2}$ —mange Gange kortere end *Toppen*; *den øvre Yderavne* langt tilspidset; *Inderavnerne* kortere end *Stakken*.

4—12" høi. De nedre *Grene* ofte meget korte, med eet enkelt *Smaaax*. 6—7. ☉.

Paa tørre, saavel sandige som lerede Marker og Bakker, sporadisk og ikke almindelig, men bemærket i alle Provindser, hyppigst paa *Bornholm*. ☼

Anm. *V. Myurus* Gmel. (*V. pseudomyrus* Willem., Rchb. I. c. fig. 1525), som er meget nær beslægtet med foreg. og adskilles ved en mere forlænget, nikkende Top, tæt omskudet af det øvre Blad, er funden i Holsteen (Web., N.), og muligviis høre ogsaa nogle af de danske Voxesteder herhid. Den maa søges paa lignende Localiteter som foreg.

55. Bromus. Heire.

a. Den nedre Inderavne ligelang med den øvre, længere end den bølgede Stak, Blomsterne imod Modningen i Randen indrullede (og derved fjernede fra hinanden).

172. **B. secalinus** L. (Almindelig H.) H. 121; Drej. n. 108; F. D. 293 (*B. arvensis*) og 1446 (?), Rchb. I, tab. 75, fig. 1600; And. III, 35; L. Herb. VII, 132.

Straa og *Bladskeder* glatte; *Bladene* paa Overfladen haarede og rue; *Topgrenene* under Blomstringen udbredte; efter samme nikkende; *Smaaaxene* aflange, glatte.

Smaaaxene grønne, var. i Henseende til Størrelse og Stakkens Længde (ofte aldeles stakløse). 6—7. ☺.

Almindeligt Ukrud i Vintersæden.

Anm. F. D. 1446 er ikke heldig, og det er endogsaa tvivlsomt om den hører til denne Art eller om den ikke snarere skal forestille den følgende. Til *B. commutatus*, hvortil Horn. henfører den, hører den neppe.

b. Den nedre Inderavne ligelang med den øvre, kortere end den rette Stak, Blomsterne imod Modenheden taglagte.

173. **B. arvensis** L. (Ager-H.) H. 124; Drej. n. 111; F. D. 2527; And. III, 34; Rchb. I, tab. 74, fig. 1587; H. N. VI, 88; L. Herb. I, 7.

Bladene paa Underfladen rue, tilligemed de nedre *Skeder* haarede; *Toppen* udbredt, efter Afblomstringen nikkende, med lange og slappe *Grene*; *Smaaaxene* fladtrykte; lancetformede, glatte, med opret-aabne *Blomster*; den nedre *Inderavne* ligelang med Afstanden fra sammes Spidse til Spidsen af den tredie Blomst paa samme Side.

Smaaaxene alm. brunnviolette med hvid hindeagtig Rand. 6—7. ☺.

Paa dyrkede Marker, ved Veie og Grøfter, sporadisk og ikke alm., men bemærket i alle Provindser og som det synes hyppigere i de senere Aar, da den paa enkelte Steder har været dyrket (meest udbredt har jeg fundet den paa Lolland). [*

- c. Den nedre Inderavne længere end den øvre, ligelang med Stakken, (forøvrigt som b.)

aa. *Toppen efter Blomstringen nikkende.*

174. **B. commutatus** [Schrad. fl. germ. I, 353] Mangelblomstret H.) H. 123 (undt. Cit. af F. D.); Drej. n. 109; F. D. 2526; And. IV, 37; Rchb. l. c. fig. 1589; L. Herb. I', 5; Br. pratensis (Ehrh.) Fr. mant. 3, p. 9; H. N. VI, 89.

Bladene og de nedre *Skeder* haarede; *Topgrenene* slappe; *Smaaaxene* 9—11-blomstrede, lancetformede, trindt-fladtrykte, glatte, ued taglagt-tiltrykte *Blomster*; *den nedre Inderavne* ligelang med Afstanden fra sammes Spidse til Spidsen af den tredje Blomst, dens Rand danner ovenfor Midten en stump Vinkel.

Var. i Henseende til Topgrenenes Antal og Længde (alm. ere disse dog meget kortere end hos foreg.). *Smaaaxene* almindelig matgrønne. 5—6. ☉.

Paa tørre Steder, f. Ex. Diger, Agre, funden i alle de danske Provindser, men sporadisk. (Da jeg intetsteds har bemærket den paa Enge, hvor derimod den følgende almindeligst forekommer, synes Ehrharts Navn for Danmarks Vedkommende at være mindre passende og at kunne bevirke Forvexling).

bb. *Toppen efter Blomstringen opret, sammentrængt.*

175. **B. racemosus** L. (Klaseblomstret H.) H. 123; F. D. 2644; Rchb. l. c. fig. 1590; And. IV, 36; H. N. I, 79; L. Herb. II, 24.

Bladene og de nedre *Skeder* haarede; *Toppen* klaseformet, med korte, under Blomstringen aabne *Grene*; *Smaaaxene* glatte, æg-lancetformede, noget trinde, 7—9-blomstrede med taglagt-tiltrykte *Blomster*; *den nedre Inderavne* ligelang med Afstanden fra sammes Spidse til Spidsen af den fjerde Blomst paa samme Side, dens Rand afrundet (danner en Bue).

Straaene ofte rødagtigt anløbne; Inderavnerne i Spidsen tilligemed Stakken alm. brune. 6. ☉.

Paa fugtige Enge, ikke alm., men bemærket i alle Provindser.

176. **B. mollis** L. (Blød H.) H. 122; Drej. n. 110; F. D. 1324; Rehb. l. c. fig. 1591—92; And. IV, 38; H. N. VII, 96; L. Herb. I, 6.

Straaet opret; *Blade* og *Skeder* duunhaarede; *Toppen* under Blomstringen udbredt; *Smaaaxene* haarede, glandsløse, æglancetformede, 7—9-blomstrede, med taglagt-tiltrykte *Blomster*; *den nedre Inderavne* ligelang med Afstanden fra sammes Spidse til Spidsen af den fjerde Blomst paa samme Side, dens Rand danner ovenfor Midten en stump Vinkel.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi. Var. i Henseende til Topgrenenes Længde, *Straaets* og *Smaaaxenes* Beklædning. 6—7. ☉.

β , *lejostachys* M. & K.; H. N. VIII, 95. *Smaaaxene* glatte eller lidet rue af meget korte Haar.

γ , *pygmæus* (B. nanus Weig.) Dværgform med alm. 1 enkelt Ax.

Paa Græsmarker, høie Enge, ved Veie o. s. v. meget alm. β , mellem Hovedarten, sjældnere: *Sj.* Jagtveien ved Kbh.! Sorø! Kjøge! *F.* Nyborg (Lund); *J.* Livø i Limfjorden (8), Randers (7); γ , paa mager Jordbund.

177. **B. hordeaceus** L. [Wahlenb. fl. ups. p. 40] (Strand-H.) Fr. mant. 3, p. 11; And. IV, 39; H. N. VII, 97; B. arenarius Thomine.

Straaene tæt samlede i Tuer, oftest nedliggende, 2—6" høie; *Toppen* under Blomstringen axformigt sammenkneben, med meget korte *Grene*; *Smaaaxene* elliptiske, glatte, glindsende, forøvrigt som foreg. 5—6. ☉.

Paa Strandenge, Overdrev, ved Søbredder, mangler neppe i nogen af de danske Provindser, især hyppig langs Roeskilde Fjord, paa flere Steder ved Øresundet (f. Ex. Saltholm, Kjøge Strand!), langs Sydvestkysten af Lolland (19), langs Storebelt paa Østkysten af Fyen og paa Smaaøerne S. for Fyen (12), samt paa Bovbjerg i *Jyll.*

56. Schedonorus*). Heiresvingel.

a. *Vulpioides* Fr. Smaaaxene efter Blomstringen bredest mod Spidsen, den øvre Inderavne i Randen kamformigt stivhaaret. ☉ eller ☺.

178. *S. sterilis* [Fr. Bot. not. 1843, p. 131] (Gold H.) And. III, 32; Bromus L., H. 127; Drej. n. 107; F. D. 1325; Rchb. I, tab. 73, fig. 1583; H. N. I, 80; L. Herb. IV, 66.

Straet glat; *Bladene* og de nedre *Skeder* fint- og tiltrykt-duunhaarede; *Toppen* alsidigt udbredt, med lange, i Spidsen nikkende *Grene*; *Smaaaxene* linie-lancetformede, rue, med en *Stak* som er meget længere end *Inderavnen*.

1—2' høi. 5—8. ☉.

Ved Byer, Gjærder og Mure ikke alm., men bemærket i alle Provindser og, hvor den forekommer (især ved Kjøbstæder), ofte i stor Mængde; hyppigere paa Øerne end paa Halvøen.

179. *S. tectorum* [Fr. l. c.] (Tag-H.) And. III, 33; Bromus L., H. 128; F. D. 1806; Rchb. l. c. fig. 1582; H. N. XI, 91.

Straet foroven, ligesom *Blade* og *Skeder*, duunhaaret; *Toppen* noget ensidig, nikkende, med slappe, nedhængende *Grene*; *Smaaaxene* linieformede, tæt duunhaarede, med en *Stak* omtrent af *Inderavnen*s Længde.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi. Lavere og finere end foreg., Smaaaxene mindre, ofte rødtligt anløbne. 6—8. ☉.

Den anføres som dansk allerede af Schum. og Hornem., dog uden Angivelse af Voxesteder. Den er meget sjelden her i Landet paa lignende Steder som foreg., og de eneste mig bekendte danske Voxesteder ere: *Sj.* Storehedinge (Visby)! *F.* Hofmangave (A. Meyer), Faaborg (12). !*

*) Navnet Schedonorus skyldes Pal. Beauv. (Agrost. p. 99), dets her antagne Begrændsning Fries. Orthographien Schenodorus (hidrørende fra en Trykfeil i Registret hos Beauv.) og Schoenodorus (sic!) er falsk.

b. *Festuceei* Fr. Smaaaxene bredest i Midten, den øvre Inderavne i Randen ru af meget korte Børster. 4.

180. *S. asper* [Fr. l. c.] (Ru H.) And. III, 30; *Bromus* Murr., H. 126; F. D. 1382; *Rehb.* I, tab. 76, fig. 1603; H. N. IV, 97; *Festuca aspera* M. K., *Drej.* n. 123.

Bladene paa begge Flader rue, tilligemed de nedre *Bladskeder* stivhaarede (Haarene paa *Bladskederne* nedadventte), de øvre *Skeder* glatte; *Toppen* med lange, tiltrykte *Grene* (alm. 2—4 i de nedre Halvkrandse); *Smaaaxene* 7—10-blomstrede; rue; den øvre *Yderavne* langs *Sidenerverne* langhaaret, den nedre *Inderavne* haaret til *Spidsen*, af *Stakkens* Længde eller lidet længere.

3—5' høit og stivt Græs. 6—7.

I Skove, især paa fugtig Grund; ikke sjelden paa *Halvoens* Østkyst, i *Fyen*, paa *Øerne* og i *Vest-Sjælland*, sjeldnere mod Ø. (f. Ex. Vedbæk! *Ordruks* Mose (H.), *Dronninggaard* (Dr.), *Jonstrup Vang* (15), *Boserup*!)

* 181. *S. serotinus* Rostr. (Sildigblomstrende H.) *Bromus serotinus* Beneken, *Bot. Zeit.* 1845, p. 724.

Alle *Bladskederne* langhaarede; *Toppen* nikkende, de nedre *Topgrene* parviis stillede, udsprede; den øvre *Yderavne* kortere og mindre tilspidset, glat; den nedre *Inderavne* i *Spidsen* glat, forøvrigt som foreg., men blomstrer 2 à 3 Uger senere. 4.

Tenmelig almindelig i Skove paa *Lolland* (19)! Findes sandsynligviis ogsaa i andre Egne af Landet, men har hidtil ikke været sondret fra foreg. og maa derfor nærmere iagttages.

182. *S. erectus* [Fr. l. c.] (Opret H.) And. III, 31; *Bromus* Huds., H. 125; F. D. 1383; *Rehb.* I, tab. 77, fig. 1604; H. N. IX, 96; *Festuca* Wallr., *Drej.* n. 124; L. Herb. VI, 104.

De nedre *Skeder* haarede, med udstaaende Haar; *Bladene* randhaarede; *Toppen* opret, alsidig, med kortere, opret-aabne, efter Afbloomstringen tiltrykte *Grene* (alm. 3—4 i de nedre Halvkrandse); *Smaaaxene* 5—9-blomstrede; den nedre *Inderavne* 2—3 Gange længere end *Stakken*.

1 $\frac{1}{2}$ —3' høi. Fra Rodstokken udgaar flere golde Bladknipper. Bladene smalere end hos foreg., og kun paa Overfladen rue. 6.

Paa tørre Steder, f. Ex. ved Randen af Marker og Veie sjelden: *Sj.* Birkerød (Schum.), Dronninggaard, Lundehuset (H.), Jægersborg Allee ved Bernstorff! Strandmarkerne udfor Charlottenlund (Dr.). $\overline{3}$

183. *S. inermis* [Fr. l. c.] (Stakløs H.) And. III, 29; *Bromus inermis* Leyss.; H. I, 125; Rehb. I, tab. 70, fig. 1569—70; H. N. VII, 94; *Festuca speciosa* F. D. 1805.

Bladene bredere end hos foreg., tilligemed Bladskederne glatte; krybende *Udløbere* fra Rodstokken; *Toppen* opret, alsidig, med fine, efter Afblomstringen udstaaende Grene (alm. 5—7 i de nedre Halvkrandse); *Smaaaxene* lancetformede, 6—10-blomstrede; *den nedre Inderavne* stakløs eller med en kort Stak (mange Gange kortere end Inderavnen).

1—1 $\frac{1}{2}$ ' høi. 7—8.

Enge og Gjærder mellem Ballastbroen og Kielseng paa Sydsiden af Flensborg Fjord! $\overline{3}$

57. *Dactylis*. Hundegræs.

184. *D. glomerata* L. (Hvas H.) H. 113; Drej. n. 126; F. D. 743; Rehb. I, tab. 59, fig. 1523; And. II, 20; L. Herb. V, 85.

Rodstokken sammentrængt, med Bladknipper, men uden Udløbere; *Bladene* rendede, rue; *Skedehinden* lang, toffiget; *Toppen* ensidig; med under Blomstringen udspærrede Grene og nøgleformigt sammenhobede *Smaaax*.

6—7. 4. Forekommer efter det forskjellige Voxested under flere afvigende Former:

β , *abbreviata* Drej. (*D. abbreviata* Bernh., Rehb. l. c. fig. 1522). Topgrenene meget korte, fra Grunden af besatte med 5—7-blomstrede *Smaaax*.

γ , *lobata* Drej. Topgrenene ved Grunden et langt Stykke nøgne, *Smaaaxene* omtrent treblomstrede, Inderavnerne paa Ryggen svagt rue eller næsten jævne.

Paa Græsmarker, ved Gjærder o. s. v. meget alm. β , paa tørre og solaabne Steder, f. Ex. J. Strandbredder N. for Aarhus; *F.* Øxnebjerg

ved Svendborg! *Langelands* Østkyst (19); *Loll.* Bredfjed i Rødby Fjord (14); *Falst.* Grønsund, Ulsløv Strand (Koch); *γ*, i Skove: *Sj.* Skoven ved Kongens Møller (27), Alindelille Fredskov! Boserup, Sorgenfri (20), Sparresholm (Lund); *Møens* Klinteskov! *Falst.* alm. (Koch); *Loll.* Kyllingskoven ved Juellinge (19); *J.* Haraldslund! *Sl.* Nyværk ved Slesvig!

58. *Cynosurus*. Kamgræs.

185. *C. cristatus* L. (Almindelig K.) H. 114; Drej. n. 128; F. D. 238; Reh. I, tab. 7, fig. 1351—52; And. II, 19; L. Herb. VII, 134.

Dusken linieformet, opret (1—2" lang), ensidig; *Nøglerne* afvejlende, meget kortstilkede; *Yder-* og *Inderavnerne* tilspidsede i en Braad; *Skedehinden* kort afskaaren. 6. 4.

Paa Enge, Græsmarker og ved Randen af Veie alm.

III. *Trigynia*.

59. *Holosteum*. Spidsgab.

186. *H. umbellatum* L. (Skjærmblofstret S.) H. 143; Drej. n. 145; F. D. 1204; Reh. l. c. V, fig. 4901; H. N. I, 40.

Bladene modsatte, lancetformede eller elliptiske, spidse, glatte; *Blomsterne* i Skjærm; *Blomsterstilkene* efter Afblomstringen nedhængende.

Stængelen oventil klæbrig. Kronbladene hvide. Ligner en *Cerastium*. 3—5. ☉.

Paa tørre Marker, Steengjærder, ikke almindelig: *Sj.* et Tanggjærde ved Sophienberg (21), Hørsholm (Dr.), Frydenlund, Dronninggaard, Sorgenfri (H.), Aagerup (14), Ulvedstrup ved Roeskilde (8); paa *Moen* ikke sjelden; Baagø; *Falst.* ved Moseby og Veiringe (14); *Loll.* Østofte (H.); *Bornh.* paa Skrænterne fra Pythuset til Arnager (20). *

4^{de} Klasse. Tetrandria (Firehannede).

1. Orden. Monogynia (Enhunnede).

A. Blomsterdækket dobbelt.

a. Kronen sambladet.

aa. Frugten undersædig.

α. Blomsterne ordnede til en Blomsterkurv, Frugten en med en dobbelt Fnok*) beklædt Skalfrugt. Bladene modsatte.

(1—4. N. F. Dipsacææ).

αα. Blomsterleiet beklædt med Børster.

1. **Knautia** L. (Coulter). Den ydre Fnok utydeligt fire-tandet, den indre mange- (8—10-) straalet; Kronen firedeelt; Skalfrugten sammentrykt, med 4 skarpe Kanter, uden Furer, men med 4 svage Gruber foroven.

ββ. Blomsterleiet beklædt med Skjæl (Avner).

2. **Scabiosa** L. Den ydre Fnok hindeagtig, udeelt, med tandet Rand, den indre femstraalet; Kronen femdeelt; Skalfrugten valseformet, furet.

3. **Succisa** M. & K. Den ydre Fnok firekløvet, kort, urteagtig, den indre femstraalet; Kronen firedeelt; Skalfrugten furet.

4. **Dipsacus** L. Kronen firedeelt; den ydre Fnok utydelig, hindeagtig, den indre hindeagtig, affaldende; Skalfrugten firekantet, furet (Avnerne stikkende, Blomsterleiet kegleformet).

β, Frugt todelelig Spaltefrugt (Skalfr. eller Steenfrugter) uden Fnok eller beklædte med en enkelt Bægerrand. Bladene krandsstillede.

(5—8. N. F. Rubiaceæ a, Stellatæ).

5. **Sherardia** L. Kronen tragtformet, (violet); Skalfrugten beklædt af et sextandet Bæger.

6. **Asperula** L. Kronen tragtformet (hvid); Bægerranden utydelig; Skalfrugt.

*) Den indre Fnok hos Planterne i denne Afdeling er dannet af det egenlige (oversædige) Bæger, den ydre af et Yderbæger.

7. **Galium** L. Kronen hjulformet (hvid eller guul), Bægeranden utydelig; Skalfrugt.

8. **Rúbia** L. Kronen hjulformet (grønguul); Bægerranden utydelig; Frugterne saftige; steenfrugtagtige.

bb. Frugten fri.

9. **Plantago** L. Blomsterstanden axformet; Bægeret firedeelt; Kronen regelm. firefliget; Kravens Flige tilbagebøiede; Støvdragerne afvejlende med Kronfligene og længere end disse. Frugten opspringende paatværs (Buddike), 2—4-rummet. (N. F. *Plantagineæ*).

Ann. Hos alle danske Arter af denne Slægt ere Bladene samlede ved Grunden, Skafterne bladløse.

10. **Centunculus** L. Blomsterne enlige i Bladhjørnerne; Bægeret dybt firedeelt; Kronen firefliget, med udstaaende Krave; Støvdragerne ligefor Kronfligene; kortere end disse; Frugten opspringende paatværs, enrummet. (N. F. *Primulaceæ*.)

11. **Cicéndia** Adans. Blomsterne enlige, endestillede eller i Vinklerne af gaffeldeelte Grene; Bægeret firetandet; Kronen firedeelt, med oprette Flige og Støvdragerne afvejlende med disse; Frugt 1—2-rummet, opspringende paa langs. (N. F. *Gentianeæ*.)

Gentiana Amarella og *campestris* (5, 1.)

Limosella o. fl. af de Tomægtige (14, 1 og 2.)

b. Kronen fribladet.

12. **Cornus** L. Blomst oversædig; Bægeret firedeelt; Kronblade 4, tilligemed Støvdragerne befæstede til en oversædig Skive; Fr. Steenfrugt med 2 (1—3) Rum. (N. F. *Corneæ*.)

13. **Euonymus** L. Blomst undersædig; Bægeret 4—5-deelt; Kronblade 4—5; Støvdragerne befæstede til en omkringsædig Skive; Fr. 3—5-rummet Kapsel, i hvert Rum 1 Frø, omgivet af Frøhud. (N. F. *Frangulaceæ*, c.)

X *Thapa* L. Blomsten oversædig; Bægerflige og Kronblade 4, de sidste tilligemed Støvdragerne befæstede til en Skive omkring den foroven frie Frugtknude; Frugten en en-

frøet Nød, tæt omgivet af det efterhaanden forhærdede Bæger-rør og beklædt paa Siderne af de tilsidst hornformigt tilspidsede Bægerflige. (N. F. Halorrhageæ).

Rhamnus. Fr. Bær eller Steenfrugt (5, 1.)

Cardamine hirsuta. Skulpefrugt (15, 2.)

B. Blomsterdækket enkelt.

14. * *Majanthemum* Web. Blomsterdækket firedeelt, undersædigt, alle Blomsterne ♀; Griffelen endestillet; Frugten et Bær. (Urt med buenervede Blade og Blomsterne i endestillet Klase. N. F. Smilacææ.)

15. *Parietaria* L. Blomsterne enbo eller fleerbo; ♀ og ♂ Blomsterdækket undersædigt, firedeelt (grønt), ♀ Blomsterdækket klokkeformet, i Spidsen indsnøret, firetandet; Arret penselformet; Frugt nødagtig. (Urt med fjernervede Blade og Blomster i Nøgler fra Bladhjørnerne. N. F. Urticacææ.)

16. *Alchemilla* L. Alle Blomsterne ♀; Blomsterdækket omkringsædigt, ottedeelt, (hveranden Flig mindre)*, grønt; 1 Griffel udgaaende fra Frugtknudens Basis, med hovedformet Ar; Frugten Nød, omsluttet af det vedblivende Underbæger. (Urt med haandlappede Blade og Blomster i en grenet Qvast. (N. F. Rosacææ α.)

17. *Sanguisorba* L. Blomster ♀ (eller fleerbo); Blomsterdækket oversædigt, firedeelt, farvet; Griffelen endestillet, med tolappet, kirtelkaaret Ar; Frugt som hos foreg. (Urt med fjersnitdeelte Blade og Blomsterne i Ax. N. F. Rosacææ α.)

Thesium. ♀ Blomsterdække oversædigt, 4—5-deelt, (udvendig grønt, indvendig hvidt). (5, 1.)

2. Orden. *Digynia* (Tohunnede).

Ouscuta. Frugt Buddike (Snylteplante) (5, 2.)

Gentiana. Fr. torummet Kapsel (5, 1.)

*) Blomsterdækket hos denne Slægt kan let antages for dobbelt, naar de 4 ydre (og mindre) Flige, som staae ligefor Støvdragerne, ansees for Bægerblade, men disse maa, i Lighed med andre Arter af samme Familie, f. Ex. *Potentilla*, ansees for et Yderbæger.

Herniaria. Hindefrugt (5, 1.)

Ulmus. Vingefrugt ($\frac{1}{2}$) (5, 2.)

Alchemilla. Nødfrugt (4, 1.)

Galium og *Asperula*. Todelelig Skalfrugt (4, 1.)

3. Orden. *Trigynia* (Trehunnede).

Holosteum. (3, 3.)

Ilex (4, 4.)

4. Orden. *Tetragynia* (Firehunnede).

A. Blomsterdækket dobbelt.

18. **Ilex** L. Bæger og Krone firedeelte; Griffel 0, 4 (3—5) Ar; Frugten et Bær med 3—5 enfrøede Rum og beenhaarde Skille vægge. $\frac{1}{2}$. (Bladene stedsegrønne, tornede i Randen. N. F. *Frangulaceæ*, a.)

19. **Radiola** Dill. Bæger firedeelt, med 2—3-fligede Af-snit; Krone firebladet; Fr. en firerummet Kapsel (hvert Rum deelt i 2 ufuldstændige, toklappede og tofrøede Rum). (N. F. *Lineæ*.)

20. **Bulliårda** DC. Bæger firedeelt; Krone firebladet; Fr. 4 fløerfrøede Bællekapsler. (N. F. *Crassulaceæ*.)

Sagina (a). Fr. enrummet, fireklappet Kapsel (10, 4.)

Cerastium tetrandrum (10, 4.)

B. Blomsterdækket enkelt.

21. **Potamogeton** L. Blomsterdækket firedeelt; Støvdragerne siddende paa Blomsterdækkets Flige; Frugterne 4 stilkløse Nødder eller Steenfrugter. (Vandplante med Blomsterne i Ax.)

22. **Ruppia** L. Vandplante med alm. toblomstrede Blomsterstilke; Blomsterdække 0; Støvdragerne 4, enrummede, siddende parviis paa 2 korte Skjæl (eller 2, torummede med skjælformede Støvtraade); Frugterne 4 ved Modningen langstilkede Nødder. (21—22. N. F. *Fluviales* c.)

I. Monogynia.

1. Knautia. Blaahat.

187. *K. arvensis* [Coul. Dips. p. 29] (Almindelig B.) Scabiosa L., H. 152; Drej. n. 158; F. D. 447; Rchb. ic. fl. germ. XII, tab. 680, fig. 1353; Trichera Schrad.

Stængelen stivhaaret; *Rodbladene* grovt-takkede; *Stængelbladene* fjersnitdeelte eller halvfinnede, med heelrandede, linie-lancetformede Flige og en større Endeflig; *Randkronerne* uregelrette, større end de regelrette *Skivekroner*.

1½—3' høi. Var. i Henseende til Dybden af Bladenes Indskjæring og Kronens Farve (blaa, violet, hvid). 6—7. 4.

β, *campestris* Koch. Alle Kronerne regelrette.

Alm. paa dyrkede og udyrkede Marker, ved Veie o. s. v. β, med Hovedarten.

2. Scabiosa. Skabiose.

188. *S. Columbaria* L. (Due-S.) H. 152; Drej. n. 159; F. D. 314; Asterocephalus Wallr., Rchb. l. c. XII, tab. 693, fig. 1378.

Stængelen næsten glat; *Bladene* paa de golde Bladknipper elliptiske, rundtakkede eller, tilligemed de nedre Stængelblade, lyreformet-halvfinnede eller -snitdeelte med tandede eller indskaarne Flige; de øvre *Stængelblade* fjersnitdeelte med smalt linieformede Afsnit; Straalerne i den *indre Fnok* 3—4 Gange længere end den *ydre Fnoks* Krave; *Randkronerne* uregelrette; *Skivekronerne* regelrette.

1—1½' høi. Kronerne violette. 7—9. 4.

Paa tørre Bakker sporadisk: i det østlige og nordlige Sj. hist og her, sjeldnere mod V. (Veirhøi! Tiissø! Nestved (H.); *Møens* Klint alm.! *Falst.* ved Grønsunds Færge! o. fl St. (Koch); *Loll.* Ny-sted (5); *Sl.* Haderslev, Midsunde N. for Færgestedet (16); paa *Bornh.*, i *Jyll.* og *F.* ikke bemærket.

189. *S. suaveolens* [Desf. cat. hort. par. 110] (Vellugtende S.) H. II, 127; Drej. n. 160; Asterocephalus Wallr., Rchb. XII, tab. 690, fig. 1372; H. N. I, 9; Scabiosa canescens W. & K., F. D. 2282.

Stængelen tæt graafilet; *Bladene* paa de *golde Bladknipper* lancetformede, heelrandede (sjeldnere tandede); *Stængelbladene* fjersnitdeelte med smalt linieformede, heelrandede Afsnit; *Straa-* *lerne* i den *indre Fnok* dobbelt saa lange som *Kraven* af den *ydre*; *Randkronerne* uregelrette; *Skivekronerne* regelrette.

Lavere end foreg. ($1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}'$ høi), Blomsterne have en ikke stærk, men behagelig Lugt, lila Kroner. 7—9. 4.

Paa sandige Marker og Bakker, hidtil kun funden i *Nordsjælland*; ved Nordbredden af Tiissø paa Skrænterne tæt Ø. for Beks Kro (27)† Kjeldby Banke ved Tømmerup pr. Kalundborg (Baagøe). 13

3. Succisa. Djævelsbid.

190. *S. pratensis* [Moench meth. 499] (Eng-D.) Rehb. XII, tab. 698, fig. 1385; Scabiosa Succisa L., H. 151; Drej. n. 161; F. D. 279.

Rodstokken lodret, den nedre Deel afstumpet («afbidt Rod»), med talrige, stærke Rodtrævler; *Stængelen* duunhaaret; *Rodbladene* elliptiske eller omvendt-ægformede, heelrandede; *Stængelbladene* lancetformede, heelrandede eller utydeligt tandede; *Blomsterkurven* kalvkugleformet; alle *Kronerne* regelrette.

1— $1\frac{1}{2}'$ høi. Kronerne blaae, sjeldnere lysrøde eller hvide. 8—9. 4.

Paa høie Enge (især paa Tørvgrund) alm. udbredt. En Var. med blegrode Blomster og femkløvede Randkroner er funden paa *Loll.* ved Hellinge (19), *Sj.* Boserup Overdrev (Lund).

4. Dipsacus. Kartebolle.

191. *D. pilosus* L. (Haaret K.) H. 150; Drej. n. 157; F. D. 1448; Rehb. XII, tab. 704, fig. 1393; H. N. II, 18; *Cephalaria pilosa* Gren. & Godr. fl. Fr. II, 69.

Bladene stilkede, ved Grunden ørede, svagt haarede; *Kurvbladene* nedhængende, ligelange med eller kortere end den kugleformede *Blomsterkurv*; *Avnerne* tæt og børsteformigt-randhaarede.

Stængel og Grene, især oventil, beklædte med Pigge. Kronerne hvide. 7—8. ☉.

I Skove sjelden: *Sj.* Sorgenfri (19), Herlufsholm, Vordingborg (H.); *Falst.* Næsgaard, Corselitze (14); *Loll.* Knuthenborg (H.),

Bremersvold (5), Vesterborg, Østofte (19), Græshave (14) o. fl. St. (19); *F.* Lundsgaard ved Kjerteminde (Heiberg), Aalykkeskoven ved Odense (H.)! Veistrup (19), Nielstrup (12), Hallenskov v. Svendborg (H.); *Als* v. Sønderborg (14); *Sl.* Udmark i Angel (1), Røest v. Slesvig (16). ²

192. *D. silvestris* [Mill. dict. n. 2] (Almindelig K.) H. 149; Drej. n. 156; F. D. 965; Rchb. XII, tab. 707, fig. 1397.

Stængelbladene siddende, ved Grunden noget sammenvoxne, fra bredere Basis lancetformede, tilspidsede, rundtakket-saugtakkede; *Kurvbladene* bueformigt opstigende, de ydre længere end den ægformede *Kurv*; *Avnerne* tæt duunhaarede og i Randen beklædte med fjerntstaaende Figge.

3—5' høi. Stængel, Rodblade og Kurvblade beklædte med Pigge, Kronerne violette, de midterste Blomster udspringe først. 7—9. ☉.

Paa Marker, ved Veie og Gjærder: *Sj.* Refsnæs (21), Kalundborg (Baagøe), N. Jernløse (Leth), Korsør, Munkbjergby (Lund), Jyderup (Dr.), Soderup (H.), Gjentofte (19), Pesthuset ved Kjøbenhavn! i Sydvest-Sjæll., paa *Møen*, *Falst.* (mod N. V) og *Loil.* alm.; *Langeland* v. Faareveile (H.); *Stryno* (12); *F.* Ulriksholm. Skovsbo (H.), Rørbæk! Kongshøi Aa (19), St. Jørgensgaard, Hvidkilde! *Femern* (H.); *Sl.* Frederiksstad, Syderstapel (16); *J.* Barritskov (16), Rosenvold (15). (I den nordlige Deel af Jylland synes den at mangle). ☾

5. *Sherardia*. Blaastjerne.

193. *S. arvensis* L. (Ager-B.) H. 153; Drej. n. 162; F. D. 439; Rchb. l. c. XVII, tab. 1183.

Bladene krandsstillede (typisk $\frac{1}{6}$), omvendt-ægformet-lancetformede, stivhaarede, især i Randen; *Blomsterne* i Hoveder i Spidsen af Grenene, omgivne af et alm. sexbladet, ved Grunden sammenvoxet *Spøb.*

Stængelen svag, nedliggende, frekantet, ru af nedadvendte Smaatorne. Kronerne violette. 6—8. ☉.

Paa dyrkede Agre mellem Sæden, især paa Leergrund, ikke sjelden i de fleste Egne af Danmark.

6. *Asperula*. Mysike.

194. *A. odorata* L. (Bokar, Skovmærke) H. 154; Drej. n. 163; F. D. 562; Rchb. XVII, tab. 1178.

Rodstokken krybende; *Bladene* krandsstillede (de nedre alm. $\frac{1}{6}$, de øvre $\frac{1}{8}$), lancetformede, glatte, i Randen og paa Rygnerven rue; *Skalfrugterne* stivhaarede af hagekrummede Børster.

Bladene have, især tørrede, en stærk og behagelig Lugt (*grønne Krands*); Kronerne hvide, ved Tørring sorte. 5—6. 4.

I Skove paa løs Muldjord og i Skygge, alm. udbredt.

195. **A. tinctoria** L. (Farve-M.) H. 155; Rechb. XVII, tab. 1180; H. N. III, 6.

Rodstokken krybende, *Bladene* krandsstillede (de nedre $\frac{1}{6}$, de øvre $\frac{1}{4}$), linieformede, glatte, i Randen lidet rue, *Skalfrugterne* glatte.

Rodstokken hørød*), Kronerne hvide, alm. med treffliget Krave. 6—8. 4.

Paa Bakker og Lyngheder: i Danmark kun funden ved Aalborg (Beck). [8]

7. Galium. Snerre.

a. Bladene trenervede, budte, uden Braad;
Stængelen jævn. (Platygaliun DC.)

196. **G. boreale** L. (Trenervet S.) H. 160; Drej. n. 164; F. D. 1024; Rechb. XVII, tab. 1186; H. N. XV, 15.

Stængelen opret, fint duunhaaret eller glat; *Bladene* linie-lancetformede eller æg-lancetformede, alm. 4 i Krandsene; *Griffelen* spaltet næsten til Grunden; *Frugterne* stivhaarede af hagekrummede Børster.

1—1 $\frac{1}{2}$ ' høi. Rodstokken alm. hørød. Kronerne hvide. 7—8. 4.

β , *latifolium*! Bladene bredere, de øvre ægformede, femnervede.

γ , *hyssopifolium* Koch, Frugterne glatte, Bladene bredt lancetformede.

Paa høie Enge og Bakker mellem Krat: alm. i Hanherred (12), nordl. og østl. *Sjæll.* og især paa *Bornh.* sjeldnere og sporadisk

*) Flere af de til disse Slægter (5—8) henhørende Arter have en hørød Rod og Rodstok. Hos nogle Arter er Griffelen til Grunden tvedelt, hvorfor de søges under Digynia.

i de øvrige Provindser, mangler f. Ex. i det sydlige Fyen (12). β , ved Helsingør (11); *Bornh.* Seiersgaard ved Rønne (Baagøe); γ , *Loll.* Vindeby Skov (19)!

b. Bladene ennervede, med en Braad. Stængelen jævn. (*Eugaliun* DC., Koch).

197. *G. silvaticum* L. (Skov-S.) H. 159, *Rchb.* XVII, tab. 1189; H. N. XIII, 34; *G. glaucum* F. D. 609.

Stængelen opret, trind, utydeligt fireribbet; *Bladene* 6—8 i Krandsene, oval-lancetformede, med en kort Braad, i Randen rue, forøvrigt glatte, paa Underfladen blaagrønne; *Blomsterstanden* stærkt forgrenet; *Blomsterstilkene* haarfine, før Blomstringen nikkende, efter samme aabne; *Kronfligene* med en kort Spids; *Frugterne* glatte, svagt rynkede.

1¹ 2—2' høi. Rodstokken høirød. Kronerne hvide. 6. 7. 4.

I Skove og Krat. *Sl.* i Skoven ved Wittensee (16), i de andre danske Provindser ikke bemærket (De af Drejer l. c. angivne sjællandske Voxesteder høre ikke herhid, men til en Form af følgende). ☞

198. *G. Mollugo* L. (part.) (Bredbladet S.) H. 159; *Drej.* n. 170; F. D. 455; *G. elatum* Thuill.; *Gren. & Godr.* fl. Fr. 2, p. 22; *Rchb.* XVII, tab. 1187—88.

Stængelen opret eller fremliggende, firekantet; *Bladene* alm. 8 i Krandsene, linie-lancetformede, i Randen rue; *Topgrenene* udbredt-aabne; *Blomsterstilkene* efter Blomstringen udspærrede; *Kronfligene* tilspidsede; *Frugterne* glatte, svagt rynkede.

Stængel og Blade var. glatte eller duunhaarede. Kronerne hvide. 6—8. 4.

β , *ochroleucum* H. N. II, 20; Kronerne bleggule.

γ , *umbrosum* (*G. insubricum* Gaud., *Rchb.* XVII, tab. 1188—89; *G. silvaticum* *Drej.* n. 171.) *Stængelen* svag, nedliggende; *Bladene* bredere, tynde, med tydeligt Aarenæt; *Toppen* udspærret, med haarfine Grene; *Kronerne* smaae.

Ved Gjærder, i Udkanten af Skove o. s. v., ikke sjelden i Danmark, især meget alm. paa *Loll.-Falster* og i det sydl. *Fyen*! (ikke bemærket i det nordlige Jyll. og paa *Bornh.*!). β , med Hovedarten. γ , i Skove, sjeldnere: *Sj.* Hammermølleskoven ved Helsingør (11), mellem Springforbi og Papirmøllen (*Schum.*); *J.* Østdedgaard!

199. **G. erectum** [Huds. fl. Angl. p. 68] (Opret S.) Gren. & Godr. fl. Fr. 2, p. 23; Rehb. VII, tab. 1188; G. Mollugo L. (part.)

Stængelen opret, dens Ledstykker ved Grunden mindre opsvulmede end hos foreg.; *Toppen* mere sammentrængt og med kortere Grene; *Blomsterstilkene* opret-aabne (ikke vandret udspilede); *Bladene* bredere mod Spidsen, kort braadspidsede; *Frugterne* større, forøvrigt som foreg. 6—7.

β , *rigidum* Gren. & Godr. Bladene smalt linieformede, glindsende, Pl. lavere.

I Lundehuusmosen ved Kbh. har jeg for flere Aar siden fundet et aldeles ægte Expl. af denne Art. Fra Ringsted findes Expl. i Drejers Herbarium, den angives fremdeles fra Hørreby Lyng paa *Falst*; Ravensby og Godsø p. *Loll.* (19), og uden Tvivl vil den findes paa flere Steder (Fra Holsteen har jeg seet Expl. samlede ved Viehburg pr. Kiel. 18). β , *Sj.* mellem Sorø og Pedersborg! J. Hjortlund Kirkegaard (12).

Anm. Denne Art, som almindelig adskilles af de nyere Forfattere, har ikke tidligere med Bestemthed været angivet for Norden. Dens Adskillelse fra foreg. er nægtelig ikke meget skarp, og skjøndt den har et ret eiendommeligt Udseende, kunde man let fristes til at ansee den for en magrere Form af hiin, og som saadan er den utvivlsomt indbefattet under Linnés og flere senere Forfatteres G. Mollugo. Da jeg ved Sammenligning med forskjellige Exemplarer fra Sydeuropa, ogsaa fra England (Babington), har overbeviist mig om, om at den rette G. erectum findes her, anfører jeg den, for at dens Udbredelse her i Landet og dens Berettigelse som særskilt Art yderligere kan blive undersøgt.

200. **G. verum** L. (Guul S.) H. 158; Drej. n. 169; F. D. 1146; Rehb. XVII, tab. 1187.

Stængelen opret eller opstigende, med 4 Ribber, duunhaaret; *Bladene* 6—12 i Krandsene, smalt linieformede med tilbagebøiet Rand, glatte eller paa Underfladen duunhaarede; *Blomsterne* i en tæt sammentrængt Top med korte, efter Blomstringen horizontalt udbredte Grene; *Kronfligene* budte med en meget kort Braad; *Frugten* glat.

Rodstokken ofte høirød. Kronerne gule. 6—8. 2.

β , *effusum* (ochroleucum H. N. II, 21); G. decolorans Gren.

& Godr. fl. Fr. II, p. 19. Kronerne bleggule, Toppen mere udbredt, med længere Grene. Bliver ikke sort ved Tørring.

γ , *altissimum* Lecoq & Lamotte; (G. *eminens* Gren. & Godr. l. c.) Kronerne bleggule, næsten dobbelt saa store som Hovedartens; Toppen forlænget, udbredt, med mere fjerntblomstrede Grene; de nedre Blade bredere. Bliver sort ved Tørring.

δ , *littorale*! Rodstokken krybende, Stænglerne nedliggende eller opstigende, med korte Ledstykker, Toppen meget sammenkneben, Kronerne mørkgule.

Ved Gjærder og Veie, paa Bakker, forekommer i alle danske Provindser, især i Sandegne (endog i Flyvesandsstrækninger) og er derfor sparsommere i de frugtbare Egne af Landet. β , forekommer ikke sjældent med Hovedarten. γ , *Sl.* ved Bülk (18); δ , alm. i det vestlige Jyllands Sandklitter; *Bornholm!* *F.* Østerøen ved Nyborg (Lund).

201. **G. silvestre** [Poll. palat. 151] (Liden S.) Rchb. XVII, tab. 1193; H. N. IV, 10; H. 157 (undt. Voxest.); G. pusillum Sm., H. II, 128; F. D. 1866 (ikke L.).

Stænglerne talrige, opstigende, firekantede, glatte eller duunhaarede; *Bladene* omtrent 8 i Krandsene, linie-lancetformede, tilspidsede; *Blomsterne* i en halvskjærmformet *Top* med opret-aabne *Grene*; *Kronfligene* spidse; *Frugterne* utydeligt punkterede.

4—10" høi. Kronerne hvide. 6—7. 4.

α , *glabrum* Schrad. (G. læve Thuill.) Stængel og Blade, endog i Randen, glatte.

β , *hirtum* Koch (G. Bocconi All.) Stængelen forneden og Bladene korthaarede af udstaaende Haar, Bladene i Randen rue.

* *supinum* Gaud. (Koch Syn. p. 367). Mangestænglet og tueformet, med finere, nedliggende Stængler, kortere Ledstykker og bredere Blade end Hovedarten, Blomsterstanden meget kort (kun 1—2 Gange gaffeldeelt-grenet).

Paa Lyngbakker og Heder: paa *Halvøen* hist og her, f. Ex. ikke sjelden i Thy! Neufing Mose S. for Aalborg (Grønlund), Dybdal v. Aalborg, Eveldrup (Dr.), Randers (7), Haraldslund! Ø. Nykirke (12), Nebbegaard! Veile (28), Rødding (16), paa de vestlige Øer fra Fanø

til Sylt (N.). β , sjældnere end α , f. Ex. Eveldrup (Dr.). * Kalkbakker paa Hanstholm og ved Blissø i Thy! Paa *Øerne* er denne Art ikke hidtil bemærket.

202. *G. saxatile* L. (Lyng-S.) H. 157; Drej. n. 168; F. D. 1633; Rehb. XVII, tab. 1194; H. N. II, 19; *G. hercynicum* Weig.

Stænglerne talrige, svage, nedliggende eller opstigende, firekantede, glatte; *Bladene* 4—6 i Krandsene, omvendt-ægformede, budte med en Braad (de øvre bredt lancetformede), glatte, i Randen rue; *Blomsterne* i en halvskjærmformet Top med opret-aabne *Grene*; *Kronfligene* spidse; *Frugterne* tydeligt punkteret-rue.

4—10" høi. Bliver sort ved Tørring; Bladsubstansen tyndere end hos de foreg. Arter. Kronerne hvide. 6—7. 4.

I Hedemoser og paa tør Grund mellem Lyng og Stene: hyppig i *Halvoens* og *Nordsjællands* Hedeegne; sjældnere i *Syd-sjælland*, *Fyen* og paa de mindre Øer, f. Ex. ikke bemærket paa *Falst.* (14) eller paa *Loll.* (19).

c. *Bladene* ennervede, *Stængelen* ru af nedadvendte Smaatorne.

aa. *Blomsterstanden* en halvskjærmformet Top, dannet af langstilkede, endestillede *Qvaster* fra Hovedstængelen og de øvre *Grene*.

4. (*Aparinoides* Jord.)

203. *G. palustre* L. (Kjær-S.) H. 155; Drej. n. 165; Rehb. XVII, tab. 1195.

Stængelen svag, firekantet; *Bladene* 3—5 i Krandsene, uligestore, lancetformede, foroven bredere (eller omvendt-ægformede), budte, uden Braad, i Randen rue; *Blomsterne* i halvskjærmformet Top med udspærrede, mod Frugtmodningen tilbagebøiede *Grene*; *Blomsterstilkene* mod Frugtmodningen vandret udspilede; *Frugterne* grubet-marmorerede.

$\frac{1}{2}$ —1' køi. Bliver sort ved Tørring. Kronerne hvide. 6—7. 4.

I Kjær og Vandgrøfter alm. udbredt.

* 204. *G. elongatum* [Presl. fl. Sic. I, p. 59] (Mose-S. Gren. & Godr. fl. Fr. 2, p. 39; Rehb. XVII, tab. 1195; *G. palustre* F. D. 423.

Rodstokken langstrakt-krybende; *Stænglerne* langstrakte, opstigende, mindre tæt samlede i Tuer end hos foregaaende; *Bladene* 4—6 i Krandsene, linie-lancetformede (neppe bredere imod Spidsen), med mere fremtrædende Nerve; *Blomsterstanden* mere rigtblomstret, med opret-aabne eller vandret udspilede (ikke tilbagebøjede) Grene; *Blomster* og *Frugter* næsten dobbelt saa store som hos foreg., med hvilken den forøvrigt er meget nær beslægtet. 7—8.

I Moser og Kjær, synes at være udbredt over hele Landet, og i de fleste Egne lige saa almindelig som foreg. Art.

Anm. Ved de angivne Kjendetegn, ved dobbelt saa store Dimensioner af alle Plantens Dele og sildigere Blomstringstid er denne Art let kjendelig fra foreg., men af de fleste ældre Forff. er den ikke adskilt fra hiin, og det turde ogsaa være tvivlsomt, om den skal betragtes som en virkelig Art eller kun som en udmærket Form af foreg. I hvert Fald er den vistnok medindbefattet under Linnés *G. palustre*, skjøndt Udtrykket »fol. obovata« synes at sigte til denne. (Anbefales til nærmere Undersøgelse).

205. *G. uliginosum* L. (Sump-S.) H. 156; Drej. n. 167; F. D. 1509; Rchb. XVII, tab. 1193; H. N. XV, 17.

Stængelen svag, firekantet; *Bladene* omtrent 6 i Krandsene, smalt lancetformede, braadspidsede, i Randen og paa Ryggen rue af nedadvendte Smaatorne; *Toppen* forlænget, med opret-aabne *Blomsterstilke*; *Frugterne* punkteret rue.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Bliver ikke sort ved Tørring. Kronerne hvide. 6—7. 4.

I fugtige Enge og Moser alm.

bb. *Blomsterstanden* en forlænget Top, dannet af qvastformede *Forgreninger* i Bladhjørnerne, næsten fra Grunden af *Stængelen*.

☉. (*Aparine* Gren. & Godr.).

206. *G. Aparine* L. (Burre-S.) H. 161; Drej. n. 166; F. D. 495; Rchb. XVII, tab. 1197.

Stængelen svag, firekantet, meget ru; *Bladene* 6—9 i Krandsene, lancetformede, foroven bredere (eller linie-lancetformede), i Randen og paa Rygnerven rue af nedadvendte Smaatorne; *de blomsterbærende Grene* modsatte i Bladhjørnerne;

de frugtbærende *Blomsterstilke* rette, udspærrede; *Frugterne* tæt beklædte med Kirtler, hvorfra udgaae Hagebørster.

Stgl. klattrende ved Hjælp af dens rue Beklædning. Kronerne hvide eller gulgrønne. 6—9. ☉. Var. i Henseende til Høiden, Bladenes Form o. s. v. Af de mange Former fremhæves:

β, tenerum (G. *tenerum* Schleich.) Rehb. XVII, tab. 1197. Stængelen nedliggende, Bladene omvendt-ægformede, Frugterne forholdsviis smaae.

γ, confertum Westerlund i bot. not. 1863 p. 139 (*G. Aparine—marinum* Fr. nov. p. 24 ?) Stænglerne udstrakte, med korte Ledstykker; Bladene kortere og bredere, kjødfulde; Grenene korte, enblomstrede, med tilsidst hagekrummede *Blomsterstilke*.

Paa dyrket Jord, ved Gjærder og i Krat, meget alm. *β, Sj.* i aabne Naaleskove ved Sorø! *F.* Granskov ved Skjoldemose (12); *γ*, Strandbredder: *Sj.* Vedbæk; *J.* Damgaard!

Anm. Formen *γ*, kan ikke forvexles med *G. tricornis* With. paa Grund af Frugtens Beklædning. Den ægte *G. tricornis* (Blomsterstilkene treblomstrede, hagekrummede, Frugterne beklædte med knudrede Vorter) angives som dansk af Fr. (S. Veg. Sc. 1, p. 10. Jeg har ikke seet danske Expl. af denne, men muligviis forekommer den i Slesvig, da den er funden i Holsteen (Web.).

207. *G. spurium* L. [Fr.] (Hør-S.) F. D. 2530; Rehb. XVII, tab. 1197; H. N. II, 22; *G. Aparine γ*, Koch Syn. II, 363.

De blomsterbærende Grene gjentaget 2—3-deelte; *Bladene* smalt linie-lancetformede; *Kronerne* meget smaae, grøngule; *Frugterne* glatte, glindsende og kjødfulde, neppe mere end halvt saa store, forøvrigt som foreg. 6—7. ☉.

β, Vaillantii Rehb. XVII, tab. 1197 (*G. Aparine γ*, infestum Lgc. Haandb. 1 Udg. S. 95; *G. infestum* W. Kit., *G. Vaillantii* DC.) Frugterne beklædte med stive, korte Haar uden Kirtler ved Grunden.

Ukrud i Hørsæden: *Falst.* ved Øverup (19), Tunderup (Rasmussen) og Kraghave! *Loll.* Refshale ved Maribo Sø (19). *β*, mellem Sæden, hist og her, f. Ex. *Sj.* Tryggerød, Faxø, Pedersborg ved Sorø!

Anm. Frugterne hos denne Art har jeg stedse fundet meget mindre end hos foreg., hvorimod de af flere Forff. angives at være større end hos denne, af hvilken der ogsaa skal forekomme en Form

med glatte Frugter (*G. Aparine leiospermum* Wallr. (cf. Westerlund l. c.) som dog ikke er bemærket i vor Flora. At *G. Vaillantii* DC. snarere hører til *G. spurium* end til *G. Aparine*, er jeg fremdeles overbeviist om paa Grund af dens Characterer og Habitus; jeg har altid funden den som Ukrud blandt Sæden, dog ikke, som Hovedformen, udelukkende i Hørsæd.

8. Rubia. Krap.

† *R. tinctorum* L. (Farve-K.) Drej. p. 61; Rchb. XVII, tab. 1184.

Stængelen firekantet, tilligemed Bladenes Rand og Rygnerve ru af nedadvendte Smaatorne; Bladene 4—6 i Krandsene, elliptiske; Kronfligene tilspidsede, grøngule.

6—7. 4.

Dyrkes og forekommer stundom forvildet, t. Ex. ved St. Jørgens Sø udenfor Kjøbenhavn (Schum.).

9. Plantago. Veibred.

a. Buddiken ved en tovinget Frøstol deelt i 2 Rum (Bladene hele).

aa. *Kronrøret* glat.

208. **P. major** L. (Glat V.—Kjæmper) H. 164; Drej. n. 150; F. D. 461; Rchb. XVII, tab. 1128.

Bladene 5—9-nervede, ægformede, glatte eller med faa spredte Haar, ssmmendragne til en rendet Bladstilk omtrent af Pladens Længde; *Skaflet* trindt, utydeligt stribet; *Axet* forlænget, valseformet; *Kronens Krave* gululbruun hindeagtig; *Støvknapperne* rødbrune; *Buddiken* ottefrøet.

6—8. 4. Var. i Henseende til Størrelsen, Axets Længde (1—8"), Bladenes Rand (heelrandede eller tandede), Nervernes Antal o. s. v. En Misdannelse med bladet Ax, 3: stærkt udviklede Dækblade (*△ rosea* Dcne.) forekommer hist og her.

β, minima (DC.) 1—2" høi, Bladene trenervede, længere end Bladstilk, Axet forkortet, ægformet.

* *intermedia* (P. *intermedia* Gilib., Gren. & Godr., fl. Fr. II, 720; P. *major γ pubescens* Lge. Haandb. 2 Udg. p. 107). Bladene blødere og tyndere (ikke læderagtige), duunhaarede, ved Grunden mere eller mindre dybt tandede, ægformet-

elliptiske, jævnt afsmalnede i Bladstilken; Skaftet bueformigt opstigende; Axet kortere og noget afrundet foroven, forøvrigt som Hovedarten.

Ved Veie, paa Marker, Strandenge o. s. v. alm. β , paa sandig og tørvholdig Grund ikke sjelden; * (som maaskee er en egen Art) voxer paa sandig Jord, Overdrev, især paa Steder, som af og til oversvømmes: *Sj.* Helsingør (Heiberg), Rostgaards Dam ved Hellebæk! Selchousdal (Lund), Skjolden ved Sorø! *Loll.* Hamborgerskoven (14); *Bornh.* Rønne, Kanegaard, Aarsdale (Hjorth); *J.* fugtige Pletter mellem Klitterne ved Agger!

209. *P. media* L. (Dunet V.) H. 164; Drej. n. 151; F. D. 581; Rehb. XVII, tab. 1137.

Bladene 5—7-nervede, ægformede, duunhaarede; *Bladstilken* fladtrykt, flere Gange kortere end Pladen; *Skaftet* trindt, utydeligt stribet; *Axet* kegleformet, efter Afblomstringen valseformet (kortere end hos foreg.); *Kronens Krave* hvid hindeagtig; *Støvknapperne* hvide paa rosenrøde Støvtraade; *Buddiken* tofrøet.

Bladene fladt udbredte paa Jorden, meget kortere end Skafterne. 5—7. 4.

Ved Veie og paa tørre, lerede Marker: meget alm. i *Sjæll.* og det nordøstlige *Jyll.* til Horsens; *F.* paa Hindsholm alm.! Odense, Holkenhavn (19); *Loll.* Aalholm (3), Nakskov Volde (19); *Falst.* Landeveien mellem Gaabense og Nykjøbing, Corselitze, Gjedserødde Fyrtaarn (14), N. Kirkeby (Koch); *Møen* (14); fra de øvrige Egne af Landet ere ingen Voxesteder mig bekendte.

210. *P. lanceolata* L. (Lancetbladet V.) H. 165; Drej. n. 152; F. D. 437; Rehb. XVII, tab. 1130; L. Herb. VIII, 157.

Bladene 3—6-nervede, lancetformede eller elliptiske, glatte eller duunhaarede, Bladstilken kortere end Pladen; *Skaftet* kantet og furet; *Axet* ægformet eller kugleformet (efter Afblomstringen alm. valseformet, men kortere end hos de foreg.); de 2 *Bægerflige* paa Ryggen kjølformigt vingede; *Kronens Krave* brunn hindeagtig; *Støvknapperne* og Støvtraadene gulhvide; *Buddiken* tofrøet; *Frøene* med en Længdefure paa Inderfladen.

Var. i Henseende til Bladenes Brede og Beklædning, Skafternes Længde ($\frac{1}{2}$ —2') Axets Form o. s. v. (En Misdannelse med grenet Ax er ikke sjelden). 5—7. 4.

β , *eriphylla* Dene. i DC. prodr. XIII, 715. Axene kugleformede, Bladene tilligemed de korte Skafter, især ved Grunden, tæt silkehaarede.

Paa Græsmarker, høie Enge o. s. v. meget alm. β , paa sandig Grund, f. Ex. *F.* ved Hofmangave (18); *Loll.* Albuen ved Nakskov (19); *Bornh.* Sandvig! Gudhjem! Rønne!

bb. Kronrøret haaret.

211. *P. maritima* L. (Strand-V.) H. 166; Drej. n. 153; F. D. 243 og 691; Rehb. XVII, tab. 1132; L. Herb. V, 99.

Bladene linieformede, i Spidsen og ved Grunden smalere, kjødfulde, trenervede; *Skaftet* trindt, tiltrykt-haaret (sjældnere glat); *Axet* valseformet, forlænget; *Dækbladene* ægformede, spidse, af Bægerets Længde; *Buddiken* tofrøet; *Frøene* med en rundagtig Grube paa Inderfladen.

7—9. γ . *Bladene* ofte brunnprykkede, alm. glatte og paa den hindeagtige Bladskede duunhaarede, var. desuden:

β , *dentata* (F. D. 1634). *Bladene* fjernttandede.

γ , *pygmæa*! Skafterne meget korte (1—2''), udstrakte, *Axet* faablomstret, næsten kugleformet.

Ved Strandbredder, især paa Syltunge alm., forekommer desuden ved sandige Veie i det Indre af Landet (f. Ex. i Halvøens Hedeegne). β , med Hovedarten ikke sjelden, γ , paa Flyvesandsmarker mellem Allinge og Sandvig paa Bornh.!

b. *Buddiken* ved en firevinget Frøstol deelt i 4 Rum.
(*Bladene* fligede).

212. *P. Coronopus* L. (Fligbladet V.) H. 167; Drej. n. 154; F. D. 272; Rehb. XVII, tab. 1130; H. N. I, 23.

Bladene fjerfligede med linieformede, tilspidsede Flige, graufiltede; *Skaftet* trindt, tæthaaret; *Axet* valseformet; *Dækbladene* ved Grunden ægformede, sylformigt tilspidsede; de 2 *Bægerflige* paa Ryggen kjølformigt vingede; *Kronrøret* finhaaret; *Buddiken* firefrøet; *Frøene* med en rundagtig Grube paa Inderfladen. 7—8. ☉.

β , *pygmæa*! *Bladene* med færre Haar og svagere Flige, *Axet* forkortet (næsten kugleformet) og faablomstret.

Paa Strandenge og ved sandige Havbredder, ikke sjelden i Danmark, men mindre hyppig end foreg. β , *Bornh.* paa Sandgrund ved Allinge! Svanike (Hjorth); Christiansø (Didrichsen); *Falst.* Vaalse Vig (Koch); *Jyll.* (herb. Drej.).

10. Centunculus. Centunkel.

213. *C. minimus* L. (Liden C.) II. 168; Drej. n. 155; F. D. 177; Rchb. XVII, tab. 1082; H. N. I, 22.

Stængelen grenet, ofte nedliggende; *Bladene* ægformede, spidse; de nedre modsatte, de øvre afvejlende; *Blomsterne* næsten siddende i Bladhjørnerne.

1—2" høi. Kronerne hvide eller lysrøde. 6—8. ☉.

β, *simplex* (C. simplex Hornem. 168; F. D. 1567). *Stængelen* udeelt, opret, *Bladene* smalere.

Paa Strandfælleder og Overdrev paa Tørv- eller Hedegrund, ikke sjelden, især paa Halvøen. β, Frederikshavn (herb. Drej.), paa en Eng ved Grenaa (II.), Nebbegaard og Brøndsted i *Jyll.*

11. Cicendia. Bitterblad.

214. *C. filiformis* [Rchb. fl. exc. p. 421] (Traadstænglet B.) H. N. XIII, 36; Gentiana L., F. D. 324; Exacum Willd., H. 163; Microcala Link, Rchb. XVII, tab. 1045.

Stængelen traadfin, flere Gange gaffeldeelt, med langstilkede *Blomster* i Gaffeldelingerne; *Bladene* modsatte, siddende, linie-lancetformede.

1—3" høi. (Smaae Expl. ere ofte aldeles ugreneede). Kronen guul. 7—8. ☉.

I Hedemoser og paa sandige Overdrev, hidtil kun bemærket i den sydlige Deel af *Halvøen*: Ribe (Oeder), Ostenfeldt (Didr.), Husum (Forchhammer), ved Tolker og Tolkwade Sø i Slesvig (16). ☼

12. Cornus. Kornel.

215. *C. suecica* L. (Hønsebær). H. 171; Drej. n. 172; F. D. 5; H. N. II, 34.

Stængelen urteagtig; *Bladene* modsatte, siddende, ægformede med 2 nærvæd Grunden udgaaende Sidenerver paa hver Side af Midtnerven; *Blomsterstanden* en Skjærm, omgivet af et firebladet *Svøb*, som er længere end *Blomsterne*.

$\frac{1}{2}$ " høi. Svøbet hvidt; *Blomsterne* smaae, sortrøde; Steenfrugten rød. 5—6. ☿.

I fugtige Skove og Hedemoser: i Vendsyssel alm. (H.) og derfra sporadisk gennem *Jyll.* og *Slesv.*; paa Øerne sjeldnere; kun be-

mærket i de nordlige Egne af *Fyen* (Einsiedelsborg, Hals ved Hofmansgave (H.) og *Sj.* (Helsingør (21), Krogenberg, Danstrup og Ravns-holt Hegn (14), Marianelund v. Gurre! Gribs Skov! Frederiksborg (16)) samt paa *Møen* ved Ulfshale (H.).

216. *C. sanguinea* L. (Rød K.) H. 172; Drej. n. 173; F. D. 481; H. N. II, 35.

Buskagtig, med i yngre Tilstand tiltrykt-haarede, senere glatte *Grene*; *Bladene* modsatte, stilkede, ægformede, tilspidsede, 3—5 Sidenerver paa hver Side af Midtnerven, udgaaende fra dennes nederste Halvdeel; *Blomsterstanden* en foroven fladtrykt Qvast uden Svøb.

Grenene have ofte rød Bark. Kronerne hvide, Steenfrugterne sortblaa. 6—7. ♀.

I Kratskove og ved Gjærder, ikke sjelden i Danmark, især hyppig i Fyen, Lolland-Falster, paa Bornholm og i Angel.

13. *Euonymus*. *Beenved*.

217. *E. europæus* L. (Almindelig B.) H. 271; Drej. n. 174; F. D. 1089; Rehb. ic. fl. germ. VI, tab. 309, fig. 5134; H. N. II. 36.

Buskagtig med firekantede, glatte *Grene*; *Bladene* modsatte, elliptiske, fint saugtakkede; *Blomsterne* i langstilkede, faa-blomstrede Qvaster fra Bladbjørnerne; *Kronbladene* aflange, grøngule; *Kapselen* fireklappet, budt firekantet-lappet, rosenrød; *Frøene* hvide, heelt omgivne af en brandgul *Frøhud*.

Veddet smukt lysguult; den yngre Bark grøn, Blomsten 4- (sjeldnere 5-) delelig. 5—6. ♀.

I Kratskove og ved Gjærder, temmelig alm. udbredt i de danske Provindser.

Trapa. *Hornnød*.

X *T. natans* L. (Svømmende H.) H. II, 130; Schk. Handb. t. 25.

Vandplante; *Stænglerne* langstrakte, *de svømmende Blade* ægformet-rudeformede, skarpt tandede, kortere end de ovenfor Midten tilsidst ofte bugformigt opblæste Bladstilke; *de ned-sænkte Blade* haarformig-kamdeelte; *Blomsterne* enlige i Blad-

hjørnerne; *Nødden* sortbrun (omtr. af en Kastanies Størrelse) med størst Brede paa Midten og med 4 korsstillede Horn af de forhærdede Bægerflige.

Nødder af denne Plante, som voxer i Moser og Søer i det sydligere Europa, men ikke hidtil har været funden vildvoxende hos os, ere samlede i Mængde i Tørvmoser paa Lolland (Galdemosen ved Steensgaard) af Hr. Rostrup, og den maa derfor nævnes som en for-dum i den danske Flora hjemmehørende, men nu sandsynligviis al-deles forsvunden Plante. (Hornemann anfører den som efter Opgivende funden ved Lauenburg, men efter Rimelighed er den ogsaa derfra forsvunden).

14. *Majanthemum*. Maiblomst.

218. *M. bifolium* [DC. fl. fr. 3, p. 177] (Tobladet M.) Drej. n. 146; Rehb. ic. fl. germ. X, tab. 436, fig. 967; *M. Convallaria* Weber; *Convallaria bifolia* L., H. 378; F. D. 291.

Stængelen tobladet (sjeldnere en- eller trebladet); *Bladene* afvexlende, stilkede, hjerteformede; *Blomsterne* parvise i en endestillet Klase.

6—8" høi. Blomsterne hvide. Bærrene før Modningen grøngule med rødbrune Prikker, i moden Tilstand røde. 5—6. 4.

I Skove, især paa fugtig Grund, almindelig.

15. *Parietaria*. Springknap.

219. *P. erecta* [M. & K. D. Fl. 1, p. 825] (Opret S.) Drej. n. 149; *P. officinalis* L. (for en Deel); H. 172; F. D. 521; Rehb. l. c. XII. tab. 651, fig. 1317; H. N. 1, 58.

Stængelen opret; *Bladene* afvexlende, stilkede, elliptiske, tilspidsede, heelrandede, haarede og ru-punkterede; *Blomsterne* nøgleformigt sammenhobede i Bladhjørnerne.

Støvtraadene leddede paatværs; Støvklapperne rulle sig ved Blomstens Udspringning elastisk op. Blomsterne grønne. 6—8. 4.

Ved Gjærder og Mure, især omkring Kjøbstæder, sporadisk og ikke alm. *Sj.* Kastellet ved Kjøbenhavn (Schum)! Kjøge (9), St. Ibs Kirke ved Roeskilde, Holsteinborg! *Moen* v. Stege omkring Have-gjærder ved Strandbredden (Dr.); *Falst.* Hullebæk (14), Nykjøbing (H.)! *Loll.* Nakskov (19); *Als* ved Sønderborg Kirke (14), Slesvig! *

16. *Alchemilla*. Løvefød.

220. *A. vulgaris* L. (Almindelig L.) H. 173; Drej. n. 147; F. D. 693; L. Herb. III, 58.

Bladene haandlappede, med afrundede, saugtakke, i Randen tiltrykt-haarede Lapper; *Rodbladene* langstilkede, nyreformede, 7—9-lappede, *Stængelbladene* 3—5-lappede, med store, saugtakke, indbyrdes til et fladkravet Rør sammenvoxne *Axelblade*; *Blomsterne* gulgrønne, qvastformigt samlede i Spidsen af Stængelen og Grenene. 5—7. 4.

β, *subsericea* Koch (A. *montana* Willd., H. 164). Stængel og Blade duunhaarede.

Alm. paa høie Enge og Græsmarker. *β*, paa mere tørre Steder og noget sjeldnere end Hovedarten.

221. **A. Aphanes** [Leers fl. herb. 54] (Liden L.) H. 175; Drej. n. 148; *Aphanes arvensis* L., F. D. 973; *Alchemilla arvensis* Scop.

Stænglerne nedliggende; *Bladene* haandformigt trefligede, *Fligene* kileformede, i Spidsen 2—4-tandede, *Axelbladene* sammenvoxne, i Spidsen saugtaket-fligede, *Blomsterne* grønlig, nøgleformigt sammenhobede i Bladhjørnerne.

Blomsterne meget smaae, de mindre Bægerflige ofte utydelige. 5—8. ☉.

Paa dyrkede og hvilende Marker almindelig.

17. Sangvisorba. Qvæsurt.

222. **S. officinalis** L. (Læge-Q.) H. 169; F. D. 97; H. N. VI, 51.

Bladene uligefinnede; *Smaabladene* stilkede, æg-hjerteformede eller lancetformede med hjerteformet Basis, saugtakke, tiltagende i Størrelse mod Spidsen; *Axet* ovalt; *Dækbladene* randhaarede.

Var. med eller uden Smaabiblade ved Grunden af Smaabladene. Blomsterne mørkrøde. 6—8. 4.

Paa Enge, sjelden: *Sl.* Bredderne af Trenen ved Hollingsted (Didr.), i Mængde paa Strandenge ved Klensby Nor og Steksvig ved Slien (20), Stampemøllen ved Slesvig, Eiderbredden mellem Rendsborg og Syderstapel (16), Rantrum ved Husum, Syderhöft i Eidersted (F. Müll.).

II. Tetragynia.

18. Ilex. Christtorn.

223. **I. Aquifolium** L. (Almindelig C.) H. 177; F. D. 508; Rchb. ic. fl. germ. XVII, tab. 1080; H. N. X, 17.

Busk (eller Træ) med stedsegrønne, læderagtige, glindsende, ægformet-elliptiske, i Randen tornet-tandede *Blade*; *Blomsterne* i Skjærm fra Bladhjørnerne.

Kronerne hvide. Bær røde. 6. $\frac{1}{2}$.

β , *integrifolia*. Bladene næsten heelrandede.

I Skove og Krat: i den østlige Deel af *Halvøen* fra Grenaa mod S. ikke sjelden, sparsommere i det Indre og mod V., f. Ex. Silkeborg (16), Himmelbjerget (28), Skanderborg, Fohl Skov ved Ribe, Husum (16); *Læsø* (Kamphøv. Herb.); *F.* sjelden: Gribsvad (18), Æbelø ved Bogense, Einsiedelsborg (H.), Juelsberg og Teglværkskoven ved Nyborg (Lund), Faaborg (H.), *Thorseng* (Kyll.); *Seiero* (60 à 70 Træer samlede, Baagøe); *Moen* ved Ulfshale (17, Kph. Herb.). I Sjælland, paa Lolland-Falster og Bornholm mangler den; paa flere af de fyenske Voxesteder findes den neppe mere (12). — β , mellem Hovedarten. *

19. Radiola. Tusindfrø.

224. **R. millegrana** [Sm. fl. brit. p. 202] (Liden T.) H. 189; Drej. n. 194; Rchb. ic. fl. germ. VI, tab. 625, fig. 5152; *R. linoides* Gmel., H. N. XIV, 37; *Linum Radiola* L., F. D. 178.

Stængelen opret, med gjentaget-gaffeldeelte, udstaaende, haarfine *Grene*; stilkede *Blomster* i Gaffeldelingerne; *Bladene* modsatte, siddende, ægformede, heelrandede; *Bægerbladene* tandede; *Kronbladene* heelrandede.

$\frac{1}{2}$ —2" høi, Kronerne hvide, meget smaae. 7—9. ☉.

Oversvømmede Steder, især paa Sand- og Hedegrund, ikke sjelden, og ofte i Selskab med *Centunculus minimus*.

20. Bulliarda.

225. **B. aquatica** [DC. bull. philom. n. 49 p. 1] Drej. n. 195; H. N. IX, 42; *Tillæa* L., H. 188; *T. prostrata* Schk., F. D. 1510.

Bladene modsatte, linieformede; *Blomsterne* næsten siddende, i Bladhjørnerne.

$\frac{1}{2}$ —1" høi; Stængelen i Vand opret, ovenfor Vandet oftest udstrakt, Kronerne blegrøde. 7—8. ☉.

I Vand og udtørrede Vandhuller, ved Søbredder: *Sj.* i en udtørret Dam (Rostgaards Dam) ved Hellebæk i stor Mængde 1862! Tidligere er den, efter Hornemans Angivelse, funden i Sjælland af M. Vahl, men det specielle Voxested ikke angivet. [*

21. Potamogeton. Vandax.

a. *Plantaginifolii* Fr. *Bladene* (idetmindste nogle) paa Midten eller nedenfor samme bredere.

aa. *De nedre Blade afvexlende, de øvre (nærmest Blomsterstilkene) modsatte. Blomsterne i Ax.*

α. *Bladene* forskjelligformede, alle stilkede.

226. **P. natans** L. (Svømmende V.) H. 179; Rafn 1, 679; Drej. n. 193; F. D. 1025; Rchb. ic. fl. g. VII, tab. 50, fig. 89; H. N. V, 73.

Stængelen ugrenet; alle *Bladene* stilkede; *de nedsænkte* lancetformede (uden Plade) eller linieformede, *de svømmende* lang stilkede, ovale med hjerteformet Basis, læderagtige, heelrandede; *Blomsterstilkene* lige tykke overalt; *Frugterne* store, omvendt-ægformede, sammentrykte, i frisk Tilstand paa Ryggen budte, i tørret Tilstand skarpkjolede.

Planten bliver ved Tørring bruun, *Bladene* foranderlige i Formen: *de nedsænkte* ere enten linieformede uden Plade eller i yngre Tilstand med lancetformet, tilsidst forraadnende Plade, hvorved Stilken bliver ene tilbage. 6—8. 4.

β, *fluviatilis* (Fr. Nov. p. 28; β, *prolixus* Koch Syn. II, 775). *Bladene* fjerntsiddende, spidst-lancetformede med afrundet (ikke hjerteformet) Basis, Axstilkene udgaac fra de nedre Bladhjørner.

I Søer og Damme meget alm. i Danmark, sjeldnere i rindende Vand. β, i Grøfter ved Eveldrup i Jyll. (Dr.).

227. **P. fluitans** [Roth. tent. fl. germ. I, 72, II, 202] (Flydende V.) H. II, 132; Nolte nov. p. 16; F. D. 2105; Rchb. l. c. fig. 88; H. N. IX, 72.

Stængelen enkelt eller lidet grenet; alle *Bladene* stilkede, *de nedsænkte* vedblivende, hindeagtige, langstrakt-lancetformede, *de svømmende* lancetformede eller elliptiske (med tilspidset eller afrundet, ikke hjerteformet-indskaaren Basis), læderagtige, heelrandede, *Bladstilkene* paa Overfladen convexe; *Axelbladene* med en dobbelt Kjøl paa Ryggen; *Blomsterstilkene* tykkere og opustede foroven, tykkere end *Stængelen*; *Frugterne* sammentrykte, med skarpkjølet Ryg. 7—8. 4.

β , *rivularis*! *Stænglerne* meget lange og grenede, *de nedsænkte Blade* linieformede, forlængede (indtil 1' lange, og lignende *Bladene* af *Zostera marina*), *de svømmende* smalt lancetformede.

I Aaer og Bække, sjelden i Danmark: *J.* Varde Aa S. for Byen! Kongeaaen ved Hjortlund (12); *Sl.* i Eideren (N.); β , *F.* i Odense Aa ved Munke Mølle og Fruens Bøge! *J.* Mosbjerg Aa i Vendsyssel (23)? [8]

Anm. Den under β , anførte Form, som jeg tidligere henførte til *P. sparganifolius* Læstad. (efter Beskrivelsen i Fr. Mant. 1, p. 9), maa jeg nu efter Undersøgelse af mange Expl. (dog kun faa blomstrende og ingen frugtbærende) ansee for en Form af *P. fluitans*, frembragt ligesom den af foreg. ved Forekomst i stærkt strømmende Vand. Om den fra Jyll. af Drej. (Krøyer. Tidsskr. II, 160) med Tvivl som *P. sparganifolius* angivne Art ogsaa hører herhid, kan jeg paa Grund af Mangel paa Expl. ikke afgjøre.

228. *P. polygonifolius* [Pourr. Chlor. narb. in act. Toul., 3, p. 325] (Aflangbladet V.) Rchb. l. c. tab. 44, fig. 79—81; *P. oblongus* Viv., Fr. nov. p. 29; Lge. Haandb. 1 Udg. S. 103; H. N. V, 74 og 75 (var.).

Stængelen enkelt eller lidet grenet; alle *Bladene* langstilkede, *de nedsænkte* vedblivende, bredere eller smalere lancetformede, *de svømmende* tyndt læderagtige, heelrandede, elliptiske eller ægformede (med eller uden hjerteformet Basis); *Blomsterstilkene* lige tykke overalt, tyndere end *Stængelen*, buformigt nikkende; *Frugterne* smaae, sammentrykt-trindryggede.

Bladene ved Tørring brune, deres Form meget forskjellig. Let kjendelig fra *P. natans* ved de smaae, i tørret Tilstand rødbrune *Frugter*. 6—8. 4. Blandt de talrige Former udhæves:

α , *angustifolius* (Fr. nov. p. 30) Stængelen langstrakt, alle Bladene smalt lancetformede.

β , *amphibius* (Fr. l. c.; *P. parnassiæfolius* Schrad.) Rodstokken krybende, med korte Grene, ingen nedsænkte Blade, de svømmende bredt ægformede, ved Basis afrundede eller hjerteformede.

I Kjær, Hedemoser o. s. v., hist og her paa *Halvøen og Bornholm*; paa de øvrige Øer sjelden, f. Ex. *F.* Vængemose ved Skaarup (19). β , ikke sjelden i de *jydske* og *slesvigske* Hedemoser, især i Kildevæld paa Sandgrund; α , sjeldnere: jeg har kun fundet den i Vandhuller ved Hammeren paa *Bornholm* (i Salt- eller Brakvand).

229. *P. coloratus* [Hornem. i F. D. 1449 (1818)]; (Veibredbladet V.) Fr. S. Veg. Sc. p. 68 (cf. p. 219); H. N. XIII, 77; H. 181; Nolte nov. p. 18; *P. plantagineus* Ducroz., Rchb. l. c. fig. 82—84; *P. Hornemanni* Mey. Chl. Hanov.

Stænglerne enkelte eller lidet grenede; alle *Bladene* (kort-) stilkede, tynde, gjennemsigtige, med talrige og tydelige Tværaarer, i Randen bølgede, *de nedsænkte* ovale eller elliptiske, *de øvre* bredt-ægformede; *Blomsterstilkene* lange, lige tykke overalt og tyndere end Stængelen, rette eller bukrummede; *Axet* tæt-blomstret, *Blomsterne* meget smaae; *Frugterne* smaae, sammentrykt-trindryggede, omvendt-ægformede.

Bladene i tørret Tilstand oftest grønne, sjeldnere rødbrune (det sidste er Tilfældet med Fig. i F. D.). Frugterne endnu mindre end hos foreg. 6—8. 4.

I stillestaaende Vand, f. Ex. Grøfter, Moser, sjelden og sporadisk: *Sj.* Grøfter ved Leersøen udenfor Kjøbenhavn! en Dam ved Bognæs-gaard pr. Roeskilde! Svogerslev Mose (20) og Ladegaardsmøllen ved Roeskilde (15); *Falst.* ved Ourupgaard (Koch) og Hullebæk (14); *F.* Hofmansgave (Vahl, Hofman Bang!); *J.* Gravens Mose i V. Hanherred, Jensby Eng i Thy (Dr.); *Sl.* Wanderup S. for Flensborg (16). [2]

Ann. Rchb. (l. c.) fører *P. coloratus* F. D. som Synonym til foreg., men Expl. meddeelte af Hr. Hofman Bang fra det Vahlske Findested (Hofmansgave), hvor *P. oblongus* ikke findes, bekræfte tilstrækkelig, hvad ogsaa Figuren udviser, at F. D. 1449 og *P. plantagineus* hos Rchb. ere identiske.

β. Bladene (typisk) forskjelligformede, de nedre (nedsænkte) stilkløse.

230. **P. rufescens** [Schröd. in Cham. adnot. ad Kth. fl. berol. p. 5. (Rustfarvet V.) H. II, 133; I, 180 og 182 (P. fluitans og P. lucens angustifolius); Drej. n. 192; Schum. n. 159—60 (P. fluitans og P. serratum); F. D. 1450 (P. fluitans) og 1635 (P. lucens var.); Rehb. l. c. fig. 56; H. N. V, 76.

Stængelen enkelt; de *nedsænkte Blade* forlænget-lancetformede, hindeagtige, gjennemsigtige, de *svømmende* omvendtægformede eller elliptiske, budte, noget læderagtige, heelerandede, kortstilkede; *Åselbladene* store, tidligt henvisnende; *Blomsterstilkene* af Stængelens Tykkelse og lige tykke overalt; *Frugterne* sammentrykte, paa Ryggen skarpkjølede, udspærrede, tilspidsede i den vedblivende Griffel.

Plantens Farve i frisk Tilstand mat grøn, i tørret stærk rødbrun. Fra Bladenes Midtnerve udgaae til begge Sider et tæt Næt af Tværaarer. 7—8. 4.

I flydende og stillestaaende Vand, almindelig i de fleste Egne af Landet.

231. **P. nitens** [Web. suppl. fl. hols. n. 11] (Krumbladet V.) F. D. 1807; Rehb. l. c. fig. 60—62; P. curvifolius Hartm., H. II. 133; Drej. n. 191.

Stængelen grenet; de *nedre Blade* halvt-omfattende, lancetformede, spidse, gjennemsigtige, i Randen rue, de *øvre* kortstilkede, bredt lancetformede, i begge Ender tilspidsede, læderagtige; *Blomsterstilkene* tykkere foroven; *Frugterne* halvt-kreds-runde, sammentrykte, med en budt Kjøl paa Ryggen.

Bladenes Form forskjellig; de *svømmende Blade* mangle hyppigt aldeles, endog hos Formen **β.** 6—8. 4.

α, *salicifolius* (Fr. nov. p. 34.) De *nedsænkte Blade* linie-lancetformede, rette, Ledstykkerne og *Blomsterstilkene* forlængede, de sidste udgaae fra alle de *øvre* Led.

β, *heterophyllus* (Fr. l. c., H. N. VIII, 67, P. curvifolius.) De *nedsænkte Blade* kortere, buformigt-tilbagebøiede.

I Søer og Bække, sjelden, (**α**, især i stærkt strømmende Vand): **Moen** v. Landsled (Holst), **Loll.** Maribo Sø (5); **J.** Vaarsaa (12) og

Vang i Vendsyssel, Ove Sø i Thy (Dr.), Flade Sø ved Agger! Aalborg (Strandgaard, α), Skjern Aa ved Lønborg og Petersminde! (α); Søgaard Sø ved Aabenraa (28). [*

Anm. Paa Exemplarer af denne Art, som jeg samlede ved Stockholm Sept. 1849, har jeg fundet en eiendommelig Forgreningsmaade, som jeg ikke tidligere har seet omtalt for dens Vedkommende. Fra alle de nedsænkede Blades Hjørner udgaar 2 Grene, den indre (imod Axen vendte) kortere, opadrettet med temmelig tætsiddende Blade, den ydre, vendt imod det støttende Blad) langstrakt, nedstigende, med meget forlængede Ledstykker og skjælformede Blade, fra hvis Vinkler der udgaar opadtil nye Grene, nedadtil Rodtrævler. I Spidsen ere disse forlængede Grene opsvulmede til en Knop, som synes bestemt til at overvintre og maaskee frigjøres fra Moderplanten. Det fortjener at undersøges, om denne Forgreningsmaade, som senere er iagttaget hos *P. pectinatus* og synes at have Lighed med den af *J. Gay* hos *P. trichoides* beskrevet, er almindelig hos disse Arter ogsaa i vor Flora, og om ikke muligviis flere Arter af denne Slægt ved Underøgelse om Efteraaret maatte fremvise lignende Forhold.

232. **P. gramineus** L. (Græsbladet V.) Fr. nov. p. 36; S. Veg. p. 244; H. N. V, 77; Drej. n. 190; *P. heterophyllus* Schreb., H. 180; Schum. n. 163; F. D. 1263; Rchb. l. c. fig. 73—75.

Stængelen grenet; *de nedre Blade* i begge Ender tilspidsede, linie-lancetformede eller elliptiske, gjennemsigtige, i Randen bølget-rue, *de øvre* svømmende, stilkede, ægformede eller elliptiske, læderagtige, heclrandede; *Blomsterstilkene* tykkere foroven; *Frugterne* sammentrykte, halv-kredsrunder, med budt Ryg.

6—8. 4. Var. i Henseende til Ledstykkernes Længde, Bladenes Form o. s. v. De vigtigste Former ere:

α , *graminifolius* (Fr. nov. p. 36; Koch Syn. II, 777; *P. gramineus* Schum. n. 166 (?); H. 184; Rchb. l. c. fig. 71; F. D. 222). Bladene slappe, alle linie-lancetformede (ingen svømmende).

β , *heterophyllus* (Fr. l. c., H. N. XII, 75), de nedsænkede Blade kortere, bredere, udstaaende eller krumbøiede (de svømmende stedse tilstede).

Temmelig hyppig i alle danske Provindser, saavel i flydende som stillestaaende Vand. β , den almindeligste Form; α , sjældnere, f. Ex. *Sj. Gurre* Sø (14), Uttersløv Mose (7), Grøfter i Flommen ved Sorø! Ørsløv ved Skjelskør (Nielsen); *Falst.* ved Ourupgaard (14); *Loll.* hist og her (19); Ølene paa *Bornholm* (Oeder, 19). I udtørrede Tørvmoser og andre dyndfulde Steder forekommer undertiden en Form med lutter læderagtige og stilkede Blade (f. *terrestris* Fr. l. c.)

γ , Bladene ensformede, hindeagtige, stilkløse eller kortstilkede.

* 233. **P. Zizii** [M. & K.] (Langstilket V.) Rehb. l. c. fig. 66—67; *P. gramineus* γ , *Zizii* Koch Syn. II, 778; *P. lucens* β , *minor* Nolte, *P. luc.* β , *heterophyllus* Fr. l. c.

Stængelen grenet; alle *Bladene* elliptisk-lancetformede, kort braadspidsede, gjennemsigtige, i Randen bølget-rue; *de nedre* kort, *de øvre* tydeligt stilkede; *Blomsterstilkene* tykkere foroven, længere end Bladene; *Frugterne* omvendt-ægformet-rundagtige, med en budt Kjøl paa Ryggen.

De af mig samlede Exemplarer blive sorte ved Tørring. Afviger forøvrigt fra følg. fornemlig kun ved de lange Blomsterstilke og hele Plantens mindre Dimensioner (ogsaa Frugterne ere mindre), og staaer langt nærmere ved denne end ved foreg., til hvilken Koch henfører den.

Sjældnere end foreg. og følg. *Sj.* en Dam ved Hellebæk (12); *J.* en Aa mellem Fiilsø og Vesterhavet (ved Henne Mølle)! *SL.* Mølle-dammen ved Husum (16).

234. **P. lucens** L. (Glindsende V.) H. 181; Drej. n. 189; F. D. 195; Schum. n. 161; Rehb. l. c. fig. 64.

Stængelen grenet; alle *Bladene* ovale eller elliptiske, kortstilkede, gjennemsigtige, i Randen bølget-rue; *Axellbladene* med en dobbelt Kjøl paa Ryggen; *Blomsterstilkene* tykkere foroven, længere end det tætblomstrede *Ax*, kortere end Bladene; *Frugterne* store, sammentrykte, paa Ryggen budt trekjælede.

Vedligeholder ved Tørring en smuk grøn Farve. 7—8. 4. Bladene var. afrundede, braadspidsede og

β , *acuminatus* Rehb. l. c. fig. 69—70; *P. acuminatum* Schum. n. 162; F. D. 1384). Bladene forlænget-lancetformede, langt tilspidsede af den udløbende Midtnerve (Spidsen ofte af Pladens Længde, undertiden er Nerven alene tilbage).

I flydende og stillestaaende Vand, ikke sjelden og udbredt i alle danske Provindser. β , med Hovedarten f. Ex. *Sj.* Sorø Sø! Farum Sø, Fuglevad (14); *Loll.* Maribo Sø (14); *J.* Randers (Selmer), Kongeaaen ved Ribe (16); *SL.* Nyksborg Mølle-dam, Trenefloden v. Treya-holm (16), Eideren ved Rendsborg!

? 235. **P. decipiens** [Nolte i Rehb. fl. germ. exs. n. 1603] Rehb. l. c. fig. 63; Koch. Syn. II, 779; H. N. XIV, 76.

Stængelen grenet, med knæbøiede Ledstykker; alle *Bladene* stilkløse, med afrundet Basis, elliptiske eller ovale, budte med en meget kort Spids, heelrandede, hindeagtige, gjennemsigtige; *Blomsterstilkene* lige tykke overalt, tykkere end *Stængelen*, længere end det tætblomstrede *Ax*; *Frugterne* med en budt Kjø! paa Ryggen.

I Characterer nærmer den sig *P. praelongus*, i Udseende staaer den mellem *P. lucens* og *nitens*. 7—8. 4.

Af Prof. Fries (S. Veg. Sc.) optaget blandt de danske Planter; funden af Prof. Nolte i Holsteen (f. Ex. ved Kiel); om den ogsaa findes i Slesvig, er mig ubekjendt). 18

236. **P. praelongus** [Wulfen i Röm. Arch. III, 331] (Langstrakt V.) H. II, 134; Drej. n. 188; F. D. 1687; Rehb. l. c. fig. 59; H. N. IX, 74.

Stængelen grenet, med knæbøiede Ledstykker; alle *Bladene* stilkløse, fra en bred, halvt-omfattende Basis æg-lancetformede, budte, med en hætteformigt sammentrukken Spidse, hindeagtige, gjennemsigtige; *Blomsterstilkene* af *Stængelens* Tykkelse og lige tykke overalt, efter Afblomstringen meget længere end Bladet og det ikke tætblomstrede *Ax*; *Frugterne* store, halvkredsrunde, sammentrykte, i tørret Tilstand med en skarp, vingeformet Kjø! paa Ryggen.

Blomsterstilkene $\frac{1}{2}$ —1' lange, Bladene meget lange, heelrandede eller mod Spidsen bølgede; var. fra næsten hjerteformede til linie-lancetformede, vedligeholde ved Tørring en grøn Farve. 7—8. 4.

I Aaer og Søer, sporadisk og ikke alm. *Sj.* Esrum Sø, Sortesø (Dr.), Sorø Sø (M. Vahl); *F.* Odense Aa ved Munke Mølle! Bramstrup (18), Ollerup Sø (12); *J.* Ove Sø og Aakjærs Aa i Thy, Ride-mands Mølle ved Aalborg (Dr.), Vaarsaa mellem Hjørring og Sæby (Branth); *Sl.* Jels Sø (28), Gram Aa og Mølle-dam (8, 16) o. fl. St. (N.).

237. **P. perfoliatus** L. (Hjertebladet V.) H. 182; Drej. n. 187; Schum. n. 164; F. D. 196; Rehb. l. c. fig. 53—54.

Stængelen grenet; alle *Bladene* stilkløse, fra en hjerteformet, omfattende Basis ægformede eller æg-lancetformede, budte, hindeagtigt gjennemsigtige, i Randen bølgede; *Axel-bladene* korte, ægformede, hurtigt henvisnende; *Blomsterstilkene* lige tykke overalt; *Axet* tætblomstret; *Frugterne* sammentrykte,

budt trekjølede, med et kort Næb (af den vedblivende Griffel).

Farven i frisk Tilstand olivengrøn, i tørret brunn. 6—8. 4.

I Søer, meget alm. i de fleste Egne af Danmark (ikke bemærket paa *Falst.* (14).

238. *P. crispus* L. (Kruset V.) H. 183; Drej. n. 186; Schum. n. 165; F. D. 927; Rehb. l. c. fig. 50; H. N. VIII, 68.

Stængelen fladtrykt, grenet; alle *Bladene* stilkløse, fra en ægformet, halvt-omfattende Basis bredt linieformede eller oval-lancetformede, budte, i Randen saugtakket rue og bølgede, gjennemsigtige; *Axelbladene* korte; *Blomsterstilkene* lige tykke overalt; *Axet* faa- og fjernblomstret; *Frugterne* sammentrykte, halv-kredsrunde, med langt Næb (af den vedblivende, alm. tilbagebøiede Griffel).

I tørret Tilstand rødbrun. 6—8. 4.

I flydende og stillestaaende Vand hyppig.

Ann. Forekommer undertiden i yngre, blomsterløse Expl. med smalere, linieformede, svagt saugtakkede, men ikke bølgede Blade (Rehb. 52; *P. serrulatus* Schrad.), og en Misdannelse med Axene omdannede til Bladknipper med brede og korte, nedentil bruskagtige Blade (β , gemmifer Rehb. 51, cfr. Nolte nov. p. 22).

bb. Alle *Bladene* modsatte, *Blomsterne* i et 2—3-blomstret Hoved.
(*Antiphylllogeton* Rehb.)

239. *P. densus* L. (Tætbladet V.) H. 182; F. D. 1264; Rehb. l. c. fig. 46—49; H. N. X, 67.

Stængelen oventil gaffeldeelt-grenet, med korte Ledstykker og tætsiddende, hindeagtigt gjennemsigtige, ægformet eller elliptisk-lancetformede, spidse *Blade*; *Axelbladene* korte, omvendt-ægformede; *Blomsterstilkene* korte, i *Stængelens* Gaffeldelinger, under *Blomstringen* ovenfor Vandet, efter samme tilbagebøiede; *Frugterne* sammentrykte, i tørret Tilstand paa Ryggen vingeformigt-kjølede, med krumt Næb, Frøgjemmet tyndt; *Kimen* spiralformet (med 2 Vindinger).

Plantens Farve i tørret Tilstand olivenbrun. *Bladene* var. i Formen fra bredt ægformede til linie-lancetformede. 7—9. 4.

I flydende og især stillestaaende Vand (f. Ex. Marskgrofter); hidtil kun funden paa *Halvøen*: Nebel Sø i Thy (Dr.), Hoe, Bramminge, Villebøl (30!), Kongeaaen ved Hjortlund (12), Nibsaaen og Grøfter ved Ribe (6), Høyer (28), Tønder (H.), Rødding (16), Wittensee, Rendsborg (20), Syderstapel (F. Müll.), og paa *Als* i Adserballe Aa (10). ³¹.

b. *Graminifolii* Fr. Alle Bladene overalt ligebrede.

aa. *Axelbladene frie i Bladhjørnerne (Chloëgeton Rchb.).*

240. **P. zosteræfolius** [Schum. l. c. n. 168] (Bændelbladet V.) H. 184; Drej. n. 185; F. D. 1865 og 2046 (*P. acutifol.*); Rchb. l. c. fig. 45; *P. compressus* (L.) Fr. nov. p. 44; H. N. V, 78.

Stængelen grenet, vinget-fladtrykt; *Bladene* baandformede, budte med en Braad, mangenervede, med 3—5 stærkere Nerver; *Blomsterstilkene* 2—flere Gange længere end det 10—12-blomstrede valseformede *Ax*; *Frugterne* omvendt-ægformede, med budt Kjø. l.

Bladene meget lange, og ligne Bladene af *Zostera marina*. 6—8. 4.

I Bække og Aaer, ikke sjelden paa *Halvøen* og i *Sjælland*. (Fra de øvrige Øer er den mig ikke bekjendt.)

241. **P. acutifolius** [Link i Röm. & Sch. syst. veg. III, 513] (Spidsbladet V.) H. II, 135; Drej. n. 184; F. D. 1747; Rchb. l. c. fig. 44; H. N. V, 79.

Stængelen grenet, vinget-fladtrykt; *Bladene* linieformede, kort tilspidsede, mangenervede, med 3 stærkere Nerver; *Blomsterstilkene* neppe $\frac{1}{2}$ “, af Længde med eller lidet længere end det 4—6-blomstrede, i Frugttilstanden rundagtige *Ax*; *Frugterne* sammentrykte, skjævt omvendt-ægformede, med kjølførmert vortet Ryg.

I de fleste Blomster kommer kun een Frugtknude til Udvikling. Fra foreg. adskilles den let ved de mere tilspidsede Blade og de kortstilkede, faablomstrede *Ax*. 7—8. 4.

I Søer og Vandgrøfter, sjældnere end foreg.: *Sj.* Fredensborg, Fortunen (20), Mose ved Ordrup (17), Frederiksdal ved Sneglebakken, Dammen ved Ladegaarden (9), Utterslev Mose (19), mellem Værebros Mølle og Gundsømagle, Thorslunde (15); *Loll.* ved Birket og Grønne-gade (Rasmuss.); *F.* Ø. Skjerninge; *Thorseng* (12); *J.* mellem Bramminge og Aalbæk Mølle, Villebøl ved Kongeaaen (30)! *Sl.* Aabenraa! Huusby (28); *Bornh.* ved Nexø (20).

242. **P. obtusifolius** [M. & Koch D. Fl. I, 855] (Budtbladet V.) H. II, 135; Drej. n. 183 (undt. Cit. af H. og Schum.); F. D. 2107; Rchb. l. c. fig. 43; H. N. V, 80.

Stængelen grenet, traadformet, trind-fladtrykt; *Bladene* linieformede, ved Grunden smalere og tokirtlede, budte, med en kort Braad, 3—5-nervede, Midtnerven stærkere end Side-nerverne og dannet af flere tæt samlede Karbundter; *Blomsterstilkene* lige tykke overalt, omtrent af Længde med det tæt 6—8-blomstrede *Ax*; *Frugterne* skjævt ovale eller halv-kreds-runde, sammentrykte, paa Ryggen budt trekjolede, ujævne.

Midtnerven af en blegere Farve end det øvrige Blad. 7—8. 4.

I Tørvmoser og Søer, ikke sjelden i *Sjælland* og paa *Halvøen*; *Bornh.* Vallensgaards Mose! *F.* ved Svaninge (12); *Loll.* Grønnegade (Rasmuss.); *Falst.* Moseby (14). *

243. **P. mucronatus** [Schr. i R. & Sch. syst. III, 517] (Braadbladet V.) *P. compressus* Oed. i F. D. 203; Rchb. l. c. fig. 42; Schum. n. 167; H. 184; *P. pusillus major* Fr. nov. p. 48; *P. Friesii* Rupr.

Stængelen grenet, firekantet-fladtrykt (ikke vinget); *Bladene* linieformede, budte, med en Braad, femnervede, med 2 Kirtler ved Grunden; *Blomsterstilkene* tykkere foroven, 1—3 Gange længere end det faa- og fjernblomstrede *Ax*; *Frugterne* skjævt elliptiske, med en budt trekjølet Ryg. 7—8. 4.

I Søer og Aaer, f. Ex. *Sj.* Aaerne ved Tiissø (11)! Papirmøllen, St. Hans Hospital (H.), Nestved (Oed.); *F.* Hvedholm (H.); *J.* Vaarsaa i Vendsyssel (12), Aalborg (Strandg.)! Vildsted Sø (herb. Drej.); Randers Fjord (3), mellem Kjeldst og Broeng V. for Varde (30!), alm. i Kongeaaen ved Hjortlund (12), Ribe (6); *Sl.* Marskrøfter ved Høyer (16); *Bornh.* (H.). *

Ann. 1. Maaskee høre ikke alle de Hornemannske Voxesteder herhid. At den af Hornem. og Schum. beskrevne *P. compressus* hører til *P. pusillus major* Fr. forekommer mig inidertid af Beskrivelserne og Cit. af F. D. utvivlsomt, denne nærmer sig ligesaameget *P. obtusifolius* som *P. pusillus*, og er ved den mere fladtrykte Stængel forskellig fra begge, hvorfor jeg har anseet dens Adskillelse som egen Art (hos Rchb. o. fl. Forf.) for vel begrundet.

Ann. 2. *P. rutilus* Wolfg. (Rchb. l. c. fig. 40—41; H. N. XV, 74; *P. caespitosus* Nolt. i Hans. Herb. n. 1007), som udmærker sig bl. A. ved stivere, i Tuer voxende *Stængler*, næsten toradede, trenervede *Blade*, som tilligemed *Åvelbladene* ere langt tilspidsede, i ældre Tilstand af en rødlig Farve, er optaget som dansk af Fr. (S.

Veg. Sc.), men jeg finder intetsteds omtalt, om (den af Prof. Nolte, som har fundet den i Holsteen, ogsaa er bemærket i Slesvig.

244. **P. pusillus** L. (Liden V.) H. 185; Drej. n. 182; Fr. nov. p. 48 (undtagen α , major); Schum. n. 169; F. D. 1451; Rehb. l. c. fig. 38—39; H. N. XII, 76.

Stængelen grenet, traadformet, trind-sammentrykt; *Bladene* smalt-linieformede, trenervede, braadspidsede, med 1—2 Kirtler ved Grunden; *Blomstestilkene* lige tykke overalt, 2— flere Gange længere end det 4—8-blomstrede, mellembrodte *Ax*; *Frugterne* (i Regelen alle udviklede) skjævt elliptiske, opblæste, jævne, paa Ryggen budt trekjolede.

Forekommer under flere Former, som dog alle ere finere og spædere end de foreg. 6—9. 4.

α , *vulgaris* Fr. nov. p. 49. Bladene trenervede, spidse, $\frac{1}{2}$ ''' brede.

β , *tenuissimus* M. & K. (Rehb. l. c. fig. 39). Bladene trenervede, med utydelige Sidenerver, tilspidsede, $\frac{1}{5}$ ''' brede.

I Aaer og Søer alm. α , den hyppigste Form; β , Sj. Dragerup ved Holbæks Fjord (21); *F.* Ollerup (12); *Falst.* Oustrup (14); *Sl.* Marskgrøfter ved Husum!

Ann. *P. gracilis* Fr. nov. p. 50, som foreg., men med ennervede Blade, kugleformet-elliptiske, trindryggede Frugter (Planten ved Tørring sort), kunde muligviis findes i vor Flora, men turde let forveksles med var. β af foreg., hvis Sidenerver ere meget utydelige.

245. **P. trichoides** [Cham. & Schldl. in Linnæa II, 176] (Haarfiin V.) Rehb. l. c. fig. 34; *P. monogynus* J. Gay, (Coss. & Germ. Atl. fl. Par. tab. 33, fig. 4—6).

Stængelen traadfiin, trind, meget grenet, med 1—4 Grene fra Bladhjørnerne; *Bladene* linie-børsteformede, trenervede med utydelige Sidenerver, tilspidsede; *Blomstestilkene* lige tykke overalt, oftest nikkende, flere Gange længere end det 4—6-blomstrede, mellembrodte *Ax*; *Frugterne* halv-kredsrunde, større end hos foreg., med en Tand ved Grunden paa den indadvendte Side, paa Ryggen vortet-rundtakkede. (Kun een Frugt kommer til Udvikling i hver Blomst).

Let kjendelig fra foreg. ved Frugterne og ved den eiendommelige Forgreningsmaade (cf. J. Gay i Bull. soc. bot. de Fr. 1854 Juill.). 7—8. 4.

Paa lignende Steder som foreg., men meget sjeldnere: **Falst.** Stubberup (14); **Sl.** Vilstrup ved Haderslev (8).

bb. *Axelbladene tilvorne til Bladenes Basis i Form af en toget Skede (Coleogeton Rchb.).*

246. **P. zosteraceus** [Fr. nov. p. 51] (Mangegrenet V.) Fr. S. Veg. Sc. p. 216; Rchb. l. c. fig. 33.

Stængelen meget langstrakt og grenet, med forneden fladtrykte, foroven tykkere Ledstykker; *Bladene* linieformede, flade, kort tilspidsede, de øvre tre-, de nedre femnervede, med tydelige Tværaarer; *Blomsterstilkene* meget lange, med langt Mellemrum mellem Blomsterkrandsene; *Blomsterdækkets* Blade omvendtægformede med indbøiet Spidse; »*Frugterne* næsten kugleformede, paa Ryggen trekjolede«.

I Havet og i Aaer med stærk Strøm, sjelden: **J.** i Mængde i Kongeaaen mellem Hjortlund og Skodborg (12!); Lyø (12)?

Anm. I Henseende til Bladene ligner den *P. zosteraceus*, i Henseende til Blomsterstanden *P. marinus*; i Forgreningsmaaden og dens hele Habitus staaer den nærmest *P. pectinatus*. Den af mig (efter et sterilt Exemplar) som *P. pectinatus* γ , *flabellatus* med Tvivl anførte Form (Haandb. 2 Udg. p. 124) hører sandsynligviis herhen, hvorimod *P. flabellatus* Bab. efter Expl. fra Forf. staaer saa nær ved *P. pectinatus*, at jeg ikke kan antage den for andet end en bredbladet Form af denne.

247. **P. pectinatus** L. (Børstebladet V.) H. 185; Schum. n. 171—72 (*P. pectinatum* og *P. marinum*); Drej. n. 181; Fr. nov. p. 52; F. D. 186 (*P. marinum*) og 1746; Rchb. l. c. fig. 30—32; H. N. V, 82.

Stængelen grenet, langstrakt, traadformet; *Bladene* linieformet-børsteformede, svagt indrullede, tilspidsede, ennervede; *Bladskedens* Ører oprette; *Blomsterstilkene* lange; *Axet* mellembrudt; *Blomsterdækkets* Blade nyreformet-rundagtige; *Frugterne* halv-kredsrunder, opblæste, i tørret Tilstand budt trekjolede.

Stænglerne alm. meget lange; var. med tæt- og fjernblomstrede **Ax**, smalere og bredere Blade o. s. v. 6—8. 4.

β , *scoparius* Wallr. (Rchb. 32). *Bladene* haarfine, knippeformigt samlede.

I flydende og stillestaaende, saavel Færsk-, som oftere Salt- og Brakvand; alm. i Danmark, især i Mængde i Fjordene paa Halvøens

Østkyst. β , med Hovedarten, især i Brakvand paa Leergrund, f. Ex. *Falst.* hist og her (Koch); *F.* Hofmangsgave (18), i Brakvand N. for Nyborg (Lund); Gravensteens Nor paa *Ærø* (10); *J.* Lillestrand ved Ødstedgaard!

248. *P. marinus* L. (Traadformet V.) Fr. nov. p. 54; H. N. III, 65; Rehb. l. c. fig. 27—29; *P. filiformis* Pers., H. II, 136; Drej. n. 180; F. D. 2106; Nolte nov. p. 20; *P. setaceum* Schum. n. 170 (ikke L.).

Stænglerne enkelte eller kortgrenede, med tæt sammentrængte Ledstykker; *Bladene* haarfine, ennervede, trindt-fladtrykte, paa Grund af de korte Ledstykker knippeformigt samlede; *Bladskedernes* Ører udstaaende; *Blomsterstilkene* meget lange, haarfine, enlige paa Stænglerne; *Åxene* med 3—4 fjerne, alm. toblomstrede Krandse; *Blomsterdækkets* Blade spadeformede; *Frugterne* omvendt-ægformet-kugleformede, sammentrykte, paa Ryggen budte, i tørret Tilstand rynkede.

Finere og meget lavere end foreg., Frugterne neppe halvt saa store som hos hiin. Disse 2 Arter adskilles desuden let ved et aldeles forskjelligt Udseende. 6—8. 7.

β , *fasciculatus* (Rehb. l. c. fig. 28—29; *P. fasciculatus* Wölg.), Blomsterstilkene af Længde med eller kortere end Bladene.

Medens den i Sverige, saaledes som Navnet antyder, oftest findes i Saltvand, er den hos os udelukkende bemærket i Færskvandssøer, og sjældnere end foreg.; *Sj.* Tiissø, Sorø Sø! Haraldsted Sø (11), Fuursøen ved Frederiksdals Mølle (Dr.), Gurre Sø (14); *Loll.* Maribo Sø ved Engestofte (19); *F.* Sørup Sø (12); *J.* Vandet Sø i Thy (herb. Drej.), Gudenaas ved Randers (7), Skanderborg Sø (Aabye); *Sl.* (N.)- β , *Sj.* Gyrstinge Sø (12).

22. *Ruppia*. Havgræs.

249. *R. spiralis* [L. adnot. in herb. suo, cf. C. Hartm. Anteckn. i Vet. Akad. Handl. 1849 p. 191] (Langstillet H.) Dumort. fl. Belg., J. Gay i Coss. pl. crit. 1848; *R. maritima* L. (ex part.) H. 186; Drej. n. 179; Lge. Haandb. 1 Udg. S. 112; F. D. 364; Rehb. l. c. fig. 26; H. N. XII, 77.

Bladene børsteformede, ved Grunden omskedende; *Skeden* foroven kantet; *Blomsterstilkene* under Modenheden meget lange, alm. spiralformigt snoede; *Støvknappernes* Rum ovale; *Frugterne*

mange Gange kortere end Frugstilkene, ægformede, skjævt oprette (Griffel og Ar staae ligefor Frugstilken). 7—9. 4.

I Salt- og Brakvand, i Vandhuller, som overskyldes af Havet, alm. udbredt.

Anm. *Ruppia maritima* L. er uden Tvivl et collectivt Navn, som indbefatter baade denne og følgende Art. Ifølge den citerede Afhandling af Mag. C. Hartman er det endog *R. rostellata*, som under hiint Navn findes opbevaret i Linnés Herbarium, medens den almindelig saakaldte *R. maritima* der benævnes *R. spiralis*. Da dette sidste Navn tillige betegner en af Plantens meest fremtrædende Characterer, kan det med god Grund foretrækkes for det ældre, som desuden med lige god Ret kan anvendes paa enhver af Arterne.

250. **R. rostellata** [Koch i *Rehb. ic. crit.* 2, f. 306] (Skjævfrugtet H.) Drej. n. 178; *Rehb. ic. fl. germ.* VII, fig. 25; H. N. VI, 68; *R. maritima* Linn. *Herb. ex C. Hartm.* l. c.

Bladene som foreg.; *Skeden* mindre og ikke kantet; *Blomsterstilkene* under Modenheden langt kortere end hos foreg. (ikke snoede); *Støvknappernes* Rum næsten kugleformede; *Frugterne* flere Gange kortere end Frugstilken, fra en ægformet Basis halvmaaneformigt opstigende, tværstilte (Griffelen falder ikke i Linie med Frugstilken); *Frøggjernet* bruskagtigt.

Ifølge J. Gay (*Gren. & Godr. fl. Fr.* III, 324) er Frugtens Form foranderlig og kan ikke med Sikkerhed benyttes som Kjendetegn fra foreg. 7—9. 4.

Paa samme Steder som foreg., ikke sjelden og bemærket ved Kysterne af alle danske Provindser.

251. **R. brachypus** [J. Gay i *Coss. not. crit.* 1848 p. 10] (Kortstillet H.).

Bladene som hos foreg., *Bladskederne* bredere og mere oppustede; *Blomsterstilkene* meget korte (1—4''' lange); *Støvknappernes* Rum ægformet-kugleformede; *Frugstilkene* omtrent af Frugternes Længde (lidet kortere eller længere end samme); *Frøggjernet* beenhaardt. 8—9. 4.

Paa lignende Steder som de foregaaende Arter, men sjældnere. *Sj.* Øresund udfor Classens Have (26)! *Loll.* Lienlund ved Nakskov (19)!

5^{te} Klasse. Pentandria (Femhannede).

1. Orden. Monogynia (Enhunnede).

A. Blomsterdækket dobbelt.

a. Kronen sambladet, undersædig.

aa. Frugterne 4 Nødder med en midtstillet Griffel. (Blomsterne i ensidige, før Udspringningen spiralformigt sammenrullede Klaser eller Ax.*) Bladene oftest rue. (1—12. N. F. *Asperifoliæ*.)

α. Kronens Svælg uden Bikrone.

1. **Échium** L. Bægeret femdeelt; Kronen uregelm. tragtformet, næsten tolæbet; Støvdragerne uligelange; Smaafrugterne ved Grunden flade.

2. **Lithospérmum** L. Bægeret femdeelt; Kronen regelm. tragtformet; Svælget indsnøret af 5 indvendig haarede Længdefolder; Smaafrugterne beenhaarde, ved Grunden flade.

3. **Stenhammária** Rchb. Bægeret femdeelt; Kronen regelm. tragtformet; Svælget i Midten sammenknebet, glat; Smaafrugterne trekantede, ved Grunden puklede, furede, uden Ring; Frøgjemmet hindeagtig-opblæst.

4. **Pulmonária** L. Bægeret femtandet; Kronen regelm. tragtformet med en Haarkrands i Svælget; Smaafrugterne glindsende, fladtrykt-convexe, ved Grunden udhulede og omgivne af en Ring.

β. Kronens Svælg indsnøret af skjæl- eller tandformede (indvendig hule) Tilhængsler (den saakaldte »Bikrone«).

αα. Smaafrugterne tilvøxne til (og sammenhængende med) Griffelen.

5. **Asperugo** L. Bægeret først femfliget med todeelte Tænder mellem Fligene, tilsidst dybt todeelt, fladtrykt og tæt

*) Blomsterstandens første Forgrening er i Regelen gaffeldeelt, stundom med en Blomst i Gaffeldelingen efter den qvastformede Typus. Den yderligere Forgrening i saakaldte ensidige Klaser eller Ax er vistnok rettest at forklare som en Qvast, hvor bestandigt kun den ene Side kommer til Udvikling.

omgivende den modne Frugt; Smaafrugterne sammentrykte, med den smalere Side tilvoxne til Griffelen, tæt og fint vortet-punkterede.

6. **Cynoglössum** L. Bægeret regelm. femdeelt; Smaafrugterne fladtrykte, med den brede Side (henimod Spidsen) tilvoxne til Griffelen, overalt beklædte med Hagebørster.

† 7. **Omphalódes** Tournef. Bægeret regelm. femdeelt; Smaafrugterne hindeagtige, fladtrykte, mod Spidsen baadformigt sammendragne med indrullet Rand, med den brede Side tilvoxne til Griffelen, uden Hagebørster.

8. **Echinospérnum** Sw. Bægeret regelm. femdeelt; Smaafrugterne trekantede, med 2 Rækker Hagebørster i Randen, med den brede Side tilvoxne til Griffelen.

ββ. *Smaafrugterne tilvoxne til Frugtbunden (eller en undersædlig Skive),*

* ved Grunden flade.

9. **Myosótis** L. Kronen hjulformet eller fladkravet; Svælget lukket af 5 vorteformede Tilhængsler; Smaafrugterne jævne, glindsende.

** Smaafrugterne ved Grunden udbulede og omgivne af en Ring.

10. **Borrágo** L. Kronen hjulformet, med korte, budte eller udrandede, skjælformede Tilhængsler i Svælget; Støvtraadene tokløvede; Støvknappen befæstet paa den indadvendte Tand; Smaafrugterne rynkede.

11. **Anchúsa** L. Kronen tragtformet eller fladkravet; Svælgets Tilhængsler hvid-randhaarede, budte; Støvdragerne uden Tilhængsler; Støvtraadenes frie Deel kortere end Støvknapperne; Smaafrugterne rynkede.

12. **Sýmphytum** L. Kronen kølleformet; Svælgets Tilhængsler sylspidsede, tillukkende Røret; Støvdragerne uden Tilhængsler; Støvtraadene omtrent af Længde med Støvknapperne; Smaafrugterne jævne.

bb. Frugten Heelfrugt med endestillet Griffel,

α, bærartig.

13. **Átropá** L. Bægeret grønt, femfliget med udstaaende Flige, længere end Frugten; Kronen klokkeformet; Støvknapperne aabne sig paalangs (Urt med enlige Blomster).

14. **Phýsalis** L. Bægeret femtandet, tilvoxende efter Afblomstringen, under Frugtens Modenhed farvet, blæreformigt omsluttende Bærret; Kronen hjulformet; Støvknapperne aabne sig paalangs (Urt med enlige Blomster fra Bladhjørnerne).

† **Nicandra** Adans. Bægeret femfliget, med ægformede, oprette Flige og piilformede Ører ved Grunden, efter Afblomstringen blæreformigt opblæst og omsluttende Frugten; Kronen klokkeformet; Støvknapperne opspringe paalangs, Bærret saftløst.

15. **Solánium** L. Bægeret grønt, femdeelt, kortere end Frugten; Kronen hjulformet; Støvknapperne opspringe ved Huller i Spidsen (Urter eller Halvbuske med Blomster i uregelm. skjærmformet Qvast, oftest udgaaende fra Midten af Ledstykkerne).

16. **Lýcium** L. Bægeret grønt, tolæbet, meget kortere end Frugten; Kronen fladkravet eller tragtformet; Støvknapperne opspringe paalangs (Buske med tornede Grene, enlige eller knippestillede Blomster fra Bladhjørnerne).

β. Frugten 2—4-rummet Kapsel.

17. **Hyoscýamus** L. Kronen femlappet, uregelm. tragtformet; Kapselen tværopspringende, torummet, tæt omgivet af det vedblivende, femtandede Bæger; Arret udeelt, rundagtig-fladtrykt.

18. **Datúra** L. Kronen femtandet, regelm. tragtformet; Bægeret femtandet, tilsidst omkringskaaret; dets øvre Deel afaldende, den nedre vedblivende; tilbagebøiet; Arret tolappet; Kapselen firerummet, fireklappet, opspringende paalangs. (Nr. 13—18. N. F. Solanæ).

19. **Verbáscum** L. Bægeret femdeelt, vedblivende; Kronen

femdeelt; uregelm. hjulformet; Støvdragerne uligelange (Støvtraadene, alle eller nogle, beklædte med Uld); Kapselen toklappet, opspringende paalangs, mangefrøet, med smaae Frøe. (N. F. Scrophularineæ α).

20. **Convólulus** L. Bægeret fembladet; Kronen regelm. tragtformet, svagt femtandet, i Knopleiet snoet; Støvdragerne ligelange; Kapselen faafrøet med store Frøe; 2 Ar. (Slyngende Urter med Mælkesaft. N. F. Convolvulaceæ).

† *Polemoniúm* L. Bægeret femdeelt; Kronen dybt femfliget, hjulformet-klokkeformet, med snoet Knopleie; Arret tredeelt; Kapselen trerummet og treklappet med rundelende Opspringning, indeholdende 6—9 kantede Frøe. (N. F. Polemoniaceæ).

21. **Erythræa** Pers. Bægeret femdeelt; Kronen regelm. tragtformet, femfliget, i Knopleiet snoet; Støvknapperne efter Bestøvningen spiraldreiede; Kapselen ufuldstændigt torummet, mangefrøet; Frøene smaae, befæstede paa Frugtbladenes indbøiede Rande. (N. F. Gentianeæ).

γ. Frugten enrummet med vægstillede Frøstole.

22. **Gentiána** L. Bægeret 2—5-deelt; Kronen tragtformet eller fladkravet, 4—5-fliget, med snoet Knopleie; Kapselen toklappet, med talrige smaae Frøe paa Klappernes indbøiede Rande. (Bladene heelrandede, modsatte).

23. **Menyántes** L. Bægeret femdeelt; Kronen tragtformet, med foldet Knopleie og femfliget, indvendig fryndset Krave; Frøgjemmet saftigt, tilsidst uregelmæssig opspringende paalangs; Frøene store. (Sumplante med trekoblede, afvexlende Blade). (21—23. N. F. Gentianeæ).

† *Limnanthemum* Gmel. Bægeret dybt femdeelt; Kronen hjulformet, femlappet, med randhaarede Lapper og fryndset Svælg; Frøgjemmet uoppringende; Frøene fladtrykte, randhaarede. (Vandplante med heelrandede, kreds rundt-nyreformede Blade. N. F. Gentianeæ).

δ. Frugten enrummet med midtstillet Frøstol.

24. **Primula** L. Bægeret femtandet; Kronen tragtformet eller fladkravet; Arret kugleformet; Kapselen opspringende i

Spidsen med (5—10) Tænder. (Eng- eller Skovplanter med hele, rundtakkede Blade, alle samlede ved Grunden).

25. **Hottónia** L. Bægeret dybt femdeelt; Kronen fladkravet, med kort Rør; Arret rundagtig-flydtrykt; Kapselen femklappet med i Spidsen sammenhængende Klapper. (Vandplante med kamdeelte, rosettestillede Blade).

26. **Lysimáchia** L. Bægeret femdeelt; Kronen hjulformet; Arret tværhugget; Kapselen femklappet, opspringende paalangs. (Bladene heelrandede, modsatte).

27. **Anagállis** L. Bægeret femdeelt; Kronen hjulformet; Arret kuglerundt; Kapselen tværopspringende. (Bladene som hos foreg.) — 24—27. N. F. Primulaceæ).

cc. *Frugten fleerfoldig (2 Bællekapsler).*

28. **Vinca** L. Bægeret femdeelt; Kronen fladkravet, i Knopleiet snoet; Støvknapperne sammenstødende ovenfor Arret; 2 Frugtknuder med en fælles Griffel udvidet til et saftfuldt, i Spidsen skjægget Ar. (N. F. Apocynæ).

b. Kronen sambladet, oversædlig.

aa. *Frugten kapselagtig,*

α, opspringende ved Klapper.

29. **Sámolus** L. Bægeret halvt-oversædigt, femdeelt; Kronen regelm. femdeelt med fem tandformede Tilhængsler (golde Støvdragere) mellem Fligene; Støvdragerne frie; Kapselen enrummet, femklappet. (N. F. Primulaceæ).

30. **Lobélia** L. Bægeret femdeelt, oversædigt; Kronen uregelret, Røret spaltet i den ene Side; Støvknapperne sammenvoxne; Kapselen 2—3-rummet, 2—3-klappet. (N. F. Lobeliaceæ).

β. Kapselen opspringende ved Huller. (31—33. Urter med Mælkesaft. N. F. Campanulaceæ).

31. **Campánula** L. Kronen klokkeformet; Støvdragerne frie; Arret treffiget; Kapselen 2—3-rummet, opspringende ved Huller paa Siden (Blomsterne enlige eller i Klaser).

32. **Phyteuma** L. Kronen med 5 i Begyndelsen foroven sammenhængende, tilsidst stjerneformigt udbredte Flige; Støvdragerne frie; Arret treffliget; Kapselen trerummet, opspringende i Huller ved Grunden eller paa Midten (Blomsterne i Ax).

33. **Jasione** L. Kronen som foreg., med til Grunden deelt Krave; Støvknapperne ved Grunden sammenvoxne; Arret kølleformet, tilsidst tolappet; Kapselen torummet, opspringende ved Huller i Spidsen (Blomsterne i Blomsterkurv med mangebladet Kurvdække).

bb. Frugten bæragtig.

34. **Lonicera** L. Kronen uregelret; Støvdragerne frie; Arret næsten kugleformet; Bærret 2—3-rummet. (Buskvæxter med modsatte Blade). (N. F. Caprifoliaceæ).

Sambucus. Kronen regelret, hjulformet, Frugt trefrøet Steenfrugt (5, 3).

Viburnum. Kronen regelret, hjulformet, Frugt enfrøet Steenfrugt (5, 3).

Rubia. Kronen regelret, hjulformet, to enfrøede Steenfrugter (4, 1).

c. Kronen fribladet.

aa. Kronen uregelret (hos 35—36), Frugten kapselagtig.

35. **Viola** L. Bægeret fembladet, med Tilbængsler ved Grunden; Kronen uregelm. fembladet, det større Kronblad med en Spore; Støvknapperne sammenhængende, de 2 nedre med Spore, Knapbaandet forlænget udenfor Rummene; Kapselen opspringer fra Spidsen til Grunden i 3 Klapper; Frøstolene vægstillede. (N. F. Violarieæ).

36. **Impatiens** L. Bæger og Krone trebladede, uregelm., det uparrede Bægerblad stort, farvet, forlænget i en Spore; Støvknapperne sammenhængende; Kapselen elastisk opspringende i 5 Klapper fra Grunden; Frøstolen midtstillet. (N. F. Balsamineæ).

Erodium. Blomst undersædig, femdelelig Spaltefrugt (10, 1).

Geranium rotundifolium. (10, 1).

Euonymus. Bæger og Krone regelm. 4—5-bladede (4, 1).

bb. Kronen regelret, Frugten bæragtig.

37. **Rhamnus** L. Blomsten undersædig eller omkringsædig; Bæger og Krone 4—5-bladede; Bærret 2—4-rummet, med ligesaamange Frøe. (Buske med fjernervede hele Blade). (N. F. Frangulaceæ).

38. **Ribes** L. Blomsten oversædig, femdeelt; Arret todeelt; Bærret enrummet, med 2 vægstillede Frøstole, mangefrøet. (Buske med haandlappede Blade). (N. F. Ribesiaceæ).

39. **Hédéra** L. Blomsten oversædig eller halvt-oversædig, femdeelt; Arret udeelt; Bærret femrummet, femfrøet. (Klattrende Busk med haandlappede, stedsegrønne Blade). (N. F. Araliaceæ).

B. Blomsterdækket enkelt,

a, undersædigt.

40. **Glaux** L. Bægeret farvet, klokkeformet; Krone 0; Frugten femklappet, enrummet, 5—10-frøet Kapsel. (Strandplante med modsatte Blade uden Axelblade). 4. (N. F. Primulaceæ).

41. **Illecébrum** L. Blomsterdækket hindeagtigt, fembladet, med hætteformede, i en lang Spids endende Flige; Støvdragerne 10, de 5 golde; Frugt femklappet, enfrøet. (Enaarig Urt med modsatte Blade og hindeagtige Axelblade). (N. F. Paronychiæ).

Polygonum. Blomsterdækket farvet, 4—5-bladet, Støvdragerne 5—8, Frugten nødagtig (6, 3).

Herniaria. Blomsterdækket grønt, femdeelt (5, 2).

b. Blomsterdækket oversædigt.

42. **Thésium** L. Blomsterdækket 4—5-deelt, udvendig grønt, indvendig farvet (hvidt); Støvdragerne befæstede til og modsatte Blomsterdækkets Flige, med et Knippe af Haar ved Grunden udadtil; Frugten enfrøet, uopspringende (Skalfrugt). (N. F. Santalaceæ).

2. Orden. *Digynia* (Tohunnede).

A. Blomsterdækket enkelt.

a. Frugt enfrøet (Nød eller Hindefrugt) indsluttet i det vedblivende Blomsterdække. (Urteagtige Væxter).

aa. *Bladene flade, med hindeagtige Axelblade.*

43. **Herniária** L. Blomsterdækket grønt, femdeelt, Fligene budte; Støvdragerne 10, de 5 golde; 2 siddende, meget korte Ar. (N. F. *Paronychieæ*).

Illecebrum. Blomsterdækket hindeagtigt, Fligene sylspidsede (5, 1).
Polygonum amphibium. (6, 3).

bb. *Bladene flade, uden Axelblade.*

44. **Beta** L. Frugten tilvoxen til det vedblivende, femdeelte, kjød- eller bruskagtigt tilvoxende Blomsterdække; Frøet vandret, med hindeagtig Skal.

45. **Chenopodium** L. Blomsterdækket grønt, femdeelt; Frugten fri; Frøet vandret med hornagtig Skal.

46. **Blitum** L. (C. A. Mey.) Støvdragerne 1—5; Frugten fri i det vedblivende, femdeelte, ofte farvede (og kjødfulde) Blomsterdække. Frøet lodret (eller undtagelsesviis vandret) med hornagtig Skal.

Atriplex. Frugt fri, Frøet lodret, med hornagtig Skal, ♀ Blomsterdækket tobladet (21, 5).

Halymus. ♀ Blomsterdækket tofliget, tæt omsluttende Frugten, Frøet lodret, med hindeagtig Skal (21, 5).

cc. *Bladene trinde eller halvtrinde, kjødfulde.*

47. **Chenopodina** Moq. Blomsterdækket femdeelt, uden Tilhængsler; Frøets Skal hornagtig; Kimen spiraldreiet, Frøhvide 0. (Bladene uden Torne).

48. **Salsola** L. Blomsterdækket fembladet, efter Afblomstringen med vingeformede, paatværs tilvoxne Tilhængsler; Frøets Skal hindeagtig; Kimen spiraldreiet; Frøhvide 0 (Bladene i Spidsen tornede).

49. **Kóchia** Roth. Blomsterdækket femdeelt, med efter Afblomstringen paatværs tilvoxne Tilhængsler; Frøets Skal hindeagtig; Kimen ringformigt omgivende den midtliggende Frøhvide. (Bladene uden Torne). 44—49. (N. F. Salsolaceæ).

Scleranthus. 10 Støvdragere (de 5 ofte golde), Bladene sylformede (10, 2).

b. Frugten (Vingefrugt) længere end Blomsterdækket. 12.

50. **Ulmus** L. Blomsterdækket 4—6-deelt, klokkeformet; Støvdragerne 4—8; Frugten enrummet, enfrøet, med et paa alle Sider af Frøet hindeagtigt udvidet, fladtrykt Frøgjemme. (Træer med afvejlende, ved Grunden skjæve Blade, Blomsterne i sidestillede Hoveder eller Skjærme, udvikles før Bladene). (N. F. Ulmaceæ).

B. Blomsterdækket dobbelt.

a. Kronen undersædig, sambladet, Frugten kapselagtig.

51. **Vincetóxicum** Moench. Bægeret dybt femdeelt; Kronen hjulformet, med femlappet Bikrone; Støvknapperne sammenhængende, ved deres Knapbaands hindeagtige Forlængelse dannende et Tag over det skjoldformede, for begge Grifler fælles Ar; Støvet i Masser. Frugterne 2 (sjeldnere 1) Bællekapsler; Frøene med Frøuld. (N. F. Asclepiadeæ).

52. **Cuscúta** L. Bægeret 4—5-deelt; Kronen 4—5-fliget, klokke- eller kugleformet, med skjælformet Bikrone; Støvdragerne frie; Frugten en torummet Buddike; Frøene uden Frøuld; Kimen spiralkrummet, Frøhviden midtliggende. (Bladløs Snylteplante med Sugevorter, Blomsterne i kugleformede Hoveder). (N. F. Cuscutinæ).

Gentiana. Kronen tragtformet eller fladkravet, Støvdragerne frie, Kapselen toklappet, opspringende paalangs (5, 1).

b. **Kronen oversædig, fribladet***), Frugt todelelig Spaltefrugt, Smaafrugterne nødagtige, Frøgjemmet ofte udvendig forsynet med Ribber, indvendig med Oliekanaler; Blomster i enkelt eller sammensat Skjærm, ofte med Stor- og Smaasvøb. (53—88. N. F. Umbelliferæ).

aa. *Skjærmen hovedformet (Blomsterne siddende),*

α, enkelt.

53. **Hydrocótyle** L. Bægerkraven utydelig; Kronbladene hele, spidse; Frugten fladtrykt fra Siden; Smaafrugterne femribbede (de 3 Ribber ofte utydelige). (Bladene skjoldformede).

54. **Eryngium** L. Bægerkraven femtandet; Kronbladene i Spidsen indbøiede og derved toffigede; Frugten trind, Smaafrugterne uribbede, beklædte med Skjæl. (Bladene tornettandede.)

β. *Skjærmen sammensat.*

55. **Sanicula** L. Bægerkraven femtandet; Kronbladene med indbøiet Spidse og derved udrandede; Frugten trind, Smaafrugterne uribbede, beklædte med Hagebørster. (Bladene haandsnitdeelte).

bb. *Blomsterne i egenlig Skjærm (stilkede).*

α. Smaafrugternes Bugflade med flad eller convex Frøhvide.
(Orthospermæ).

aa. *Hovedribberne 5, Biriiberne 0.*

α'. *Skjærmen enkelt.*

† **Astrántia** L. Blomsterne omgivne af et mangebladet Svøb; Bægerkraven femtandet; Hovedribberne tykke, beklædte med 2 Rader brede og budte, tandformede Skjæl, Mellemrummene uden Oliekanaler.

*) Hos mange Slægter i denne Afdeling er den oversædige Bægerkrave saa svagt udviklet, at den indskrænkes til en utydelig Rand eller synes at mangle, hvorved Blomsterdækket faaer Udseende af at være enkelt.

β'. Skjærmen sammensat.

* Frugten sommentrykt fra Siden.

† Kronbladene i Spidsen udeelte.

56. **Bupleurum** L. Bægerkraven utydelig; Kronbladene budte, med indbøiet Spidse; Ribberne vingeformigt fremstaaende, Mellemrummene uden Oliekanaler. (Bladene hele, Kronerne gule).

57. **Helosciadium** Koch. Bægerkraven utydelig eller svagt femtandet; Kronbladene spidse, indbøiede; Ribberne traadformigt fremstaaende, 1 Oliekanal i hvert Mellemrum (Bladene snitdeelte, Kronerne hvide).

58. **Apium** L. Stor- og Smaasvøb 0; Bægerkraven utydelig; Kronbladene i Spidsen afrundede og indbøiede; Ribberne traadformigt fremstaaende, 2 Oliekanaler i hvert Mellemrum; Frugtstolen udeelt. (Bladene snitdeelte; Kronbladene hvide.)

† *Petroselinum* Hoffm. Svøbet faabladet; Frugtstolen todeelt; 1 Oliekanal i hvert Mellemrum, forøvrigt som foreg.

†† Kronbladene ved Spidsens Indbøining udrandede eller omvendt-hjerteformede.

1. Bægerkraven utydelig.

59. **Aegopodium** L. Frugten ægformet, uden Oliekanaler; Stor- og Smaasvøb 0.

60. **Carum** L. Frugten elliptisk, 1 Oliekanal i hvert Mellemrum, 2 paa Bugfladen; Storsvøbet faabladet, Smaasvøb 0.

61. **Pimpinella** L. Frugten ægformet eller oval, flere Oliekanaler i hvert Mellemrum og paa Bugfladen; Stor- og Smaasvøb 0.

2. Bægerkraven tydeligt femtandet.

62. **Cicuta** L. Smaafrugterne næsten kuglerunde, med hvælvet Bugflade; 1 Oliekanal i hvert Mellemrum; Storsvøbet 0, Smaasvøbet flerbladet.

63. **Falcaria** Host. Frugten aflang; Bugfladen plan; 1 Oliekanal i hvert Mellemrum; Stor- og Smaasvøb flerbladede.

64. **Sium** L. Frugten elliptisk eller ægformet; Bugfladen

plan; flere Oliekanaler i hvert Mellemrum; Stor- og Smaasvøb fleerbladede.

** Frugten sammentrykt fra Ryggen (eller trind).

+ *Smaafrugternes Sideribber sammensluttende.*

1. Frugtens Gjennemsnit trindt eller svagt sammentrykt.

4' Bægerkraven tydeligt femtandet.

65. **Oenánthe** L. Bægertænderne og de oprette Grifler vedblivende; Frugten glat, omvendt-kegleformet eller elliptisk, trind eller kantet, med budt-afrundede Ribber, 1 Oliekanal i hvert Mellemrum; Frugtstolen tilvoxet til Frugten; Frøet fastvoxet til Frøgjemmet.

66. **Libanótis** Crantz. Bægertænderne affaldende; Griflerne tilsidst tilbagebøiede; Frugten haaret, oval, trind eller noget sammentrykt, med tykke, budte Ribber, 1 Oliekanal i hvert Mellemrum, 4 paa Bugfladen; Frugtstolen fri; Frøet fastvoxet til Frøgjemmet.

67. **Halóscias** Fr. Bægertænderne meget smaae; Griffelen tilbagebøiet; Frugten glat, elliptisk, noget sammentrykt, med 5 skarptvingede Ribber; flere Oliekanaler i hvert Mellemrum, 6 paa Bugfladen; Frugtstolen fri; Frøet løst i Frøgjemmet.

2' Bægerkraven utydelig.

68. **Aethúsa** L. Frugten trind, ægformet-kugleformet, med tykke, skarpt kjølformede Ribber (Sideribberne bredere); 1 Oliekanal i hvert Mellemrum, 2 paa Bugfladen; Frugtstolen fri; Storsvøbet 0; Smaasvøbets Blade linieformede, nedhængende.

69. **Cnidium** Cusson. Frugten trind, oval; Ribberne hindeagtigt vingede; alle ligebrede; Stor- og Smaasvøbbladene børsteformede, udstaaende, forøvrigt som foregaaende.

2. Frugten lindseformigt fladtrykt, Sideribberne med en udvidet Rand, (hvorved Frugten bliver tovinget).

4' Kronerne hvide eller rødlig.

70. **Peucedanum** L. Bægerkraven tydelig femtandet; Alle Ribber i lige Afstand fra hinanden; de 3 midterste Ribber traad-

formede (Sideribberne svagere), Oliekanalerne (1 i hvert Mellemrum) nedløbende til Basis af Frugten, 2 paa Bugfladen.

† 71. **Imperatoria** L. Bægerkraven utydelig; Kronbladene omvendt-hjerteformede, med indbøiet Spidse; alle Ribberne i lige Afstand fra hinanden; Midtribberne skarpt kjølformede; Oliekanalerne som hos foreg.

72. **Heracléum** L. Bægerkraven tydelig femtandet; de 3 midterste Ribber traadformede, i lige Afstand fra hinanden, men fjernede fra Sideribberne; Oliekanalerne 1 i hvert Mellemrum, forsvindende ovenfor Basis, 2 paa Bugfladen, kølleformigt udvidede nedentil og ophørende ovenfor Midten.

2^e Kronbladene gule.

73. **Pastinaca** L. Bægerkraven utydelig; Kronbladene rundagtige, udrandede med indrullet Spidse; de 3 midterste Ribber traadformede, fjernede fra Sideribberne; Oliekanalerne (1 i hvert Mellemrum) ophørende nedenfor Midten.

† 74. **Anéthum** L. Bægerkraven utydelig; Kronbladene tværsafskaarne, med indrullet Spidse; alle Ribberne i lige Afstand fra hinanden; Midtribberne skarpt kjølformede; Oliekanalerne naae til Grunden af Mellemrummene.

+ *Smaasfrugternes Sideribber frastaaende (Frugten firevinget).*

1. Bægerkraven utydelig, Frøet fastvoxet til Frøgjemmet, 1 Oliekanal i hvert Mellemrum.

75. **Levisticum** Koch. Kronbladene afrundede med indbøiet Spidse (gule); Midtribberne vingede, smalere end Sideribberne; Storsvøb og Smaasvøb mangebladede.

76. **Selinum** L. Kronbladene i Spidsen udrandede, omvendt-hjerteformede, med indbøiet Spidse (hvide); Midtribberne vingede, smalere end Sideribberne; Storsvøb 0 eller faabladet, Smaasvøbet mangebladet.

77. **Angélica** L. Kronbladene hele, spidse, lidet indbøiede (hvide eller røde); Midtribberne traadformede, flere Gange smalere end Sideribberne; Storsvøb 0 eller faabladet, Smaasvøbet mangebladet.

2. Bægerkraven femtandet, Frøet frit (løst i Frøjemmet), beklædt med talrige Oliekanaler.

78. **Archangélica** Hoffm. Kronbladene hele, spidse, med indrullet Spidse; Midtribberne skarpt kjølformede, flere Gange smalere end de vingede Sideribber.

ββ. *Hovedribberne 5, Biribberne 4.*

79. **Laserpitium** L. Bægerkraven femtandet; Kronbladene udrandede, omvendt-hjerteformede; Hovedribberne traadformede; Biribberne hindeagtigt vingede, uden Børster eller Torne. Storsvøbets Blade udeelte.

80. **Daucus** L. Bægerkraven femtandet; Kronbladene udrandede, omvendt-hjerteformede; Hovedribberne traadformede (de 3 midterste beklædte med Børster, Sideribberne udgaae fra Bugfladen), Biribberne vingede, med en enkelt Rad Torne. Storsvøbets Blade fjersnitdeelte.

β. Smaafrugterne med en Længdefure paa Bugfladen, dannet af Frøhvidens indbøiede Rande (*Campylospermæ*).

αα. *Bægerkraven femtandet, Hovedribberne 5, Biribberne 4, beklædte med Pigge og Børster.*

81. **Caucalis** L. Hovedribberne traadformede, beklædte med Børster; Biribberne med en enkelt Række af Pigge.

82. **Torilis** Adans. Hovedribberne beklædte med Børster, Biribberne med flere Rækker af Pigge.

ββ. *Bægerkraven utydelig, Hovedribberne 5 (eller 0), Biribberne 0.*

* Smaafrugterne ende i et Næb.

83. **Anthriscus** Hoffm. Smaafrugterne uribbede; Næbet femribbet, kortere end Frugten.

84. **Scandix** L. (excl. sp.) Smaafrugterne med 5 budte Ribber; Næbet uribbet, af Frugtens dobbelte Længde.

** Smaafrugterne uden Næb.

85. **Chærophýllum** L. (excl. sp.) Smaafrugterne lancetformede (eller linieformede), med budte Ribber; 1 Oliekanal i hvert Rum; Storsvøb 0.

86. **Myrrhis** Scop. Smaafrugterne lancetformede; Frøgjemmet med en dobbelt Hinde, den indre tæt beklædende Frøet, den ydre løs, med ophøiede, skarpe, hule Ribber; Oliekanaler og Storsvøb 0.

87. **Conium** L. Frugten ægformet, med ophøiede, bølgetandede Ribber; Oliekanaler 0; Storsvøbet mangebladet.

γ. Frøhviden udhulet, foroven og forneden sammenbøiet.
(Coelospermæ).

† 88. **Coriandrum** L. Bægeret femtandet, Kronbladene ved den indbøiede Spidse omvendt-hjerteformede, (paa Straaleblomsterne dybt todeelte); Frugten kugleformet, med sammenhængende Smaafrugter og svagt ophøiede, bølgede Ribber.

3. Orden. *Trigynia* (Trehunnede).

a. Blomsterdækket dobbelt, oversædigt.

89. **Viburnum** L. De ydre (udstraalende) Kroner større, hjulformede, de indre klokkeformet-rørformede; Frugten enfrøet Steenfrugt. (Busk med lappede Blade).

90. **Sambucus** L. Alle Kronerne hjulformede; Frugten trefrøet (bæragtig) Steenfrugt. (Bladene fjersnitdeelte). (91—92. N. F. Caprifoliaceæ).

b. Blomsterdækket dobbelt, undersædigt.

91. **Corrigiola** L. Bæger og Krone femdeelte; Frugten en enfrøet, uopspringende Hindefrugt eller Nød (Bladene med hindeagtige Axelblade). (N. F. Paronychieæ).

92. **Drosera** L. Bægeret femdeelt, 5 Kronblade; Griflerne 3 (sjældnere 4—5), oftest indtil henimod Grunden tvedeelte, med hele eller i Spidsen tolappede Fliga; Frugten en enrummet, treklappet, mangefrøet Kapsel med vægstillede Frøstole (Bladene alle samlede ved Grunden, tæt beklædte med klæbrige, stilkede Kirtler). (N. F. Droseraceæ).

Stellaria media. Frugten kapselagtig, opspringende med Tænder. (10, 3).

Holosteum. Frugten kapselagtig, opspringende med Tænder i Spidsen (3, 3).

c. Blomsterdækket enkelt.

Polygonum aviculare (6, 3).

4. Orden. *Tetragynia* (Firehunnede).

93. **Parnassia** L. Bæger og Krone fembladede; 5 kirtlet-randhaarede Bikronblade; Frugten enrummet, fireklappet Kapsel med vægstillede Frøstole. (N. F. Droseraceæ).

Drosera. Ingen Bikronblade; Kapselen treklappet. (5, 3).

5. Orden. *Pentagynia* (Femhunnede).

a. Bægeret urteagtigt.

Drosera (5, 3).

Linum. Bægeret fembladet, Frugt tirummet, tifrøet Kapsel.

Cerastium semidecandrum (10, 5).

Spergula vernalis (10, 4).

b. Bægeret hindeagtigt.

94. **Statice** L. (excl. sp.). Bægeret femnervet og femtandet; Kronbladene 5, ved Grunden sammenvoxne med Støvdragerne; Frugt enfrøet, uopspringende; Blomsterne i gaffeldeelt grenede, ensidige Ax.

95. **Arméria** Willd. Blomsterne i Hoved med taglagt Svøb, de ydre Svøbblade ved Grunden forlængede i et nedadrettet, hindeagtigt Rør; forøvrigt som foreg. (94—95. N. F. Plumbagineæ).

6. Orden. *Polygynia* (Mangehunnede).

Myosurus. Støvdragerne $5-\infty$, Frugterne talrige, nødagtige, paa en kegleformigt forlænget Frugtbund. (13, 3).

I. Monogynia.

1. Echium. Slangehoved.

252. **E. vulgare** L. (Almindelig S.) H. 219; Drej. n. 196; F. D. 445; Reh. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1298, fig. 2.

Stængelen rank-opret, tilligemed de linie-lancetformede *Blade* stivhaaret-ru; *Blomsterstanden* pyramideformet, sammensat af ensidige, før Udspringningen tilbagerullede Ax fra Bladhjørnerne.

1—3' høi. Kronen blaa*), sjældnere blegrød eller hvid. 6—7. ☉.

Ved Veie og paa Græsmarker, meget alm. paa Bornholm, i Sjælland, Møen og den nordlige Deel af Falster og Lolland; i **Fyens** nordøstlige Deel ikke sjelden (hyppigst paa Hindsholm), mod S. og V. sporadisk: Nyborg, V. Skjerninge! Skaarup (19), Svaninge, Mynderup; **Lyø** (12); paa **Halvøen** alm. i V. Hanherred (12) og omkring Aalborg (Branth), S. for Limfjorden sjelden og sporadisk: Nibe (8), Hvidbjerg ved Skive (Funch), Løistrupgaard ved Randers (16), Mariager (7), Holme ved Aarhuus (2), Horsens (Jørgens.), Nørup ved Veile (Warming), Estrup mellem Kolding og Ribe (28), Ribe (Fabr. Müller), Haderslev (Grønlund), Volmerstoft, Flensborg (16).

2. Lithospermum. Steenfrø.

253. **L. officinale** L. (Læge-S.) H. 210; Drej. n. 197; F. D. 1084; Reh. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1313, fig. 1.

Bladene lancetformede, tilspidsede, tiltrykt-korthaarede, med ophøiede Sideaarer paa Underfladen; *Kronens* Svælg fempuklet, Kronrøret (under Blomstringen) af Længde med Bægerfligene; *Nødderne* jævne, glindsende, hvide.

*) Alle Arter af Familien Asperifoliæ (Nr. 252—73), hvis Krone i ældre Tilstand har en blaa eller violet Farve, have umiddelbart efter Udspringningen røde Kroner. Kun hos enkelte Arter og undtagelsesviis vedligeholder den røde Farve sig under hele Blomstringen. Naar Kronens Farve i det Følgende uden yderligere Bemærkninger angives, er den bestemt efter den ældre Tilstand. Om Blomsterstandens Forhold i Knoptilstanden see ovenfor (i Slægts-Oversigten). Hos flere Arter af Familien forekommer Blomsten under en dobbelt Form: deels (♀) med stærkt udviklet Griffel (længere end Bægeret) og korte Støvdragere, deels (♂) med kort (i Bægeret indsluttet) Griffel og stærkere udviklet Krone og Støvdragere.

Kronerne hvidgule. Kun 2—3 Frugter komme til Udvikling i hver Blomst. 6—7. 4.

Paa Skrænter, stenede og grusede Pladser, i Kratskove: paa *Øerne* sporadisk og i enkelte Egne (f. Ex. Bornholm, Møens Klint, Roeskilde og Fredriksværk) hyppig; paa *Halvøen* sjeldnere: J. Kalø Slot (13); *Sl.* Ballastbakken ved Flensborg, Nyværk ved Slesvig (16).

254. **L. arvense** L. (Rynket S.) H. 211; Drej. n. 198; F. D. 456; Rchb. l. c. tab. 1314, fig. 5—6.

Bladene oval-lancetformede, de nedre budte, de øvre næsten spidse, korthaaret-rue, Sideaarerne utydelige; *Kronens* Svælg foldet; *Bægerfligene* under Blomstringen længere end Kronrøret, efter Blomstringen linieformet-forlængede; *Nødderne* rynket-ujævne, brune.

Kronerne hvide med sortgrønt Rør, større end hos foreg. Roden rødviolet. 5—6. ☉.

Ukrud i Vintersæden, alm. udbredt paa *Øerne*; paa *Halvøen* sjeldnere: Hansted og Korsø i Thy (Carst.), paa Aagaards Kalkbakker og ved N. Sundby (12), Sohngaardsholm (Juel), Ranum v. Løgstør (8), Horsens (Jørg.); Haderslev (Grønlund).

3. Stenhammaria. Hestetunge.

255. **S. maritima** [Rchb. fl. excurs. I, p. 387] (Strand-H.) *Pulmonaria* L., H. 215; F. D. 25; H. N. V, 5; *Hippoglossum* Hartm. Skand. fl. 4. Uppl.; *Mertensia maritima* Don, Rchb. l. c. tab. 1317, fig. 1.

Stængelen meget grenet, nedliggende; *Bladene* elliptiske eller omvendt-ægformede, kjødfulde, blaagraae, paa Overfladen (i tørret Tilstand) rue af talrige vorteformede Punkter, forøvrigt glatte.

Kronerne lysblaa eller lila. 6—7. 4.

Ved Strandbredder, meget sjelden, og kun funden i den nordvestlige Deel af *Jylland*: Hirtshals i Hjørring Amt (Juel), Svinekløv ved den grønne Strand i V. Hanherred (16), Klitmøller ved Thisted (28), Hansted paa Hanstholmen i Thy (7)! Bovbjerg (Khr. Wichfeld). 2.

4. *Pulmonaria*. Lungeurt.

256. **P. officinalis** L. (Almindelig L.) H. 214; Drej. n. 199; F. D. 482 (slet); Rchb. l. c. XVIII, tab. 1317, fig. 2.

Rodbladene ægformede eller æg-hjerteformede, med en smalvinget *Bladstilk*; *Stængelbladene* ægformede eller elliptiske, siddende eller kortstilkede; *Stængelens Haar* udstaaende eller nogle nedadrettede, blandede med Kirtelhaar.

Bladene ofte plettede. Var. med smalere, elliptiske Rodblade og lancetformede Stængelblade (*P. angustifolia* H. 214, F. D. 483). Kronerne violet-blaa. Undertiden mangler Haarkrandsen i Svælget. 4—5. ♀.

I Skove og Krat meget alm.

257. **P. angustifolia** [L. Fl. Suec. ed. 2, p. 58] (Himmel-blaa L.) Drej. n. 200; F. D. 2344; H. N. I, 14; *P. azurea* Bess., Lge. Haandb. 2 Udg. S. 143; Rehb. l. c. tab. 1319, fig. 1—2.

Rodbladene lancetformede, nedløbende i en bredvinget *Bladstilk*; *Stængelbladene* smalt lancetformede, i Randen noget tilbagerullede, halvt-omfattende og lidet nedløbende; *Stængelens Haar* nedadrettede, ingen (eller ganske faa) kirtelbærende.

Bladene med talrigere, men kortere og blødere Haar end foreg. Kronerne himmelblaa (var. med hvide Kr. — 14). 4—5. ♀.

I aabne Skove sjelden: *Sj.* Jonstrup Vang imod Seminariet (i Mængde)! *

5. Asperugo. River.

258. **A. procumbens** L. (Fremliggende R.) H. 218; Drej. n. 201; F. D. 552; Rehb. l. c. XVIII, tab. 1327.

Stængelen kantet, ru af nedadvendte Børster, gaffeldeelt; *Bladene* lancetformede, budte, heelrandede eller utydeligt tandede, rue, ved Forgreningerne modsatte; *Blomsterne* enlige eller parvise i Gaffeldelingerne eller Bladhjørnerne; *Bægeret* tiltagende i Størrelse efter Afblomstringen.

Holder sig fast ved Hjælp af den rue Beklædning. Kronerne mørkviolette. 5—7. ☉.

Ved Gjærder, især omkring Byer, alm. i *Sjæll.* og paa de østligere og sydligere Øer, sparsommere i *Fyen* (Hindsholm, Odense (12), Nyborg (Lund), Aunslev (16), V. Skjerninge, Svendborg! Skaarupør, *Strynø* (12); *Samsø* (2); paa *Halvøen* sjelden: Broust i Ø. Hanherred (16), Mariager Kloster (7), Ebeltoft (Ørting), Jægergaarden ved Aarhus (16), Horsens (Jørg.), Fredericia (12), Ribe (Andresen), Flensborg (16).

6. Cynoglossum. Hundetunge.

259. **C. officinale** L. (Læge-H.) H. 213; Drej. n. 203; F. D. 1147; Rehb. l. c. XVIII, tab. 1330.

Stængelen opret; *Bladene* lancetformede, de nedre stilkede, de øvre halvt-omfattende; *Blomsterstanden* en Top; *Frugterne* fladtrykte, omgivne af en fremstaaende Rand.

1—3' høi. Hele Planten graafiltet. Frugterne hænge fast i Klæderne ved de hagekrummede Børster. Har en ubehagelig (muscagtig) Lugt. Kronerne skident mørkrøde. 6—7. ☉.

Ved Gjærder og Veigrøfter omkring beboede Steder hist og her.

7. Omphalodes. Vaarforglemmigei.

† 260. **O. verna** [Moench. meth. p. 420] (Hjertebladet V.) Rehb. l. c. XVIII, tab. 1326, fig. 2; Cynoglossum Omphalodes L., H. II, 140.

Rodbladene langstilkede, æg-hjerteformede, *Stængelbladene* æg-lancetformede, kortstilkede; *Blomsterne* i gaffeldeelt, faa-blomstret Klase.

Svagt- og korthaaret, Kronen himmelblaa (ligner de større Myosotis-Arter). 4—5. ♀.

Dyrkes i Haver og forekommer derfra undertiden forvildet, f. Ex. Pulverholz og Nyværk ved Slesvig (16).

8. Echinosperrum. Pigfrø.

261. **E. Lappula** [Lehm. asperif. 121] (Tvehaget P.) Drej. n. 202; Rehb. l. c. XVIII, tab. 1329, fig. 2; H. N. IX, 9; Myosotis L., F. D. 692; H. 209; Cynoglossum Wallr.

Stængelen opret, foroven grenet; *Bladene* lancetformede; *Blomstertilkene* efter Afblostringen oprette; *Bægeret* dybt, næsten til Grunden, femkløvet, med linie-lancetformede Flige; *Frugterne* vortet-punkterede, med 2 Rækker af 2—3-hagede Børster i Randen.

Stængel og Blade tæt og tiltrykt haarede, rue. Kronen himmelblaa. Ligner under Blostringen Myosotis, under Frugtmodningen Cynoglossum. 6—7. ☉.

Paa tørre, grusede Steder omkring Byer sjelden: *Bornh.* ved Hammershuus (19), Nexø og Rønne (H.); *Moen* (16); *Sj.* Stevns

Klint (9), udenfor Øster- og Amager-Port ved Kbhvn. (H., Dr.), Helsingør (27); F. Odense (H.). (Paa flere af de nævnte Voxesteder synes den nu at være forsvunden).

9. Myosotis. Forglemmigei.

a. Bægerets nedre Deel beklædt med udstaaende, hagekrummede Haar.

aa. *Fugaces* Fr. Tidligt blomstrende og hurtigt henvisnende. ☉.

α. Bægeret under Frugtmodningen lukket, længere end Blomsterstilken.

262. **M. versicolor** [Pers. Syn. I, p. 156] (Forskjelligfarvet F.) H. 209; Drej. n. 213; Fr. nov. 67; F. D. 583 (høire Fig.) og 2285 b.; Rehb. l. c. XVIII, tab. 1325, fig. 1; H. N. I, 12.

Stænglerne oventil gaffeldeelte; *Bladene* lancetformede, spidse, ved Stængelens Forgreninger ofte modsatte; *Blomsterne* i nedentil bladløse Klaser; *Blomsterstilkene* (efter Afblostringen) udstaaende; *Bægeret* dybt femfliget; *Griffelen* lidet længere end Nødderne.

4—8" høi. Bladene stærkere randhaarede end følg., med udstaaende Haar. Kronen først gul, siden blaa eller violet. 5—6.

Paa tørre, især dyrkede Marker, alm. udbredt.

263. **M. stricta** [Link Enum. hort. berol. I, 164] (Rank F.) Drej. n. 214; Fr. nov. p. 67; F. D. 2285 a.; Rehb. l. c. tab. 1324, fig. 2; H. N. I, 13.

Stænglerne stivt oprette, fra Grunden af grenede; alle *Bladene* spredte, oval-lancetformede, budte; *Klaserne* forneden bladbærende (undertiden Blomster fra de nederste Bladhjørner); *Blomsterstilkene* meget korte, opret-tiltrykte; *Bægeret* dybt femfliget; *Griffelen* af Længde med eller kortere end Nødderne.

2—6" høi; med tættere, men kortere og blødere (ofte indbøjede) Haar end foreg. Kronen blaa, meget liden. 4—5.

Paa sandige Marker alm. {*

β. Bægeret af Længde med eller kortere end Blomsterstilken, dets Flige under Frugtmodningen opret-udstaaende.

264. **M. collina** [Hoffm. D. Fl. ed. 1, p. 61] (Bjerg-F.) Fr. nov. p. 66; H. N. I, 11; M. hispida Schldl., Drej. n. 212; F. D. 2284; Rehb. l. c. tab. 1323, fig. 2—3.

Bladene omvendt-æg-lancetformede, budte eller (de øvre) spidse, alle spredte; *Klaserne* forneden bladløse; *Blomsterstilkene* udstaaende, omtrent af Bægerets Længde; *Griffelen* af Længde med Nødderne, meget kortere end det til lidet nedenfor Midten femfligede Bæger.

2—6" høi, tæt- og stivhaaret, med udstaaende Haar. Kronen blaa, meget liden. 4—5.

Paa tørre Marker og Bakker, meget alm.

265. **M. sparsiflora** [Pohl i Hopp. Taschenb. 1807 p. 123] (Fjernblomstret F.) H. 206; Drej. n. 211; F. D. 1688; Rehb. l. c. tab. 1324, fig. 3; H. N. X, 14.

Stængelen svag, gjentagne Gange grenet; *Bladene* elliptiske, de nedre omvendt-ægformede, budte; *Blomsterne* enlige ved Stængelens Forgreninger og i fjernblomstrede, forneden bladbærende Klaser; *Blomsterstilkene* efter Afblomstringen nedbøiede, 2—4 Gange længere end det dybt femdeelte Bæger (Bægerfligene næsten dobbelt saa lange som Røret); *Griffelen* kortere end Nødderne.

Haarene fjerne, korte og indbøiet tiltrykte. Kronen blegblaa. 5—6.

Forekommer forvildet i og omkring Haver (oprindelig indført), f. Ex. Marienlyst ved Helsingør (21); Classens o. fl. Haver ved København! ☐

bb. Persistentes Fr. Sildigere blomstrende og længere vedvarende. (Bægeret under Frugtmodningen kortere end Blomsterstilkene). ☉ eller 4.

266. **M. arvensis** [Roth fl. germ. II, p. 222] (Mark-F.) M. intermedia Link, H. II, 140; Drej. n. 210; Lge. Haandb. 1 Udg. n. 258; Fr. nov. p. 65; Rehb. l. c. tab. 1323, fig. 1; H. N. X, 13; M. scorpioides α, arvensis L.

Bladene oval-lancetformede, de nedre omvendt-ægformede, budte; *Klaserne* bladløse; *Blomsterstilkene* imod Frugtmodningen udstaaende, dobbelt saa lange som det dybt femdeelte Bæger;

Bægerfligene sammenstødende; *Kronens* Krave huul; *Griffelen* omtrent af Nøddernes Længde, flere Gange kortere end Bægeret.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi, graaagtig af den tætte Haarbeklædning. Kronen blaa. 5—7. ☉.

Paa dyrket Jord i Mark og Have, i Udkanten af Skove o. s. v. alm.

267. *M. silvatica* [Hoffm. D. Fl. ed. 2, p. 85] (Skov-F.) H. 207; Drej. n. 209; Fr. nov. p. 64; F. D. 583 (venstre Fig.); Rehb. l. c. tab. 1322, fig. 1.

Bladene lancetformede, budte eller spidse, de nedre ovale eller elliptiske, stilkede; *Klaserne* bladløse; *Blomsterstilkene* af Længde med eller lidet længere end *Bægeret*, som er dybt femdeelt, med opret-aabne *Flige*; *Kronens* Krave flad; *Griffelen* over halvt saa lang som Bægeret.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi, friskere grøn og ikke saa tæthaaret som foreg. Kronen dobbelt saa stor, blaa, sjeldnere hvid eller blegrød. 5—6. ♀.

I Skove og Krat ikke sjelden.

b. Bægeret overalt tiltrykt-haaret (under Frugtmodningen kortere end Blomsterstilkene).

268. *M. lingulata* [Schultz i Lehm. Asperifol. I, p. 110] (Sump-F.) Fr. nov. p. 64; Rehb. l. c. tab. 1321, fig. 1; H. N. IV, 11; *M. cæspitosa* Schultz, H. II, 139; Drej. n. 208; F. D. 2283.

Rodstokken sammentrængt, lodret; *Stængelen* trind; *Bladene* lancetformede, budte; *Klaserne* forneden bladbærende; *Bægeret* meget kortere end Blomsterstilken, dybt femdeelt med udstaaende *Flige*; *Kronfligene* afrundede; *Griffelen* meget kort.

Stænglerne alm. talrige fra Rodstokken, tiltrykt-haarede, ved Grunden rødlig; ingen Udløbere. Kronen mindre end hos følgende, blaa. 6—8. ☉.

β , *radicans!* Stænglerne langstrakte, meget grenede, opstigende og ved Grunden rodslaaende; noget kantede; Bægeret deelt omtrent til Midten.

I Tørv- og Hedemoser, paa sumpige Steder i Skove, ikke sjelden og bemærket i alle danske Provindser. β , F. Skaarup (19)! *Sl.* Haderslev (Grønlund)!

269. **M. palustris** [With. arr. of brit. pl. 2, 225] (Eng-F.) H. 207; Drej. n. 207; Fr. nov. p. 63; F. D. 1988; Rchb. l. c. tab. 1320; *M. scorpioides* β , *palustris* L.

Rodstokken forlænget, krybende; *Stængelen* kantet; *Bladene* lancetformede, Stængelbladene spidse; *Klaserne* bladløse; *Bægeret* kortere end Blomsterstilken, femtandet med udstaaende Tænder; *Kronfligene* svagt udrandede; *Griffelen* af Bægerets Længde.

Høiere og med større Kroner (blaa) end de øvrige Arter. Har ofte, især Formen γ , Udløbere fra Rodstokken. 6—8. 4.

α , *genuina* Rchb. l. c. tab. 1320, fig. 1. Stængelen med udstaaende Haar.

β , *laxiflora* (*M. laxiflora* Rchb. l. c. fig. 4), Stængelens Haar tiltrykte, Grenenes udstaaende, Kronerne store.

γ , *strigulosa* (*M. strigulosa* Rchb. l. c. fig. 3), Stængelens og Grenenes Haar tiltrykte. Lavere og spædere end Hovedarten, Kronen mindre. (Ofte Udløbere fra Rodstokken).

Paa Enge, ved Randen af Bække og Søer, alm. udbredt. γ , (en udmærket Form) ved Sandbjerg pr. Hørsholm! Fidt-Mose ved Hjortespring! Sorø! Selchousdal (Lund); F. Ollerup (12).

Ann. *M. repens* Don (E. B. 2703) hører, efter Expl. fra Babington (og Beskrivelsen i Sammes Man. of Brit. bot.) ikke herhen, forskjellig ved nedentil bladbærende Klaser, længere og efter Aflomstringen stærkt tilbagebøjede Blomsterstilke, dybere deelt Bæger, kortere Griffel, blegblaa Kroner og Stængelen stivhaaret af udstaaende Haar. Denne maa eftersøges i vor Flora.

10. **Borrago. Hjulkrone.**

† 270. **B. officinalis** L. (Blaa H.) Drej. p. 75; Rafn p. 48; Rchb. l. c. XVIII, tab. 1302.

Bladene elliptiske, stilkede, tilligemed *Stængelen* og det dybt femdeelte *Bæger* tæt beklædt af hvide, stikkende Haar. *Kronen* himmelblaa. 6—7. ☉.

Forekommer forvildet omkring Haver, f. Ex. *Sj.* Rungsted (Dr.), Bidstrupgaard (14), Maglekilde ved Roeskilde (Thomsen); *Møen* ved Marienborg (9); *Loll.* Stokkemærke, Aunede (19); *J.* Sindal i Vendsyssel (Juel), Staby pr. Holstebro! Charlottenlund ved Kolding (30), *Sl.* Aarøsund (Nielsen); Stampemøllen ved Slesvig, Fredriksort (16).

11. Anchusa. Oxetunge.

271. **A. arvensis** [M. Bieberst. fl. taur. cauc. I, 123] (Krumhals). Drej. n. 205; Rehb. l. c. XVIII, tab. 1310, fig. 1; Lycopsis L., H. 218; F. D. 435 (slet).

Bladene lancetformede, rundbugtet-tandede; *Kronens Rør* bøiet; *Bægeret* næsten til Grunden femkløvet.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Hele Planten stivhaaret og meget ru. Kronen himmelblaa. 5—7. ☉.

Paa dyrkede Marker alm.

272. **A. officinalis** L. (Læge-O.) H. 212; Drej. n. 204; F. D. 572; Rehb. l. c. XVIII, tab. 1309; H. N. VII, 6.

Bladene lancetformede, heelrandede eller utydeligt tandede; *Bægeret* til lidet nedenfor Midten femdeelt; *Kronrøret* ret.

1—2' høi, stivhaaret-ru, Kronen først rødagtigt-, senere blaa-violet, sjeldnere hvid. 6—7. ♀ eller ☉.

Var. i Henseende til Beklædningen, Bægerfligernes Retning o. s. v. Den hvide Form har efter Premierlieut. Lunds lagttagelse, smalere Blade, bredest paa Midten (hos Hovedarten ere de bredest ved Grunden).

Ved Veie og paa Marker, hyppig i *Sjæll.* og paa *Øerne* (Bornholm indbef.), paa Hindsholm og i Jyllands nordlige Deel; sjeldnere og sporadisk i det vestlige *Lolland*, *Langeland* og det sydlige *Fyen* (Nyborg! Hvidkilde (Jørgens.), Hørup, Steenstrup (12), Faaborg!) og *Halvøens* sydlige Deel (Skanderborg, Horsens (12), Rødning, Husum (16), Flensborg (12)).

12. Symphytum. Kulsukker.

273. **S. officinale** L. (Læge-K.) H. 216; Drej. n. 206; F. D. 664 og 1569; Rehb. l. c. XVIII, tab. 1303, fig. 1; H. N. V, 3; L. Herb. III, 60.

Stængelen vinget af de nedløbende Blade; *de nedre Blade* æg-lancetformede, stilkede, *de øvre* lancetformede, tilspidsede, nedløbende; *Bægeret* dybt femdeelt; *Kronens* Krave svagt femtandet, med tilbagebøiede Tænder; *Støvknapperne* længere end Støvtraadene.

1—2' høi; stivhaaret-ru; Kronen violet, sjeldnere rosenrød ell. hvid. 6—8. ♀.

Var. med længere eller kortere Griffel og Bikronskjæl; Bægertrænderne oprette eller udstaaende (den sidste Form *S. patens* Sibth.).

Ved Søbredder og andre fugtige Steder, især omkring Byer, hist og her, men ikke almindelig, i alle danske Provindser.

† *S. orientale* L. H. N. V, 4. *Stængelen* ikke eller kun ved Bladenes Basis vinget. mere ru end hos foreg.; *de nedre Blade* æg-hjerteformede, de øvre svagt eller aldeles ikke nedløbende; Støvknapper og Støvtraade ligelange. Kronen rød eller violet. 6—8.

Forvildet ved Veistrup i Fyen (19)!

13. *Atropa*. Galnebær.

274. *A. Belladonna* L. (Giftig G.) H. 260; F. D. 758; Rehb. l. c. XX, tab. 1629.

Bladene (alm. 2 sammen, det ene mindre) elliptisk-ægformede, heelrandede; *Blomsterne* enlige i Bladhjørnerne, nikkende; *Blomsterstilke* og *Bæger* klæbrig-haarede.

2—3' høi. Kronen skident violet med brune Aarer. Bærret sort. Rod og Blade have en bedøvende Lugt. Giftig. 7. 7.

Ved Gjærder omkring beboede Steder, sjelden (og maaskee fra ældre Tider indført): *J.* Møgelkjær (H.), ved Teglovn N. for Kolding! og Bellevue S. for Kolding, (30); *F.* Middelfart (H.), *Langeland* ved Hou, *Loll.* v. Christianssæde og Aalholm (H.). *Sj.* Maglekilde ved Roeskilde (Thomsen), Sparresholm (Lund); ☞

14. *Physalis*. Blærebæger.

† 275. *P. Alkekengi* L. (Jødekirsebær). H. 261; F. D. 1636; Rehb. l. c. XX, tab. 1630.

Bladene modsatte, stilkede, æg-hjerteformede eller ægformede med indsnøret Basis, heelrandede eller svagt tandede; *Blomsterne* enlige i Bladhjørnerne, nikkende.

1' høi. Kronen gulhvid, Bægeret først grønt, siden tilvoxende og opblæst, tilligemed Bærret høirødt. 6—7. 7.

Omkring Byer og andre dyrkede Steder (oprindelig indført): *Loll.* ved Saxkjøbing (19), Hunseby (5), Nørreballe, Hillested, Godsted (H.); *Falst.* ved Bregninge, Horbeløv, Taaderup (14); *Sj.* Vemmetofte (Sünckenberg). ☞

† *Nicandra*.

† *N. physaloides* [Gärtn. de fruct. II, p. 237, tab. 131] Rchb. l. c. XX, tab. 1626, fig. 2; *Atropa physaloides* L.

Glat; *Stængelen* opret med kantet-furede Grene; *Bladene* ægformede eller elliptiske, bugtet-tandede, med vinget Bladstilk; Blomsterne store, enlige, *Bægeret* femkantet-vinget, gennemsigtig-blegggrønt (imod Modenheden blegbrunt), med stærkt fremtrædende Aarenæt; *Kronen* blegblaa eller lila. 7—8. ☉.

Oprindelig fra Sydamerika, dyrket i Haver og derfra forvildet: *Sj.* Særsløv ved Holbæk (Leth), Jonstrup (14), Søllerød (Petersen)! *Falst.* Horbeløv (Koch); *Bornh.* langs Stranden ved Rønne søndre Baadehavn (Baagøe)!

15. *Solanum*. Natskygge.a. *Stængelen* urteagtig, opret.

aa. *Underjordiske Knoller paa Rodstokkens Grene*. 4.

† *S. tuberosum* L. (Kartoffel). Rafn II, p. 156; Rchb. l. c. XX, tab. 1633, fig. 3—4.

Bladene mellembrudt-fjersnitdeelte med ægformede eller ovale Afsnit; *Blomsterne* i Skjærm eller Qvast fra de øvre Bladhjørner; *Blomsterstilkene* ovenfor Midten leddede; *Kronen* femkantet.

Var. meget i Henseende til Kronens Farve (violet, blaa, hvid) og Knollernes Størrelse, Form og Farve. 6—7.

Dyrkes alm. overalt i Landet (oprindelig indført fra Amerika).

bb. *Roden pæleformet, grenet, ingen Knoller*. ☉.

276. *S. nigrum* L. (Sort N.) H. 263; Drej. n. 239; F. D. 460; Rchb. l. c. XX, tab. 1631, fig. 1—2.

Stængelen med fremstaaende, knudrede Kanter; *Bladene* rudeformet-ægformede, heelrandede eller rundbugtet-tandede, tilligemed *Stængelen* svagt duunhaarede; *Blomsterstanden* skjærmformet, modsat Bladet eller fra ubestemte Steder af *Stængelen*; *Blomsterstilkene* i Spidsen tykkere, tilsidst nedbøiede; *Bærret* kugleformet, sort-violet.

Kronen hvid, undertiden med violette Spidser eller Underflade. Støvkapperne gule. 8—10.

Paa dyrket Jord, især i Haver, et almindeligt Ukrud, dog ikke overalt, f. Ex. sjelden i det nordlige Jyll. (Branth).

277. **S. humile** [Bernh. i Willd. Enum. hort. ber. I, 236] (Glat N.) Drej. n. 238; F. D. 2345; **S. nigrum**—**humile** Rehb. l. c. XX, tab. 1632, fig. 2; H. N. IX, 14.

Stængelen med utydeligt vortede Kanter, tilligemed *Bladene* næsten glatte; *Bærrene* guulgrønne, forøvrigt som foreg. 8—10.

Ved Gjærder og paa dyrket Jord med foreg., men sjeldnere: **Sj.** Charlottenlund, Amager (Drej.), Farimagsvæien! Sorø (12), Kalundborg (15); **Falst.** ved Moseby og Taaderup (14); **Thorseng** ved Lundby! **F.** Hofmangave (18), i det sydlige alm. (12); **Bornh.** Rønne (14), Terkels Mølle (Zahrtmann). [F]

278. **S. villosum** [Lam. dict. 4, p. 289] (Haaret N.) H. II, 147; Drej. p. 88; H. N. XV, 22; **S. nigrum**—**villosum** Rehb. l. c. XX, tab. 1632, fig. 1.

Bladene ægformede, bugtet-tandede, tilligemed *Stængelen* fint-udhaarede; *Bærrene* voxgule, forøvrigt som foreg. 8—10.

Med de foreg., sjelden: Helsingør (Rafn)?, Amager (27). [F]

279. **S. miniatum** [Bernh. l. c.] (Høirød N.) Drej. n. 240; H. N. XV, 21; **S. nigrum**—**miniatum** Rehb. l. c. tab. 1632, fig. 3; **S. nigrum villosum** F. D. 1927.

Stængelen med fremstaaende, stærkt knudret-vortede Kanter, tilligemed de rudeformet-ægformede, rundtakket-fjerlappede *Blade* duunhaarede; *Bærrene* høirøde, forøvrigt som foreg. 8—10.

Paa Ryddepladser, omkring Byer o. s. v. ikke alm. Amager ved Porten og Götchens Batteri (Dr.)! Hellested, Tryggevalde (9); **Falst.** Stubbekjøbing (19); **Loll.** Lindholm (19). [F]

b. *Stængelen* buskagtig, bøiet og noget slyngende.

280. **S. Dulcamara** L. (Bittersød N.) H. 262; Drej. n. 237; F. D. 607; Rehb. l. c. XX, tab. 1633, fig. 1—2.

Bladene æg-hjerteformede, ofte spydformet-ørede ved Grunden; *Bærrene* aflange.

Kronerne violette med 2 grønne, hvidrandede Pletter ved Grunden af hver Flig. Bær røde. 6—7. *h*.

Var. i Bladenes Form, Beklædningen o. s. v.

β, *tomentosum* Koch Syn. II, p. 584, med duunhaarede Stængler og Blade.

γ, *marinum* Bab. man. ed. 3, p. 225. Stængelen fremliggende, meget grenet, med kortere Ledstykker og tætsiddende, hele eller ørede Blade, som tilligemed de unge Grene ere kjødfulde.

δ, *laciniatum* Dun. (DC. prodr. XIII, 78). Alle Bladene ørede, de nedre og midterste lyreformede, med 2—3 Par Flige ved Grunden.

Paa fugtige Steder i Kratskove alm. udbredt. *β*, sjeldnere og paa solaabne Steder; *γ*, ved Strandbredder i Sandet: *Sj.* Nykjøbing (27), Helsingør (Heiberg); *Loll.* ved Bredfjed! o. fl. St. langs Østersøen mellem Rødby og Nakskov Fjord (19); *Ærø* (10)! *δ*, *Loll.* ved Maibølle (5)!

Anm. Fra den hos os forekommende Strandform afviger den af Babington beskrevne *γ*, *marinum* ved hjerteformede og ikke ørede Blade.

16. Lycium. Bukketorn.

† 281. *L. vulgare* [Dun. i DC. prodr. XIII, 509] (Gjærde-B.) *L. barbarum* L. ex part., *Rechb.* l. c. XX, tab. 1635, fig. 1 (*L. afrum*).

Stængelen buskagtig, mnd bueformigt-hængende Grene; *Bladene* lancetformede; *Blomsterne* enlige eller 2—3 samlede, omgivne af Bladknipper fordeelte langs op ad Stængelen. *Kronens* Rør og Krave ligelange.

Kronen violet, Bær røde. 6—7. *h*.

Planten alm. ved Hegn og udbreder sig med Lethed, hvorfor den forekommer forvildet, især i det sydvestl. Sjøell. og Fyen.

17. Hyoscyamus. Bulmeurt.

282. *H. niger* L. (Almindelig B.) H. 259; *Drej.* n. 236; *F. D.* 1452; *Rechb.* l. c. XX, tab. 1623.

Stængelen opret, de nedre Blade stilkede, halvfinnede, de øvre halvtomfattende, bugtet-tandede eller halvfinnede; *Blomsterne* kortstilkede, ensidige, fra de øvre Bladhjørner.

Klæbrig-haaret, har en ubehagelig, bedøvende Lugt og er giftig. Kronens Krave gulgraa med mørkviolette Aarer, Røret indvendigt mørkviolet. 6—7. ☉.

β , *agrestis* Fr. (H. *agrestis* W. & K.) H. N. VIII, 8. Lavere, med gule Kroner. ☉.

Paa grusede Steder omkring Byer ikke sjelden. β , paa dyrkede Marker, sjeldnere: J. Ribe (d'Origny)! *Bornh.* Klemensker (Zahrtmann).

18. Datura. Pigæble.

283. **D. Stramonium** L. (Giftig P.) H. 258; Drej. n. 235; F. D. 436; Rehb. l. c. XX, tab. 1624.

Stængelen oventil gaffeldeelt, med *Blomsterne* enlige, kortstilkede i Greenvinklerne; *Bladene* ægformede, grovt og uregelmæssigt bugtet-tandede; *Kapselen* beklædt med Blødpigge.

Grøn, næsten aldeles glat, giftig. Kronen hvid. 7—9. ☉.

Ved Strandbredder og paa grusede Steder omkring Byer, ikke alm. *Sj.* Snedkersteen! Vedbæk (15), Strandmøllen (Dr.), Skovshoved, Farum (H.), Amager ved Götchens Batteri! Næstved (H.); *Bornh.* ved Rønne (H.)! *Falst.* Idestrup (5), *Loll.* Maribo, Hunseby, Sundby (H.), Nebbelunde (5); *J.* Skovbakken ved Aalborg (Juel); *Sl.* Hvidding S. for Kongeaaen (16), Gram (1), Vonsbæk (Nielsen), *Als* v. Stolbro (10).

19. Verbascum. Kongelys.

a. *Thapsus*. Bladene tæt beklædte af en hvidguul Filt, mere eller mindre nedløbende. Støvdragerne uligelange; de længere med nedløbende Støvknapper. Kapselen aflang.

† *V. phlomoides* L. Rehb. l. c. XX, tab. 1639—41. *Bladene* ægformet-elliptiske, rundtakkede, de nedre stilkede, de midterste kort nedløbende i 2 brede, korte, afrundede Vinger, de øvre Blade ikke nedløbende; Klasen forneden mellebrudt, sjældent grenet; forøvrigt som følg., men ikke saa stærkt filtet. 7—8. ☉.

Forvildet paa Gjærder ved Hasmark pr. Hofmausgave (18)! og i *Loll.* ved Nakskov (19), paa hvilket Sted den dog senere er forsvunden. Den fra Møens Klint af Hornem. anførte tilhører maaskee en Form af følg.

284. **V. thapsiforme** [Schräd. monogr. Verb. I, p. 21] (Uldbladet K.) Fr. nov. p. 68; Rehb. l. c. XX, tab. 1638; H. N. IV, 19; V. phlomoides Drej. n. 232; H. 256 (og 254: V. Thapsus tildeels).

Bladene nedløbende, rundtakkede, de nedre elliptiske, de øvre ægformede, tilspidsede, udstaaende; *Klasen* tætblomstret; *Blomsterstilkene* (under Blomstringen) kortere end Bægeret; *Kronen* uregelm. hjulformet, den ene Flig mindre end de øvrige; de 3 (kortere) *Støvdragere* tæt hviduldede, de 2 (længere) med oventil svagthaarede Støvtraade, $1\frac{1}{2}$ —2 Gange længere end de aflange, paa den ene Side nedløbende Støvknapper.

Hele Planten tæt beklædt af en uldagtig, gulhvid Filt, dannet af grenede Haar, Kronen gul, sjældent hvid. (Klasen ofte ved Grunden grenet). 7—9. ☉.

β , *cuspidatum* [Schräd.]. H. II, 145; F. D. 1810; H. N. IV, 20. Klasen forneden afbrudt; de øvre Blade og Dækbladene langt tilspidsede.

Paa tørre Marker, ved Gjærder: i *Sjæll.* meget alm., især i den vestlige Deel; *Loll.* og *Falst.* hist og her (19, 14); *J.* sjelden: Fredericia! Kolding (1), fra de øvrige Provindser er intet Voxested mig bekendt. β , hist og her med Hovedarten. ☞

285. **V. Thapsus** L. (Filtbladet K.) H. 254 (tildeels); Drej. n. 234; F. D. 631; V. Schraderi Mey., Koch. Syn. II, 586; Rehb. l. c. XX, tab. 1637.

Bladene nedløbende, utydeligt rundtakkede, de nedre omvendt-ægformet-lancetformede, budte, de øvre elliptiske, spidse, opret-tiltrykte; *Klasen* tætblomstret; *Blomsterstilkene* kortere end Bægeret; *Kronen* tragtformet, næsten regelret (den ene Flig ubetydeligt større end de øvrige); de 3 kortere *Støvdragere* tæt hviduldede, de 2 længere med svagt haarede eller glatte Støvtraade, der omtrent ere 4 Gange længere end de paa begge Sider nedløbende Støvknapper.

Beklædningen som hos foreg. og ligesom denne, hos store Expl. med nedentil grenet Klase. Kronen gul, sjeldnere hvid. 7—8. ☉.

Paa tørre, meest lerede Steder, ved Veie og paa Skrænter, især i Strandegne, kun sjældent i Selskab med foreg. (ved Sorø!); meget alm. paa Bornholm, Møen, Falster og Lolland, i *Sj.* sporadisk og

meget sjældnere end foreg., i *Fyen* ikke sjelden (12), paa *Halvoens* Østkyst hist og her.

Anm. Synonymien hos Drej. (fl. excurs.) er bleven indviklet paa Grund af at han har beskrevet *V. thapsiforme* under Navn af *V. phlo-moides* L., som ikke findes egenlig vildvoxende i den danske Flora. Nr. 233 og 234 Drej. l. c. høre vistnok begge til *V. Thapsus*, men Beskrivelserne synes at være affattede efter enkelte Exemplarer.

b. *Lychnitis* Benth. Bladene ikke nedløbende, glatte eller kortfildede, Støvdragerne ligelange, med ikke nedløbende Støvknapper, Kapselen aflang.

286. **V. nigrum** L. (Mørk K.) H. 257; Drej. n. 230; F. D. 1088; Rchb. l. c. XX, tab. 1649.

Bladene ægformet-elliptiske med hjerteformet Basis, rundtakkede, paa Overfladen glatte eller svagthaarede, paa Underfladen tyndt fildede, de nedre langstilkede, de øvre siddende eller kortstilkede; *Klasen* forlænget; *Blomsterstilkene* dobbelt saa lange som Bægeret; *Støvdragerne* alle violet-uldede.

Kronen gul med violette Pletter i Svælget, sjældnere hvid. 7—8. ☉.

β, *thyrsoideum* (Host.) Bladene paa begge Flader tæt-fildede, Blomsterstilkene længere.

I Kratskove, ved Veie og Gjærder alm. udbredt. β, sjældnere, f. Ex. *Sj.* ved Helsingør (27); *Loll.* Pederstrup (19); *J.* Kolding!

287. **V. Lychnitis** L. (Smaablomstret K.) H. 256; Drej. p. 85; F. D. 586; Rchb. l. c. XX, tab. 1648.

Bladene elliptiske, rundtakkede, paa Overfladen næsten glatte, paa Underfladen kort hvidfildede, de nedre kortstilkede, de øvre siddende, *Blomsterstanden* en Top eller grenet Klase (dannet af indbyrdes adskilte, længere eller kortere stilkede Knipper fra Bladhjørnerne); *Støvtraadene* hviduldede.

Stængelen foroven tilligemed Blomsterstilke og Bæger støvet-hvidfildede. Kronen hvid eller bleggul. 7—8. ☉.

Ved Gjærder, omkring Byer o. a. dyrkede Steder, sjelden og maaskee oprindelig udkommen fra Haver: *Sj.* Hørsholms Kirkegaard (Dr.)! Frederiksdal (H.)! *J.* Bjørnsholm (A. Lange), Ørsted (H.); *Sl.* Slotsgravene ved Husum, Slesvig (16), Egerfælde (H.). *

c. *Blattaria*. Bladene glatte, ikke nedløbende; Støvdragerne uligelange, de længere med nedløbende Støvknapper. Kapselen kugleformet.

† *V. Blattaria* L. (Enligblomstret K.) Rechb. l. c. XX, tab. 1653.

Stængelen glat, dens øvre Deel kirtelhaaret, *Bladene* glatte, bngtet-rundtakkede, siddende, de øvre halvt omfattende, *Blomsterne* i en fjernblomstret Klase, dannet af enlige Blomster i Bladhjørnerne, *Blomsterstilkene* kirtelhaarede, længere end Bægeret og omtrent af Længde med Dækbladene; *Støvtraadene* røduldede. 7—8. ☉.

Forvildet fra Haver: *Sj.* Bognæs (Kyll.) ikke funden i senere Tid; *Falst.* Nykjøbing (19)! Brarup, Skjærne (Koch)! *Loll.* Christianssæde (2); *Sl.* Egernfælde (H.). ☞

d. Bastardformer, frembragte ved Krydsning mellem de foreg. Arter.

(Forekomme i Regelen kun i enkelte Exemplarer og bære sjelden spiredygtigt Frø. Benævnelsen er hentet fra de Arter, fra hvilke de antages at nedstamme).

≡ **V. thapsiformi-nigrum** [Schiede, pl. hybr. 36]; Rechb. l. c. XX, tab. 1663; *V. adulterinum* Koch Syn. II, 591.

Mindre flettet, *Bladene* halvt nedløbende, de øvre hjerteformede; *Klasen* forneden afbrudt; *Blomsterstilkene* af Bægerets Længde; *Støvtraadene* røduldede, forøvrigt som *V. thapsiforme*.

Forekommer sporadisk i Selskab med *V. thapsiforme* og *nigrum*, af hvilke den ansees for en Bastardform: *Sj.* Sorø Akademihave! Lundbygaard (Arbo)! Buddinge (9), Strandmøllen (15), Frederiksdal (14); *J.* Kolding (30).

≡ **V. Thapso-nigrum** [Schiede, pl. hybr. 32] *V. collinum* Schrad. monogr. tab. 5, fig. 1; H. II, 146; Drej. n. 231; F. D. 1811; Rechb. l. c. XX, tab. 1639, fig. 1.

Bladene ægformet-elliptiske, rundtakkede, halvt eller næsten ikke nedløbende, paa Overfladen svagt, paa Underfladen tæt-filtede; *Klasen* forlænget, forneden afbrudt; *Blomsterstilkene* neppe saa lange som Bægeret; *Støvtraadene* røduldede; *Støvknapperne* ikke nedløbende.

Forekommer enkeltviis med foreg. og *V. nigrum*, af hvilke den er en Bastardform; *Sj.* Vedbæk! mellem Taarbæk og Strandmøllen (Drej.), Lundtofte (14), Bidstrup (19), Tappernøje! *Falst.* N. Vedby (Koch), Nykjøbing Slots Ruiner! *Loll.* Bregneholt (19), Ourebygaard (H.); *F.* Christiansminde og Ørkilds Slotsbakke ved Svendborg!

× *V. nigro-Thapsus* [Fr. S. Veg. Sc. p. 192]?

Stængelen svagt, *Bladene* tæt-filtede, de nedre stilkede, de mellemste og øvre siddende (ikke nedløbende), forøvrigt som *V. Thapsus*.

En Form, (funden ved Strandmøllen af Hr. Piper) som kun ved de ikke nedløbende Blade adskiller sig fra *V. Thapsus*, maa jeg ogsaa formode at være en Bastard, og da Beskrivelsen hos Fr. (l. c.) ikke strider derimod, har jeg troet at kunne henhøre den til denne, af hvilken jeg dog ikke har seet Expl.

× *V. nigro-Lychnitis* [Schiede l. c. 40] *Rchb.* l. c. XX, tab. 1664; *V. Schiedeanum* Koch Syn. II, 592.

Bladene elliptiske, tilsidsede, dybt-rundtakkede; *Blomsterstilke*, *Bæger* og den øvre Deel af *Stængelen* støvet-hvidfiltede; *Støvtraadene* røduldede.

Med Hovedarterne i Sorø Akademihave! og ved Frederiksdal (14).

20. *Convolvulus*. *Snerle*.

288. *C. arvensis* L. (Ager-S.) H. 235; *Drej.* n. 228; F. D. 459; *Rchb.* ic. fl. germ. XVIII, tab. 1337.

Bladene spydformede (sjældnere næsten pилformede), med spidse, heelrandede Lapper ved Grunden; *Dækbladene* linieformede, fint randhaarede, fjernede fra Bægeret.

Var. glat og duunhaaret, med 1- og 2-blomstrede *Blomsterstilke*. Kronen hvid eller blegrød, med 5 rosenrøde *Striber*, aabne i Solskin, vellugtende (omtrent som Mandler). 6—8. 7.

Paa dyrkede og hvilende Marker, Grøftevolde, meget alm. og et besværligt Ukrud.

289. *C. sepium* L. (Gjærde-S.) H. 235; *Drej.* n. 229; F. D. 458; *Calystegia* R. Br.; *Rchb.* l. c. tab. 1340 og 1341 fig. 1.

Bladene pилformede med budte, bugtet-tandede Lapper ved Grunden; *Dækbladene* hjerteformede, glatte, tæt omgivende

Bægeret og længere end dette; *Blomsterstilkene* firekantede, enblomstrede.

Hele Planten glat. Kronen hvid, større end hos foreg. 7—9. 4.

β, coloratus! Stængelen og Bladnerverne paa Underfladen mørkrøde. Kronerne rosenrøde.

Ved Gjærder og i Kratskove, især paa fugtig Grund: i enkelte Egne sjelden, f. Ex. i det nordlige *Jylland* (Aalborg 16), i det østlige *Sjælland* ikke alm., i de fleste Egne af Danmark temmelig hyppig. *β, J.* ved Damgaard! *F.* Nyborg (Lund)! Svendborg! *Loll.* ved Søholt (19); *Sj.* Stillinge (Lund).

† *Polemonium. Flok.*

† *P. coeruleum* L. (Jacobs Stige). H. 236; F. D. 255.

Stængelen opret, bladet; *Bladene* fjersnitdeelte, med lancetformede, heelrandede Afsnit; *Blomsterstanden* en Top eller Halvskjærm; *Kronen* omtrent dobbelt saa lang som Bægeret.

Glat eller foroven duunhaaret, Kr. blaa, sjeldnere hvid. 5—6. 4.

Dyrkes som Siirplante og forekommer hist og her forvildet, f. Ex. i en Mose mellem Dronningaard og Kaningaarden (19).

21. *Erythræa. Tusindgylden.*

290. *E. pulchella* [Fr. nov. ed. I, p. 30] (Liden T.) H. 265; Drej. n. 247; F. D. 1637; H. N. III, 16; *E. ramosissima* Pers., Rchb. l. c. XVII, tab. 1061; *Centaurium inapertum* Rafn II, p. 77; *Gentiana Centaurium* b. L. (Fl. Suec.).

Stængelen skarpt firekantet, med smalvingede Kanter; *Bladene* ægformede; *Blomsterne* i den gaffeldeelte Stængels Vinkler paa *Blomsterstilke* næsten af Længde med Bægeret; *Bægerfligene* (ved Blomstens Udspringning) kortere end Kronrøret; *Kronens* Flige elliptiske, budte.

Stængelen gjentagne Gange, ofte fra Grunden af, gaffeldeelt. Smaae Expl. (*Gentiana pulchella* Sw.) have stundom enblomstret, aldeles udeelt Stængel. Kronen rosenrød, mindre end hos de følg., lukker sig ved Middagstid. 1—6" høi. 7—10. ☉.

Paa Strandenge og sandige Overdrev i Nærheden af Stranden forekommer den ikke sjeldent i alle danske Provindser, sjeldnere ved Færskvandssøer, f. Ex. *Sj.* ved Tiis Sø (Lund), Smørumnedre (14), Frederiksdal (19); *Loll.* ved Maribo Sø! *F.* Tørvmoser paa Hinds-holm!

291. **E. Centaurium** [Pers. Syn. I, 283] (Almindelig T.) H. 264; Drej. n. 245; Rehb. l. c. tab. 1061, fig. 1; H. N. II, 31; Gentiana L. (Sp. pl.), F. D. 617; Centaurium Erythræa Rafn l. c. 75.

Stængelen skarpt firekantet; *Bladene* elliptiske eller ovale, budte eller noget spidse; *Blomsterstilkene* meget korte, med 2 *Dækblade* ved Grunden; *Bægerfligene* omtrent halvt saa lange som den nys udsprungne Krones Rør; *Kronfligene* ovale.

4—10" høi. Stængelen forneden udeelt, Blomsterne i tæt Qvast fra Enden af Stængelen og de i de øvre Bladhjørner modsatte Grene. Kronen rosenrød, sjældnere hvid.

Paa Græsmarker og høie Enge, ikke sjelden. ☞

292. **E. linarifolia** [Pers. l. c.] (Smalbladet T.) Drej. n. 246; Rehb. l. c. 1061, fig. 2; E. littoralis Fr. nov. ed. I, p. 29; H. 265; F. D. 1814; H. N. V, 9; Gentiana Centaurium α L. (Fl. Suec.); Centaurium vulgare Rafn l. c. 73.

Stængelen budt firekantet, de 2 Flader bredere, convexe; *Bladene* budte, de nedre omvendt-ægformede, de øvre linieformede; *Blomsterstilkene* meget korte, med 2 *Dækblade* ved Grunden; *Bægerfligene* næsten af Længde med den nys udsprungne Krones Rør; *Kronfligene* ovale, budte.

2—8" høi. Stænglerne (ofte flere fra samme Rodstok) forneden udeelte, oventil gaffeldeelte, dannende en fjernblomstret Qvast. Kronen rosenrød, sjældnere hvid. 7—10. ☉.

β , *minor* Hartm., lavere (1—3" høi), med vedblivende og i en Rosette samlede Rodblade; Blomsterne samlede i en tæt sammentrængt Qvast.

Paa Strandfællede og Syltunge, ikke alm., men bemærket i alle Provindser, forekommer (ligesom 290) sjældnere inde i Landet paa Enge eller ved Færskvandssøer. β , paa lignende Steder som Hoved-; men sjældnere: *Loll.* Øerne i Maribo Sø! *J.* Aaby i Vendsæl (Grønlund)! Enge indenfor Klitterne ved Fjaltring!

22. Gentiana. Entian.

a. *Endotricha* Fröl. . Kronens Svælg beklædt med fryndset-mangedeelte Skjæl af Kronfligenes Antal.

293. **G. Amarella** L. (Smalbægret E.) H. 299; Drej. n. 243; F. D. 328; Rehb. l. c. XVII, tab. 1046; H. N. VI, 15.

Stængelbladene siddende, fra en ægformet Basis smalt lancetformede; *Bægeret* næsten regelret femfliget med linieformede, spidse Flige; *Kronen* femtandet.

Rodbladene omvendt-ægformede, kortstilkede; *Kronen* skident blaa eller violet. 8—9. ☉.

Var. α , med korte Blomsterstilke (*G. Amarella* Willd.), β , med Blomsterne længere end Stængelens Ledstykker samt ved Grunden afsmalnede Stængelblade (*G. uliginosa* Willd.) og γ , med budte, næsten tungeformede, Stængelblade (*G. lingulata* Ag., H. N. VI, 14). Blomsten paa smaae Expl. undertiden, især hos β , firedeelt; Kapselen var. siddende og kortstilket.

Paa Enge, Overdrev og Fælleder, især i Nærheden af Havet, bemærket i alle danske Provindser, men i enkelte Egne sjelden, f. Ex. i det sydlige *Fyen* og den sydlige Deel af *Jyll.*

Anm. *G. germanica* Willd. (F. D. Suppl. ined. tab. 67), som adskilles fra foreg. ved større Kroner og tilspidsede Bægerflige, fra følg. ved ligestore Bægerflige, kunde muligviis forekomme i vor Flora. Expl. sendte under dette Navn fra Aalborg (Juel) høre til en Form af *G. Amarella*, med tydelig stilket Kapsel. Dette Forhold er ogsaa foranderligt hos *G. germanica*.

294. *G. campestris* L. (Bredbægret E.) H. 300; Drej. n. 244; F. D. 367; Rehb. XVII, tab. 1046; H. N. VIII, 10.

Stængelbladene siddende, æg-lancetformede, *Bægeret* dybt firedeelt, de 2 ydre Flige ægformede, de indre meget mindre, lancetformede, tilspidsede; *Kronen* firetandet; *Kapselen* meget kortstilket.

Rodbladene som hos foreg. Forekommer ogsaa med femdeelt Blomst. *Kronen* ureen blaa eller violet, sjældnere hvid. 8—10. ☉.

Paa Strandenge, Overdrev og Lyngbakker, alm. paa *Halvoen*, ligesaa i det østlige og nordlige *Sjæll.*; sjelden i Vestsjælland, *Fyen* og paa *Loll.-Falst.*

b. *Coelanthæ* Fröl. *Kronens* Svælg nøgent.

295. *G. Pneumonanthe* L. (Smalbladet E.) H. 297; Drej. n. 242; F. D. 269; Rehb. XVII, tab. 1051; H. N. XIV, 15.

Bladene linieformede, med tilbagerullet Rand; *Bægeret* regelm. femfliget med linieformede Flige; *Kronen* femtandet, tragtformet; *Støvknapperne* sammenklæbede.

De nedre Stængelblade smaae, skjælformede, Blomsterne enlige i Spidsen af Stængelen eller flere, kortstilkede i de øvre Bladhjørner. Kronen stor og smukt ultramarinblaa, indvendig med grønne Punkter, sjældent hvid (Grimstrup ved Varde, 14). 8—9. 4.

I Hedemoser og tørvholdige Enge, paa *Halvøen* meget alm. i den vestlige Deel, sjældnere mod Ø., paa *Øerne* sjelden: *Sj.* Annebjerggaard, Kalundborg, Svenstrup, Roeskilde, Gilleleie, Kronborg Overdrev, Udsholt, Kjøge (H.), Vallensbæks Mose (15); *Loll.* ved Hunseby (H.).

23. Menyanthes. Bukkeblad.

296. *M. trifoliata* L. (Almindelig B.) H. 226; Drej. n. 241; F. D. 541; Rchb. XVII, tab. 1043.

Stængelen opstigende; *Bladene* omskedende, stilkede, tre-koblede, med omvendt-ægformede eller ovale Smaablade; *Blomsterne* i Klase.

Kronen indvendig hvid, med tæt og sirligt trævlet-fryndset Krave, udvendig rosenrød. Undertiden findes en Misdannelse med grøn, bægrelignende Krone (◁ *paradoxa* Fr.) 5—6. 4.

I dybe Moser og Kjær, Hængedynd, alm. udbredt. ◁ i en Mose ved Bagsværd!

† *Limnanthemum.*

† *L. nymphoides* [Hffg. et Lk. fl. port. I, p. 344.] Rchb. l. c. XVII, tab. 1042; *Menyanthes* L., F. D. 339; *Waldschmidia* Web. (Wiggers) primit. p. 20, H. 228; *Villarsia* Vent.

Stængelen nedsænkt under Vandet, ved Ledene rodslaaende; *Bladene* langstilkede og ved Grunden omskedende, kreds rundt-nyreformede, næsten heelrandede, læderagtige, paa Underfladen punkterede; Blomsterstilkene langstrakte, tilsidst bøiede, 1—4 udgaaende fra Bladhjørnerne.

Hele Planten glat. Kronerne store, smukt gule. Ligner i Bladformen *Nymphæa* og *Hydrocharis*. 7—8. 4.

Findes vildvoxende i Marskgrøfter og Aaer i Holsteen, men neppe i det egenlige Danmark. I Kronborgs Fæstningsgrave, hvor den i flere Aar har voxet og udbredt sig, er den oprindeligt indplantet (21), ligeledes sandsynligviis i Søerne ved Hørsholm, hvor den 1863 er funden af Apotheker Piper.

24. Primula. Kodriver.

- a. Bladene glatte, paa Underfladen meledede,
Kronen rød eller lila.

297. *P. farinosa* L. (Melet K.) H. 224; Drej. n. 215; F. D. 125; Rehb. l. c. XVII, tab. 1092; H. N. XIII, 38.

Bladene omvendt-ægformet-lancetformede, rundtakkede; *Skaflet* bladløst; *Svøbladene* sylformede, ved Grunden sækformigt udvidede; *Blomsterne* kortstilkede, i en tæt Skjærm; *Bægertænderne* linieformede, budte; *Kronens* Flige omvendt-hjerteformede; *Svælget* med korte, gule Kirtler.

3—10" høi. (En af vore smukkeste vildvoxende Planter). 5—6. 4.

I Moser og vaade Enge paa tørvholdig Bund, forekommer alm. paa *Bornh.* (20) og ikke sjældent i et Bælte gennem det midterste Sjælland (ikke bemærket i Egnen af Helsingør eller i Sydvest-Sjælland); i de andre Provindser sjelden: *J.* Skanderborg Dyrehave, Horsens paa Enge ved Fjorden (16); *F.* ved V. Skjerninge (H.); *Thorseng* (Lund). Paa de 2 sidstnævnte Steder er den sandsynligviis nu forsvunden. *

- b. Bladene duunhaarede, rynkede, ikke meledede.
Kronen guul.

298. *P. officinalis* [Jacq. misc. I, 158] (Huulkravet K.) H. 222; Drej. n. 218; Rehb. l. c. XVII, tab. 1090; *P. veris* α, L., F. D. 433.

Bladene med ægformet Plade, pludseligt overgaaende i en vinget, uregelm. bølget-rundtakket Bladstilk; *Blomsterne* i alsidig Skjærm med sylformede *Svøblade*; *Bægeret* ensfarvet, kort- og hvidagtig duunhaaret, lidet længere eller kortere end de tæt- og korthaarede Blomsterstilke, klokkeformet, opblæst, skarpt femkantet, med 5 korte, spidse, ægformede Tænder, omtr. $\frac{1}{3}$ af Bægerrørets Længde; *Kronen* tragtformet; *Kronens* Flige omvendt-hjerteformede, hvælvede; *Svælget* indsnøret ved en Krands af vorteformede Fremragninger.

Skaftet 4—8" høit, tilligemed Blomsterstilke og Bæger fløielshaaret. Kronen citronguul med 5 orangefarvede Pletter i Svælget, sjældnere høirød. Blomsterne af behagelig, men ikke stærk Lugt. 4—5. 4.

Var. (ligesom de øvrige Arter i Slægten) ♀, med mindre Kroner, kortere Støvdragere indsluttede i Kronrøret, (som derved faaer en sækformet Udvidelse paa Midten) og stærkt udviklet Griffel (af Længde med Bægeret) og ♂, med større Kroner, længere Støvdragere (som naae til Kronrørets øvre Deel, der har en sækformet Udvidelse umiddelbart under Kraven) og tilbagetrængt Griffel (kortere end Bægeret). En Var. med enblomstrede, fra Rodstokken udgaaende Blomsterstilke og Dækblade ved Grunden (*β*, *subacaulis* Doell.) er funden i Fyen ved St. Jørgensgaard (12)!

Paa høie Enge og Bakker mellem Krat alm., sjeldnere i Skove.

* *P. unicolor* [Nolt. i Hans. Herb. Nr. 1159] *P. Tommasinii* Gren. & Godr. fl. Fr. II, p. 499, Rehb. l. c. XVII, tab. 1102 (?); *P. officinali-elatior* Muret i Reut. pl. vasc. de Genève p. 143; *P. elatior β*, *macrocarpa* Personnat, Bull. soc. bot. Fr. I, p. 160; *P. elatior β*, *decipiens* Sond. fl. Hamb. p. 113.

Adskilles fra foreg. ved ensidig Skjærm, ikke ensfarvet Bæger (Tænderne og Nerverne grønne, Mellemrummene hvidagtige), ved større og mere flade Kroner, som mangle de orangerfarvede Pletter i Svælget, fra følg. ved klokkeformig opblæst Bæger (omtr. af Kronrørets Længde) med kortere og bredere Flige, ved mørkere Kroner med hvælvede Flige samt ved mindre klæbrige Blomsterstilke. 4—5. 4.

Funden i Steenskoven paa *Lolland* (19)! og ved Borreby i *Sjælland*. (Nielsen)!

Ann. Ansees af de fleste Forff. for en Bastard af *P. off.* og *elatior*, men dette synes at modsiges af den Kjendsgjerning, at den ægte *P. elatior* ikke findes i Omegnen af Skjelskør, hvor denne Plante er funden. (Personnat (l. c.) bemærker ligeledes, at denne er den eneste Form som forekommer ved St. Flour i Frankrig). Jeg er derfor snarere tilbøielig til at ansee den enten for en storblomstret Form af *P. officinalis* eller for en Afart af *P. elatior*.

299. *P. elatior* [Jacq. l. c.] (Fladkravet K.) H. 223; Drej. n. 217; Rehb. l. c. XVII, 1090; H. N. II, 32; *P. veris β*, L., F. D. 434.

Bladene som hos de 2 foreg., men med talrige Sidenerver, lodrette paa Midtnerven; *Blomsterne* i noget ensidig Skjærm med sylformede Svøbblade; *Bægeret* omtrent af Længde med Blomsterstilken, tragt- eller valseformet, med æg-lancetformede, pludseligt tilspidsede Tænder, omtr. halvt saa lange som Bæger-

røret (Tænderne og de fremstaaende Nerver grønlig, Mellemrummene hvidagtig-gjennemsigtige); *Kronen* fladkravet, med svagt udrandede *Flige*, svovlguul med citronguult, ikke indsnøret *Svalg*.

Skaftet $\frac{1}{2}$ —1' høit, tilligemed Blomsterstilk og Bæger klæbrig-duunhaaret, Blomsterne uden eller med svag Lugt. Blomsterstilkens Haar krusede, omtr. af Længde med Blomsterstilkens Gjennemsnit. 4—5 (omtr. 8—14 Dage tidligere end *P. officinalis*). 4.

I Skove: i det østlige *Sj.* alm., sjeldnere mod V. (Ringsted! Tase Mølle! Førsløv!), i de andre Provindser sporadisk og som oftest mindre alm. end foreg. (Dyrkes tilligemed de 2 følgende som Siirplante i forskjellige Varieteter).

* 300. *P. variabilis* [Goupil ann. soc. Linn. Paris 1825 p. 294] (Langstillet K.) Gren. & Godr. Fl. Fr. II, 448; *P. brevistyla* DC., Rchb. l. c. XVII, 1103; *P. grandiflora* β , *caulescens* autt. (Lge. Haandb. 1—2 Udg.).

Bladene jævnt afsmalnede i en vinget Bladstilk, Sidenervene fjernere og mindre lodrette paa Midtnerven end hos foreg.; *Skjærmen* alsidig; *Blomsterstilkene* længere end Bægeret (meget længere end hos foreg.); *Bægeret* opblæsttragtformet, dets Tænder lancetformede, jævnt tilspidsede, omtrent af Bægerrørets halve Længde; *Kronen* fladkravet, med omvendt-hjerteformede *Flige*; forøvrigt som foreg.

Ansees af nogle Forff. for en Bastardform af *P. officinalis* og *grandiflora*. 5. 4.

I Skove hist og her: *Sj.* Asnæs Nordstrand (Smith); *Moens* Klint! *F.* Holkenhavn (Lund)! Langeskov Kro (16), Tidselholt, Skaarup, Klingstrup o. fl. St. i det sydøstl. Fyen (12, 19); *J.* Haslund Krat ved Randers (Selmer)! Holme (2), Boller (13); *Sl.* Haderslev, Halk (Grønlund)! *Bornh.* (20)!

301. *P. grandiflora* [Lam. fl. fr. 2, 248] (Storblomstret K.) *P. acaulis* Jacq., H. 223; Drej. n. 216; *P. elatior* β , *acaulis* H. N. II, 33; *P. veris* γ , L., F. D. 194; *P. vulgaris* Huds.; *P. silvestris* Scop., Rchb. l. c. XVII, 1091.

Bladene omvendt-ægformede, jævnt afsmalnede til en vinget Bladstilk, bølget-rundtakkede; *Blomsterstilkene* enblomstrede, udgaaende fra Rodstokken; *Bægeret* skarpt femkantet, tragtformet, med linie-lancetformede, tilspidsede Tænder omtr. af Bægerrørets Længde; *Kronen* fladkravet, med omvendt-hjerteformede *Flige*; *Svalget* svagt indsnøret ved en Krands af Vorter.

Blomsterstilke og Bæger uldhaarede. Kronen større end hos de foreg. og blegere gul, med en mørkere Ring ved Svælget, har en behagelig, men svag Lugt. 4—5. 4.

I Skove, ikke sjelden paa *Halvøens* Østkyst, sjeldnere i det Indre af Landet og mod V. (f. Ex. Rimmen pr. Lemvig! Kalbygaard! Gram (1), Husum (16), derfra mod Ø. sjeldnere: hist og her i det sydlige *Fyen* og paa *Øerne* indtil Møens Klint; *Sj.* alm. i Asnæs Skov ved Kalundborg (Baagøe, Smith)! *Bornh.* ved Nexø (20). (Varieteter med røde og hvide Kroner ved Hammelev pr. Haderslev (Grønlund), med brunrøde Kroner ved Magaard i Fyen (19).

25. Hottonia. Vandrøllike.

302. *H. palustris* L. (Almindelig V.) H. 228; Drej. n. 219; F. D. 487 og 1867 (var.); Rehb. l. c. XVII, 1081.

Bladene kamformigt fjersnitdeelte; med linieformede Af-snit; *Skaflet* bladløst, med krandsstillede *Blomster* foroven, dannende en fjernblomstret Klase; *Blomsterstilkene* mod Frugtmodningen tilbageboiede; *Dækbladene* linieformede, af Længde med eller kortere end *Blomsterstilkene*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronen hvidagtig-kjødfarvet, med brandguult Svælg, sjeldnere rosenrød. 5—6. 4.

I Kjær, Grøfter o. a. stillestaaende Vand, alm. udbredt.

26. Lysimachia. Fredløs.

a. *Naumburgia* Mönch. Kronen dybt femdeelt med 5 Tænder mellem Fligene.

303. *L. thyrsiflora* L. (Gulddusk). H. 230; F. D. 517; Rehb. l. c. XVII, 1085; *Naumburgia* Drej. n. 225.

Stængelen opret; *Bladene* modsatte, sjeldnere krandsstillede ($\frac{1}{3}$ eller $\frac{1}{4}$), siddende, smalt lancetformede; *Klaserne* stilkede i Bladhjørnerne, tæt blomstrede, ovale; *Kronfligene* linieformede; *Støvdragerne* sammenvoxne til en kort Ring.

Klaserne udvikles kun fra de midterste Blade paa Stængelen. Bladene punkterede, Kronen gul. Har stundom 7—10 Støvdragere. 6—7. 4.

I Kjær, ved Bredderne af Aaer og Søer, alm. i *Sjæll.* og paa *Halvøen* (især dens vestlige Egne), sjeldnere paa *Øerne*; i det sydlige *Fyen* ikke funden (12!), paa *Bornh.* kun ved Kleven i Clemensker Sogn (Hjorth).

b. *Lysimastrum* Duby. Kronen uden Tænder
mellem Fligene.

aa. *Støvdragerne ved Grunden sammenvoagne.*

304. **L. vulgaris** L. (Almindelig F.) H. 229; Drej. n. 222; F. D. 689; Rechb. l. c. XVII, 1086.

Stængelen opret; *Bladene* modsatte eller krandsstillede ($\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$), meget kortstilkede, fjernervede, elliptiske eller lancetformede, paa Underfladen duunhaarede; *Blomsterstanden* en Top, dannet af Halvskjærme fra de øvre Blades Hjørner; *Bægerfligene* æg-lancetformede, omgivne af en mørkere Rand.

Var. i Henseende til Bladenes Brede og Antal i Krandsen, samt Beklædningen og Blomsterstilkens Længde. Kronen guul. 6—8. 4.

Ved Søbredder, paa Enge mellem Krat, i Moser o. s. v., almindeligt.

† *L. punctata* [Jacq. Fl. austr. I, 366].

Stængelen opret; *Bladene* krandsstillede ($\frac{1}{3}$), sjældnere modsatte, elliptisk-ægformede; *Blomsterne* enlige i Bladhjørnerne, kortstilkede og kortere end Bladene; *Bægerfligene* linie-lancetformede, haarede og besatte med sorte Punkter (ligesom Bladene undertiden). Kronen guul. 7—8. 4.

Hjemmehørende i Sydeuropa, dyrkes hist og her i Haver og forekommer stundom forvildet, f. Ex. *Sj.* Kirkehelsinge (Baagø!), Gurre i Mængde i Anlægget ved Skovriderboligen! *Sl.* Angel (7).

bb. *Støvdragerne frie.*

305. **L. nummularia** L. (Pengebladet F.) H. 231; Drej. n. 223; F. D. 493; Rechb. l. c. XVII, 1084.

Stængelen krybende; *Bladene* modsatte, kortstilkede, fjernervede, hjerteformet-kredsrunde eller ovale, budte, glatte; *Bægerfligene* hjerteformede, spidse.

Kronen guul, tilligemed Bladene med mere eller mindre talrige (under Lupen synlige) blodrøde Punkter. Blomsterstilkene snart kortere, snart længere end Bladene. 6—7. 4.

Paa Enge, ved Randen af Veie og i fugtige Skove, ikke sjelden, især meget hyppig i det sydl. *Sjæll.* og *Fyen* samt paa *Øerne*.

306. **L. nemorum** L. (Arveagtig F.) H. 231; Drej. n. 224; F. D. 174; Rehb. l. c. XVII, 1084; H. N. I, 21.

Stængelen svag, udstrakt eller opstigende; *Bladene* modsatte, kortstilkede, grundnervede, ægformede, spidse, glatte; *Bægerfligene* lancet-sylformede, tilspidsede.

Blomsterstilkene fine, oftest længere end Bladene, mod Frugtmodningen tilbagebøiede; Kronen neppe halvt saa stor som foreg., guul. Ligner *Anagallis arvensis*. 7—8. ☐.

I fugtige, skyggefulde Løvskov, paa *Halvøen* og i *Fyen* ikke sjelden, men sporadisk; i *Sjæll.* sjelden: Stokkebjerg Skov (Weilbach), Frederiksborg, Sparresholm (H.). Hædede Skov ved Gisselfeld! Langebæk og Steensbøg Skove (West); ligesaa paa de mindre Øer: *Langel.* v. Tranekjær (12); *Loll.* Stokkemarke (19); *Møens* Klinteskov! *Bornh.* Hammershuus, Røe (8)! Almindingen, Svanike (F. D.).

27. *Anagallis*. Arve.

307. **A. arvensis** L. (Rød A.) H. 232; Drej. n. 220; F. D. 88; Rehb. l. c. XVII, 1082.

Stængelen udstrakt; *Bladene* modsatte (sjeldnere krandsstillede), siddende, ægformede; *Blomsterstilkene* enlige i Bladbjørnerne, efter Afblostringen nedbøiede; *Bægerfligene* sylformede, tilspidsede; *Kronfligene* kirtlet-randhaarede.

Kronen hørirød eller kjødfarvet, sjeldnere lila. 6—8. ☉.

Paa dyrkede Agre mellem Sæden, alm. udbredt, især i stor Mængde paa *Bornholm*!

* 308. **A. coerulea** [Schreb. spicil. fl. lips. p. 5] (Blaa A.) Drej. n. 221; F. D. 1570; *A. arvensis* *coerulea* H. 232.

Stængelen udstrakt eller opstigende; *Bladene* modsatte eller krandsstillede ($\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$), siddende, æg-lancetformede; *Bægerfligene* sylformede, under Lupen saugtakke; *Kronfligene* rundtakke.

Kronen blaa. Ansees af Flere for en Afart af foreg. 6—8. ☉.

Paa dyrkede Agre: *Sj.* paa Markerne ved Lyngby Sø (Lehm., gjenfunden 1861, Wahlstedt), Kongelunden paa Amager (19), Langebæks Mølle (Rosenørn-Lehm), Petersgaard, Viemose (West); *Falst.* Eget, Horbeløv (Hansen), Horreby, S. Kirkeby (Koch); *Loll.* Bollesminde (Galschiøtt); *F.* Hofmansgave (N. E. Hofm.-Bg.).

28. Vinca. Singrøn.

† 309. **V. minor** L. (Liden S.) H. II, 147; F. D. 1813; Rehb. l. c. XVII, 1062.

Stængelen fremliggende eller krybende; *Bladene* modsatte, elliptiske, læderagtige og stedsegrønne; *Bægerfligene* spidse, kortere end Kronrøret, glatte.

Var. med ægformede eller lancetformede Blade. Kronen blaa, sjældnere hvid. 5. 4.

I Skove og ved Gjærder: *Sj.* Frydenlund (H.), Dronninggaard (19), Søndermarken! *Falst.* ved et Gjærde paa Nykjøbing Mark (Koch); angives ogsaa fra *Jyll.* (uden Voxested) (H.); *Sl.* Papirmøllebakken ved Flensborg, Nyværk ved Slesvig (16). Paa alle disse Steder er den dog sandsynligviis forvildet fra Haver, hvor den dyrkes som Siirplante.

29. Samolus. Samel.

310. **S. Valerandi** L. (Strand-S.) H. 266; Drej. n. 226; F. D. 198; Rehb. l. c. XVII, 1083; H. N. XV, 24.

Stængelen opret; *Bladene* omvendt-ægformede, budte; *Blomsterne* i Klaser i Enden af Stængelen og fra de øvre Bladhjørner; *Blomsterstilkene* udstaaende, ovenfor Midten knæbøiede med et Dækblad ved Bøiningen; *Kapselen* kugleformet.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronerne hvide. 7—8. 4.

Paa Strandenge, sporadisk og ikke alm., men bemærket i alle danske Provindser, hyppigst paa *Øerne* og i *Fyen*, sjældnere i *Sjælland*. Forekommer ogsaa, men sjældent, ved Bredderne af Færskvandssøer (f. Ex. Skaritsø! Suserup! Lindede ved Kjøge (9), Kattinge Sø ved Roeskilde (Dr.). $\frac{3}{4}$

30. Lobelia. Lobelie.

311. **L. Dortmanna** L. (Tvepibet L.) H. 247; Drej. n. 248; F. D. 39; Rehb. l. c. XIX, tab. 1618; H. N. VIII, 7.

Bladene tæt samlede ved Roden, linieformede, seglformigt tilbagebøiede, torummede paalangs; *Skaflet* faabladet; *Blomsterne* i en fjernblomstret Klase, efter Afblomstringen nedhængende.

Roden hvidtrævlet. $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ høi. Bladene og Stængelens nedre Deel under Vandet. Kronerne blegt blaaagtigt-hvide. 7—9. 4.

I Søer og ved Søbredder paa Gruus- eller Sandbund, paa *Halvøen* hist og her i Søerne i Hede- og Klitstrækningerne, især mod V.; paa *Øerne* meget sjelden: *Læsø* (H.); *Sj.* Gurre Sø ved Helsingør (21)!

31. Campanula. Klokke.

a. Blomsterne stilkede, i Klasse eller Top.

aa. Kapselen opspringende ved Huller i Midten eller Spidsen (nedenfor Bægerfligene).

312. *C. persicifolia* L. (Smalbladet K.) H. 240; Drej. n. 254; F. D. 1087; Rehb. l. c. XIX, tab. 1613.

Stængelen opret; Bladene fjernt og svagt saugtakke; Rodbladene omvendt-ægformet-lancetformede, stilkede; Stængelbladene lancet-linieformede, siddende; Klasen faablomstret; Bægerfligene lancet-sylformede, neppe halvt saa lange som Kronen; Kapselen glat eller stivhaaret.

Blade og Bægerflige alm. glatte, sjeldnere haarede. Kronen blaa. 6—7. 4.

β , *calycida*! De nedre Blade omvendt-ægformede, Stængelen enblomstret; Bægerfligene elliptiske, over halvt saa lange som Kronen.

Paa Bakker, især mellem Krat: paa *Bornholm*, *Møen* og *Falster* samt i det østlige og sydlige *Sjæll.* hist og her, i de øvrige Provindser sjelden og sporadisk: *Loll.* Ravnsby (19), Christianssæde (2); *F.* Ulriksholm (H.), Holkenhavn (25); *J.* Aagaard og Nørbjerg i V. Hanherred (16), Dybdal ved Aalborg (12), Ellitshøj S. for Aalborg (H.), Vaar Skov ved Løgstør (Andresen), Mønsted ved Viborg (7), Hodal Mølle ved Hobro (16); Arnage Bakke ved Ebeltoft (H.), Boeslum Strand (Ørting), Aarhus, Veile; *Sl.* Haderslev (7). I det sydlige Fyen ikke funden. β , Bornholm (11).

313. *C. Rapunculus* L. (Rapuntsel-K.) H. 239; Drej. n. 253; F. D. 1326; Rehb. l. c. XIX, tab. 1613.

Roden tapformet, kjødfuld; Bladene bølget-saugtakke, de nedre stilkede, elliptiske eller omvendt-ægformede, de øvre siddende, lancetformede; Toppen klaseformet forlænget; Bægerfligene sylformede, over halvt saa lange som Kronen; Kronfligene oprette.

2—3' høi. Var. glat og haaret. Kronen blaa. 7—8. ☉.

I Krat og ved Gjærder, sporadisk, men paa de fleste Steder sandsynligviis forvildet fra Dyrkning i ældre Tid: *Sj.* Udby, Slangerup, Jægerbakken ved Frederiksborg, Bregentved (H.), alm. Ukrud i Sorø Akademihave (12)! *Falst.* Bønnet, Veiringe, Aastrup (14); *Loll.* Sæbyholm! Juellinge (19), Aalkholm (H.); *F.* Hverringe (Heiberg); *J.* Thyrsbæk (H.); Sønderborg paa *Als* (20); *Sl.* Haderslev, Flensborg, Nyvæk ved Slesvig, Slotsengen ved Husum (16). ☞

314. *C. patula* L. (Aabenbægret K.) H. 239; Drej. n. 252; F. D. 373; Rehb. l. c. XIX, tab. 1614; H. N. VIII, 6.

Roden tynd; *Bladene* rundtakkede; *Toppen* halvskjærmformet, med aabne, i Spidsen deelte Grene; *Bægerfligene* kortere end den halve Krone; *Kronfligene* udbøiede, forøvrigt som foregaaende, hvilken den meget ligner.

1—2' høi. Var. som foreg. i Henseende til Beklædningen. Kronen blaa. 7—8. ☉.

Ved Gjærder, paa Marker og Bakker, meget sjelden: *Sj.* Brinker ved Aaen mellem Nymølle og Dyrehaven (9), Brankebakken ved Frederiksdal (O. F. Müller); i haandskrevne Anmærkn. af Rafn angives den fra Sønderborg. *Sl.* Husum (F. Müll.). ☞

bb. Kapselen opspringende i Huller ved Grunden,

α, glat.

315. *C. rotundifolia* L. (Rundbladet K.) H. 238; Drej. n. 251; F. D. 1086; Rehb. l. c. XIX, tab. 1603.

Rodbladene langstilkede, nyreformede eller rundagtigt-ægformede, rundtakkede; *Stængelbladene* lancetformede, de øvre linieformede, heelrandede; *Blomsterne* nikkende; *Bægerfligene* sylformede, udstaaende, ikke halvt saa lange som Kronen.

$1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi. Rodbladene ere alm. henvisnede naar Blomstringen begynder. Kronen blaa (sjeldnere hvid). 7—8. ♀.

β, stricta Schum. (C. Rapunculus F. D. 855). Stængelen stivt opret, høi og mangegrenet, Rodbladene ægformet-elliptiske.

γ, parviflora! Stængelen lav; Bladene næsten børsteformede; Kronerne meget smaae, blege.

δ, calycida! Enblomstret, Bægerfligene linie-lancetformede, af Længde med Kronen.

Ved Gjærder og i Kratskove, paa aabne Marker og Lyngheder alm. udbredt. *β*, i Skove: *Sj.* Lyngby (14); *F.* Rødskebølle ved

Svendsborg (12); **J.** Ødstedgaard! γ , i Sandklitter: **Sj.** Tibirke Bakker! **J.** Nebbegaard! **Sl.** Rendsborg! δ , **Sj.** Grevinge i Odsherred (9); **F.** V. Skjerninge!

316. **C. latifolia** L. (Bredbladet K.) H. 241; Drej. n. 255; F. D. 85 (var.) og 782; Rchb. l. c. XIX, tab. 1599.

Stængelen opret, udeelt, svagt kantet; *Bladene* dobbelt saugtakke, haarede, *de nedre* ægformede, tilspidsede, med en vinget Bladstilk, *de øvre* æg-lancetformede, næsten siddende; *Klasen* udeelt, med enblomstrede, tilsidst nikkende *Blomsterstilke*; *Bægerfligene* lancetformede, udstaaende.

3—4' høi. Kronerne store, blaae, sjeldnere hvide. 7—8. 4.

I Skove: paa **Halvoens** Østkyst, i det sydlige **Fyen**, Sydvest-sjælland og paa Øerne ikke sjelden; sparsommere i **Sjællands** østlige og nordlige Egne: Sophienberg (H.), Vedbæk! Strandmøllen (Dr.), Charlottenlund (15), Jonstrup Vang (14), Boserup! Alindelille!

β . Kapselen haaret.

317. **C. Trachelium** L. (Nældebladet K.) H. 242; Drej. n. 256; F. D. 1026 og 2167 (var.); Rchb. l. c. XIX, tab. 1600.

Stængelen opret, skarpt kantet; *Bladene* stivhaarede, grovt og dobbelt saugtakke, tilspidsede, *de nedre* hjerteformede, stilkede, *de øvre* æg-lancetformede, næsten siddende; *Blomsterne* i Klasse eller Top, med 1—3-blomstrede, lidet nikkende *Blomsterstilke*; *Bægerfligene* æg-lancetformede, oprette; *Kapselen* stivhaaret af udstaaende Haar.

2—3' høi. Rodstokken uden Udløbere. Var. i Henseende til Bladenes Indskjæring, Blomsterstandens Forgrening og Bægerets Beklædning. Kronen mørkblaa, sjældent hvid. 7—8. 4.

I Skove og Krat, alm. udbredt.

318. **C. rapunculoides** L. (Ensidig K.) H. 241; Drej. n. 257; F. D. 1327; Rchb. l. c. XIX, tab. 1600.

Rodstokken krybende; *Stængelen* opret, budt-kantet; *Bladene* rue, grovt og dobbelt saugtakke, spidse, *de nedre* hjerteformede, langstilkede, *de øvre* æg-lancetformede, siddende; *Blomsterne* i ensidig Klasse, med enblomstrede, nikkende *Blomsterstilke*; *Bægerfligene* linie-lancetformede, tilbagebøiede; *Kapselen* korthaaret af nedadrettede Haar.

1—2' høi. Kronen blaa. 7—8. 4.

Omkring Haver og Byer, ikke sjelden i Danmark, og ofte et besværligt Ukrud i Haverne paa Grund af de vidtforgrene Udløbere; sjeldnere paa Marker mellem Sæden, f. Ex. J. Ø. for Aalborg (12); *Langel.* ved Rudkjøbing (19); *Bornh!*

b. Blomsterne stilkløse, nøgleformigt samlede i Enden af Stængelen og de øvre Bladhjørner.

319. **C. glomerata** L. (Nøgleblomstret K.) H. 245; Drej. n. 250; F. D. 1328; Rchb. l. c. XIX, tab. 1596.

Bladene fint rundtakkede, duunhaarede, *de nedre* langstilkede, æg-lancetformede med hjerteformet Basis; *de øvre* siddende og halvt omfattende, ægformede; *Bægerfligene* oprette.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi. Var. i Henseende til Bladenes Brede, Beklædningen og Kronens Størrelse. Kronen blaa eller violet. 7—8. 4.

Ved Gjærder og i Kratskove, bemærket i alle danske Provindser (undtagen Bornholm), men i de fleste Egne sporadisk og ikke alm., hyppigt forekommer den i et Parti af det østlige *Jylland* (omtrent fra Hobro til Horsens!), i det nordøstlige *Fyen* og Egnen om Roeskilde. *

Anm. 1. Angivelsen af *C. Cervicaria* L. fra Lolland (Müll. i F. D. 787) beroer uden Tvivl paa en Feiltagelse. Paa det angivne Voxested (ved Rødby) findes *C. glomerata* i Mængde.

Anm. 2. *Wahlenbergia hederacea* Rchb. l. c. tab. 1617 (Lge. Hdb. 1 Udg. n. 303; Campanula F. D. 330) er angivet af Horn. (1, 245) at være funden paa Sylt og Føhr, men er ikke senere gjenfundet. De Expl., hvorefter Tegningen i F. D. er gjort, ere samlede i Hertugdømmet Oldenburg (sml. Horn. II, 144), hvorfor denne Plante indtil videre bliver at udstryge af den danske Flora.

32. *Phyteuma. Rapuntsel.*

320. **P. spicatum** L. (Axbærende R.) H. 245; Drej. p. 93; F. D. 362; Rchb. l. c. XIX, tab. 1586.

Bladene dobbelt saugtakkede, *de nedre* langstilkede, æghjerteformede, *de øvre* linie-lancetformede, siddende; *Blomsterne* i et endestillet, under Blomstringen ovalt, imod Frugtmodningen valseformet Ax.

1—2' høi. Kronerne guulhvide, med grønlig Spidser; Støvtraadene randhaarede. 6—7. 4.

I Skove, alm. i den østlige Deel af *Halvøen*, sporadisk mod V. (f. Ex. Nørholm N. for Varde! Kloby og Lundager Krat ved Ribe (6), Fjedsted Skov v. Ribe (Fabr. Müller) og i *Fyen* (aftagende mod

Ø.); paa de øvrige Øer mangler den, kun i *Sj.* er den funden ved Sorgenfri, formodenlig forvildet (Drej., 19!). *]

33. *Jasione*. Munke.

321. *J. montana* L. (Blaa M.) H. 246; Drej. n. 249; F. D. 319; Rchb. l. c. XIX, tab. 1578.

Roden udeelt; *Stænglerne* enlige eller flere fra Rodhovedet, nedentil tætbladede, foroven nøgne, furede; *Bladene* linieformede, bredere imod Spidsen, bølget-tandede, stivhaarede; *Blomsterkurvene* enlige i Enden af Stænglerne.

Kronerne blaa, sjældnere hvide. 6—8. ☉.

β, *iittoralis* Fr. nov. ed. 2, p. 269; Rchb. l. c. XIX, tab. 1578, fig. 2; H. N. VI, 12. Mangestænglet, med flere, nedliggende eller i Spidsen opstigende Stængler og mindre Blomsterkurve. (Denne Form har jeg fundet med glatte Blade).

Tørre Marker og Bakker, almindelig. *β*. ved sandige Strandbredder og paa Sandbakker: *Sj.* Tibirke (27); *Thorseng* paa Breguinge Bakke (12); *F.* Knudshoved (19); *Bornholm* alm. i Sandstrækningerne, især omkring Rønne! *J.* hist og her i Klitterne ved Vesterhavet, f. Ex. Agger, Fjaltring, Thorsted! Blaavand, Bækbølling (30)! *Sl.* Eidersted (F. Müller).

34. *Lonicera*. Gedeblad.

322. *L. Periclymenum* L. (Almindelig G.) H. 267; Drej. n. 258; F. D. 908; Rchb. l. c. XVII, 1172.

Stængelen slyngende; *Bladene* elliptiske eller ovale; *Blomsterne* i et endestillet, mangeblomstret Hoved; *Bægerets* Krave vedblivende (i Spidsen af Frugten).

Blomsterskaff, Bæger og Krone udvendig kirtlet-duunhaarede; *Bladene* var. glatte eller paa Underfladen duunhaarede, heelrandede eller bugtet-fjerlappede (*β*, *quercifolia*). Kronen vellugtende, lysgul, udvendig rødagtig (især naar den voxer paa aabne Steder). Bærrene høirøde. 7—8. ♀.

I Krat og ved Gjærder, alm. udbredt, ogsaa i de magre Egne. *β*, *Sj.* Lundtofte (19), Sorgenfri! *Loll.* Steensgaard, Ravnsby; *F.* Skaarup (19); hyppigst paa Ryddepladser i Skove.

323. *L. Xylosteum* L. (Dunet G.) H. 268; Drej. n. 259; F. D. 808; Rchb. l. c. XVII, 1174.

Stængelen opret; *Bladene* ægformet-elliptiske eller ovale; *Blomsterstilkene* modsatte i Bladhjørnerne, toblomstrede med ved Grunden sammenvoxne Blomster; *Bægerets* Krave affaldende.

Hele Planten duunhaaret, Kronen hvidgul; Bærrene mørkrøde. De 2 Blomster ere i yngre Tilstand indbyrdes frie, omgivne yderst af to bladagtige, spidse, og indenfor disse af 2 budte, skaalformede Dækblade. De sidste omgive tæt Frugtknuderne, og voxe tilsidst sammen med disse. 5—6. h.

I Skove og Krat, sporadisk, hyppig i det østlige *Sjæll.*, *Moen* og især *Bornholm*. I Landets vestligere Egne er den sjeldnere og maaskee aldeles ikke tilstede.

35. Viola. Viol.

a. *Nomimum* Ging. De 2 mellemste Kronblade udstaaende til Siderne, Griffelen ved Grunden lidet bøiet, foroven ret eller under Arret hagekrummet. (4).

aa. *Bægerbladene* budte. Ingen overjordisk Stængel, men Rodstok eller krybende Udløbere.

α. Blomsterstilkene efter Blomstringen oprette. Griffelen oventil puklet, med skjævt endestillet Ar. Kapselen budt trekantet.

324. **V. palustris** L. (Eng-V.) H. 250; Drej. n. 263; F. D. 83; Rchb. ic. fl. germ. III, fig. 4491; H. N. VIII, 31.

Bladene nyreformede (eller nyre-hjerteformede), med utydelige Sideaarer; *Axelbladene* ægformede, frie; *Blomsterstilkene* (under Blomstringen) længere end *Bladene*, med 2 *Dækblade* nedenfor Midten; *Bægerbladene* budt-ægformede, med afrundede Tilhængsler af Længde med den næsten rette *Spore*; *Støvknapperne* Rum parallele, de 2 nedre med en kort, tyk, afrundet *Spore*.

Rodstokken krybende; *Bladene* glatte eller før Udviklingen svagt duunhaarede; Kronen blegt lila med violette eller mørkrøde Aarer. 5.

I Moser (mellem Sphagnum) og fugtige Enge alm. udbredt.

325. **V. epipsila** [Ledeb. ind. sem. hort. dorp. 1820] (Tørv-V.) F. D. 2405; Fr. S. Veg. Sc. II, 556; *V. scanica* H. N. VIII, 32.

Bladene nyreformet-hjerteformede, med tydeligt og stærkt forgrenet Aarenæt; *Axelbladene* ægformede, frie; *Blomsterstilkene* (under Blomstringen) af Længde med *Bladene*, med 2 *Dækblade* ovenfor Midten; *Bægerbladene* ovale med afskaarne Tilhængsler, der ere kortere end den bøiede *Spore*; *Støvknapperne* Rum parallelle, de 2 nedre med en kegleformet, bøiet *Spore* af Længde med *Støvknapperne*.

Rodstokken krybende, meget skjør; *Bladene* paa Underfladen duunhaarede, tilsidst næsten glatte. Kronen blaaagtigt lila, med mørkere Striber, næsten dobbelt saa stor som foreg. 5 (noget senere end foreg.).

I Moser paa tørvholdig Bund, især ved raadne Træstød, hidtil kun funden sporadisk: *Sjæll.*: Tryggerød, Ordrup- og Lundehuus-Moserne! Bloustrød! Jonstrup Vang, Særløse ved Roeskilde, Brofelde ved Holbek (15), Sorø! *Falst.* Horreby Lyng (Benzon), *F.* Ollerup! *J.* Haven i Vendsyssel (8), Urup (2); *Sl.* Veesriis ved Rylskov!

326. **V. uliginosa** [Schrab. n. journ. IV, 80] (Sump-V.) Fr. mant. 2, 51; Rehb. l. c. fig. 4492; H. N. V, 27.

Bladene aflang - hjerteformede, rundtakket - saugtaktede; *Axelbladene* lancetformede, kirtlet-tandede, indtil ovenfor Midten sammenhængende med den vingede *Bladstilk*; *Blomsterstilkene* med *Dækblade* ovenfor Midten; *Bægerbladene* budte, med afskaarne Tilhængsler, der ere meget kortere end den budt-kegleformede *Spore*.

Kronbladene store, lysviolette. 5—6.

I Tørvmoser, meget sjelden: *Bornh.* i Vallensgaards Mose (20)! Echodalen i Almindingen (Hoff)! ☞

β, Griffelen under Arret hagekrummet, *Blomsterstilkene* efter Ablomstringen udstrakte; Kapselen kugleformet.

327. **V. hirta** L. (Korthaaret V.) H. 249; Drej. n. 264; F. D. 618; Rehb. l. c. fig. 4493; H. N. VIII, 30.

Rodstokken lodret eller skjæv, uden Udløbere; *Bladene* æg-hjerteformede, paa begge Flader haarede; *Axelbladene* smalt lancetformede, grønne, randhaarede; *Blomsterstilkene* med *Dækblade* (alm.) nedenfor Midten; *Kapselen* haaret; *Støvknapperne* Rum forneden frastaaende.

Bladene og især Bladstilkene forstørres betydeligt efter Blomstringen; Kronen lugtløs, blegblaa eller lila, sjeldnere hvid (paa de senere Blomster 0). 4—5.

I aabne Skove og paa Bakker mellem Krat, hyppig i de fleste Egne af Danmark, men paa enkelte Steder (f. Ex. omkring Sorø) ikke bemærket.

328. **V. odorata** L. (Marts-V.) H. 249; Drej. n. 265; F. D. 309; Rchb. l. c. fig. 4498; H. N. IV, 41.

Rodstokken med krybende Udløbere; *Bladene* nyreformet-hjerteformede, rundtakkede, glatte eller før Udviklingen svagt haarede; *Axelbladene* æg-lancetformede, hindeagtige, randhaarede; *Blomsterstilkene* med *Dækblade* ovenfor Midten; *Kapselen* som foreg.; *Støvknappernes* Rum forneden frastaaende.

Bladene alm. glindsende; Kronen mørk violet, vellugtende. 4.

β , *alba*. Blomsterstilkene duunhaarede, Kronbladene hvide med violet Spore.

I Udkanten af Skove, paa Græspletter og ved Gjærder i Nærheden af Byer, ikke sjelden. β , *Sj.* Grøfter udfor Slukefter! *Falst.* S. Kirkeby (Koch); *F.* mellem Skaarup og Skaarupør (19), mellem Svendborg og St. Jørgensgaard (12).

bb. Den overjordiske Stængel udviklet, Bægerbladene spidse; *Kapselen* trekantet.

α . Stængelen eensidigt haaret.

329. **V. mirabilis** L. (Forskjelligblomstret V.) H. 252; Drej. n. 266; F. D. 1045; Rchb. l. c. fig. 4504.

Stængelen opret; *de nedre Blade* nyreformede, *de øvre* bredt hjerteformede, kort tilspidsede, svagt haarede, især langs Nerverne og Bladstilkene paa Ryggen; *Axelbladene* *) lancetformede, tilspidsede, heelrandede (de hos Rodbladene sammenhængende med Bladstilkene); *Dækbladene* nærved Blomsten; *Bægerbladene* spidse; *Sporen* budt, omtrent dobbelt saa lang som de afrundede Bægertilhængsler.

*) Ved Undersøgelsen af Axelbladene hos Violarterne med overjordisk Stængel maa man benytte dem, der sidde paa Midten af Stængelen, som de fuldkomnest udviklede og mindst foranderlige.

De først udviklede Blomster udgaae fra Rodstokken, ere fuldstændige, men frembringe kun sjældent Frugt, de senere fra Stængelen frugtbærende, oftest med meget ufuldstændige eller ingen Kronblade. Kronen vellugtende, violet. 4—5.

I Skove og Krat sporadisk: *J.* Haslund Krat (Selmer), Haraldslund! *Sj.* Alindelille Fredskov! Borreveile (H.), Ledreborg! Boserup (Albrecht)! Jonstrup Vang (15), Krattet ved Ordrups Kongekilde! Kjøge Aas (9), Basnæs Skov (Nielsen). I de andre Provindser ikke bemærket. {*

β. Stængelen glat eller alsidigt haaret.

330. *V. silvatica* [Fr. fl. hall. p. 64] (Skov-V.) Fr. mant. 3, p. 121; H. N. VI, 26; *V. canina silvatica* H. 251; *V. silvestris* Kit.; Drej. n. 268; Rchb. l. c. fig. 4503; *V. canina* F. D. 1453 (?).

Rodstokken udskyder blomsterløse Bladknipper og opstigende Blomsterstængler; *Bladene* hjerteformede, de øvre kort tilspidsede, de nedre budte; *Bladstilkene* uvingede, flere Gange længere end de lancetformede, tilspidsede, fryndset-saugtakkede *Axelblade*; *Sporen* budt, udrandet, 2—3 Gange længere end Bægertilhængslerne, eensfarvet med *Kronen*; *Griffelen* i Spidsen bøiet, med en svag Haarkrands ved Bøiningen og et lidet sidestillet *Ar*; *Kapselen* spids.

Kronen blaaagtig-lila, lugtløs. (De tidligst udspringende Blomster frembringe hyppigt ikke moden Frugt og de sildigste mangle ofte Kronblade, ligesom hos flere af Slægten og typisk hos Nr. 329.) 5.

β, *macrantha* Fr. (*V. Riviniana* Rchb. l. c. fig. 4502). Kronen større, det uparrede Kronblad svagt udrandet, Sporen dobbelt saa lang som Bægertilhængslerne, hvidagtig.

I Skove og Krat alm. udbredt. *β*, med Hovedarten.

Anm. *V. arenaria* DC., som adskilles ved lavere og finere Stængler, som tilligemed Bladene ere duunhaarede, fløielshaaret Kapsel, er, saavidt mig bekjendt, ikke hidtil funden i Danmark, hvor den dog muligviis kunde findes paa sandige Bakker. Expl. samlede mellem Bramstedt og Ulzburg i Holsteen (Lehm.) findes i Hornemanns Herbarium.

331. *V. canina* L. (Mark-V.) H. 251, II, 144; F. D. 2646; H. N. IV, 42; *V. ericetorum* Schrad., Drej. n. 267; Rchb. l. c. fig. 4501 *γ*.

Stænglerne udstrakte eller opstigende, ingen blomsterløse Bladknipper; *Bladene* aflang-ægformede, med hjerteformet Basis, budte, *Bladstilkene* uvingede, flere Gange længere end de lancetformede, tilspidsede, fryndset-saugtakke *Axelblade*; *Sporen* fladtrykt, budt eller udrandet, dobbelt saa lang som Bæger-tilhængslerne, guulhvid; *Griffel* og *Ar* som hos foreg.; *Kapselen* budt.

Kronen blaa eller lila. 5—6.

β , *lucorum* Fr., Rchb. l. c. fig. 4501 δ . *Stænglerne* langstrakte, *Sporen* grønligvid.

γ , *minor*. Ingen overjordisk Stængel, *Bladene* bredere, *Bladstilken* lidet længere end *Axelbladene*. 1—3" høi. (V. *flavicornis* Sm.; V. *canina* β , *sabulosa* Rchb. l. c. fig. 4501 α).

Paa Bakker, udyrkede, tørre Marker og i Udkanten af Skove meget alm.; β , i Skove; γ , paa Lyngheder og tørre Fælleder.

Anm. V. *lancifolia* Thore, Rchb. l. c. fig. 4506 (V. *pumila* Fr. mant. 3, p. 123, V. *lactea* Sm., E. B. 445), forskjellig ved længere, æg-lancetformede Blade, som ved Grunden ere afrundede eller afsmalnede i en oventil vinget *Bladstilk*, lange og tynde *Blomsterstilke*, smalere og blegere *Kronblade*, spids *Kapsel*, kunde muligviis findes her, da den er funden ved Hamborg (Sonder). Den ansees af Flere for en Var. af V. *canina*.

332. V. *stricta* [Hornem. oec. Pl. II, 145] (Rank V.) Fr. mant. 3, p. 124; Drej. n. 269; F. D. 1812; V. *nemoralis* Kütz.; V. *lactea* Nolt. nov.; Hans. Herb. Nr. 1163 (ikke Sm.); V. *Ruppii* Rchb. l. c. fig. 4505 og V. *lactea* fig. 4507.

Stænglen opret, trekantet, med Udløbere fra Rodstokken; *Bladene* fra en æg-hjerteformet Basis forlænget-lancetformede, nedløbende i den oventil vingede *Bladstilk*; de mellemste *Axelblade* halvt saa lange som *Bladstilken*, de øvre ligelange med denne, lancetformede, tilspidsede, fryndset-saugtakke; *Blomsterstilkene* meget længere end *Bladene*; *Sporen* lidet længere end Bæger-tilhængslerne.

Planten bleggrøn, Kronen lys mælkeblaa med bleg grøngul Spore. 5—6.

β , *humilis* Wimm., Fr. mant. 3, p. 124, lavere, med mere nedliggende *Stængler*.

Paa høie Enge og Strandfællede, i Kratskove, sjelden: *Sj.* Vesterfællede (Schlichtkrull), Stillinge pr. Korsør (Lund), Tørvmose ved Flakkebjerg (Nielsen)! Skjørringe Eng ved Storehedinge (Visby)! *F.* Øxemose ved Hofmangave og Kratskov ved Lunde pr. Odense (4, 18)! *Loll.* ved Darket (5)! Stokkemarke (19), *Bornh.* (Hjorth)! *β, F.* Lunde (med Hovedarten (18))! *

Anm. De Expl. jeg har seet fra de angivne Voxesteder, stemme vel overens med Fig. i *F. D.* og Beskrivelsen (cfr. Koch Syn. II, 93). Fra de ølandske Expl. af *V. persicæfolia* Schreb., *Fr. H. N. IV*, 43, som beskrives med kortere Spore, mindre nedløbende Bladstilk, formaaer jeg dog ikke tilstrækkeligt at adskille vore. De med *V. stricta* beslægtede Arter staae hinanden meget nær, ere i høi Grad foranderlige og derfor vanskelige at bestemme. Ogsaa har Hornem. indbefattet flere Arter under sin *V. stricta*, og som Hovedkilden til denne bør derfor citeres *Fl. dan.* 1812.

? 333. *V. pratensis* [Mert. & Koch *D. Fl. II*, 267] (Lavstænglet *V.*) *Fr. mant.* 3, p. 125; *H. N. IV*, 44; *Rchb. l. c.* fig. 4507 b; *V. pumila* Vill., Gren. & Godr. *fl. Fr. I*, 180.

Stænglerne glatte, oprette eller opstigende, med Udløbere fra Rodstokken; *Bladene* bredt lancetformede, ved Grunden afrundede eller nedløbende i en vinget Bladstilk; *Axelbladene* bladagtige, de mellemste af Længde med eller længere end Bladstilken; *Blomsterstilkene* meget fine, længere end *Bladene*; *Sporen* omtrent af Længde med Bægertilhængslerne.

Lavere og finere end foreg. Den paa *Bornh.* fundne Plante er maaskee kun en spød Form af foreg. Blomsterne smaae, med blegblaae Kroner. 5—6.

Bornh. paa fugtige Pletter imellem Lyngen (Blemmelyng) i Knudsker Sogn (8)! Tjæreby, Vallensgaards Mose (Hoff, Hjorth)!

b. *Melanium* DC. De 4 øvre Kronblade opadrettede. Griffelen opstigende, med stort, krukkeformet Ar. (©).

334. *V. tricolor* L. (Stedmodersblomst). *H.* 253; *Drej. n.* 262; *F. D.* 623; *Rchb. l. c.* fig. 4517.

Stængelen opstigende eller opret, grenet; *Bladene* ægformede eller æg-hjerteformede, (de øvre elliptiske), rundtakkede; *Axelbladene* lyreformet-fjersnitdeelte, med rundtakket Endeafsnit; *Sporen* længere end Bægertilhængslerne; *Kapselen* budt.

4—10*). En i Henseende til Bladenes Form, Kronens Farve o. s. v. meget foranderlig Plante. De i vor Flora forekommende Former ere:

α , *vulgaris*. Kronbladene længere end Bægeret, lysblaa, det nedre ved Basis guult med sorte Striber.

β , *angustifolia*! Stængelen langstrakt, opret, Bladene linie-lancetformede, Axelbladene store, med linieformede, heelrandede Afsnit, Kronbladene som hos α .

γ , *hortensis*. Kronbladene længere end Bægeret, mørkviolette og var. med forskjellige Farver.

δ , *arenaria* Sond. Hamb. Fl. p. 137, F. D. 2647; V. *sabulosa* Boreau (Puel & Maill. herb. loc. Fr. Nr. 213)? Stænglerne meget grenede, udstrakte, Bladene linie-lancetformede, Axelbladene næsten haandsnitdeelte, med meget smale Sideafsnit, Sporen lang og tynd, Kronen trefarvet, omtr. af Længde med Bægeret. (Er maaskee en egen Art).

ϵ , *arvensis* (V. *arvensis* Murr., H. 254; F. D. 1748, usædvanligt stort Expl.). Kronbladene kortere end Bægeret, hvide, det nedre ved Grunden guult med sorte Striber.

ζ , *syrtica*. Kronen som foreg., Bladene kjødfulde.

Paa tørre Marker og Bakker alm. udbredt. α , især paa Sandgrund og udyrket Mark; β , Borød ved Sorø! Jylland (5)! γ , dyrkes i Haver og forekommer derfra forvildet; δ , Klitter ved Skagen (Drej.), ved Ræhr og Agger i Thy! *Sj.* Hellebæk! *Bornh.* Dueodden (Hjorth). ϵ , ogsaa paa Leerjord (især som Ukrud mellem Sæden); ζ , ved sandige Strandbredder.

36. Impatiens. Springfrø.

335. **I. Noli tangere** L. (Springbalsamin). H. 248; Drej. n. 270; F. D. 582; Rchb. ic. fl. germ. V, 4483.

Stængelen opret med opsvulmede Led; *Bladene* ægformet-elliptiske, rundtakkede; *Blomsterstilkene* 1—4-blomstrede, kortere

*) Denne Art kan i Grunden rigtigst angives at blomstre hele Aaret; i milde Vintre finder man den hyppigt i Blomster indtil Nytaar eller længere; ja Hr. Rostrup har hele Vinteren igjennem, endog under Sneen, fundet kronløse Blomster, som tidligt paa Foraaret frembragte modne Frugter.

end Bladene; *Blomsterne* hængende; *Sporen* i Spidsen tilbagebøiet; *Frøene* mørkbrune, ovale, fladtrykte med 4 skarpe Kanter og faae bølgeformede, ophøiet-rynkede Striber mellem Kanterne.

Stængelen skjør, meget saftig, Blomsterne lysgule med rødlig-brune Punkter. De tidligst frugtbærende Blomster ere alm. mindre og ufuldstændigt udviklede (mangle det uparrede Bægerblad).

Paa fugtig og løs Skovjord, ikke sjelden i Danmark.

† *I. parviflora* [DC. prodr. I, 687] (Smaablomstret S.) Ledeb. ic. ross. I, t. 89.

Bladene saugtakkede. *Blomsterstilkene* oprette, 3—5-blomstrede, længere end Bladene, *Kronen* blegere guul og mange Gange mindre end hos foreg., med kort, ret *Spore*; *Frøene* graa-brune, ovale, trindt-fladtrykte uden Kanter, men overalt tæt og fint sribede, forøvrigt som foreg. 8—9. ☉.

Oprindelig fra Siberien, funden forvildet i stor Mængde ved Nebbegaard pr. Hørsholm (15)!

37. *Rhamnus*. *Vrietorn*.

336. *R. catharticus* L. (Tvebo-V.) H. 269; Drej. n. 260; F. D. 850; H. N. II, 36.

Grenene modsatte, ende ofte i en Vedtorn; *Bladene* ægformede, ovale eller elliptiske, fint saugtakkede, med 3 Sidennerver paa hver Side af Midtnerven; *Blomsterne* tvebo; 4 *Støvdragere*, *Arret* firekløvet.

Bladene modsatte (paa de forkortede Grene knippestillede), ofte duunhaarede, Kronen grøn, hos ♂ bruun hindeagtig; ♀ Blomsten har 4 golde Støvdragere. 5—6. ♀.

I fugtige Kratskove ikke sjelden.

337. *R. Frangula* L. (Tvekjønnet V., Tørstetræ). H. 270; Drej. n. 261; F. D. 278.

Grenene tornløse, ligesom Bladene spredte; *Bladene* ovale eller ægformet-elliptiske, budte med en kort Spids, heelrandede, med flere Nerver paa hver Side af Midtnerven; *Blomsterne* tvekjønnede; 5 *Støvdragere*; *Arret* udeelt.

Kronen hvidagtig. 6. ♀.

I Skove og Krat, især paa fugtig, tørvholdig Grund, alm.

38. Ribes. Ribs.

a. *Grossularia* DC. Bladene støttede af enkelte eller 2—3-grenede Barktorne. Blomsterstilkene 1—3-blomstrede.

338. **R. Grossularia** L. (Stikkelsbær). H. 275; Drej. n. 271; R. *Uva crispa* F. D. 546.

Tornene enkelte eller tregrenede; *Bægeret* klokkeformet, med ovale, skident røde Flige; *Kronbladene* omvendt-ægformede, rødlig-bleggrønne.

Bladene mindre end hos de følgende Arter; Bladstilkene randhaarede af grenede, i Spidsen kirtelbærende Haar. Bærrerne hos den vilde Plante lysgrønne eller gule, sjeldnere røde. (Foruden de Bladene støttende Torne findes undertiden flere eller færre og større eller mindre Torne langs opad Grenene). 5. h.

α , *pubescens* (R. *Uva crispa* L.) Frugtknuden svagt haaret, den modne Frugt glat.

β , *glandulosum* (R. *Grossularia* L.) Frugtknuden og den modne Frugt beklædt med Kirtelhaar.

I Kratskove og ved Gjærder alm. Forskjellige Former dyrkes i Haver paa Grund af de velsmagende Frugter.

b. *Ribesia* DC. Stængelen tornløs. Blomsterne i Klaser.

aa. *Klaserne* hængende. *Dækbladene* kortere end *Blomsterstilkene*. ♂.

339. **R. nigrum** L. (Solbær). H. 275, Drej. n. 274; F. D. 556.

Bladene 3—5-lappede, paa Underfladen kirtlet-punkterede; *Dækbladene* sylformede; *Bægeret* duunhaaret med ovale Flige; *Kronbladene* ovale eller omvendt-ægformede.

Har en temmelig stærk og ikke ubehagelig Lugt. Blomsterne grønne, indvendig violette, Bær sorte (af krydret Smag). 5—6. h.

I fugtige Skove, ved Bredderne af Bække og Aaer, sporadisk og ikke meget alm., hyppigst i det nordøstlige Sjæll. Dyrkes alm. i Haver.

340. **R. rubrum** L. (Ribs). H. 272; Drej. n. 273; F. D. 967; H. N. IV, 57 (var.).

Bladene 3—5-lappede, paa Underfladen duunhaarede eller tilsidst glatte; *Dækbladene* ægformede; *Bægeret* glat, dets Flige tilligemed *Kronbladene* spadeformede.

Blomsterne grønne, Bær røde (syrlige), sjeldnere hvide (β , *leuco-carpon!*). 5—6. $\frac{1}{2}$.

Paa lignende Steder som den foreg., men mere alm. udbredt. β , ved Rugtved i Vendsyssel (12). Dyrkes alm. i Haver under forskellige Former i Henseende til Bærrenes Størrelse og Farve.

bb. Klaserne oprette, Dækbladene længere end Blomsterstilkene.

Tvebo.

341. **R. alpinum** L. (Fjeld-R.) H. 274; Drej. n. 272; F. D. 968; H. N. XIII, 56.

Bladene trefligede med dybt og dobbelt saugtakke Flige, paa Overfladen tiltrykt-haarede; *Klasestilkene* og de lancetformede *Dækblade* i Randen kirtelhaarede; *Bægeret* glat, med ægformede Flige; *Kronbladene* spadeformede.

♀ Klasen alm. faablomstret, med 5 golde Støvdragere, ♂ Klasen mangeblomstret, med golde Støvveie. Blomsterne grøngule, Bær røde (smagløse). 5—6. $\frac{1}{2}$.

I høitliggende Skove, sjelden: paa *Moens* Klint i Mængde! *Falst.* i Krat ved S. Alslev (Koch), *Bornh.* (H), ved Blykobbeaaen i Knudsker Sogn (Baagøe); forekommer desuden paa enkelte Steder i Kratskove (muligviis forvildet fra Haver, hvor den stundom dyrkes), f. Ex. *Sj.* Tryggerød Skov! *F.* paa flere Steder i det sydlige (19); *J.* Randers, Veile (7); *Sl.* Haderslev, Munkbraup i Angel (16).

39. Hedera. Vedbende.

342. **H. Helix** L. (Almindelig V.) H. 277; Drej. n. 275; F. D. 1027; H. N. XIII, 39.

Stængelen tæt besat med Hæfterødder og derved klattrende; *Bladene* haandnervede, 3—5-fligede eller lappede, paa de blomsterbærende Grene ægformet-elliptiske, tilspidsede, heelrandede; *Blomsterne* i Skjærm; *Blomsterstilke* og *Bæger* duunhaarede.

Bladene læderagtige, mørkgrønne med hvide Aarer, glindsende. Blomsterne grønne, Bær sorte (9—10. Frugten modnes i det paafølgende Foraar). $\frac{1}{2}$.

I Skove og ved Gjærder ikke sjelden, især hyppig i det østlige *Sl.* samt paa *Lolland-Falster* og *Bornholm*. Kun de ældre, op til Mure eller Træer i asthæftede Individer frembringe Blomster. De paa Skovbunden krybende Expl. blomstre ikke.

40. *Glaux*. Sandkryb.

343. *G. maritima* L. (Almindelig S.) H. 279; Drej. n. 227; F. D. 548; Rehb. ic. fl. germ. XVII, tab. 1127; L. Herb. VIII, 160.

Bladene modsatte, ovale eller elliptiske, heelrandede, glatte; *Blomsterne* siddende i Bladhjørnerne, med rosenrøde Kroner.

2—6" høi. Den afblomstrede Stængel udskyder ved Grunden traadformede, i Sandet krybende Udløbere, der ved hvert Led have 4 traadformede (Arbeids-) Rødder. Paa Udløberne findes en eller flere Vinterknopper, der hver er forsynet med 4 mægtige, tapformede (Amme-) Rødder (Meddeelt af Doc. Didrichsen). 6—7. ♀.

Ved Strandbredder, saavel paa Havstokken som paa Syltenge, alm. udbredt.

41. *Illecebrum*. Bruskbæger.

344. *I. verticillatum* L. (Krandsblomstret B.) H. 278; F. D. 335; H. N. XII, 60.

Stænglerne fremliggende; *Bladene* modsatte, omvendt ægformet-kredsrunde, heelrandede; *Blomsterne* krandsstillede, siddende i Bladhjørnerne (hvide). 7—8. ○.

Paa sandige Veie og Overdrev, tørvholdig Bund, kun bemærket i de sydlige Egne af Landet: *Sl.* sporadisk, f. Ex. mellem Ø. Vedsted og Lystrup ved Ribe (6), Løgumkloster (28), Wanderup ved Flensborg! Ø. Orsted, Bilskov og Lyrskov mellem Flensborg og Slesvig, Rendsborg (16), mellem Horup og Læk (20), Lund ved Husum! *Falst.* ved Nykjøbing (H.). ☞.

42. *Thesium*. Naalebæger.

345. *T. ebracteatum* [Hayne i Schrad. journ. 1800, I, p. 33] (Hørbladet N.) Drej. n. 277; Rehb. ic. fl. germ. XI, 1168; H. N. XI, 56; *T. pratense* H. 279; F. D. 1205.

Stængelen fra en vandret, grenet Rodstok opstigende eller opret; *Bladene* linieformede, spredte; *Blomsterne* i Klase; *Blomsterstilkene* enblomstrede med et enkelt *Dækblad* under Blomsten, de øverste tomme *Dækblade* danne en Bladdusk; *Blomster-*

dækket tragtformet, ved dets smalere Basis tilleddet til Blomsterstilken og det vedblivende Dækblad, dets Flige under Blomstringen aabne, efter samme med indbøiet Spidse; et bruskagtigt Korn ved Grunden af hvert Indsnit.

Rodtrævlerne forsynede med smaae vorteformede Udvæxter, ved hvilke den nærer sig som Snylteplante paa andre Planters Rødder. 6—7. 4.

β , *subbracteatum* J. Vahl i Fr. S. Veg. Sc. p. 52; T. pratense Drej. n. 278. 2—3 Dækblade under Blomsten.

Paa græsklædte Bakker, sjelden og hidtil kun bemærket i *Sjælland*: Brede Bakker! Jonstrup Vang (14)! Ballerup Mark ved Hareskoven (H.), Jægerspris (9, 14)! β , paa Brede Bakker med Hovedarten (27). [2]

II. Digynia.

43. Herniaria. Bridurt.

346. **H. glabra** L. (Almindelig B.) H. 281; Drej. n. 275 (bis); F. D. 529.

Stænglerne fremliggende; *Bladene* elliptiske eller ovale, med hindeagtige *Axelblade*, de nedre modsatte, de øvre, ligesom Grenene, afvejlende; *Blomsterne* smaae, danne tætte Nøgler i Bladhjørnerne; *Blomsterdækket* (hos Hovedarten) glat.

Stænglerne ofte rodslaaende, beklædte med meget korte, nedadrettede Haar; *Bladene* glatte; *Blomsterne* grønne. 6—9. 4.

β , *subciliata* (Babington man. p. 121). *Bladene* fint randhaarede, *Blomsterdækket* udvendigt haaret.

Paa tørre, især sandige Marker og Bakker, alm. udbredt. β , *Sj.* ved Bredderne af Tjustруп Sø! *Falst.* ved Bregninge (14); Søby paa *Ærø* (10)!

? 347. **H. hirsuta** L. (Stivhaaret B.) H. 282; Drej. n. 276.

Stænglerne fremliggende, tæt duunhaarede af udstaaende Haar; *Bladene* omvendt-ægformede, tilligemed *Blomsterdækket* stivhaarede, forøvrigt som foreg. 7—9. 4.

Paa tørre Marker, angives af H. som funden paa Hastrup Mark ved Præstø (Badstüber), men muligviis beroer denne Angivelse paa en Forveksling med Afarten af foreg. [2]

44. Beta. Bede.

348. **B. maritima** L. (Strand-B.) H. 292; Drej. n. 297; F. D. 1571; H. N. XIII, 67.

Stænglerne flere, fremliggende; *Rodbladene* ægformet-rudeformede, nedløbende i Bladstilken, i Randen bølgede, *Stængelbladene* lancetformede; *Blomsterne* i Ax, dannede af tæt samlede og forneden sammenvoxne, 2—3-blomstrede Nøgler, der ere kortere end *Dækbladene*; *Arrene* lancetformede. 7—8. 4.

Ved Strandbredder, sporadisk og temmelig sjelden: **J.** paa Vestkanten (Beck), Tyvholm og Græsholm ved Frederikshavn (Dr.), Aarhus! **F.** Langø ved Hindsholm! **Sj.** Reersø (Dr.), Korsør! Vresen mellem Nyborg og Langeland, **Frø** ved Ourehoved (H.), Halen ved Marstal (Bredsdorff). ☞

† *B. vulgaris* L. (Rødbede). Enstænglet, *Stængelen* opret; *Rodbladene* budt ægformet-hjerteformede; *Stængelbladene* ægformet-rudeformede; *Blomsterstanden* som foreg., *Arrene* ægformede. ☉ eller ☉.

α , *Cicla* (B. *Cicla* L.) Roden cylindrisk eller omvendt-kegleformet, Bladstilkene tykke.

β , *rapacea* Koch (Runkelroe). Roden kjødfuld, roeformet (rød, gul eller hvid).

Dyrkes alm. i Haver (α) og i Marker (β).

45. Chenopodium. Gaasefod.

a. Frøene glandsløse.

349. **C. hybridum** L. (Hjertebladet G.) H. 284; Drej. n. 292; F. D. 2049.

Stængelen opret; *Bladene* hjerteformede, bugtet-tandede eller lappede, med tilspidsede Tænder; *Blomsterstanden* en oventil bladløs Top, dannet af udspærrede, qvastblomstrede Grene; *Frøene* grubet-punkterede.

Bladene alm. uden Meel. 7—8. ☉.

Paa dyrket, løs Jord, f. Ex. omkring Byer, i Haver o. s. v. ikke sjelden, men sporadisk.

350. **C. urbicum** L. (Rank G.) H. 283; Drej. n. 291; F. D. 1148.

Stængelen rank opret; *Bladene* triangelformede, ved Grunden lidet nedløbende i Bladstilken, grovt tandede; *Blomsterstanden* en forlænget, oventil bladløs Dusk, sammensat af tiltrykte, ax-blomstrede Grene; *Frøene* meget fint punkterede; med budt Rand.

Bladene meledede. 7—9. ☉.

β , *intermedium* Koch (C. rhombifolium Mühlenb., Drej. n. 290). *Bladene* bugtet-tandede, med tilspidsede Tænder.

Ved Gårder, omkring Byer o. a. dyrkede Steder, sporadisk, men forekommer i alle Provindser. β , paa Ryddepladser, sjældnere. Exemplarer fra Helsingør (11), efter hvilke Beskrivelsen hos Drej. er af-tatt, forekomme mig tvivlsomme og synes snarere at henhøre til Blitum rubrum ifølge dens Habitus og de glindsende Frøe.

351. **C. murale** L. (Muur-G.) H. 284; Drej. n. 289; F. D. 2048; H. N. XV, 59.

Stængelen opstigende; *Bladene* ægformet-rudeformede, grovt og skarpt tandet-saugtakkede, med tilspidsede Tænder; *Blomsterstanden* en Top, sammensat af udspærrede, qvastblomstrede Grene med Blade til Spidsen; *Frøene* ophøiet punkterede, med skarp-kjølet Rand.

Bladene meledede. 7—9. ☉.

Ved Mure og omkring Byer, ikke almindelig: *Sj.* Lyngby Kirkegaard! udenfor Nørre Port! Dragør paa Amager! Herløv, Jyllinge o. fl. St. i Nordsjælland (19), Roeskilde (15), Sorø! Havrebjerg ved Slagelse (12), Korsør! i Omegnen af Skjelskør alm. (Nielsen); *F.* Hofmansgave (18)! Svendborg! *Sl.* Gelting, Husum (16), *Loll.* ikke sjelden (19)! *Falst.* Nykjøbing! o. fl. St. (14), *Bornh.* Rønne! *

b. *Frøene* glindsende.

aa. *De ældre Blade* bugtet-tandede eller lappede.

352. **C. album** L. (Hvidmelet G.) H. 285; Drej. n. 286.

Stængelen opret; *Bladene* ægformet-rudeformede, bugtet-tandede, de øvre elliptiske, næsten heelrandede; *Blomsterstanden* en Top, sammensat af ax- eller qvastblomstrede, oventil bladløse Grene; *Frøene* jævne.

6—9. ☉. Var. betydeligt i Henseen e til Bladformen, Blomsterstanden o. s. v.

α , *album*. Bladene stærkt meledede; Blomsterne i Ax.

β , *viride* (C. *viride* L., Drej. n. 275; F. D. 1150). Bladene lidet meledede, svagt tandede eller næsten heelrandede; Blomsterne i Qvast.

γ , *glomerulosum* Hartm. (C. *opulifolium* Drej. n. 288). Bladene tyndere, rundagtigt-ægformede, skarptandede, næsten trelappede; Blomsterstanden en Top med forlængede Grene og smaae, spredte Nøgler.

Omkring Byer, paa Gjødningspladser, i Haver o. a. dyrkede Steder, meget alm. (α og β); γ , sjeldnere.

Anm. Om den ægte C. *opulifolium* Schrad. (H. N. XIV, 62) forekommer i Danmark, er mig ikke bekjendt. Den under dette Navn af Drej. beskrevne er neppe andet end en Form af foreg.

353. C. *ficifolium* [Sm. Fl. brit. I, 276] (Figenbladet G.) Drej. n. 287.

Stængelen opret; Bladene fra en kileformet Basis spydformet-trelappede, den midterste Lap forlænget, budt, bugtet-tandet, de øvre Blade linie-lancetformede, næsten heelrandede; Blomsterstanden som foreg., med qvastblomstrede Grene; Frøene fiint grubet-punkterede, mindre end hos foreg. 7—9. ☉.

Paa lignende Steder som foreg., sjelden: Dæmningen ved St. Jørgens Sø og Kastellet ved Kjøbenhavn!

† Ch. *Botrys* L. (Egebladet G.) N. E. Fl. germ. IV, 56.

Stængelen opret; Bladene ovale eller omvendt-ægformede, budte eller udrandede, fjerlappede, med paa Underfladen stærkt fremstaaende Nerver; Blomsterstanden en forlænget, indtil Spidsen bladbærende Top, sammensat af qvastformede Grene fra Bladhjørnerne; Frøene jævne, lindseformet-fladtrykte, mindre end hos de foreg.

Hele Planten beklædt med korte, kirtelbærende Haar eller siddende Kirtler, af stærk aromatisk, ikke ubehagelig Lugt. 7—8. ☉.

Forvildet omkring Haver o. a. dyrkede Steder: Sj. Snedinge Mølle (Nielsen); F. Østrupgaard N. for Odense, hvor den i flere Aar har voxet i Mængde (Møller)!

bb. Alle Bladene heelrandede.

354. **C. polyspermum** L. (Tætfrøet G.) H. 287; Drej. n. 283; F. D. 1153.

Stængelen opret eller fremliggende, med udspærrede Grene fra Grunden af; *Bladene* elliptisk-ægformede eller ovale, budte eller spidse; *Blomsterne* nøgleformigt samlede i tæt- eller fjerntblomstrede, qvastformede Grene fra Bladhjørnerne; *Blomsterdækket* ved Frugtens Modenhed aabent; *Frøene* punkterede.

Bladene uden Meel. 7—9. ☉.

β, acutifolium (Sm.) Bladene spidse, Grenene tætblomstrede, næsten axformede.

Omkring Byer og andre fugtige Steder, især paa fugtig Grund: i de fleste Egne af Danmark ikke sjelden, hyppigst i det sydøstlige Jylland, Fyen og paa Øerne. **β**, med Hovedarten.

355. **C. Vulvaria** L. (Stinkende G.) H. 286; Drej. n. 284; F. D. 1152; **C. olidum** Curt.

Stængelen nedliggende eller opret, med vandret udstaaende Grene fra Grunden af; *Bladene* ægformet-rudeformede, budte; *Blomsterne* nøgleformigt samlede i tætblomstrede Grene fra de øvre Bladhjørner; *Blomsterdækket* ved Frugtens Modenhed lukket; *Frøene* fiint punkterede.

Har en stærk og meget ubehagelig Lugt. Hele Planten graaagtig af et melet Overtræk. Frøene større og mere løst omsluttede af Frøgjæmmet end foreg. 7—9. ☉.

Paa dyrkede Steder, ved Møddinger og Ryddepladser, sjelden: **Sj.** Charlottenlund, Nørreport og Salpeterværket udenfor Østerport (H.), Jagtveien (17), Amager ved Götchens Batteri! **F.** Ryslinge (H.); **Bornh.** Nexø (11).

46. Blitum. Andefod.

a. *Blomsterdækket* ved Frugtmodningen kjødfuldt, farvet (hvorved Nøglerne faae Lighed med Bær).

1 Støvdrager.

X 356. **B. capitatum** L. (Jordbærspinat). H. 8; Drej. p. 104.

Bladene spydformede, tandede; *Blomsterne* i rundagtige

Nøgler, samlede i et oventil bladløst Ax; *Blomsterdækket* ved Modenheden purpurrødt. 6—8. ☉.

Forvildet omkring Haver og dyrkede Steder, f. Ex. *Sj.* Bagsværd (H.), Valdbby (Dr.); *J.* Randers (7). Har maaskee tidligere været hyppigere, da den angives som alm. af Kylling. [2]

† *B. virgatum* L. (Axelblomstret A.) Drej. p. 104; H. N. VIII, 52.

Bladene spydformede, dybt tandede; *Blomsterne* i rundagtige Nøgler med Dækblade indtil Spidsen af Stængelen; *Blomsterdækket* ved Modenheden høirødt. 6—8. ☉.

Som foreg. forvildet, f. Ex. Gram i Slesvig (1); Næsby paa Falster (Benzon).

b. *Blomsterdækket* kortere end den modne Frugt, tørt (grønt eller farvet). 5 Støvdragere*).

aa. *Arrene korte*. ☉.

357. **B. rubrum** [Rchb. fl. exc. p. 582] (Rød A.) Drej. n. 294; *Chenopodium* L., H. 282; F. 1149.

Stængelen opret; *Bladene* triangelformet-rudeformede eller spydformede, bugtet-tandede, de øvre lancetformede, spidse, ofte heelrandede; *Blomsterstanden* Ax eller Dusk (med Dækblade til Spidsen), sammensat af aflange, tætblomstrede Nøgler; *Frøene* smaae, glindsende, budtkjølede i Randen.

Var. meget i Henseende til Bladenes Form og Indskjæringer. Har alm. en rød Farve, især paa Stængelen. 7—9.

Paa dyrkede Steder og ved Strandbredder (især i stærkt leret eller gjødet Jordbund), alm. udbredt.

358. **B. botryoides** [Drej. fl. exc. p. 295 (undt. Voxest.))] (Drueblomstret A.) *Chenopodium* Sm., E. B. 2247; Nolt. nov. p. 24; *Chenopod. rubrum* ♂, *glomeratum* og *ε*, *crassifolium* Moq. (DC. prodr. XIII, 2, p. 84).

*) Denne Afdeling hører hos L. og flere nyere Forff. til *Chenopodium*, fra hvilken Slægt den dog synes naturligt adskilt, skjøndt den vanskeligt kan sondres ved kunstige Kjendetegn. Med Fries og Koch har jeg beholdt den Meyerske Slægtsbegrænsning.

Stængelen opret eller opstigende, med lange, udspærrede Grene nedadtil; *Bladene* spydformet-triangelformede, budte, heelrandede eller med faae, korte Tænder; *Blomsterne* i en oventil bladløs Dusk, sammensat af forlængede, fjernblomstrede Nøgler; Frøene som hos foreg., men næsten dobbelt saa store. 8—9.

Ved Strandbredder i Dynd, udtørrede Marskgrøfter: *Falst.* ved Gjedsergaard (14); *Loll.* Nakskov; Vresen i Storebælt (19); *F.* Langø ved Hindsholm! Øxemose ved Hofmangave (27)! *Lyø*, Avernakø (12)! *Ærø* (N.); Brandsø og Aarø i Lille Belt (28, 7)! *Føhr* (N.).

Anm. Exemplarerne fra de angivne Voxesteder, efter hvilke Beskrivelsen er affattet, afvige ved de anførte Kjendetegn og især ved Blomsterstanden altfor meget fra foreg. til at kunne være en Afart af denne, saaledes som flere Forff., og deriblandt Moquin-Tandon (l. c.) antage. Angives ogsaa fra Flaskekroen (Drej.), men de Expl., som jeg har seet derfra, synes at tilhøre en mindre Form af *B. rubrum*.

359. **B. glaucum** [Koch D. Fl. Suppl.] (Rundbugtet A.) Drej. n. 296; *Chenopodium* L., H. 286; F. D. 1151.

Stængelen opret eller nedliggende, med udspilede Grene; *Bladene* elliptiske eller lancetformede, fjernt og dybt rundbugtet-tandede, paa Underfladen blaagraae; *Blomsterne* i sammensatte, foroven bladløse Ax, dannede af korte, rundagtige, tætblomstrede Nøgler; Frøene jævne, glindsende (dobbelte saa store som hos de 2 foreg.), deels vandrette, deels lodrette. 7—9.

Ved Randen af Damme o. a. fugtige Steder, især omkring Landsbyer, alm. udbredt, sjældnere ved Strandbredderne.

bb. Arrene forlængede. 4.

360. **B. Bonus Henricus** [C. A. Mey. i Ledeb. fl. alt. I, p. 11] (Stolt Henrik). Drej. n. 293; *Chenopodium* L., H. 282; F. D. 579.

Stængelen opret; *Bladene* spydformede, heelrandede; *Blomsterne* i et sammensat, oventil bladløst Ax, dannet af tætsiddende og tætblomstrede, aflange Nøgler; Frøene jævne, glindsende.

Hele Planten, især i ung Tilstand, beklædt med Meel. 5—7.

Ved Gjærder og omkring Byer meget almindelig.

47. Chenopodina. Strandgaasefod.

361. *C. maritima* [Moq.-Tand. i DC. prodr. XIII, 2, 161]. *Chenopodium* L., H. 287; F. D. 489; *Schoberia* C. A. Mey., Drej. n. 281; H. N. IV, 50; *Suæda* Dumort.

Stængelen opret eller opstigende, fra Grunden af grenet; *Bladene* spredte, halvt-valseformede, kjødfulde; *Blomsterne* i rundagtige, faablomstrede Nøgler i Bladhjørnerne fra Grunden af Stængelen og Grenene; *Frøene* glindsende.

α , *vulgaris* Moq. Stængelen udstrakt eller opstigende, fra Grunden af grenet, Frøene større.

β , *erecta* Moq. Stængelen opret, nedentil oftest ugrenet; Frøene mindre.

$\frac{1}{2}$ —1' høi, blaagraa (især α), ofte rødligt anløben (især β). 7—9. ☉. De 2 Former, som begge forekomme i vor Flora, afvige fra hinanden i Udseende, ogsaa i dyrket Tilstand, og maa nærmere undersøges, da de muligviis ere 2 adskilte Arter.

Ved Strandbredderne, i leret Marskbund alm.

48. Kochia. Tangurt.

362. *K. hirsuta* [Nolte nov. fl. hols. p. 24] (Laaden T.) Drej. n. 282; H. N. IV, 49; *Salsola* L., H. 293; F. D. 187; *Echinopsilon* Moq.

Stængelen opstigende, fra Grunden af grenet; *Bladene* spredte, linieformede, budte, kjødfulde, haarede; *Blomsterne* parviis i Bladhjørnerne; *Blomsterdækkets* Tilhængsler kegleformede; *Frøene* glandsløse. 7—9. ☉.

Ved Strandbredderne paa Marskenge, i raaden Tang o. s. v., sjældnere end foreg. Sj. ved Lammefjorden alm.! Skjelskør (H.); F. mellem Nyborg og Holkenhavn (H.); *Halvøen*: Ydre Bjerrum ved Ribe (6), Romø, Amrom, Beenshallig (N.), Føhr (20), Skovbøl ved Husum (16), Aarø, Femern, Ærø (N.), Drejø (12), *Langelands* Østkyst (19); *Loll.* ved Bredfjed! *Falst.* ved Bøtø (5), Vaalse Nor (14)! ☞

49. Salsola. Sodaurt.

363. *S. Kali* L. (Tornet S.) H. 292; Drej. n. 280; F. D. 818.

Stængelen med udspærrede Grene fra Grunden af; *Bladene* naaleformede, tornspidsede, kjødfulde (de nedre modsatte); *Blomsterne* enlige i Bladhjørnerne; *Blomsterdækket* under Blomstringen hindeagtigt, ved Frugtmodningen bruskagtigt med tilspidsede Flige og afrundede *Tilhængsler*.

Var. glat eller korthaaret. 7—8. ☉.

Ved sandige Strandbredder hist og her.

50. *Ulmus*. Ælm.

364. *U. montana* [Sm. Fl. brit. I, p. 281] (Storbladet Æ., Ypern). Fr. mant. 3, 19; F. D. 632 (*U. campestris*) og 2532; Rehb. ic. fl. germ. XII, tab. 1332; H. N. XII, 63; *U. campestris* H. 294; Drej. n. 279.

Bladene ægformet-elliptiske eller omvendt-ægformede, tilspidsede, ved Grunden skjæve, grovt og dobbelt saugtakke, rue; *Blomsterne* næsten siddende, i et Hoved eller meget forkortet Halvskjærm; *Støvdragere* 5—6; *Vingefrugterne* glatte, ovale, i Spidsen svagt udrandede, Indskjæringen fortsættes i en Griffelkanal af Frøets Længde.

Bladenes Tænder alm. grovere og i Spidsen mere indbøiede end hos de følgende Arter. Blomsterne hyppigst rødlige. 4. (6 fr.) $\frac{1}{2}$.

Et hyppigt Træ i Plantager og omkring Byer, mindre alm. vildvoxende i Skove, f. Ex. *Bornh.* alm. paa Østkysten (i Granit-Terrainet); *Sj.* Boserup Skov (20), Borreveile (H.), Kulaas Skov i Ods herred! *Falst.* hist og her (Koch); *Loll.* temmelig alm. i Skovene (19); *F.* Keirup (H.) og fl. St. i det sydlige (12).

† 365. *U. campestris* [Sm. Fl. brit. I, p. 281] (Smaalbladet Æ.) Fr. mant. 3, 18; F. D. 2531; Rehb. l. c. tab. 1331.

Bladene ægformet-elliptiske, tilspidsede, ved Grunden skjæve, dobbelt-saugtakke, rue eller næsten jævne; *Blomsterstanden* som hos foreg.; *Støvdragere* 4—5; *Vingefrugterne* glatte, omvendt-hjerlteformet-kredsrunde, dybt indskaarne; med Frøet umiddelbart under Indskjæringen.

Grenene spædere, Bladknopperne og Bladene mindre end hos foreg., Griflerne alm. mere udspærrede. Blomsterne brunnagtigt-grønne. $\frac{4}{2}$ — $\frac{5}{1}$. (6 fr.) $\frac{1}{2}$.

I Plantager omkring beboede Steder, hist og her, men sjældnere end foreg. og neppe oprindelig vildvoxende, f. Ex. flere Steder omkring Kjøbenhavn!

* 366. **U. suberosa** [Ehrh. Beitr. VI, p. 87] (Kork-Æ.) Schum. p. 84; Rafn 258; Rchb. l. c. tab. 1333; *U. campestris* β, *suberosa* Fr. mant. 3, p. 18, H. N. IV, 80.

Barken paa Grenene korkagtig, vingeformigt udstaaende; *Bladene* meget mindre; *Blomsterdækket* alm. firedeelt, 4 Støvdragere, forøvrigt som foreg.

Ved Gjærder og omkring beboede Steder, sjældnere end de foreg., f. Ex. *Sj. Kaningaarden* ved Fuursøen (Schum.), *Glacierne* mellem Øster- og Nørre-Port, Kjøbenhavns Vold lige for Nørregade, Tivoli, gamle Kongevei (19), Bülow'sveien mellem Ladegaarden og Falkoneeralleen! *Basnæs Skov* (Nielsen); *Sl. Dybbøl* (12).

Anm. Mange Forfattere ansee denne Art for en Form af *U. campestris*, men da den har et meget forskjelligt og eiendommeligt Udseende og da desuden, efter hvad Hartig (forstl. Culturpfl. p. 458) har gjort opmærksom paa, dens Ved er forskjelligt fra de 2 foregaaende Arters, har jeg troet at maatte opføre den som en egen Art. Det af ham fremhævede Kjendemerke, at Axelbladenes Ar foroven ere omgivne af en Række Haar, har jeg dog ikke kunnet finde bekræftet paa de af mig undersøgte Exemplarer.

† 367. **U. effusa** [Willd. prodr. fl. berol. n. 296] (Skjærmblomstret Æ.) Drej. p. 100; Rchb. l. c. tab. 1337; H. N. IV, 81; *U. pedunculata* Foug.

Bladene som hos foreg., men duunhaarede paa Underfladen og jævne (ikke rue); *Blomsterne* stilkede (i Skjærm); *Støvdragerne* 6—8; *Vingefrugterne* randhaarede, elliptiske, dybt indskaarne; Frøet umiddelbart under Indskjæringen.

Foruden de angivne Kjendetegn adskilles den fra de foreg. ved endnu mere skjæve Blade og mindre Frugter. 4—5 (fr. 6). I_2 .

Forekommer hist og her omkring Byer og Gaarde (oprindelig indført), f. Ex. *Sj. Helsingør* (21)! mellem Lundehuset og Bernstorff! *Vesterbro* (10), *Alleen S. for Bidstrupgaard* (14)! *Loll. Borgø* i Maribo Sø (Kherre Wichfeld); *Bornh. Rabekkegaard* i Knudsker Sogn (Hjorth); *Sl. Hollingsted* i Angel (Hansen), *Husum* (F. Müll.). *

51. Vincetoxicum. Svalerod.

368. **V. officinale** [Moench method. 717] (Hvidblomstret S.) Rchb. l. c. XVII, tab. 1067; *Asclepias Vincetoxicum* L., H. 280; F. D. 849; *Cynanchum* R. Br.; Drej. n. 306.

Stængelen opret; *Bladene* modsatte, æg-hjerteformede, tilspidsede; *Blomsterne* i Qvaster fra Bladhjørnerne, *Blomsterstilkene* kortere end *Bladene*; *Kronens* Flige ægformede; *Bikronen* femlappet med budte Lapper.

Indeholder Mælkesaft. Kronen hvid med lysgul Bikrone. 6—7. ☉.

I høitliggende Kratskove, paa Brinker: paa *Bornh.* og i det nordlige og nordøstlige *Sjæll.* hist og her, sparsommere mod S., f. Ex. Kjøge, Prambroen i Stevns Herred (9), Færø (H.); i de øvrige Provindser sjelden: *F.* Romsø ved Hofmansgave, Nyberg (H.), Holkenhavn (Lund); *J.* Buderupholm (H.). 1*

52. *Cuscuta*. Hørsilke.

a. *Epilinelia* Pfeiffer. Bægeret næsten til Grunden femdeelt, Arrene kølleformede.

369. *C. Epilinum* [Whe. Arch. der Apoth. Verein 8. p. 51] (Ager-H.) H. II, 131; Drej. n. 176; F. D. 1987; H. N. XII, 29; *C. densiflora* Soy. Will., Rchb. l. c. XVIII, tab. 1342, fig. 3.

Stængelen enkelt eller svagt grenet; *Kronrøret* kugleformet, dobbelt saa langt som Kraven, omtrent af Længde med Bægerfligene; *Bikronens* Skjæl oprette; tiltrykte til *Kronrøret*, med nedentil afrundede Mellemrum; *Kapselen* forneden torummet.

Stængelen og Blomsterne bleggule, Hovederne med færre, men større Blomster end følg. 7—8. ☉.

Snyltende Ukrud i Hørren, hist og her paa *Øerne*, men ikke alm. og hidtil ikke bemærket i stor Mængde. Paa *Halvøen* sjelden: Hatting ved Horsens (16); Rosgaarde (12) og Løitmark i Angel (16).

b. *Cuscuta* Pfeiff. Bægeret 4—5-lappet (eller -fliget). Arrene traadformede. Kapselen heelt torummet.

370. *C. europæa* L. (Gjærde-H.) H. 176; Drej. n. 177; F. D. 199; *C. major* DC.; Rchb. l. c. tab. 1342, fig. 4.

Stængelen grenet; *Kronrøret* valseformet, af Længde med Kraven, meget længere end Bægerfligene; *Bikronens* Skjæl oprette, tiltrykte til *Kronrøret*, tokløvede med nedentil afrundede Mellemrum.

Stængelen traadformet, tilligemed Bægeret rødligt anløben. Kronen blegguul. 6—7. ☉.

β , *nefrens* Fr. (C. Schkuhriana Pfeiff. i Bot. Zeit. 1846 p. 20?) Kronrøret uden Skjæl.

Snylteplante paa Urtica dioeca, Humulus, Salix og andre vedvarende og buskagtige Væxter ved Gjærder og i Kratskove, ikke sjelden, især hyppig i Sydsjælland, Fyen og paa Øerne.

Anm. Formen β , som efter Fries findes paa Vicia sativa, er maaskee en egen Art, som fortjener nøiere Undersøgelse. Da Pfeiffer (l. c.) citerer F. D. 199 til C. Schkuhriana, har jeg anført denne Form her, skjøndt det ikke er mig bekjendt at den er funden i Danmark, og Mangelen af Skjæl paa Fig. i F. D. muligviis kunde hidrøre fra en Unøiagtighed ved Tegningen. En nærstaaende Art, C. Ligustri F. W. Areschoug, som er funden i det vestlige Sverige, især paa Liguster, kunde muligviis findes ogsaa her i Landet.

371. C. Epithymum [Murr. i L. syst. veg. ed. 15 p. 173] (Lyng-H.) Drej. n. 175; H. 177; F. D. 427 (slet); Rchb. l. c. tab. 1343, fig. 3, 5, 6, H. N. XII, 31; C. minor DC.

Stængelen grenet; Bægerfligene kortere end Kronen; Kronrøret valseformet, af Længde med Kraven og med Bikronens Skjæl, som ere sammenstødende i Spidsen og tillukkende Svælget, fryndsede, med smale, spidse Mellemrum forneden; Støvknapperne fremragende.

Stænglerne haarfine, rødlig; Blomsterne mindre end hos foreg., Bægeret rødligt, Kronerne hvide. 7—8. ☉.

Snylteplante paa Calluna, Genista, Thymus, Helianthemum, ikke sjelden i Halvøens Hedeegne, især i den sydlige Deel, sjelden paa Øerne: Sj. Veirhøi i Odsherred! Tiisvilde, Ledreborg (H.), Sonnerup (Feddersen), Roeskilde (Rohde i Schlichtkrulls Herb.). ☞

372. C. Trifolii [Babingt. man. 2 ed. p. 216] (Kløver-H.) E. B. Suppl. 2898; C. Epithymum β , Trifolii Choisy, Rchb. l. c. tab. 1343, fig. 4.

Hovederne større og mere tætblomstrede, Bikronskjællene smale, halvt saa lange som Kronrøret, med afrundede Mellemrum forneden; Bægerfligene af Kronrørets Længde, forøvrigt som foreg., men hele Planten af blegere Farve. 7—8. ☉.

Snylteplante paa Græsmarker og især paa Kløver, i hvilken den danner rundagtige Pletter, er først iagttaget her i Landet for omtrent 20 Aar siden, men har siden den Tid udbredt sig stærkt og er bemærket i alle Provindser, paa enkelte Steder et besværligt Ukrud i Kløvermarkerne. ☞

53. Hydrocotyle. Vandnavle.

373. *H. vulgaris* L. (Almindelig V.). H. 304; Drej. n. 339; F. D. 90; Rchb. l. c. XXI, tab. 1842.

Stængelen krybende; *Bladene* skjoldformede, kredsrunder, rundtakket-lappede, længere end Blomsterstilkene; *Skjærmen* hovedformet, 4—6-blomstret, ofte flere Skjærme paa samme Skaft, krandsformigt fjernede fra hinanden; *Frugterne* udrandede i Spidsen og ved Grunden.

Bladstilkene nærvæd Pladen langhaarede, Planten forøvrigt næsten glat. Bladene var. i Størrelse; Blomsterne meget smaae, kortstilkede eller næsten siddende. 7—9. 4.

I Tørvmoser, ved Søbredder og paa fugtige Enge, ikke sjelden i Danmark.

54. Eryngium. Mandstro.

374. *E. maritimum* L. (Strand-M.) H. 302; Drej. n. 341; F. D. 875; Rchb. l. c. XXI, tab. 1849; H. N. XIV, 23.

Bladene haandlappede med tornet-tandede Lapper, *de nedre* nyreformede, stilkede, *de øvre* omfattende; *Svøbbladene* bredt kileformede, 3—5-tornet-lappede, lidet længere end det rundagtigt-ægformede Hoved, de enkelte *Blomster* omgivne af tornet-fligede *Dækblade*.

Hele Planten glat, blaagraa, Svøbbladene violet anløbne, Blomsterne blaae. 7. 4.

Ved sandige Strandbredder (paa Havstokken), forekommer i alle Provindser, i Jyll. hyppigere paa Øst- end Vestkysten.

375. *E. campestre* L. (Bjerg-M.) H. 304; F. D. 554; Rchb. l. c. XXI, tab. 1852.

Bladene dobbelt- eller tredobbelt fjersnitdeelte, med tornet-tandede Afsnit; *Rodbladene* stilkede; *Stængelbladene* med en øreformet, tornet Skede omfattende; *Svøbbladene* linie-lancetformede, tornspidsede, meget længere end det rundagtige Hoved; *Dækbladene* ved Blomsterne udeelte; *Bageret* længere end Kronen.

Hele Planten glat, graagrøn, Blomsterne skident-hvide. 7—8. 4.

Sandige Bakker, meget sjelden: *J.* i Vendsyssel og ved Viborg (Rafn), ikke funden i de senere Aar. 4

55. *Sanicula*. **Sanikel.**

376. *S. europæa* L. (Skov-S.) H. 305; Drej. n. 340; F. D. 283; Rchb. l. c. XXI, tab. 1847.

Bladene haandsnitdeelte med saugtakkede, i Spidsen tre-lappede Afsnit; *Skjærmen* dobbelt sammensat, med uligelange *Straaler*; *Smaaskjærmene* danne et rundagtigt Hoved.

1' høi. Kronen rødlig-hvid. 6—7. 4.

I Skove almindelig, sjeldnere i det nordl. Jyll. (efter H.).

Astrantia. *Stjerneskjærm*.

† *A. major* L. (Stor S.) Rchb. l. c. XXI, tab. 1843.

Rodstokken beklædt med trævlede Rester af visne Blad-skeder; *Bladene*, især de nedre, langstilkede, dybt haandfligede med grovt og dobbelt saugtakkede, i Spidsen uregelmæssig 2—3-deelte Flige; een endestillet Skjærm og modsatte sidestillede Grene (som ende med en Skjærm og ofte have modsatte Side-skjærme); *Svøbbladene* talrige, under Blomstringen stjerneformigt udbredte, lancetformede; *Bægerfligene* braadspidsede, længere end Kronbladene.

1—1½' høi, glat. Svøbbladene nætformigt aarede, hvide eller rødlige med grøn Spidse; Blomsterne og Frugternes Skjæl hvide. De sidestillede Skjærme ofte ufrugtbare. 6—8. 4.

Dyrkes i Haver og forekommer hist og her forvildet, f. Ex. *Sj. Dronninggaard*, Humletofte (9)! *Aldershvile* (19), *Krattet ved Lunde-huset!* *Møen* v. *Liselund* (14).

56. *Bupleurum*. **Hareøre.**

377. *B. tenuissimum* L. (Smalbladet H.) H. 306; Drej. n. 323; F. D. 1090; Rchb. l. c. tab. 1891, fig. 2; H. N. I, 27.

Stængelen grenet fra Grunden af, med opstigende eller nedliggende Grene; *Bladene* linie-lancetformede, tilspidsede, heelrandede; de endestillede *Skjærme* alm. trestraalede, de side-stillede ufuldstændige; *Smaaskjærmene* 3—5 blomstrede; *Blomsterne* siddende, kortere end de sylformede *Svøbblade*; *Frugten* kornet-ru.

Stænglerne traadformede, 2—8" lange. Kronbladene gule. 7—8. 4.

Paa Syltenge og Strandfælleder sporadisk og ikke alm., men bemærket i alle danske Provindser; sjeldnere i det Indre af Landet, f. Ex. *F.* ved Skjoldemose (12). ³⁴

378. **B. rotundifolium** L. (Rundbladet H.) H. 306; F. D. 2408; Rechb. l. c. tab. 1880, fig. 2.

Stængelen opret, oventil grenet; *de øvre Blade* ægformede, gennemvoxne af Stængelen, *de nedre ovale*, omfattende; *Skjærmene* mangestraalet; *Storsvøb* 0; *Smaasvøbets* Blade ægformede, braadspidsede; efter Blomstringen sammensluttende omkring Frugterne; *Frugten* med ophøiede Striber mellem Ribberne.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronbladene gule. 6—7. ☉.

Ukrud i Haver paa *Æro* (10); ligesaa i Haver og Marker ved Christianshavn (Visby)! Angives desuden som Ukrud mellem Sæden fra *Meen* (Kyll.); *Falst.* ved Korselitze (H.), men er ikke funden paa disse Steder i de senere Aar. ³⁵

57. *Helosciadium*. Skjærmille.

379. **H. inundatum** [Koch Umb. p. 126] (Svømmende S.) Drej. n. 324; H. N. I, 26; Sison L., H. 325; F. D. 89; *Apium* Rechb. l. c. XXI, tab. 1855, fig. 1.

De nedsænkede Blade dobbelt kamdeelte, med haarformede Flige, *de øvre* fjersnitdeelte med kileformede, 3—5-fligede Afsnit; *Skjærmene* modsatte Bladene, tostraaledede uden *Storsvøb*; *Smaasvøbet* faabladet.

Naar den voxer paa tør Grund er Stængelen heelt krybende og uden haardeelte Blade, i Vand bliver Stængelen forlænget, svømmende og alle Blade haardeelte (β , *fruitans* Fr. H. N. VIII, 18; Rechb. l. c. fig. 2). Kronbladene hvide. 6—8. 4.

I Tørvgreve, Hedemoser og ved Randen af Gadekær eller Søer: paa Øerne sporadisk, hyppigere paa *Halvøen* (især i den midterste og vestlige Deel og paa *Bornholm*. β , *Sj.* Hellebæk (Heiberg)! *Bornh.* Rønne (Hjorth); *J.* i Aar ved Thorsted pr. Ringkjøbing (2)! Tørvgreve ved Skodborg V. f. Kolding! ³⁶

380. **H. repens** [Koch l. c.] (Krybende S.) H. N. XIII, 42; *Sium* Jacq., H. 324; F. D. 1514; *Apium* Rechb. l. c. tab. 1855, fig. 2.

Stængelen krybende; *Bladene* fjersnitdeelte, med rudeformet-

ægformede, uregelmæssigt tandet-lappede Åfsnit; *Skjærmen* 4—7-straalet med 3—5-bladet *Storsvøb* og fleerbladet *Smaasvøb*.

Kronbladene hvide. 7—8. ☿.

I Sumpe og Tørvmoser, hidtil kun funden i *Fyen* ved Midskov paa Hindsholm (4)! ☿

58. *Apium. Selleri.*

381. *A. graveolens* L. (Have-S.) H. 341; Drej. n. 325; F. D. 790; Rehb. l. c. XXI, tab. 1854.

Bladene fjersnitdeelte, de øvre enkelt eller dobbelt haandsnitdeelte; *Afsnittene* rudeformede eller kileformede, i Spidsen tandet-lappede; *Skjærmen* kortstilket, dens *Straaler* 6—12 eller flere.

Bladene glatte, glindsende, mørkgrønne, Kronbladene hvide. Planten har en stærk Lugt, som i tørret Tilstand længe vedligeholder sig. 7—9. ☹.

Ved Strandbredder mellem Tang og i feed Marskbund, sporadisk og ikke alm., forekommer i alle danske Provindser, især i *Sydsjælland*, *Fyen* og paa *Øerne*. Dyrkes i Haver for Rodens og Bladenes Skyld.

Petroselinum. Persille.

† *P. sativum* [Hoffm. Umb. 177] (Have-P.) E. B. Suppl. tab. 2793; *P. hortense* Rehb. l. c. XXI, tab. 1856; *Apium Petroselinum* L.

Bladene 2—3-dobbelt fjersnitdeelte, *Afsnittene* smalt-lancetformede, (paa Rodbladene kileformede) hele eller fligede; *Skjærmen* mangestraalet; Kronbladene gulgrønne. 6—7. ☹.

Dyrkes alm. i Kjøkkenhaver.

59. *Ægopodium. Squalderkaal.*

382. *Æ. Podagraria* L. (Almindelig S.) H. 342; Drej. n. 326; F. D. 670; Rehb. l. c. XXI, tab. 1861.

Rodstokken med krybende Udløbere; *de nedre Blade* 2—3-dobbelt, *de øvre* enkelt haandsnitdeelte; *Hoved-* og *Smaa-afsnittene* 3, stilkede, de sidste ægformede med skjæv Basis, tilspidsede, saugtaktede; *Skjærmene* 12—20-straaledede, den midterste frugtbærende, de øvrige golde.

Kronbladene hvide. 6—7. 4.

β, subsimplex. Alle Bladene enkelt haandsnitdeelte, med æg-hjerteformede Afsnit.

I Skove og ved Gjærder, især i Haver et almindeligt og besværligt Ukrud. *β*, Fredensborg Slotshave!

60. Carum. Kommen.

383. *C. Carvi* L. (Almindelig K.) H. 337; Drej. n. 327; F. D. 1091; Bunium Carvi M. B., Rchb. l. c. XXI, tab. 1872.

Bladene dobbelt fjersnitdeelte, *Afsnittene* fligede eller snitdeelte med smalt linieformede Afsnit; *Storsvøbet* enbladet eller 0, *Smaasvøbene* 0.

Frugterne krydrede. Kronbladene hvide. Ved Grunden af Bladskederne findes i Regelen 2 haandsnitdeelte Ører med traadformet linieformede Afsnit. 5—6. ☺.

β, atrorubens! Krone og de øvre Bladskeder purpurrøde.

Paa Enge, Græsgange og ved Gjærder alm. Dyrkes som Handelsplante. *β*, ved Ladegaardsaaen udenfor Kjøbenhavn (5)! Ordrups Mose!

61. Pimpinella. Pimpinelle.

384. *P. magna* L. (Stor P.) H. 340; Drej. n. 328; F. D. 1155; Rchb. l. c. XXI, tab. 1868; H. N. II, 41.

Stængelen kantet, furet, fleerbladet; *Bladene* fjersnitdeelte; *Afsnittene* æg-hjerteformede, saugtakke eller fligede; *Grisflerne* længere end Frugtknuden og af Længde med den ovale *Frugt*.

1½—2' høi. Kronbladene hvide, var. (*β, rosea* Koch) med rosenrøde Kroner. 6—7. 4.

Paa Enge og i fugtige Kratskove: i det nordvestlige *Sjælland* ikke sjelden, mod S. ved Nestved (H); *Falst.* Gaabense! *Loll.* alm. (14); *F.* Bogense; *J.* Ebeltoft (H.); *Als* alm.! *Sl.* Høyer, Kappel, Klapskov ved Slesvig (16); *β*, med Hovedarten, f. Ex. Enge ved Leersøen! ☞

385. *P. Saxifraga* L. (Almindelig P.) H. 338; Drej. n. 329; F. D. 669; Rchb. l. c. tab. 1869.

Stængelen trind, stribet, med bladløse Skeder foroven; *Rodbladene* fjersnitdeelte, med ægformede, saugtakke eller

fligede Afsnit, *Stængelbladene* dobbelt fjersnitdeelte; *Griflerne* kortere end Frugtknuden og den ægformede Frugt.

$1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}'$ høi. Skjærmene før Udspringningen nikkende. Kronbladene hvide (var. ros. ligesom foreg.) 7—8. 4.

β , *dissectifolia* Wallr.; Rchb. l. c. fig. 4. Bladene fjersnitdeelte, med linieformede Afsnit.

Paa Grøftevolde, Græsmarker og Bakker, alm. udbredt. β , med Hovedarten.

Anm. *P. nigra* Willd. (H. 340) med tæt duunhaarede *Blade*, Grene og Blomsterstilke, *Roden* tyk, indeholdende en ved at udsættes for Luftens Paavirkning blaaagtig Saft, er angivet fra Inmingsted pr. Husum (F. Müll.) og med *Tvivl* fra Ærø (Bendtsen, 12). — Jeg har ikke seet danske Expl. af denne Art, men da den findes saavel i Skåne som i Holsteen, er det rimeligt at den ogsaa forekommer her, og den anbefales derfor til nøiere Eftersøgning.

62. Cicuta. Gifttyde.

386. *C. virosa* L. (Vand-G.) H. 328; Drej. n. 330; F. D. 208; Rchb. l. c. XXI, tab. 1853.

Rodstokken afdeelt ved Tværskillerum; *Rodtrævlerne* traadformede; *Bladene* 2—3-dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* linie-lancetformede, saugtakke; *Storsvøbet* 0 eller faabladet; *Smaasvøbladene* talrige, sylformede.

Stængelen tyk, huul, 2—4' høi. Kronbladene hvide. Giftig. 7—8. 4.

I Moser, ved Sø- og Aabredder ikke sjelden.

63. Falcaria. Seglblad.

387. *F. Rivini* [Host, fl. austr. I, 381] (Langfinnet S.) Rchb. l. c. XXI, tab. 1862; Sium *Falcaria* L., H. 324; F. D. 1749; H. N. II, 40; Critamus *Falcaria* Rchb.

Bladene haandsnitdeelte, det midterste Afsnit tredeelt, *Sideafsnittene* 2—3-deelte, med langstrakt-linieformede, fiint og skarpt saugtakke Afsnit, nedløbende i den vingede *Smaabladstilk*; *Stor-* og *Smaasvøb* flerbladete.

Kronbladene hvide. 7—8. 4.

Paa Marker mellem Sæden, sjelden: *Sj.* Skove mellem Jonstrup og Roeskilde (14)! *Loll.* mellem Vesterborg og Vedby, Rubjergmark

ved Juellinge (19)! *Bornh.* en Eng mellem Vallensgaards Mose og Almindingen (Baagøe)! (Angives af H. fra Færgegaarden ved Femern-Sund, muligviis i Holsteen og ikke paa den slesvigske Ø Femern). ☞

64. *Sium*. Mærke.

388. *S. latifolium* L. (Bredbladet M.) H. 322; Drej. n. 331; F. D. 246; Rehb. l. c. XXI, tab. 1877.

Rodstokken krybende; *de nedre Blade* langstilkede, 2—3-dobbelt fjersnitdeelte; *Smaaafsnittene* linieformede, *de øvre Blade* stilkløse, enkelt fjersnitdeelte med lancetformede, skarpt og lige-
ligt saugtakke Afsnit; *Stor- og Smaasvøbene* fleerbladede, med lancetformede, hele Blade; *Frugtens* Sideribber randstillede; *Oliekanalerne* tydelige udenpaa Frøjemmet.

3—5' høi. Bladstilkene paa de nedsænkede Blade leddede. Kronbladene hvide. 7—8. 4.

Ved Bredderne af Søer, Aaer og Kjær, alm. udbredt.

389. *S. angustifolium* L. (Smalbladet M.) H. 322; H. N. I, 25; Berula Koch, Drej. n. 332; Rehb. l. c. tab. 1878; *Sium nodiflorum* F. D. 247 (ikke L.).

Rodstokken krybende; *Bladene* fjersnitdeelte; *Afsnittene* ægformet-elliptiske, dybt og uregelmæssigt saugtakke (ved Grunden ofte fligede); *Skjærmene* kortstilkede, modsatte Blade; *Svøbene* fleerbladede, med lancetformede, i Storsvøbet alm. indskaarne Blade; *Frugten* med svage Ribber, Sideribberne indenfor Randen; *Oliekanalerne* ikke tydelige udenpaa Frøjemmet.

1—3' høi. Kronbladene hvide. 7—8. 4.

Ved Grøfter, Bække og Kilder alm. udbredt. ☞

65. *Oenanthe*. Klaseskjærm.

a. Roden dannet af knippe stillede, kjødfulde Trævler; Frugten bredest oventil.

390. *Oe. fistulosa* L. (Vand-K.) H. 325; Drej. n. 335; F. D. 846; Rehb. l. c. tab. 1898; H. N. II, 39.

Rodtrævlerne kølleformet-aflange eller traadformede; *Rod-*

stokken med Udløbere; *Rodbladene* 2—3-dobbelt fjersnitdeelte; *Stængelbladene* enkelt fjersnitdeelte med linieformede, budte Afsnit, Udløbernes Blade dobbelt fjersnitdeelte med omvendt-ægformede, 2—3-lappede Afsnit; *Bladstilken* opblæst huul, længere end Pladen; den først udviklede *Skjærm* 2—3-straalet med frugtbare Blomster, (Smaaskjærmene i Frugttilstanden kugleformede), de senere 4—10-straaledede med ufrugtbare Blomster; *Frugten* kantet, omvendt-kegleformet, kortere end de vedblivende *Grifler*.

Planten af en blaagrøn Farve. Kronbladene rødlig-hvide. 7—8. 4.

I og ved Randen af Aaer, Grøfter og Kjær, alm. udbredt. *

391. **Oe. Lachenalii** [Gmel. fl. bad. I, p. 678] (Eng-K.) Drej. n. 336; Rchb. l. c. tab. 1892; H. N. XV, 25; Oe. pimpinelloides Sm., H. 325; F. D. 1454 (ikke L.)

Rodtrævlerne forlænget-kølleformede (og nogle traadformede); *Rodbladene* dobbelt fjersnitdeelte med aflange eller kileformede, budt 2—3-lappede Afsnit, *de nedre Stængelblade* 2—3-dobbelt, *de øvre* enkelt fjersnitdeelte, med smalt linieformede, spidse Afsnit; *Bladstilken* kortere end Pladen; *Skjærmene* 6—12-straaledede, de ydre Blomster i Smaaskjærmene langstilkede, ufrugtbare, de indre frugtbare, næsten siddende (Smaaskjærmene i Frugttilstanden halvkugleformede); *Frugten* omvendt-ægformet, længere end de vedblivende *Grifler*.

Rodbladene henvisne meget tidligt. Kronbladene rødlig-hvide. 7—8. 4.

Paa Enge, især i Nærheden af Stranden, sjelden: *Sj.* Tappernøie, Evenet ved Præstø, Gaunø, Kongebroen ved Korsør (H.); *Falst.* (Kyll.), Nøisomhed ved Nykjøbing (14)! *Thorseng* ved Stioul (9); *F.* Svendborg (11), Holkenhavn (Lund), Langø ved Hindsholm! *J.* Palsgaard (H.); *Sl.* Sverdrup ved Haderslev Fjord (Grønlund), Gjenner (28)! Aabenraa (N.), Bæverør ved Gelting (16), Husum (H.). *

b. Roden dannet af krandsstillede, traadformede Trævler. Frugten smalere oventil.

392. **Oe. Phellandrium** [Lam. fl. fr. 3, p. 432] (Billebo-K.) Drej. n. 337; Rchb. l. c. tab. 1896; Phellandrium aquaticum L., H. 327; F. D. 1154.

Rodstokken med Udløbere; *Stængelen* grenet; *Grenene* ud-

spærrede; *Bladene* 2—3-dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* udspilede, omvendt-ægformede eller elliptiske, dybt fligede, med lancetformede Flige, de nedsænkede Blade med haarformede Afsnit; *Skjærmen* mangestraalet; alle *Blomsterne* i Smaaskjærmene stilkede; *Frugten* ægformet-elliptisk.

2—3' høi. Giftig. Kronbladene hvide. 7—8. ☉ eller 4.

I Søer, Damme og Tørvgrave alm. udbredt.

Anm. 1. Blade, samlede i Varde Aa (30)! synes at tilhøre *Oe. fluviatilis* Colem. (Bab. man. brit. bot. ed. 3 p. 140, E. Bot. Suppl. 2944), som udmærker sig ved de under Vandet nedsænkede Blade, hvis Afsnit ere meget forlængede, parallele, linieformede eller linie-kileformede, hvorimod Bladene ovenfor Vandet have bredere Afsnit end *Oe. Phellandrium*, af hvilken den dog muligviis kun er en Afart. Maa yderligere eftersøges i rindende Vand.

Anm. 2. At eftersøge *Oe. conioides* (Phellandrium conioides Nolt. i Hagens Herb. N. 215), hvis nøiere Beskrivelse af Forf. (Index sem. hort. Kilon.?) er mig ubekjendt. Den ligner i Udseende endeel *Conium maculatum* og synes især forskjellig fra foreg. ved større Blade med bredere og grovere Flige, samt ved dobbelt saa store, lancetformede Frugter. Den er funden i Holsteen (Nolt.) og findes muligviis ogsaa i det egenlige Danmark. (Frugter af Expl. fra Øllerup i Fyen (12), synes at høre herhen).

66. Libanotis. Hjorterod.

393. *L. montana* [All. fl. ped. 2, p. 30] (Laaden H.) H. N. XII, 45; *L. vulgaris* DC., Drej. n. 338; *Athamanta Libanotis* L., H. 314; F. D. 754.

Stængelen kantet, furet; *Bladene* dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* halvfinnede med elliptiske, braadspidsede Flige; det nedre Par Afsnit tiltrykte til Bladstilken; *Stor-* og *Smaasvøb* fleerbladede.

Hele Planten, især Frugter og Blomsterstilke, duunhaarede; Rodhalsen beklædt med de trævleformede Rester af henvisnede Bladskeder. 1—3' høi. Kronbladene hvide eller rødlig. 7—8. 4.

Paa Strandskrænter, sandige Bakker, sjelden og sporadisk: *Sj.* Jægersborg, Valdbygaard (H.), Korsør (14)! Reersø (Dr.), Seierø (Baagøe), Nexelø, Odsherred mellem Overby og Ebbelykke (H.), Refsnæs (15); nordl. *Samsø* (Jacobsen); *F.* Fyenshoved (H.)! *Sl.* Gram (16), Svanskilde (H.); *Loll.* Gottesgabe (19), Kramnitze Odde ved Rødby Fjord!

67. Haloscias. Lostilk.

394. *H. scoticum* [Fr. S. Veg. Sc. p. 180] (Skotsk L.) H. N. XI, 28; *Ligusticum* L., H. 319; F. D. 207.

Bladene dobbelt trekoblede; *Afsnittene* rudeformet-elliptiske, foroven grovt og uregelmæssigt saugtakke (Sideafsnittene skjæve); *Stor-* og *Smaasvøbbladene* 5—7, uligestore, tiltrykte.

Stængelen sribet, nedentil rødlig, 1—2' høi, hele Planten glat, Bladene glindsende. Kronbladene hvide. 7. 4.

Ved Strandbredder meget sjelden: J. Tyvholm og Græsholm ved Frederikshavn (Dr.), Løkken (H.), Ørum Klit i Thy (Andresen)! *Loll.* ved Rødby (F. D.)? 2

68. *Æthusa*. Halvsvøb.

395. *Æ. Cynapium* L. (Vild Persille). H. 329; Drej. n. 334; F. D. 1991; Rchb. l. c. tab. 1901.

Bladene 2—3-dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* halvfinnede med lancetformede Flige; *Storsvøbet* 0, *Smaasvøbbladene* alm. 3, linieformede, nedhængende, ensidige, længere end *Smaaskjærmene*; *Bugfladens Oliekanaler* foroven sammenstødende, nedentil (ovenfor Basis) bueformigt nærmede til hinanden (ikke sammenløbende).

Giftig. 1—2' høi. Bladene glatte, mørkgrønne, af en svag, men ubehagelig Lugt. Kronbladene hvide. 6—9. ☉.

β, *pygmæa* Koch (*Æ. segetalis* Boenn.) 2—6" høi; de nedre Blade trekoblede, med budte Flige, *Smaasvøbene* korte, Blomsterstilkene lidet længere end Frugten.

Almindeligt Ukrud i Haver, β, mellem Sæden.

69. *Cnidium*. Brændeskjærm.

396. *C. venosum* [Koch Umb. 199] (Fiinbladet B.) Drej. n. 333; H. N. IV, 30; *Selinum lineare* Schum. p. 95; H. 314; F. D. 1330; *Selinum silvestre* L. sp.

Stængelen trind, sribet; *Bladene* dobbelt fjersnitdeelte, med forlængede *Bladskeder* (ingen Bladstilk paa Stængelbladene); *Afsnittene* linieformede, spidse, med ophøiet Midtnerve paa Underfladen; *Svøbbladene* børsteformede, *Smaasvøbet* af *Smaaskjærmens* Længde.

1—2' høi. Kronbladene hvide. 7—9. 4.

Paa høie Enge, ved Gjærder, mellem Krat, meget sjelden; *Sjæll.*

Sundbyvester (19) og Kongelunden paa Amager! Vesterfælle og Flaskekroen! Lille Værløse Overdrev (Mort.); *F.* Strandbredder ved Svendborg (H.); *J.* Bjørum Skov (Beck). ¹³

70. Peucedanum. Svovlrød.

397. *P. palustre* [Moench meth. 82] (Kjær-S.) Drej. n. 317; *Selinum* L., H. 312; *F. D.* 257 og 412 (*S. silvestre*); *Thysselinum* Hoffm., Koch. Syn. II, 336.

Stængelen furet; *Bladene* 2—3-dobbelt fjersnitdeelte; *Smaaafsnittene* hele eller dybt deelte, med linie-lancetformede, braadspidsede Flige; *Stor-* og *Smaasvøbbladene* talrige, lancetformede, nedbøiede; i Randen hindeagtige; *Skjærmens Straaler* eensidigt duunhaaret rue; *Oliekanalerne* paa Bugfladen ikke synlige udenpaa Frøgjemmet.

3—5" høi. Bladenes Flige og især Svøbbladene i Randen rue, forøvrigt glat. Kronbladene hvide. 7—8. 4.

I Tørvmoser, paa fugtige Enge, mellem Krat, alm. udbredt.

398. *P. Oreoselinum* [Moench meth. 82] (Udspilet S.) H. N. II, 38; *Athamanta* L., H. 315; *F. D.* 1750.

Stængelen trind, sribet; *Bladene* tredobbelt fjersnitdeelte, med langstilkede, stivt udspilede eller næsten tilbagebøiede Afsnit; *Smaaafsnittene* elliptiske, indskaaret-tandede; *Stor-* og *Smaasvøbene* mangebladede, med linieformede, nedbøiede Blade; *Oliekanalerne* paa Bugfladen synlige udenpaa Frøgjemmet.

1—3' høi. Kronbladene hvide. 7—8. 4.

Paa Bakker, høie Enge: i det egenlige Danmark kun funden paa *Bornh.*: Duebjerggaard i Almindingen (8)! Kleven (Feddersen), Almegaard nær Rønne (20)! Splitsgaard (14) o. fl. St. i det nordvestlige Bornh. (Baagøe). (I Holsteen, Nolte.) ¹⁴

71. Imperatoria. Storskjærm.

X 399. *I. Ostruthium* L. (Mesterrod). H. 335; H. N. V, 13; *Peucedanum* Koch.

Stængelen trind, sribet; *Bladene* trekoblede; *Afsnittene* dybt todeelte, med ægformede eller elliptiske, skarpt og dobbelt saugtakkede Afsnit; *Bladskederne* store; *Storsvøb* 0; *Smaasvøb-*

bladene børsteformede, hurtigt affaldende; *Frugterne* kreds-runde.

2—4' høi, glat, med store, mangestralede Skjærme.

Angives af Kylling fra *Bornholm*, hvor den endnu dyrkes i Bønderhaver (20), og muligviis aldrig har været vildvoxende.

72. *Heracleum*. Bjørneklo.

400. *H. Sphondylium* L. (Almindelig B.) H. 317; Drej. n. 319; F. D. 2406 (*H. sibiricum* * *australe* Hartm.).

Stængelen furet; *Bladene* enkelt eller dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* snitdeelte, halvfinnede eller lappede med uregelmæssigt tandet-saugtakke Lapper (eller Flige), *Smaaaskjærmene* flade, de ydre *Kroner* større; *Frugtknuden* duunhaaret; *Frugten* oval, svagt udrandet, tilsidst glat.

3—5' høi, stivhaaret-ru. Kronbladene hvide eller rødlige. 6—8. ☉.

Var. betydeligt i Henseende til Smaabladenes Form og Indskjæringer. Den meest afvigende Form er:

β, *elegans* Koch. *Bladene* dobbelt fjersnitdeelte, med forlænget-lancetformede, langt tilspidsede Afsnit.

Paa Enge, ved Gjærder og i Udkanten af Skove, meget alm. β, sjeldnere, f. Ex. *Sj.* ved Sorø! Bakkerne ved Ørholm og Brede (H.), *Bornh.* ved Helligdommen i Rø Sogn (19).

* 401. *H. sibiricum* L. (Sibirisk B.) Fr. mant. 2, 16; H. N. IV, 29; Drej. i Krø. Tidsskr. III, 414.

Smaaaskjærmene hvælvede; *Kronerne* omtrent ligestore, grøngule; *Frugtknuderne* og de rundagtigt-ovale, dybt udrandede *Frugter* glatte, forøvrigt som foreg.

Var. ligesom foreg. i Henseende til *Bladene*. 6—8. ☉.

Paa lignende Steder som den foregaaende Art. Jeg har ofte fundet Former, som svare til Beskrivelsen hos Fr., men hyppigere saadanne, der syntes at danne en Overgang til *H. Sphondylium*. (Saa udmærket som den forekommer i den nordsvenske Flora har jeg aldrig seet den hos os. Dens Fordeling og bestemte Begrænsning fra foreg. bør nærmere iagttages). *

73. *Pastinaca*. Pastinak.

402. *P. sativa* L. (Almindelig P.) H. 335; Drej. n. 318; F. D. 1206; L. Herb. VI, 120.

Stængelen kantet, furet; *Bladene* fjersnitdeelte, de nedre ofte dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* æg-lancetformede; grovt saugtakket-lappede, glindsende, glatte eller paa Underfladen svagt duunhaarede; *Svøb* 0; *Frugterne* kredsround-ovale.

2—3' høi. Roden (i det første Aar) spiselig. Kronbladene gule. 7—8. ☉.

β, silvestris. Bladene paa begge Flader duunhaarede.

Ved Veie, omkring Byer, paa høie Enge o. s. v. alm. udbredt i *Sjæll.* (især omkring Kjøbenhavn) og paa *Møen*; i mange Egne sparsom, synes f. Ex. at mangle paa Bornholm, og ofte kun forvildet, da den dyrkes i Haver. *β*, med Hovedarten, f. Ex. ved Pesthuset udenfor Kjøbenhavn!

74. Anethum. Dild.

† 403. *A. graveolens* L. (Have-D.) H. 336; F. D. 1572.

Stængelen trind, stribet; *Bladene* dobbelt fjersnitdeelte, med linieformet-traadformede *Afsnit*; *Svøb* 0.

1—3' høi, glat, blaagrøn. Kronbladene gule. Har en stærk krydret Lugt. 7—8. ☉.

Dyrkes i Haver og forekommer derfra hist og her forvildet.

75. Levisticum. Løvestikke.

† 404. *L. officinale* [Koch Umb. p. 101] (Almindelig L.) Drej. p. 114; *Ligusticum Levisticum* L., H. 318; Hayne Arnz. I, 82 c. tab.

Stængelen trind, stribet; *Bladene* dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* kileformet-rudeformede, i Spidsen tandet-lappede; *Svøbbladene* lancetformede; *Blomsterstilkene* meget korte.

4—5' høi; *Stængelen* blaadugget, *Bladene* glindsende, *Kronbladene* gule. Har en stærk og gennemtrængende Lugt, omtrent som *Selleri*. 7—8. ☿.

Dyrkes hist og her i Bønderhaver og forekommer forvildet, f. Ex. *Sj.* i Hammermølleskoven ved Helsingør! *F.* Lykkesholms Skov; *J. V.* Haldne i Vadum Sogn (Vendsyssel)! ved Nørre Tranders (H.); *Bornh.* Allinge (Hjorth). ☿

76. Selinum. Seline.

405. *S. Carvifolia* L. (Kommenbladet S.) H. 313; Drej. n. 322; F. D. 667.

Stængelen furet, vinget-kantet; *Bladene* 2—3-dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* indskaarne, med lancetformede, braadspidsede, i Randen rue Flige; *Bladskederne* korte; *Smaasvøb-bladene* traadformede.

2—3' høi. Kronbladene hvide. 7—8. 4.

I Tørv- og Hedemoser, paa høie Enge mellem Krat, ikke sjelden men sporadisk, hyppigere paa Halvøen end paa Øerne. [2]

77. Angelica. Angelik.

406. *A. silvestris* L. (Skov-A.) H. 321; Drej. n. 320; F. D. 1639.

Stængelen trind, stribet, foroven tilligemed *Skjærmens Straaler* fløielsagtigt duunhaaret; *Bladene* 2—3-dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* ægformet-elliptiske, fint og skarpt saugtakke; *Bladskederne* store, opblæste; *Storsvøbet* faabladet, affaldende; *Smaasvøb-bladene* flere, traadformede.

3—5' høi. Stængelen huul, tyk, blaadugget. Kronerne hvide eller rødlig. 7—8. 4.

I fugtige Skove og paa Enge mellem Krat, alm. udbredt.

78. Archangelica. Qvan.

407. *A. littoralis* [Fr. S. Veg. Sc. p. 181] (Vand-Q.) H. N. X, 23; Angelica Fr. fl. Hall. p. 51; Drej. n. 321; F. D. 2407; Angelica Archangelica α , L., H. 320 (tildeels, med Undtagelse af flere Synonymer og Voxestederne fra de nordlige Lande).

Stængelen trind, furet, glat; *Skjærmens Straaler* duunhaarede; *Bladene* 2—3-dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* skjævt-ægformede, grovt og skarpt-saugtakke, Endeafsnittet trefliget; *Bladskederne* store, opblæste; *Storsvøbet* mangebladet, med linieformede Blade; *Smaasvøb-bladene* flere, linieformede; *Smaaskjærmene* hvælvede efter Afblomstringen.

4—6' høi. Stængelen tyk, huul, rødlig, Bladene blaagrønne, Kronbladene bleggørnne. 7—8. 4.

Ved Bredderne af Bække og Aaer, som den ofte følger i lange

Strækninger: bemærket i alle Provindser; ogsaa, men sjældnere, ved Strandbredder: f. Ex. ved flere Fjorde paa Halvøens Østside (7). [*)]

Anm. *A. officinalis* Hoffm. (*Angelica Archangelica* β, L.) er ikke funden i Danmark.

79. *Laserpitium*. Foldfrø.

408. *L. latifolium* L. (Bredbladet F.) H. 316; Drej. n. 316; F. D. 1513.

Stængelen trind, stribet; *Bladene* 2—3-dobbelt fjersnit-deelte; *Afsnittene* hjerteformede, saugtakkede; den indadvendte Side af *Skjærmens Straaler* ru; *Storsvøbet* mangebladet, med lancet-sylformede Blade.

3—5' høi. Kronbladene hvide. 7—8. 4. Bladene paa Underfladen blaagrønne, alm. glatte, var.

β, *asperum* (Crantz). Bladstilke og Smaablade i Randen og paa Underfladen rue.

γ, *tenuisectum*, Bladenes Afsnit linie-lancetformede, heel-randede.

I Skove, meget sjelden og kun funden i *Sjæll.*: Slangerup, Jonstrup Vang, Hareskoven (H.), Ballerup, Kirkeværløse, ved Søndersøen S. for lille Værløse, Hestangs Mølle (14). γ, i Jonstrup Vang (14).

80. *Daucus*. Gulerod.

409. *D. Carota* L. (Almindelig G.) H. 308; Drej. n. 315; F. D. 723.

Stængelen furet, stivhaaret-ru; *Bladene* dobbelt fjersnit-deelte; *Afsnittene* mere eller mindre dybt halvfinnede, med lancet-formede, tilspidsede Flige; *Storsvøbets* Blade kamdeelte, sjældnere tredeelte, med linieformede Afsnit, ved Udspringningen omtrent af *Skjærmens Længde*; *Biribbernes* Torne af Længde med Frugtens Tværsnit.

1—2' høi. Roden hos den vilde Plante hvidagtig, hos den dyrkede brandguul, *Skjærmen* efter Ablomstringen huul (ved de ydre *Straalers Sammentrækning*), Kronbladene hvide eller rødlig, de midterste Blomster i *Skjærmen* ofte mørkrøde, golde. 7—8. ☉.

Ved Gjærder og paa Marker, alm., især meget hypig i *Fyen* og paa *Loll.-Falst.* Dyrkes i Haver formedelst dens spiselige Rod.

81. *Caucalis*. Fodangel.

410. *C. daucooides* L. (Faastraalet F.) H. 307; Drej. n. 307; F. D. 2346.

Stængelen kantet, furet; *Bladene* 2—3-dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* fjersnitdeelte eller halvfinnede, med linie-lancetformede, spidse Flige; *Storsvøbet* 0 eller enbladet; *Skjærmen* faa- (omtr. tre-)straalet; *Smaasvøbladene* 3—5, lancetformede, med hindeagtig Rand og randhaarede; *Smaaskjærmene* fleerblomstrede, men kun med 2—3 frugtbare Blomster; *Frugten* elliptisk, *Biribbernes* Pigge hagekrummede, af Længde med Frugtens Tværnsnit.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Bladene og Stængelens Led haarede; Kronbladene rødlig. 6—7. ☉.

Paa dyrkede Marker, mellem Sæden, meget sjelden: *Møen* ved Sømark (H.), Graaryg (9), Fruerstuefaldet (14)! *Sl.* i Egnen af Husum (Ferd. Müll.). ☞

82. *Torilis*. Randfrø.

411. *T. Anthriscus* [Gmel. fl. bad. I, p. 615] (Hvashaaret R.) Drej. n. 308; *Tordylium* L., F. D. 919; *Caucalis* H. 307.

Stængelen opret, ru, foroven furet; *Bladene* dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* elliptiske, halvfinnede eller saugtakke; *Skjærmene* langskafte; *Storsvøbet* fleerbladet med linieformede Blade; *Biribbernes* Pigge sylformede, spidse, bøiede (ikke hagekrummede).

1—3' høi. Kronbladene rødlig eller hvide. 6—7. ☉.

Ved Gjærder og Veie, i Krat o. s. v. alm. udbredt.

412. *T. nodosa* [Gärtn. fruct. I, p. 82] (Knudret R.) H. N. XII, 44; *Tordylium* L.; *Caucalis* Scop., H. 308; F. D. 1990.

Stængelen opstigende eller nedliggende, trind, stribet; *Bladene* dobbelt (de øvre enkelt) fjersnitdeelte; *Afsnittene* mere eller mindre dybt halvfinnede; *Skjærmene* kortskafte, modsatte Bladene, tætblomstrede (Blomsterne næsten siddende),

mod Frugtmodningen kugleformede; *Storsvøbet* fleerbladet, med linieformede Blade; *de ydre Frugter* beklædte med hagekrummede Pigge, *de indre* med rue Vorter.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi. Kronbladene hvide. 6—8. ☉.

Paa Diger og tørre Marker; i vor Flora kun funden paa Marskdigerne i det vestlige *Slesvig*: Dagebøl, Husum (H.!), Eidersted (N.). ☞

83. *Anthriscus*. Kørvel.

a. Frugterne beklædte med krogede Smaatorne.

413. *A. vulgaris* [Pers. Syn. I, 320] (Gjærde-K.) Drej. n. 311; *Scandix Anthriscus* L., H. 332; *Caucalis scandicina* Roth, F. D. 863.

Stængelen glat, trind, sribet; *Bladene* 2—3-dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* mere eller mindre dybt halvfinnede; *Bladskederne* randhaarede; *Bladstilke* og *Nerver*, især paa Underfladen, haarede; *Skjærmene* kortskafte, modsatte *Bladene*; *Smaasvøbet* 2—3-bladet, med lancet-sylformede, randhaarede Blade; *Næbet* $\frac{1}{3}$ af de ægformede Frugters Længde.

$\frac{1}{2}$ —2' høi. Kronbladene hvide. 5—6. ☉.

Ved Gjærder, især omkring Byer: i *Sjæll.*, paa *Bornh.* og de øvrige sydlige Øer ikke sjelden; sparsommere i *Fyen*; paa *Halvøen* sjelden: J. Aarhus (Aagaard), Braband (16), Horsens (13); *Sl.* Rødding, Husum (16), Owschlag, Nybel ved Rendsborg (20). ☞

b. Frugterne glatte.

† 414. *A. Cerefolium* [Hoffm. Umb. p. 41] (Have-K.) Drej. p. 111; *Scandix* L., H. 331; *Chærophyllum sativum* Gärtn., F. D. 1640; *Cerefolium sativum* Bess.

Stængelen trind, sribet, Ledstykkerne ved Grunden duunhaarede; *Bladene* tredobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* halvfinnede; *Bladskederne* randhaarede, *Bladstilke* og *Nerver* spredt-haarede; *Skjærmene* endestillede, paa kortere eller længere Skaft, eller sidestillede (modsatte *Bladene*), siddende; *Smaasvøbet* 2—3-bladet, med lancetformede, randhaarede Blade; *Næbet* $\frac{1}{3}$ af den linieformede *Frugts* Længde.

1—3' høi. Har en stærk og behagelig Lugt. Kronbladene hvide. 5—6. ☉.

Ved Gjærder og omkring Byer, oprindelig forvildet fra Haver, hvor den dyrkes.

415. **A. silvestris** [Hoffm. Umb. p. 40] (Vild K.) Drej. n. 310; Chærophyllum L., H. 333; F. D. 2050.

Stængelen furet, forneden haaret, foroven glat; *Bladene* 2—3-dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* mere eller mindre dybt halvfinnede, glatte eller paa Underfladen fjernt-haarede; *Skjærmene* endestillede, langskaftede, før Udspringningen nikkende; *Smaasvøbet* omtrent fembladet, med ægformede, tilspidsede, hule Blade; *Næbet* $\frac{1}{5}$ af den æg-lancetformede *Frugts* Længde.

2—3' høi. Bladskederne og Bladstilkene ved Grunden af Afsnittene haarede. Kronbladene hvide, udstraalende. 5—6. ☿.

Paa Enge, ved Gjærder og i Skove meget alm.

84. Scandix. Languæb.

416. **S. Pecten Veneris** L. (Kamformet L.) H. 331; Drej. n. 309; F. D. 844; H. N. IV, 28.

Bladene dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* haandsnitdeelte, med linieformede Afsnit; *Smaasvøbladene* randhaarede, hele eller i Spidsen 2—3-fligede; *Næbet* fladtrykt fra Ryggen, i Randen tilligemed Frugtens Ribber ru; *Griflerne* oprette.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronbladene hvide, udstraalende. Griffelfoden mørk-rød. 6—7. ☉.

Paa Marker mellem Sæden, sjelden i den nordlige Deel af Landet: J. Aalborg (Dr.); Sj. udfor Tuborg (26)! Vordingborg (Købke); alm. Ukrud paa *Møen*, *Falster*, *Lolland* (!) og *Femern* (H.). ☿

85. Chærophyllum. Huulsvøb.

417. **C. temulum** L. (Knudret H.) H. 334; Drej. n. 312; F. D. 918.

Stængelen trind, stribet, under Ledene opsvulmet, forneden stivhaaret ru, foroven haaret; *Bladene* haarede, dobbelt fjersnitdeelte; *Afsnittene* ægformede, halvfinnet-lappede med rundtakket-saugtaktede Lapper; *Skjærmene* endestillede, før Udspringningen

nikkende; *Smaasvøbet* 5—8-bladet med æg-lancetformede, tilspidsede, randhaarede Blade; *Ribberne* glatte.

1—2' høi. Stængelen nedentil rødplettet. Kronbladene hvide. 6—7. ☉.

Ved Gjærder og i Kratskove alm. udbredt.

86. Myrrhis. Sødskjærm.

418. *M. odorata* [Scop. fl. carn. p. 207] (Spansk Kørvel). Drej. n. 313; F. D. 1928; Scandix L., H. 330.

Stængelen trind, furet; *Bladene* haarede, 2—3-dobbelt fjersnitdeelte med æg-lancetformede, halvfinnede *Afsnit*; *Skjærmene* endestillede; *Smaasvøbladene* lancetformede, langt tilspidsede, haarede, nedhængende; *Grifterne* tilbagebøiede.

2—3' høi. Stærklugtende (omtr. som *Anthriscus Cerefolium*). Kronbladene hvide; den modne Frugt mørkbruun, glindsende ($\frac{1}{2}$ " lang). 5—6. 4.

Omkring Haver, Byer o. a. beboede Steder, sporadisk i alle Provindser, (formodenlig forvildet fra en tidligere Tids Havekultur, skjøndt den nu ikke længere dyrkes).

87. Conium. Skarntyde.

419. *C. maculatum* L. (Plettet S.) H. 311; Drej. n. 314; F. D. 2168.

Stængelen glat, trind, oventil furet; *Bladene* tredobbelt fjersnitdeelte, med lancetformede, halvfinnede *Afsnit*; *Storsvøbet* 6—7-bladet; *Smaasvøbet* 3—4-bladet, ensidigt, med æg-lancetformede, glatte Blade.

2—4' høi, glat, glindsende; Stængelen rødplettet. Giftig. Kronbladene hvide. 6—7. ☹.

Ved Gjærder og Veigrøfter, især omkring Byer o. a. dyrkede Steder, ikke sjelden: mindre hyppig i Kjøbenhavns Omegn end i de fleste andre Egne af Landet og ikke bemærket paa Bornholm (Hoff).

88. Coriandrum. Koriander.

† 420. *C. sativum* L. (Have-K.) H. II, 158; F. D. 1989.

Stængelen trind, sribet, glat; *Bladene* 2—3-dobbelt fjer-

snitdeelte; *Afsnittene* fjersnitdeelte eller halvfinnede, med linieformede Flige (Rodbladene ligesaa, men med bredere Flige); *Smaasvøbbladene* ensidige, linieformede.

1—2' høi. Kronbladene hvide eller rødlige, udstraalende. Frugterne krydrede. 6—7. ☉.

Dyrkes undertiden, dog sjældent, i Haver, og forekommer forvildet: *Sj.* Kjøbenhavn ved Farimagsgveien! Kjøge (9); *Ærø* (N.); *J.* Horsens (2); *Sl.* Aabenraa (H.). *

III. Trigynia.

89. Viburnum. Qvalkved.

421. *V. Opulus* L. (Sneebolletræ). H. 343; Drej. n. 342; F. D. 661; Rchb. ic. fl. germ. XVII, tab. 1171.

Bladene haandnervede, 3—5-lappede, med tilspidsede, tandede Lapper; *Bladstilken* foroven tokirtlet; 2—4 linieformede *Axelblade* ved Grunden af hvert Blad; *Blomsterne* i mangegrenet og mangeblomstret Qvast, Straaleblomsterne golde, med hjulformede *Kroner*; *Bærret* kugleformet; *Frøet* fladtrykt.

Kronerne hvide. Straaleblomsterne have ofte 5 røde Kirtler (feilslaaede Støvdragere) i Svælget. Bær røde. 6. ♀.

I fugtige Kratskove, ved Gjærder, alm. udbredt. (I Haver dyrkes en Afart *β*, *roseum* R. & S., med lutter golde Blomster og store hjulformede Kroner).

90. Sambucus. Hylde.

422. *S. nigra* L. (Almindelig H.) H. 345; Drej. n. 344; F. D. 545; Rchb. l. c. XII, tab. 730.

Bladene fjersnitdeelte med 2 Par elliptiske, saugtakkede Afsnit og et uparret Endeafsnit; *Axelbladene* linie-børsteformede (eller 0), *Qvasterne* samlede til en femgrenet Skjærm.

Bladene have en stærk, ubehagelig, Blomsterne en vammel-sødagtig Lugt. Kronerne hvide, Støvdragerne gule, Bær sorte. $\frac{6}{2}$ — $\frac{7}{1}$. ♀.

β, *laciniata* (Mill.). F. D. 2169; Bladene dobbelt fjersnitdeelte, med fligede Afsnit.

Ved Gjærder, i Kratskove og omkring Byer, meget alm. β , sjeldnere: *Sl.* Sommersted (16), Gram (1), Nisvraa i Angel (Jessen); *Æro* (H.); *F.* Naaleskov ved Veistrupgaard (19); *Sj.* Petersminde ved Kalundborg (Baagøe), Sundbyvester paa Amager (19).

† 423. *S. racemosa* L. (Klaseblomstret H.) *Rehb.* l. c. XII, tab. 731.

Bladene som foreg.; *Axelbladene* vorteformede; *Qvasterne* samlede til en ægformet Klase.

Blomsterne guulhvide, med tilbagebøjede Kronflige; Bær røde; Blomsterstilkene ved Frugtmodningen violette. 5. (Fr. 7). $\frac{1}{2}$.

Dyrkes hist og her i Plantager og forekommer derfra forvildet, f. Ex. *Sj.* Folehaveskov ved Rungsted! Ordrups Krat mellem Skovløberhuset og Ordrupsdal! Aldershvile (14), Brede, Ravnholm's Skov (Petersen), Dronninggaard, Søndermarken, Vesterfælled (19), Philosphgangen ved Sorø! *J.* Hjørring (Juel); *Sl.* Fattigcolonien ved Husum (16); *Loll.* Søholt (5); *Bornh.* ved Rømersdal! Echodalen (20). $\frac{1}{4}$

424. *S. Ebulus* L. (Sommer-H.) H. 344; *Drej.* n. 343; *F. D.* 1156; *Rehb.* l. c. XII, tab. 729; H. N. IV, 7.

Afsnittene lancetformede med afrundet Basis, saugtaktede, 3—4 Par og et uparret Endeafsnit; *Axelbladene* bladagtige, ægformede; *Qvasterne* samlede til en tregrenet Skjærm.

3—4' høi. Blomsterne rødlig-hvide (stærktlugtende); Støvdragerne mørkrøde; Bær sorte. 7—8. 4.

Ved Gjærder, sjelden: *Sj.* Jægerspriis (H.), Rolighed ved Sorø! *Falst.* ved Nykjøbing (H.); *Loll.* Kjettinge! Taars ved Saxkjøbing (5); *J.* Fredericia (H.); *Sl.* Christiansfeld (28), Sønderborg (16), Digerne i Marsken (H.). $\frac{1}{2}$

91. *Corrigiola*. Skorem.

425. *C. littoralis* L. (Sand-S.) H. 348; *F. D.* 334; H. N. XII, 59.

Fleerstænglet, med udstrakte, traadformede *Stængler*; *Bladene* omvendt-ægformet-linieformede, med hindeagtige *Axelblade*; *Blomsterne* stilkede, i Nøgler fra de øvre Bladhjørner; *Bægeret* vedblivende.

Kronerne smaae, hvide. 7—8. \odot .

Sandige Veie og Overdrev; mangler paa Øerne; *J.* sjelden: Rye (12); hyppigere i *Sl.*, f. Ex. Bommerlund, Bilskov ved Flensborg, Schuby ved Slesvig (16), Sønderbrarup (Frøhl.), Rendsborg! $\frac{1}{2}$

92. Drosera. Soldug.

426. **D. rotundifolia** L. (Rundbladet S.) H. 354; Drej. n. 352; F. D. 1028; Rchb. ic. fl. germ. III, fig. 4522.

Bladene *) næsten kredsrunde (Breden større end Længden), *Bladstilkene* haarede; *Skaftet* opret, omtrent 3 Gange længere end *Bladene*; *Dækbladene* linieformet-traadformede; *Frøene* omgivne af en hindeagtig, linieformet Frøhud.

2—6" høi. Kronblade og Støvdragere hvide, Arrenes Flige hvide, kølleformede, alm. udeelte. 7. ♀.

β, *bracteata* (Lyngby). *Blomsterne* i en gaffeldeelt Qvast; *Dækbladene* omvendt-ægformede, kirtelhaarede.

I Tørv- og Hedemoser mellem Sphagnum, alm. udbredt. β, i Mængde paa Hals ved Hofmangave (Lgb.)!

427. **D. longifolia** L. (Langbladet S.) H. 355; Drej. n. 353; F. D. 1093; Rchb. l. c. fig. 4524; H. N. V, 30; *D. anglica* Huds.

Bladene linieformet-tungeformede, budte, med glat *Bladstilk*; *Skaftet* opret, omtrent dobbelt saa langt som *Bladene*; *Dækbladene* linieformet-sylformede, af Længde med *Blomsterstilkene*, hurtigt affaldende; *Frøene* som foreg.

3—8" høi, Kronerne hvide, Støvtraadene hvide med gule Støvknapper, Arrets Flige kølleformede, hele eller udrandede, hvide med røde Spidser.

β, *obovata* Koch (*D. obovata* M. & K., Rchb. l. c. fig. 4525). *Bladene* omvendt-ægformede.

I Hængedynd og Moser mellem Sphagnum, sporadisk og mindre hyppig end foreg. *Sj.* Adserbo Overdrev! Juul Sø i Rudehegn (13), Birkerød, Lyngby, Raavaddam! Ordrup (H), Kongsted Mose (13); *Loll.* Musse (Rasmussen), Nysted (5); *F.* Langeskov Kro (16), Hals ved Hofmangave (4); *J.* Gravens Mose i V. Hanherred (16), Klitter i Thy (Andresen)! Ferslev ved Aalborg (Branth), Stockholm Mose og Hasselholt V. for Skive (16), Ranum ved Løgstør (8)! Viborg (Morville), Maabjerg ved Holstebro, Hjerting (16); *Sl.* Huusby i Angel, Tolkwade Sø ved Slesvig (16). β, med Hovedarten, sjældnere: *Sj.* Lyngby Mose (14)! *J.* Ferslev ved Aalborg (Branth).

*) *Bladene* hos alle Arter i denne Slægt ere rosetformigt samlede ved Grunden, *Skaftet* bladløst.

428. **D. intermedia**. [Hayne i Schrad. Journ. 1801, p. 37] (Liden S.) H. II, 160; Drej. n. 352 b; F. D. 2108; Rehb. l. c. fig. 4523; H. N. V, 32.

Bladene omvendt-ægformede, budte, med glat Bladstilk; *Skafte* opstigende, af Længde med eller lidet længere end Bladene; *Dækbladene* sylformede, vedblivende; *Frøene* trinde, ovale, kirtlet-vortede, uden Frøhud.

1—3" høi. Kronerne hvide; Støvtraadene gule; Arrets Flige ud-randede eller tokløvede, rødlig. 7—8. 4.

Hedemoser og Klitsumpe, sandige Overdrev: paa *Halvøen*, især den midterste og vestlige Deel, ikke sjelden; **F.** Rødskebølle (12); **Sj.** Rørvig (Feddersen), Grevinge (Weilbach), Adserbo Overdrev! Søborg (Lgb.), Gurre (1).

IV. Tetragnia.

93. Parnassia. Leverurt.

429. **P. palustris** L. (Hvid L.) H. 349; Drej. n. 345; F. D. 584.

Stængelen med eet Blad nedenfor Midten og een ende-stillet Blomst; *Bladene* hjerteformede, *Rodbladene* stilkede, *Stængelbladet* siddende og omfattende; *Bikronbladene* med 9—13 kirtlede Frydser.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Bladene glatte, med rødgyule Punkter; Kronerne hvide med gjennemsigtige Aarer; Bikronbladene gualgrønne. 8—9. 4.

Fugtige Enge, især paa tørvholdig Grund, ikke sjelden, dog mindre hyppig paa Bornholm og Lolland-Falster!

V. Pentagnia.

94. Statice. Hindebæger.

430. **S. Behen** [Drej. fl. exc. n. 350] (Tætblomstret H.) F. D. 2409; Rehb. ic. fl. germ. XVII, tab. 1140; H. N. X, 21; **S.** Limonium L. (tildeels), Koch Syn. I, 684.

Bladene omvendt-ægformet-elliptiske, braadspidsede, med tydelige Sidenerver paa begge Flader; *Axene* halvskjærmformigt samlede, efter Blomstringen tilbagebøiede, *Smaagrenene* korte, med tætsiddende, taglagte Blomster; *Dækbladene* tilspidsede, de nedre paa *Smaagrenene* tomme.

Bladene paa Underfladen sort-punkterede. Dækbladene (i Randen) og Bægeret hvid-hindeagtige. Kronen blaa. 8—9. 4.

Paa Syltunge: ved Kysterne af Nordsøen paa *Halvøen* fra Hjerting til Husum og de vestlige Øer; omkring Østersøen, især mod V. *Femern* (N.); *Ærø* (10); *Strynø*, *Drejø* (12); F. Bjørnemose (Jørgensen); *Thorseng* ved Stiou (Rafn); *Langel.* ved Fakkebjerget (Ørsted); *Loll.* Nakskov, Øerne i Rødby Fjord! *Sj.* Basnæs, Ørsløv, Stignæs (Nielsen), Holsteinbor, Ormø, Reersø (Dr.); paa Egholm i Limfjorden (Mørch)! Mangler i attegat-Partiet! ☞

Anm. S. *Limonium* H. 352, som indbefatter baade denne og følgende, angives ogsaa fra Saltholm og paa Næsset ved Assens (Kyll.), hvilke Voxesteder sandsynligviis begge høre til S. Behen.

431. *S. rariflora* [Drej. l. c. n. 349] (Fjernblomstret H.) F. D. 2410 og 315 (slet: S. *Limonium*); S. *bahusiensis* Fr. mant. 1, 10; Rehb. l. c. XVII, tab. 1140.

Bladene omvendt-ægformet-lancetformede, braadspidsede, med især paa Overfladen svage Sidenerver; *Blomsterstanden* halvskjærmformet, med udspærrede eller opstigende Grene, *Smaagrenene* (Axene) forlængede med tydeligt adskilte Blomster, paa de ydre Grene ensidige, paa de indre afvejlende; *Dækbladene* budte, paa *Smaagrenene* alle blomsterbærende.

Dækbladene og Bægerets Nerver røde, i Randen hvidhindede. Kronen blaaagtig-lila. 8—9. 4. Forekommer under 2 Former:

α , *danica* Fr. S. Veg. Sc. I p. 200. (S. *rariflora* Drej., H. N. XI, 26); Bladene flade med en Braad fra Spidsen, Axene oprette; Væksten lavere (3—6" høi).

β , *borealis* Fr. l. c. (S. *bahusiensis* Fr. mant. 1; H. N. III, 18), Bladene bredere, i Randen bølgede, med en Braad nedenfor Spidsen; Axene noget indbøiede. 1—2' høi.

Paa Syltunge, i Danmark fornemlig i Kattegat-Partiet: α , *Sj.* ved Roeskilde Fjord paa mange Steder, f. Ex. ved Frederikssund (Dr.), mellem Jægerspris og Nedre Draaby (21)! Saltbæk N. for Kalundborg (Rafn); J. Mariager Fjord (23); β , sjeldnere: *Sj.* Ourø (15)! Hesseløen (Lgb.); F. ved Hofmangsgave (4)! *Falst.* paa Strandenge ved Nøisomhed (14). ☞

Anm. Skjøndt det af Prof. Fries givne Navn er ældre end Drejers, har jeg beholdt dette sidste fordi det betegner den mest iøjnefaldende Forskjel mellem de to Arter og fordi Navnet »*bahusiensis*» navnlig betegner den større Form, der har sit Centrum i Bahuslän, medens den mindre synes at være den fremherskende i Danmark.

95. *Armeria*. *Faareleger*.

432. *A. vulgaris* [Willd. Enum. hort. Berol. I, 333] (Almindelig F.) Reh. ic. fl. germ. XVII, tab. 1149; F. D. 2585; *A. maritima* H. 351 (ikke Willd); *A. elongata* Lge. Haandb. 1 Udg. n. 421; H. N. VIII, 15.

Bladene smalt linieformede, glatte eller randhaarede, samlede i flere Rosetter fra Spidsen af Rodstokken; *Skafterne* alm. glatte, flere Gange længere end *Bladene*; *de 3—4 ydre Svøbblade* tilspidsede af den udløbende bladagtige Midtnerve, *de indre* budte; *Bægerørret* haaret paa de 5 ophøjede Nerver, i Furerne glat, omtr. af Længde med Smaablomsterstilkene; *Kronbladene* budte eller svagt indtrykte.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronen rosenrød. 5—9. 4. Var.

α , *elongata* (Statice elongata Hffm.; S. *Armeria* F. D. 1092; *A. campestris* γ , Hoffmanni Wallr.; *A. elongata* Drej. n. 348). *Skafterne* langstrakte, *de ydre Svøbblade* længere tilspidsede.

β , *purpurea* Reh. l. c. tab. 1148 (*Armeria purpurea* Koch; Drej. n. 347; *A. campestris* β , Kochii Wallr.) *Svøbbladene* mere budte, *Kronbladene* mørk-rosenrøde.

γ , *humilis* Mey. Chl. hanov. (Reh. l. c. tab. 1148) *Lavere*, med smalere, ofte randhaarede *Blade*.

Ved Strandbredder: i enkelte Egne, f. Ex. omkring Kjøge, meget alm., sjeldnere paa sandige Marker og Bakker inde i Landet. β , paa Enge, sjeldnere. [*

433. *A. maritima* [Willd. l. c.] (Engelskgræs). F. D. 2584; Reh. l. c. tab. 1148; Drej. n. 346; H. N. V, 12; *A. vulgaris* H. 351 (tildeels).

Bladene smalt linieformede, budte; *Skafterne* duunhaarede, omtr. dobbelt saa lange som *Bladene*; *Svøbbladene* kortere og

mere budte; *Bægerrøret* overalt haaret; *Kronbladene* udrandede, forøvrigt som foreg.

3—6" høi. Kronen rødagtig-lila. 6—8. 7.

Ved Strandbredder, især paa Syltøge, sjeldnere end foreg. *J.* Tornby i Vendsyssel, Østergaard ved Løgstør (12), paa Steenrevler ved Limfjorden paa begge Sider af Ottesunds Færge! *F.* Langø ved Hindsholm! Schelenborg (12), Østerøen ved Nyborg (Lund); *Sj.* Reersø (Baagø), Kongsøre Nebbe i Odsherred (9), Veirhøi! Roeskilde Fjord paa flere Steder (19, 21!). Dyrkes alm. i Haver til Indfatning af Blomsterbede.

Anm. Arterne i denne paa Former rige Slægt (*Statice Armeria* L.) trænge til en nøiere Undersøgelse og skarpere Begrænsning.

6te Klasse. Hexandria (Sexhannede).

1. Orden. Monogynia (Enhunnede).

A. Blomsterdækket dobbelt.

1. *Berberis* L. Bæger og Krone sexbladede; Kronbladene med 2 Kirtler ved Grunden; Støvknapperne opspringe ved Klapper; Arret siddende, skjoldformet; Frugten 1—2-frøet Bær. 7. (N. F. *Berberidæ*).

2. *Peplis* L. Bægeret tolvtdet, de 6 Tænder mindre; Kronen sexbladet (hurtigt affaldende, ofte 0); Frugt torummet, mangefrøet Kapsel. ☉. (N. F. *Lythrarieæ*).

Trientalis. Bægeret og Kronen syvdeelte; Frugt enrummet Kapsel. 4. (7, 1).

Subularia o. fl. Firepægtige (15, 1—2). 2

B. Blomsterdækket enkelt.

a. Frugten undersædig, kapselagtig (Løgbærende Væxter).

3. *Galanthus* L. Blomsten omgivet af et Hylster; Blomsterdækket sexbladet, dets 3 ydre Blade større, de 3 indre mindre, i Spidsen udrandede; Støvknapperne sylformigt tilspidsede, opspringende i Spidsen.

4. *Leucójum* L. Blomsterne omgivne af et Hylster;

Blomsterdækket sexbladet, alle dets Blade af lige Længde; Støvknapperne budte, opspringende i Spidsen.

5. **Narcissus** L. Blomsterne omgivne af et Hylster; Blomsterdækket sexbladet, dets Blade alle ligestore og udbredte; en sambladet, krands- eller rørformet Bikrone befæstet til Svælget; Støvknapperne budte, opspringende ved Længdespalter (3—5. N. F. Narcissineæ).

b. Frugten oversædig, bæragtig (Urter uden Løg).

6. **Asparagus** L. Blomsterdækket sexdeelt, klokkeformet, med meget smalt Rør ved Grunden (hvorved Blomsterstilken faaer Udseende af at være leddet paa Midten); Griffelen deelt i 3 Ar (Tvebo).

7. **Convallaria** L. Blomsterdækket sexfliget eller -tandet; Griffelen udeelt, med trekantet Ar. (6—7. N. F. Smilacææ).

c. Frugten oversædig, kapselagtig.

aa. Blomsterdækket kronbladagtigt farvet,

α, sambladet.

† *Muscari* Tournef. Blomsterdækket kugle- eller krukkeformet, sextandet med indsnøret Svælg; Kapselen skarpt sexkantet. (N. F. Liliacææ).

† *Endymion* Dumort. Blomsterdækket klokkeformet, næsten til Grunden sexdeelt; Fligene i Spidsen tilbagebøjede; Kapselen budt trekantet. (N. F. Liliacææ).

β. Blomsterdækket fribladet,

aa. med Honninggjemmer.

8. **Fritillaria** L. Perigonbladene med Honninggrube ved Grunden, Griffelen med trespaltet Ar; Frøene flade. (Løgvæxt).

9. **Lilium** L. Perigonbladene med Honningfure langs Midtlinien (forneden); Arret udeelt, trekantet; Frøene flade (Løgvæxt).

ββ. Blomsterdækket uden Honninggjemmer.

* Støvknapperne befæstede med Basis til Støvtraadene.

10. **Tulipa** L. Griffel 0; Arret trelappet; Frøene flade (Løgvæxt, med enkelt endestillet Blomst uden Svøb).

11. **Gagea** Salisb. Griffelen med afstumpet, udeelt eller utydeligt trelappet Ar; Frøene rundagtige (Løgvæxt med Blomsterne i Skjærm, omgivne af et Svøb).

** Støvknapperne befæstede med Ryggen til Støvtraadene.

+ Blomster i Skjærm, omgivne af et fælles hindeagtigt Hylster.

12. **Allium** L. Støvdragerne tilvoxne til Perigonbladene, ved Grunden sammenhængende; Griffelen udeelt; Frøene kantede (Løgvæxt, med en stærk og eiendommelig Lugt).

++ Blomster i Klasse uden fælles Hylster.

13. **Ornithogalum** L. Støvtraadene hindeagtigt udvidede, glatte; Frøene runde (eller kantede), uden Tilhængsler (Blomsterstilken uledet. Løgvæxt).

14. **Anthéricum** L. Støvtraadene traadformet-sylformede, glatte; Frøene kantede, uden Tilhængsler. (Blomsterne tilledede til Blomsterstilken. Rodstok med Trævlerødder. Intet Løg.) — (8—14. N. F. Liliaceæ).

15. **Narthécium** Moehr. Støvtraadene traadformede, uldhaarede; Frøene omgivne af traadformede Tilhængsler (Frøkappe). Krybende Rodstok med Trævlerødder; intet Løg. (N. F. Colchicaceæ).

bb. Blomsterdækket hindeagtigt eller bladagtigt (bruunt ell. grønt).

a. Blomsterne i Qvast eller Nøgler *).

16. **Juncus** L. Kapselen trerummet, treklappet, mangefrøet. (Bladene skedeformede, trinde eller sammenrullede).

17. **Luzula** DC. Kapselen enrummet, treklappet, trefrøet; (Bladene flade). (16—17. N. F. Juncaceæ).

*) Typisk forekommer hos disse 2 Slægter en af qvast- eller nøgleformede Blomsterstande 1 eller flere Gange sammensat Halvskjærm, hvis Grene paa den temmelig korte Blomsteraxe udvikle sig fra oven nedad, men derimod aftage i Længde franeden opad.

β. Blomsterstanden en Kolbe.

18. **Ācorus** L. Kolben falsk-sidestillet*); Kapselen tre-rummet, uopspringende. (Bladene sværdformede). (N. F. Aroideæ).

d. Frugten oversædig, nødagtig.

Polygonum (6, 3).

C. Blomsterdækket 0.

19. **Calla** L. Blomsterne i Kolbe, omgivet af et kræmmerhuusformet, i Spidsen tilbagebøiet Hylster, der er længere end Kolben; Frugten Bær. (Støvdragerne ofte i ubestemt Antal). (N. F. Aroideæ).

2. Orden. *Digynia* (Tohunnede).

Polygonum. Fr. Nød (6, 3).

Ulmus. Fr. Vingefrugt (5, 2).

3. Orden. *Trigynia* (Trehunnede).

A. 1 Frugtknude, 3 Griffler (eller 1 Griffel med 3 Ar).

a. Frugt nødagtig.

20. **Polygonum** L. Blomsterdækket farvet, dybt femdeelt med ligestore Flige; Frugt en trekantet eller fladtrykt Nød; Arrene hovedformede.

21. **Rumex** L. Blomsterdækket (alm.) grønt, sexbladet, dets 3 ydre Blade (Bægerblade) udstaaende, de 3 indre (Kronblade) større, ved Modenheden sammensluttende omkring den trekantede Nød; Arrene penselformede. (20—21. N. F. Polygonææ).

*) Stængelens bladagtige Forlængelse ovenfor Kolben er at ansee som et Hylsterblad, tilsvarende til det som findes hos *Calla*.

b. Frugt kapselagtig.

22. **Colchicum** L. Blomsterdækket sambladet, regelm. sexdeelt med langt Rør; Støvdragerne tilvoxne til Røret. Frugten spalter sig ved Modenheden til 3 Bællekapsler. (N. F. Colchicaceæ).

B. 3 Frugtknuder, siddende Ar.

23. **Scheuchzeria** L. Arret skjævt tilvoxet til Spidsen af Frugtknuden (tilsyneladende sidestillet); Frugterne (Fleerfoldfrugt) 3 samlede ved Grunden, frastaaende i Spidsen, uden fælles Frugtaxe, toklappet-opspringende, 1—2-frøede.

24. **Triglochin** L. Arret endestillet; Frugterne 3—6 enfrøede Spaltefrugter, befæstede omkring en fælles Frugtaxe og tilsidst løsrivende sig fra neden. (23—24. N. F. Alismaceæ, a.).

4. Orden. *Hexagynia* (Sexhunnede).

Triglochin maritimum (6, 3).

5. Orden. *Polygynia* (Mangehunnede).

25. **Alisma** L. Blomsterdækket sexbladet, dets 3 ydre Blade (Bægerblade) grønne, de 3 indre (Kronblade) farvede. Frugterne talrige Nødder (Fleerfoldfrugt). (N. F. Alismaceæ, b.).

I. Monogynia.

1. Berberis. Berberisse.

434. **B. vulgaris** L. (Almindelig B.) H. 397; Drej. n. 393; F. D. 904; Rchb. ic. fl. germ. III, tab. 18, fig. 4486.

Bladene omvendt-ægformede, tornet-saugtakkede, knippeformigt samlede (i Dværggrene) fra Hjørnerne af en enkelt

eller tregrenet *Vedtorn* (et omdannet Blad); *Blomsterne* i nikkende Klaser; *Bærrene* ovale.

Blomsterne gule, lugte sødt; Bær røde (af syrlig Smag), Støvdragerne bøje sig ved Berøring elastisk henimod Støvveien. 5—6. h.

Ikke sjelden ved Gjærder, hvor den, især i tidligere Tid, ofte har været plantet. I enkelte Egne forekommer den vildvoxende i Skove, f. Ex. *Bornh.* hyppig i Almindingen! *Sj.* Odsherred, Tryggerød (H.), Skovsborg! *Falst.* ved Nykjøbing (H.).

2. Peplis. Vandkryber.

435. *P. portula* L. (Portulak-V.) H. 399; Drej. n. 394; F. D. 64.

Stængelen udstrakt eller krybende, med modsatte Blade og Grene; *Bladene* omvendt-ægformede, stilkede, heelrandede; *Blomsterne* enlige, næsten siddende, i Bladhjørnerne.

Var. (efter det forskjellige Voxested) i Henseende til Plantens Farve (oftest rødagtigt anløben), Ledstykkeernes Længde og Bladenes Størrelse. 6—9. ☉.

Paa fugtige Steder, f. Ex. Overdrev, Veigrøfter, Moser, baade paa Leer-, Sand- og Tørvgrund: alm. paa *Halvøen* og *Bornh.*; i de øvrige Provindser sjældnere: *Sj.* sporadisk mod N. O., mod S. sjelden: Kjøgekro (9); ligesaa i *F.* Ulriksholm, Hindsholm (N. E. Hofm. Bang), Filstrup! Heldagergaard (12) og paa de sydlige Øer: *Falst.* i Horreby Lyng (H.), Byskov, Bregninge (14); *Loll.* ved Ravnby (19); *Thorseng* paa flere Steder (12).

3. Galanthus. Vintergjæk.

† 436. *G. nivalis* L. (Almindelig V.) H. 361; Drej. p. 133; F. D. 1641; Rehb. ic. fl. germ. IX, 807.

Bladene linieformede, paa Ryggen kjølede; *Skaftet* enblomstret; *Hylsteret* i Spidsen tokløvet; *Blomsterne* nikkende; *Blomsterdækkets ydre Blade* omvendt-ægformede, hule (hvide), de indre omvendt-hjerteformede (indvendig grøntstribede, udvendig hvide med en grøn Plet foroven).

Løgvæxt. 3—5" høi. 3—4. 4.

Paa Enge og i Krat, oprindelig forvildet fra Haver, hvor den dyrkes: *Sj.* Ørsholt (11), Kongens Have i Fredriksborg (Knæckenborg), Charlottenlund (15), Bernstorf, Antvorskov (H.); *Falst.* Horbeløv, Nykjøbing (Koch); *F.* St. Jørgensgaard (12); *J.* Bjørnsholm (8),

Oust Mølle ved Randers (16); *Sl.* Slotsengen ved Husum, Nyværk ved Slesvig (16).

4. *Leucojum*. Hvidblomme.

437. *L. æstivum* L. (Sommer-H.) H. 361; F. D. 1265; Rehb. l. c. IX, fig. 805.

Bladene linieformede; *Skaftet* tveægget, 2—4-blomstret med nikkende *Blomster*; *Hylsteret* budt; alle *Perigonbladene* elliptiske (hvide med en grøn Plet mod Spidsen).

Løgvæxt. 1—1½' høi. 5—6. 4.

Paa Enge mellem Krat, sjelden og muligviis forvildet ligesom foreg.: *J.* Aalborg (16), Tagkjær ved Aarslev (H.), langs Braband Søes sydlige Enge fra Constantinsborg til Viby (2); *Loll.* i en Ellemose ved Ulriksdal (Kmherre Wichfeld). *

5. *Narcissus*. *Narcis*.

† 438. *N. poëticus* L. (Pindselilie). Drej. p. 133; Rehb. l. c. IX, fig. 808.

Bladene linieformede, svagt rendede, budtkjolede; *Bikronen* rundtakket, hjulformet, meget kortere end *Perigonbladene*.

Løgvæxt. Blomsterne hvide, med gul, i Randen brandgul *Bikrone*. 5. 4.

I Kratskove, forvildet fra Haver, hvor den dyrkes som Siirplante: *Sj.* mellem Ørsholt og Gurre (21), Esrom (Dr.), Flommen ved Sorø (12); *Falst.* S. Kirkeby, Riserup, Gaabense (Koch); *Sl.* Fruenhof i Angel (16). *

439. *N. Pseudonarcissus* L. (Paaskelilie). H. II, 164; Drej. p. 133; F. D. 2170; Rehb. l. c. IX, fig. 816.

Bladene linieformede, flade med en svag Kjøl; *Bikronen* tragtformet, i Randen bølget-rundtakket, af Længde med *Perigonbladene*.

Løgvæxt. *Perigonbladene* bleggule, *Bikronen* mørkere gul. 4—5. 4.

I Kratskove, sandsynligviis oprindelig forvildet (da den ligesom foreg. dyrkes som Siirplante): *Sj.* Søborg ved Slotsruinerne (Lgby), Esrom (Dr.); *Loll.* Juellinge (19); *F.* Rødkilde! *J.* Bjørnsholm (8), Kjærgaard Skov ved Ribe (d'Origny); *Sl.* Eisbøl Slotsbanke ved Haderslev (Grønlund), Fruenhof i Angel, Nyværk ved Slesvig, Slotsengen ved Husum (16). *

6. Asparagus. Asparges.

440. **A. officinalis** L. (Almindelig A.) H. 373; F. D. 805; Rehb. l. c. X, fig. 967.

Stængelen glat; *de primære Blade* skjælformede, spredte langs opad Stængelen og Grenene; *de secundære Blade* (eller golde Blomsterstilke) børsteformede, 2—5 knippeformigt samlede i Hjørnerne af Grenenes Skjæl; fra Hjørnerne af Stængelens øvre og Grenenes nedre Skjæl (Blade) udgaae 1—3 stilkede Blomster.

1—3' høi. Alm. ere i nogle Blomster fortrinsviis Støvveien, i andre Støvdragerne udviklede og Planten bliver da tvebo, uden at dog det andet Kjon aldeles feilslaaer. — Kronen skident gulgrøn; Bær røde. De unge Stængler spiselige. 6—7. 4.

Ved Strandbredder: *Sj.* Kalundborg (16), paa flere Steder ved Kysterne af Isefjorden, f. Ex. Ourø, Hammerbakken ved Vellerup (15), Oxholm (9) og Elhorn i Roeskildefjord (Albrecht), Hersløv ved Roeskilde! *Amager* (H.): *Sævedø* (17); *Falst.* hist og her ved Strandkanterne (Koch); *Flatø* i Guldborgsund! *Loll.* Kramnitze Odde (H.) o. fl. St. (5); *Langel.* ved Faareveile (12), *Hjortø*, *Avernako*, *Ærø* (H.); *F.* paa Øerne i Odense Fjord (H.), Bjørnemose (Jørgensen); *J.* Dagnæs ved Horsens Fjord (16). Forekommer desuden forvildet fra Haver, hvor den dyrkes som Kjøkkenvæxt.

7. Convallaria. Konval.

a. *Coelocrinon* Koch. Blomsterdækket klokkeformet, Støvdragerne befæstede ved Grunden af Røret.
(Blomsterne i Klase).

441. **C. majalis** L. (Lilie-K.) H. 375; Drej. n. 376; F. D. 854; Rehb. l. c. X, fig. 960.

Hovedaxen med 2—3 lancetformede eller elliptiske *Blade*, som tilligemed det bladløse, halvtrinde *Blomsterskaft* (Biaxen) omgives af 5—6 hindeagtige *Skeder*; *Klasen* ensidig; *Blomsterstilkene* nikkende, længere end Dækbladene.

6—8" høi. Bladene i Knoptilstanden kræmmerhuusformigt indrullede, Blomsterne hvide, vellugtende; Bær røde. 5—6. 4.

I Skove, alm. udbredt.

b. *Polygonatum* Tournef. Blomsterdækket valse- eller kølleformet, Støvdragerne befæstede i Midten af Røret (Blomsterne i Bladhjørnerne).

aa. *Bladene krandsstillede, Bær røde.*

442. **C. verticillata** L. (Krandshladet K.) H. 376; F. D. 86; Rchb. l. c. fig. 966; *Polygonatum* Moench, Drej. n. 377.

Stængelen svagt kantet; *Bladene* linie-lancetformede, 3—7 i hver Krands; *Blomsterstilkene* alm. toblomstrede; *Støvtraadene* glatte.

Stængelen 1—1½' høj, forneden rødplettet. Blomsterne hvide, i Spidsen af Fligene grønne. 6. 4.

I fugtige Skove og Krat: i *Halvøens* østlige Skove ikke sjelden, især i Strækningen mellem Randers og Veile, sparsommere i det Indre af Landet mellem Krat paa Heden, f. Ex. Haraldslund! Fresenhagener Skov ved Læk (16); paa Øerne meget sjeldnere: **F.** mod N. V. (7), Sanderungaard (H.); **Sj.** Egebæksvang (21), Dumpedals Mølle ved Birkerød (H.), mellem Ermelund og Ordrups Mose! Charlottenlund (Weilbach).

bb. *Bladene spredte, Bær blaaagtige.*

443. **C. multiflora** L. (Salomons Segl). H. 377; F. D. 152; Rchb. l. c. fig. 961; *Polygonatum* Moench, Drej. n. 379.

Stængelen trind; *Bladene* ægformet-elliptiske, halvt omfattende; *Blomsterstilkene* 3—5-bloomstrede; *Støvtraadene* haarede.

1½—2' høj. Rodstokken vandret, hvid, leddet, Stængelen i Knoptilstanden nikkende; Blomsterne hvide med grønspidsede Flige. (Spædere Former have stundom enblomstrede Blomsterstilke). 5—6. 4.

I Skove, alm. udbredt.

444. **C. Polygonatum** L. (Kantet K.) H. 376; F. D. 377; Rchb. l. c. fig. 964; *Polygonatum anceps* Moench, Drej. n. 378.

Stængelen kantet; *Bladene* elliptisk-ægformede, halvt omfattende; *Blomsterstilkene* 1—2-bloomstrede; *Støvtraadene* glatte.

1—1½' høj. Rodstokken som hos foreg., men med fjernere Led. Blomsterne større. 5—6. 4.

I høitliggende Skove, paa Brinker mellem Krat: paa *Bornholm* og *Møens* Klint alm.; i det nordøstlige **Sj.** ikke sjelden, men sporadisk; sparsommere mod V.: Refsnæs (15), Næsbyholm (H.), Egholm

i Storebelt (17) og i de øvrige Provindser; *Falst.* ved Grønsund! Ulslov (Koch); *Thorseng* (Lund); *F.* Hofmausgave (4), ved Ladegaardssøen pr. Nyborg (Lund); *J.* Aagaard i V. Hanherred (16), Dybdal ved Aalborg (Branth). Lundbykrat (H.), Ingerslev Bjerger (Selmer), Horsens (Jørg.), Ribe (Warming); *St.* Haderslev, Kobbemølleeskoven ved Flensborg, Immingsted og Süderholz ved Husum (16).

Muscari.

† *M. botryoides* DC. (Sukkertop). Drej. p. 134; Rehb. l. c. fig. 998; Hyacinthus L., H. II, 168.

Bladene linie-lancetformede, ved Grunden meget smale; *Skaftet* bladløst, med Blomster i en tæt, endestillet, opret Klase; *Blomsterne* nikkende, de øvre golde, oprette.

Løgvæxt. Blomsterne mørkblaa. 5. 4.

Forvildet fra Haver, sjelden, f. Ex. *F.* Marker ved Skaarup (19); *Loll.* Engestofte (Kherrinde Wichfeld).

Endymion.

† *E. nutans* Dumort. (Klokkehyaacinth). *Agraphis nutans* Link, Rehb. l. c. fig. 1008; Hyacinthus non scriptus L.

Bladene lancet-linieformede, rendede; *Skaftet* bladløst, med Blomster i en ensidig, nikkende Klase, *Blomsterne* hængende, blaae.

Løgvæxt. 5—6. 4.

Hist og her forvildet i og omkring Haver.

8. *Fritillaria. Keiserkrone.*

445. *F. Meleagris* L. (Vibæag). H. 366; Drej. p. 134; F. D. 972; Rehb. l. c. fig. 974.

Skaftet bladbærende; *Bladene* spredte, linieformede, rendede, *Blomsten* enlig, endestillet, nikkende, med klokkeformet Blomsterdække; *Perigonbladene* lancetformede (kjødfarvet- og mørkrødt-tærnede, sjeldnere gulhvide), nedenfor Midten udvendig puklede, indvendig med en aflang Hønninggrube.

Løgvæxt. 5. 4.

I Kratskove, formodenlig forvildet fra Haver, sjelden: *Sj.* Charlottenlund paa en Eng bag Slottet, Sneeslov i Flakkehjerg Herred (H.); *F.* Hverringe paa Hindsholm (A. Lange); *St.* Nyværk ved Slesvig (16).

9. Lilium. Lilie.

† *L. bulbiferum* L. (Løgbærende L.) H. II, 165; Rehb. l. c. fig. 995.

Bladene spredte ($\frac{1}{3}$), linie-lancetformede, med *Løgknopper* i Bladhjørnerne; *Blomsterne* oprette, i en endestillet, faablomstret Skjærm; *Blomsterdækket* klokkeformet, med rette, indvendig ru-vortede Perigonblade.

Løget med taglagte Skjæl. Blomsterne brandgule med rødbrune Pletter. 6—7. 4.

Forvildet fra Haver, sjelden: *Sj.* Kjøge; *J.* Aalborg; *Sl.* Gottorp (H.) ³

† *L. Martagon* L. (Krandsbladet L.) H. II, 165; Rehb. l. c. fig. 989.

Bladene krandsstillede, elliptisk-lancetformede, uden *Løgknopper*; *Blomsterne* i Klase, nikkende; *Blomsterdækket* med tilbagerullede, indvendig haarede Perigonblade.

Løget med gule, taglagte Skjæl. Blomsterne rosenrøde med mørkrøde Pletter. 6—7. 4.

Forvildet: *Sj.* Vodrofgaard (19), Skjoldnæsholm (9); *Falst.* Rise-rup, Kippinge (Koch); *F.* Hesselagergaards Skov (19); *Sl.* Gottorp (H.) ^{*}

10. Tulipa. Tulipan.

446. *T. silvestris* L. (Vild T.) H. 367; Drej. n. 380; F. D. 375; Rehb. l. c. fig. 983.

Bladene (2—3) spredte, langstrakt og smalt lancetformede; *Blomsten* enlig, endestillet, lidet nikkende; *de indre Perigonblade* og *Støvdragerne* ved Grunden skjægghaarede.

Løget omgivet af brune Hinder. Blomsterne gule, vellugtende. 5—6. 4.

I Kratskove omkring beboede Steder: muligviis forvildet fra Dyrkning i ældre Tider, bemærket i alle Provindser og i enkelte Egne i Mængde, f. Ex. omkring Kjøbenhavn!

11. Gagea. Guldstjerne.

a. 2—3 Rodblade ved Grunden af Blomsterskiftet.

447. *G. spathacea* [Schult. Syst. Veg. 7, p. 541] (Hylsterbladet G.) Drej. n. 382; Rehb. l. c. fig. 1039;

Ornithogalum Hayne, H. 367; H. N. I, 67; *O. minimum* F. D. 612 (ikke L.).

Et større og mange smaae *Løg* indsluttede af en fælles Hinde; *Rodbladene* traadformede, halvtrinde, ikke rendede; 1 lancetformet, ved Grunden huult, i Spidsen trindt, langt-tilspidset Blad hylsterformigt omgivende den 2—4-blomstrede, ved en fælles Blomsterstilk fra Hylsteret fjernede *Skjærm*; *Smaa-blomsterstilkene* glatte (trinde), med 2—4 lancet-sylformede *Dækblade* ved Grunden; *Perigonbladene* budte, lancetformet-ovale; *Støvdragerne* meget kortere end Griffelen; *Frugtknuden* budt og utydeligt sexkantet.

Blomsterne gule, til-idst med rødligt Anstrøg. 5. 4.

I Skove, især paa fugtig Grund, sporadisk, men ikke sjelden og bemærket i alle Provindser. [3]

448. *G. arvensis* [Schult. l. c. 547] (Ager-G.) Drej. n. 383; Rehb. l. c. fig. 1049—50; H. N. XV, 69; *Ornithogalum* Pers., H. II, 167; F. D. 1869.

To rundagtige *Løg* indsluttede af en fælles Hinde; *Rodbladene* smalt linieformede, rendede; tilbagebøiede; 2 større *Svøblade* tæt omgivende den mangeblomstrede, med flere mindre *Dækblade* forsynede *Skjærm*; *Smaa-blomsterstilkene* og de lancetformede, spidse *Perigonblade* paa Yderfladen duunhaarede.

Blomsterne gule. Har ofte Løgknopper ved Grunden af *Smaa-blomsterstilkene*. 4—5. 4.

Paa Agre o. a. dyrkede Steder i Landets sydligere Egne, sjelden: f. Ex. *Sl.* ved Egeruførde (N.); *Lolland* i Mængde ved Nakskov (14); *Falster* i det østl. alm. (14)! *Møen* i Haver (Dr.); *Bornh.* Rønne, ved Byaaen (Hoff)! [3]

b. 1 Rodblad ved Grunden af Blomsterskafet.

449. *G. minima* [Schult. l. c. 539] (Liden G.) Drej. n. 381; Rehb. l. c. fig. 1040; H. N. XII, 71; *Ornithogalum minimum* L., H. 369; F. D. 1331.

Et større og et mindre *Løg* omgivne af en fælles Hinde (eller det mindre udenfor samme); *Rodbladet* smalt linieformet, fladt, paa Ryggen stribet; 1 lancetformet, tilspidset *Svøblad*

hylsterformigt omfattende den 2—6-blomstrede, ved en fælles Blomsterstilk fra Hylsteret fjernede *Skjærm*; *Smaablomsterstilkene* traadformede, glatte, med linieformede *Dækblade* ved Grunden; *Blomsterdækket* ved Grunden stumpet afskaaret, med linie-lancetformede, tilspidsede Perigonblade; *Frugtknuden* trekantet.

Finere og spædere (men ikke lavere) og med mindre Løg end de øvrige. Blade og Skaft ved Grunden haarfine; Blomsterne gule. 4—5. 4.

I Skove og Krat, sporadisk og ikke alm., fra *Slesvig* er mig intet Voxested bekendt, forøvrigt bemærket i alle Provindser. 1*

450. **G. lutea** [Schult. l. c. 538] (Almindelig G.) Drej. n. 384; Rchb. l. c. fig. 1045; H. N. XIV, 72; Ornithogalum L., H. 368; F. D. 378.

Eet enkelt, ægformet Løg omgivet af Hinder; *Rodbladet* opret, linie-lancetformet, fladt eller rendet, paa Ryggen skarpkjølet, sribet, i Spidsen kappeformet; 2—3 *Svøblade* (det ydre størst) ved Grunden af den 2—8-blomstrede *Skjærm*; *fælles Blomsterstilk* 0 eller meget kort; *Smaablomsterstilkene* glatte, uden *Dækblade* ved Grunden; *Blomsterdækket* med afsmalnet Basis, dets Blade lancet-linieformede, budte; *Frugtknuden* trekantet.

Svøbladene alm. dunet-randhaarede. Ofte findes flere Smaaløg ved Grunden af det større Løg, men udenfor dettes Hinder. Var. med Blade af blaagrøn Farve. Blomsterne gule. 4. 4.

I Skove, Haver, ved Gjærder o. s. v., meget alm.

451. **G. stenopetala** [Rchb. Fl. exc. p. 107] (Eng.-G.) Ornithogalum Fr. fl. Hall., p. 58; H. N. II, 64; O. pratense H. II, 166; F. D. 2225; Rchb. l. c. fig. 1033—37.

Tre Løg: det ene hindedækket, udskydende Blad og Blomsterskaft, de 2 øvrige nøgne (det ene større, vandret, det andet mindre, lodret); *Bladene* flade; *Skjærmen* 2—4-blomstret, med 1—2 *Dækblade* ved Grunden af *Smaablomsterstilkene*; *Perigonbladene* langstrakt oval-linieformede, budte; forøvrigt som foreg., med hvilken den har megen Lighed.

Blomsterne gule. 4—5. (Lidet sildigere end foreg.). 4.

β, bifolia Koch Falst. Veget., med 2 Rodblade.

Paa Grøftevolde og Agre, høie Enge og i Krat: *Slesvig* (Nolte); *Samsø* (Jacobsen); *F.* Dalby Klint paa Hindsholm (A. Lange), Østerøen ved Nyborg (Lund); *Loll.* Nakskov (19); *Falst.* alm. (14); *Sj.* Lillehedinge i Stevns, Kirsebærgangene ved Kjøbenhavn (12)! Charlottenlund (Lütken), Bognæs ved Roeskilde (20)! *Bornh.* hyppig omkring Rønne (Hjorth), Arnager (20). *β, Falst.* S. Kirkeby, S. Alsløv (Koch). Forekommer sandsynligviis paa mange flere Steder, men hidtil overseet paa Grund af de overjordiske Deles store Lighed med foreg. ☞

12. Allium. Løg.

a. De 3 (indre) Støvdragere tretandede, den midterste Tand støvknappbærende (Bladene ligebrede).

aa. Bladene flade.

452. *A. Scorodoprasum* L. (Skov-L.) H. 362; Drej. n. 388; F. D. 1455; Rehb. ic. fl. germ. X, tab. 490, fig. 1073.

Bladene i Randen rue; Skederne tvæggede; Skjærmen faablomstret, med talrige Løgknopper ved Grunden af Blomsterne; *Hylsteret* enbladet, kort-tilspidset; *Støvdragerne* kortere end eller af Længde med Blomsterdækket, Tænderne sylspidsede, den midterste med Støvknappen halvt saa lang som Støvtraaden.

2—3' høi; Bladene indtil $\frac{1}{2}$ " brede. Flere, ofte stilkede Smaaløg ved Grunden af Hovedløget. Løgknopperne rundagtige eller omvendt-ægformede, mørkviolette; Blomsterne violetrøde. 6—7. 4.

β, minus Fr. (*A. arenarium* Sm., Rehb. l. c. fig. 1074; *A. Scorodoprasum* F. D. 290). Mindre og spædere, med smalere Blade, trinde Bladskeder.

I Kratskove, ved Gjærder og paa høie Enge, ikke sjelden, bemærket i alle Provindser og i enkelte Egne hyppig, f. Ex. paa *Bornh.*, ved Helsingør og Kjøbenhavn. *β, Sj.* ved Kjøge (9), Vemmetofte (H.); *Møen*; Flatø i Guldborgsund; *Loll.* Lienlund ved Nakskov (19); *F.* Nyborg; *J.* Aarhus, Palsgaard (H.).

† *A. Porrum* L. (Porre-L.) Rehb. l. c. tab. 489, fig. 1071. Bladene bredt linieformede, rendede; Skjærmen tæt-blomstret, kugleformet, uden Løgknopper; *Hylsteret* enbladet, langt-tilspidset; *Blomsterdækket* hvidt med røde Striber.

Dyrkes i Kjøkkenhaver.

† *A. sativum* L. (Hvid L.) Rchb. l. c. tab. 488, fig. 1069. *Bladene* linieformede, flade; *Skjærmen* faablomstret, med Løgknopper; *Hylsteret* enbladet, langt tilspidset, affaldende; *Blomsterdækket* skident hvidt eller rødligt; Smaaløg ved Grunden af Hovedløget.

Dyrkes som foreg.

bb. Bladene hule, trinde eller halvtrinde.

453. *A. vineale* L. (Strand-L.) H. II, 162; Drej. n. 389 (undtagen Synon.); F. D. 1870 (slet) og 2227; Rchb. l. c. fig. 1075; *A. arenarium* Fr. nov. p. 84; H. N. VIII, 69.

Bladene halvtrinde, paa Overfladen svagt furede; *Hylsteret* enbladet, langt tilspidset; *Skjærmen* med Løgknopper ved Grunden af Blomsterne; *Perigonbladene* budte; *Støvdragerne* længere end Blomsterdækket, Tænderne sylspidsede, den midterste med Støvknappen længere end Støvtraaden.

$\frac{1}{2}$ —2' høi. *Bladene* smale, alm. henvisnede naar Blomsterne udspringe; Smaaløg ved Grunden af Hovedløget. Løgknopperne omvendt-ægformede, budte med en kort Spids; Blomsterne rosenrøde eller guulgrønne med Anstrøg af Rødt, var. grønne (*viridiflorum* Drej., F. D. 2227). 6—7. 4.

α , *capsuliferum* Koch. *Skjærmen* mangeblomstret, med faae Løgknopper.

β , *compactum* Thuill. Løgknopperne danne et kugleformet Hoved; Blomsterne 0 eller meget faae.

Ikke sjelden i Nærheden af Kysterne i alle Provindser, f. Ex. paa Havstokken, Brinker mod Stranden; sjeldnere inde i Landet ved Gjærder og i Krat. (β , er hos os den hyppigste Form.)

454. *A. Kochii* [Lge., Fl. dan. ined.] (Mangeblomstret L.) *A. vineale* β , *purpureum* Koch, Falst. Veg. p. 39.

Bladene halvtrinde, i den nedre $\frac{2}{3}$ af deres Længde randede, foroven trinde, sylspidsede; *Skjærmen* mangeblomstret med talrige Løgknopper; *Perigonbladene* spidse, mørkt carmoisinrøde, i Randen lysere, længere end de tandløse og af Længde med eller lidet kortere end de tandede *Støvdragere*; forøvrigt som foreg.

Høiere ($1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ ') og med større Løg end foreg. 7. 4.

I Mængde ved en Gruusgrav udenfor Nykjøbing paa Falster (Koch)! (Har vedligeholdt sit Udseende og Characterer ved fleeraarig Dyrkning i den botaniske Have.)

Anm. Denne smukke Løgart, som jeg har benævnt efter Finderen, den utrættelige Botaniker Provst Koch, staaer ifølge Charactererne nærmest ved *A. vineale*, fra hvilken den dog synes mig tilstrækkelig adskilt, hvorimod den i Udseende, fornemlig ved de talrige og smukt mørkrøde Blomster, har mest Lighed med *A. sphærocephalum* L. (H. II, 162, F. D. 2111, Reh. l. c. 1080). Denne er imidlertid meget forskjellig ved hule, trinde, ved Grunden fladtrykte Blade, tobladet Svøb, kugleformet Skjærm med kortere Blomsterstilke og uden Løgknopper. Den er funden i Holsteen (Nolte), men hidtil ikke, saavidt mig bekjendt, i vor Flora, thi paa det Kyllingske Voxested, (Løghøien ved Ribe), som citeres til denne, findes den neppe mere, og det turde vel endog ansees for tvivlsomt, om den af Kyll. angivne Plante med Rette er henført til *A. sphærocephalum*.

† *A. Cepa* L. (Rød L.) Reh. l. c. tab. 494, fig. 1083. Løget stort, enligt; Stængelen nedenfor Midten bugformigt opblæst; Bladene trinde, rørformede; Skjærmen kugleformet, mange blomstret, uden Løgknopper; Støvdragerne meget længere end Blomsterdækket, med korte Tænder.

Dyrkes i Kjøkkenhaver.

† *A. ascalonicum* L. (Skalot-L.) Reh. l. c. tab. 491, fig. 1076. Løgene smaae, flere samlede; Stængelen ligetyk overalt; Bladene trinde, rørformede; Skjærmen med eller uden Løgknopper; Hylsteret tobladet; Støvdragerne lidet længere end Blomsterdækket, med korte Tænder.

Dyrkes i Kjøkkenhaver, men blomstrer neppe hos os.

b. Alle Støvdragerne uden Tilhængsler.

aa. Bladene ligebrede, uden Sideaarer; Blomsterne røde eller rødlig-grønne.

α. Løget rundagtigt, dannet af kjødfulde Løgskjæl uden Plade; Løgknopper ved Grunden af Blomsterne.

455. *A. oleraceum* L. (Vild L.) H. 363; Drej. n. 390; F. D. 1456; Reh. l. c. tab. 487, fig. 1067.

Bladene rue, forneden halvtrinde, mod Spidsen flade, paa Overfladen furede, paa Underfladen mangestribede; Hylsteret

tobladet, med langt tilspidsede Blade, (det ene meget længere end det andet); *Skjærmen* faablomstret; *Blomsterstilkene* lange; *Blomsterdækkets* Blade budte, af Længde med *Støvdragerne*.

1—2' høi. Løgknopperne elliptiske, tilspidsede; Blomsterne hvid- eller gulgrønne, rødt anløbne eller blegt rosenrøde med brune Striber. 7. 4.

β , *canaliculatum* Fr. Høiere af Væxt; Bladene brede, rendede; Blomsterne brunagtigt grønne.

I Skove og Krat, ved Gjærder o. s. v., alm. udbredt. β , med Hovedarten, f. Ex. Bastionerne ved Kjøbenhavn!

456. **A. carinatum** L. (Kjølet L.) H. II, 161; F. D. 2109; Rchb. l. c. tab. 482, fig. 1057; H. N. VI, 64.

Bladene smalt linieformede, rendede, mod Spidsen flade, med 3—5 fremstaaende Striber; *Hylsteret* som foreg.; *Skjærmen* mangeblomstret; *Blomsterstilkene* lange; *Blomsterdækket* trekantet; *Perigonbladene* budte, med indrullet Spidse, kortere end *Støvdragerne*.

1' høi. Blomsterne lila-rosenrøde, Bladene henvisnede i Blomstringstiden. 7. 4.

I høitliggende Krat: *Sl.* ved Aabenraa (Bargum efter N.); *F.* Hofmansgave (18)! *Bornh.* Rønne (Hjorth), Rabekkegaard (Hamann). Angives af Kyll. fra Stevns og Assens. ^[3]

β . Løget aflang-valseformet, dannet af de henvisnede Blades Skeder; Løgknopper 0.

† *A. Schoenoprasum* L. (Pur-L.) H. 365; F. D. 971; Rchb. l. c. tab. 496, fig. 1085.

Bladene trinde, rørformede; *Skjærmen* kugleformet, noget længere end det 2—3-bladede *Hylster*; *Perigonbladene* lancetformede, spidse, længere end *Støvdragerne*.

6—10" høi. Blomsterne violet-røde. 6—7.

Dyrkes i Kjøkkenhaver. Angives af O. F. Müller (i F. D.) fra Hindsø i Fyen, hvilket formodenlig hidrører fra en Feiltagelse, hvis den ikke der tilfældigviis har været forvildet.

457. **A. montanum** [Schmidt. Fl. boëm. IV, p. 28] (Kantet L.) Fr. mant. 2, p. 18; Rchb. l. c. tab. 500, fig. 1094;

A. angulosum L. (ex part.), Nolt. nov. p. 33 (?); H. II, 163 (?); F. D. 2110; *A. fallax* R. & S., H. N. V, 70.

Løgene udgaae fra en forlænget, næsten vandret *Rodstok*; *Bladene* smalt linieformede, flade, omtrent femnervede; *Skaftet* oventil skarpkantet; *Hylsteret* 2—3-bladet, af den hvælvede, mangeblomstrede *Skjærms* halve Længde; *Støvdragerne* længere end *Blomsterdækket*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Blomsterne rosenrøde, brune Støvdr. (Fr.). 7. 4.

Paa Lyngbakker og Heder, kun bemærket i *Slesvig*: Gelting Birk, Hedebacker ved Læk, Egekrat ved Königsmark pr. Husum (16), mellem Schauendal og Olderup (N.). 16

Anm. Saavel Fig. i F. D. som de slesvigske Exemplarer jeg har seet (fra Gelting) stemme bedst overeens med *A. montanum* hos Rehb. (l. c.). Nolte (l. c.) angiver fremdeles *A. senescens* som funden i *Sl.* (mellem Enge og Læk). Da jeg ikke har seet Expl. fra dette Voxested og ingen Synonymer ere anførte, er jeg uvis om hvorhen denne hører; muligviis til *A. acutangulum* Schrad., (Rehb. 1095; *A. fallax* * *serotinum* Fr. l. c.), som adskilles ved høiere og mere kantet Stængel, længere og bredere Blade med tydeligere Midtnerve samt indsluttede Støvdragere. Af samme Grund er jeg ikke sikker paa, om de fra N. og H. anførte Synonymer ere rigtigt anvendte, saa meget mindre som Synonymiken af de 2 Arter er meget forviklet. Disse ere dog maaskee kun 2 Former af samme Art (Irmisch, Zwiebelgew. p. 17 erklærer Charactererne fra Bladnerverne og Støvdragerne for vaklende), frembragte ved Forekomst paa forskjellige Localiteter (*A. acutangulum* angives at voxer paa Enge).

bb. Bladene lancetformede, med Sideaarer, Blomsterne hvide.

458. *A. ursinum* L. (Rams-L.) H. 364; Drej. n. 387; F. D. 757; Rehb. l. c. tab. 507, fig. 1109; H. N. II, 61.

Løget aflang-lancetformet, solidt; 3 *Blade*: det ydre hindeagtigt uden Plade, de 2 øvrige langstilkede, med flad Plade; det yderste af disse med en hindeagtig Skede omfattende det trekantede, paa Underfladen concave *Skaft* og det inderste Blads kjødfulde Skede; *Hylsteret* dybt 2—3-deelt, af Længde med den flade, faa- (8—20)-blomstrede *Skjærm*; *Løgknopper* 0; *Støvdragerne* kortere end *Blomsterdækket*.

Bladpladerne vende Underfladen opad; *Løget* dannes af det inderste Blads kjødfulde Skededeel, som i Aarets Løb fortæres med Undtagelse af de som krandsstillede Trævler vedblivende Karbundter. *Hylsteret* hurtigt affaldende. 5—6. 4.

Paa skyggefulde, især noget fugtige Steder i Skove, oftest i

Strandegne; ikke alm., men bemærket i alle Provindser, og hvor den voxer, (oftest under Egefræer), udbreder den sig stærkt og findes alm. i stor Mængde.

13. Ornithogalum. Fuglemælk.

† 459. **O. nutans** L. (Nikkende F.) H. 370; Drej. n. 386; F. D. 912; Albuca Rchb. l. c. X, tab. 473, fig. 1031.

Blomsterne (efter Afblomstringen) nikkende, i ensidig Klase; *Blomsterstilkene* kortere end *Dækbladene* og *Blomsterdækket*; *Støvtraadene* hindeagtige, *de 3 indre* længere, linieformede, trekløvede (den midterste Flig kortere, støvknappbærende), *de ydre* mindre, oval-lancetformede, hele eller udrandede; *Frugtknuden* rundagtig, i Spidsen indtrykt, under Blomstringen kortere end *Griffelen*.

Blomsterne indvendig hvide, udvendig grønne. 4—5. 4.

Ved Gjærder og paa skyggefulde Steder omkring Byer og Haver, funden i alle Provindser, men ikke overalt. Synes oprindeligt at være udvandret fra Haver. 3

† 460. **O. umbellatum** L. (Halvskjærmblostmest F.) H. 369; Drej. n. 385; F. D. 1266; Rchb. l. c. tab. 467, fig. 1019.

Blomsterne i Halvskjærm, *Blomsterstilkene* udspærrede eller opstigende, længere end *Dækbladene* og *Blomsterdækket*; *Støvtraadene* lancetformede, udeelte; *Frugtknuden* oval, under Blomstringen længere end *Griffelen*.

Bladene mørkgrønne med hvid Midtnerve; Blomsterne indvendig hvide, udvendig grønne. 5. 4.

Paa lignende Steder som foreg., men sjældnere, og ligesom hiin oprindeligt indført.

14. Anthericum. Edderkopurt.

461. **A. ramosum** L. (Grenet E.) H. 371; Drej. n. 391; F. D. 1157; Rchb. l. c. tab. 511, fig. 1114; H. N. VI, 65.

Stængelen oventil grenet (dannende en Top); *Bladene* linieformede, noget rendede; *Dækbladene* flere Gange kortere end *Blomsterstilkene*; *Griffelen* ret.

Blomsterne hvide. 7. 4.

β, *Pseudo-Liliago*! Stængelen ugrenet, Blomsterne i Klase.

Paa Bakker, mellem Krat, sjelden: *Sj.* Jægerspriis (21), Frederikssund (Feddersen), Veile Viig i Voldborg Herred, Leire (Kyll.), Bidstrupgaard, Slingerup, Søllerød, Ørholm (H.), Brede Bakker! *β*, (som i Udseende ligner følg.) ved Brede med Hovedarten, og i enkelte Aar fremherskende fremfor denne (F. Schmidt), Nymølle (14). [*

462. **A. Liliago** L. (Ugrenet E.) H. 372; Drej. n. 392; F. D. 616; Rchb. l. c. fig. 1115; H. N. VI, 65.

Stængelen ugrenet; *Blomsterne* i Klase; *Bladene* linieformede, rendede; *Dækbladene* af *Blomsterstilkenes* halve Længde; *Griffelen* opstigende.

Blomsterne hvide, større end hos foreg. 6—7. 4.

I Kratskove, sjelden: *Sj.* Jægerspriis (9), mellem Bidstrup og Roeskilde, Fortunen (H.); *Sl.* mellem Schauendal og Olderup (N.), Egekrat ved Engelsborg pr. Husum (16). [†

Anm. Jeg har ikke seet *sjællandske* Expl. af denne Art, og maaskee henhøre de fra *Sj.* anførte Voxesteder til var. *β* af foreg., idetmindste synes dette at være Tilfældet med den af O. F. Müll. (F. D. l. c.) omtalte Form fra Kobbermøllen (?). Fig. i F. D. fremstiller dog den ægte *A. Liliago*, hvortil ogsaa de *slesvigske* Expl. henhøre.

15. Narthecium. Beenbræk.

463. **N. ossifragum** [Huds. Fl. angl. 145] (Sværdbladet B.) H. 372; Rchb. l. c. tab. 421, fig. 936; H. N. XIV, 73; Anthericum L., F. D. 42.

Rodstokken krybende (beklædt med Trævler af de henvisnede Blades Karbundter); *Rodbladene* linieformet-sværdformede; *Stængelbladene* skedeformigt omfattende; *Blomsterne* i Klase; *Blomsterstilkene* med et *Dækblad* ved Grunden og et ovenfor Midten; *Perigonbladene* længere end *Støvdragerne*, kortere end den spidse *Kapsel*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Blomsterne gule. 7—8. 4.

I Tørv- og Hedemoser, kun bemærket paa *Halvøen*, i hvis vestlige og midterste Egne den ikke er sjelden; sparsommere mod Ø., f. Ex. J. Randers (7), Riis Mose mellem Horsens og Skanderborg (2), Brøndsted ved Fredericia! *Sl.* Aabenraa (Grønlund), Flensborg! Oxager i Angel (14).

16. *Juncus*. Siv.

a. Frøene med en til begge Sider udvidet Frøhud.

464. *J. maritimus* [Lam. Dict. 3, 264] (Strand-S.) H. 383; Drej. n. 360; F. D. 1689; Rchb. ic. fl. germ. IX, tab. 402, fig. 895; H. N. IX, 69.

Rodstokken vandret; *de nedre Blade* skedeformede, uden Plade; *de øvre* nedentil omskedende, oventil ligesom de blomsterbærende og blomsterløse (nøgne) *Stængler* trinde, uleddede, sylspidset-stikkende; *Blomsterstanden* en dobbelt sammensat, falsk-sidestillet*) Qvast med oprette Grene; *de ydre Perigonblade* spidse, *de indre* budte med en Braad, alle af Længde med den elliptiske, braadspidsede *Kapsel*.

1—2' høi og meget stiv. 8—9. 7.

Paa Strandenge, især i lerede Huller, som Vandet af og til overskyller: *Sj.* Kalundborg (H.), Jægerspriis (28), Saltholm (9), Holmene ved Præstø, Vordingborg (H.), Holsteinborg (17) o. fl. St. i Egnen af Skjelskør; *F.* Langø ved Hindsholm! Østerøen ved Nyborg (Lund), Aastrup, V. Skjerninge; *Thorseng*, *Langeland* (12); *Loll.* Nakskov, Bjerremark, Kjeldernæs; *Falst.* mellem Stubbekjøbing og Grønsund (19), Nøisomhed, Klodskov, Vennerslund (14); *J.* Nebbegaard ved Lillestrand! Aarø i Lillebelt (8); *Als* (H.); *Sl.* ikke sjelden paa Østkysten fra Aabenraa mod S., *Femern* (N.).

b. Frøene uden (eller med en utydelig) Frøhud.

aa. *Blomsterbærende og blomsterløse Stængler* nøgne, med bladløse *Skeder ved Grunden* (*Blomsterstanden* falsk-sidestillet).

465. *J. conglomeratus* L. (Knop-S.) H. 380; Drej. n. 361; F. D. 1094; Rchb. l. c. IX, fig. 912—13.

Tueformet; *Stængelen* fint stribet, med sammenhængende Marv; *Blomsterstanden* dobbelt sammensat af kortstilkede Nøgler; *Perigonbladene* lancetformede, tilspidsede; *Støvdragerne* 3; *Kapselen* omvendt-ægformet, trekantet, indtrykt, med Griffelens vorteformede Basis i Indskjæringen.

*) Falsk-sidestillet kaldes Blomsterstanden fordi den forlængede Spids, fra hvis Side den synes at frembryde, maa ansees som et Hylsterblad og ikke som en Fortsættelse af Stængelen.

De bladløse Skeder lysbrune. Blomsterstanden tæt, næsten kugleformet. Var. med længere Grene og Nøglerne derved fjernede fra hinanden. (En saadan Form med blegere og mindre Blomster er *J. subuliflorus* Drej. n. 362). 6—7. 4.

Paa fugtig Leerjord, ved Grøfter og paa Overdrev, forekommer i alle Provindser, sjældnere i det nordlige *Jyll.* (Drej.). β , en Skyggeform: *Sj.* ved Fuursøen (Dr.); *J.* Sæbygaards Skov i Vendsyssel (12); *Sl.* Aabenraa!

466. *J. effusus* L. (Lyse-S.) H. 381; Drej. n. 363; F. D. 1096; Rehb. l. c. fig. 920; H. N. IX, 70.

Tueformet; *Stængelen* jævn, ved Tørring meget fint sribet, med sammenhængende Marv; *Blomsterstanden* dobbelt sammensat, med forlængede *Blomsterstilke*; *Perigonbladene* lancetformede, tilspidsede; *Støvdragerne* 3 eller 6; *Kapselen* omvendt-ægformet, trekantet, indtrykt, med forkortet *Griffel* udgaaende fra Indskjæringen.

De bladløse Skeder lysbrune. Blomsterstanden alm. en fjernblomstret Qvast, var. (β , *compactus* Leight.) med sammentrængt Blomsterstand og desuden forekommer en Afændring med de ydre Grene i Qvasten topskydende. (γ , *prolifer* Sond.). 6—7. 4.

Paa lignende Localiteter som foreg., i de fleste Egne hyppigere end hiin. β , *Loll.* Torrig Skov (19); anføres ogsaa af Drej. (Krøytidskr. III, 415); γ , *Falst.* ved Grønsund (19).

Anm. Paa Grund af Afændringsformer kan den ofte forvexles med foreg., og forenes af Flere med denne; (*J. communis* Mey.); dog synes de typiske Former af begge vel adskilte i Naturen, om end vanskelige at begrænde ved bestemte Kjendetegn.

467. *J. glaucus* [Ehrh. Beitr. 6, 83] (Blaagraa S.) H. 382; Drej. n. 364; F. D. 1159; Rehb. l. c. fig. 922; H. N. I, 69.

Rodstokken sammentrængt, tueformet; *Stængelen* dybt sribet, blaagraa, med afbrudt Marv; *Blomsterstanden* dobbelt eller flere Gange sammensat, qvastformet, med spredte, forlængede *Grene* og *Blomsterstilke*; *Perigonbladene* lancetformede, tilspidsede, *de ydre* lidet længere, *de indre* kortere end den ovale eller elliptiske, budte, af den vedblivende *Griffelbasis* braadspidsede *Kapsel*.

2—3' høi. De bladløse Skeder mørk-kastaniebrune. 7—8. 4.

Ved Sø- og Aabredder, fugtige Steder paa Gruus- og Leergrund, især i Strandegne, bemærket i alle Provindser sporadisk, men ikke sjelden (f. Ex. meget hyppig paa Bornholm!) *

Ann. *J. diffusus* Hoppe, som adskilles fra denne ved en mere grøn Farve og sammenhængende Marv, fra de 2 foreg., ved rødbrune Skeder og 6 Støvdragere, kunde muligviis findes i vor Flora.

468. **J. balticus** [Willd. Berl. Mag. 1809, p. 288] (Klit-S.) H. 381; Drej. n. 365; Rchb. l. c. fig. 917; H. N. I, 68.

Rodstokken vandret krybende; *Stængelen* jævn, i tørret Tilstand sribet, med sammenhængende *Marv*; *Blomsterstanden* enkelt eller dobbelt sammensat; *Perigonbladene* æg-lancetformede, de ydre spidse, de indre kortere, budte med en kort Braad; *Kapselen* elliptisk, braadspidset af den vedblivende Griffelbasis, af Længde med eller længere end de ydre *Perigonblade*.

Lavere ($\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi), men mere robust end foreg., Kapselen næsten dobbelt saa stor; de bladløse Skeder lysbrune. 7—8. 4.

* *inundatus* (*J. inundatus* Drej.; F. D. 2287; Rchb. l. c. fig. 916). Stængelen lavere og meget finere, Blomsterstanden enkelt, forøvrigt som Hovedarten.

I Sandklitter; ikke sjelden i den nordvestlige Deel af *Jylland* fra Skagen til Holstebro (Drej., Poulsen)! *Bornh.* ved Frydenlund N. for Rønne! Flyvesand Ø. for Boderne! * med Hovedarten; *J. Tranum* Strand (Dr.), Hjortdal (16)! Kollerup, Bulbjerg, Nors Klit (Dr.)!

469. **J. filiformis** L. (Traadstænglet S.) H. 382; Drej. n. 366; F. D. 1207; Rchb. l. c. fig. 919.

Rodstokken vandret krybende; *Stænglerne* i Spidsen bøiede, jævne, ved Tørring sribede, med sammenhængende Marv; *Blomsterstanden* en enkelt, faablomstret Qvast omtrent paa Midten af Stængelen; *Perigonbladene* lancetformede, spidse; *Kapselen* næsten kugleformet, budt med en meget kort *Griffel*.

Stænglerne $\frac{1}{4}$ —1' høie, traadformede; de bladløse Skeder lysbrune. 7—8. 4.

I Tørv- og Hedemoser, alm. i *Halvøens* Hedeegne og paa *Bornh.* i *Sjæll.* sporadisk i den nordlige Deel, sjeldnere mod S. og paa de andre Øer: *Falst.* ved Bøtø (5); *Thorseng* ved Bregninge! *Æro* (10).

bb. Alle Stænglerne bladbærende (Blomsterne endestillede, i Nøgler eller oftere i en af talrige Nøgler enkelt eller dobbelt sammensat Qvast).

α. Bladene afdeelte ved Led paatværs.

470. **J. obtusiflorus** [Ehrh. Beitr. 6, 83] (Budtblomstret S.) H. 384; Drej. n. 371; F. D. 1872; Rehb. l. c. fig. 901; H. N. I, 70; J. retroflexus Rafn II, 486.

Rodstokken vandret; Stænglerne oprette, 2—3-bladede, tiligemed Blade og Bladskeder trinde; Blomsterstanden en dobbelt sammensat Qvast med efter Blomstringen tilbagebøiede Smaagreene; Perigonbladene ligelange, budte, lidet kortere end den ægformede, tilspidsede, trekantede Kapsel.

1—2' høi. Dækblade og Perigonblade rødligt anløbne, i Randen hvidhindede. 7—9. 4.

I Hængedynd og paa vaade Enge, sporadisk og ikke hyppig, men funden i alle Provindser (undtagen Bornh.). *

471. **J. acutiflorus** [Ehrh. Beitr. 6, 82] (Spidsblomstret S.) H. 385; Drej. n. 368; F. D. 2112; Rehb. l. c. fig. 906—7; J. silvaticus Reichard.

Rodstokken vandret; Stænglerne oprette, 3—4-bladede, tilligemed Blade og Bladskeder trindt-sammentrykte, Bladenes Tværskillevægge tydelige, ingen Striber paalangs; Blomsterstanden en dobbelt sammensat Qvast, med korte, udspærrede Smaagreene; Perigonbladene sylspidsede, de indre længere, i Spidsen tilbagebøiede, alle kortere end den ægformede, langt-tilspidsede Kapsel.

1½—3' høi. Planten større og kraftigere, Blomsterne mindre end hos de følgende Arter af samme Afdeling. 7—8. 4.

β, macrocephalus Koch. Nøglerne dobbelt saa store, paa længere Grene.

I Tørvmoser og paa fugtige Enge, ikke alm. og hidtil, saavidt mig bekjendt, kun funden paa *Halvøen*: Borre Sø ved Silkeborg (7)! Østbirk (2)! mellem Ribe og Medolden (16)! Hjortlund (12), Papirmøllen ved Flensborg! Pulverholz Eng ved Slesvig (16), Husum, Rendsborg! *β*, med Hovedarten ved Flensborg, Brøndsted i *Jyll.*!

Anm. Det i H. N. VII, 71 indeholdte Expl. under Navn af J. acutiflorus fra Stockholm (Nyman), tilhører en Form af J. alpinus.

472. **J. lamprocarpos** [Ehrh. Calam. n. 126] (Glandskapslet S.) Drej. n. 369; Rehb. l. c. fig. 902—4; *J. articulatus* (α) L., F. D. 1097; H. N. V, 71.

Tueformet; *Stænglerne* opstigende, 3—6-bladede, tilligemed *Blade* og *Bladskeder* trindt-fladtrykte, Bladenes *Skillevægge* tydelige, Mellemmummene (ved Tørring) fint sribede; *Blomsterstanden* en dobbelt sammensat Qvast med udspærrede *Grene*; *Perigonbladene* ligelange, de ydre spidse, de indre budte med en Braad, alle kortere end den trekantede, æg-lancetformede, braadspidsede *Kapsel*.

$1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}'$ høi. Kapselen glindsende sort eller mørkbruun. Nøglerne større end hos de 2 foreg. 7—8. 4.

β , *repens* (*J. repens* Nolt. nov.) Stængelen krybende (eller i Vand flydende), rodslaaende.

γ , *pauciflorus* Sond. fl. Hamb. p. 193 (*J. nigritellus* D. Don, Bab. man.; *J. articulatus* β , subatratus H. N. XII, 72). Qvastens *Grene* færre og mere oprette, færre *Blomster* i Nøglerne.

δ , *multiflorus*! Nøglerne større, mangeblomstrede; de nedre *Grene* paa Stængelen udgaae *nedenfor* Bladet.

I Tørvmoser, paa Enge og ved Grøfter alm. udbredt. β , ved sandige Søbredder eller i selve Vandet; γ , med Hovedarten paa magrere Grund; δ , paa fugtige Steder, sjældnere, f. Ex. *J. Skagen* (Drej.), Toftegaard i Store Vildmose, Rørbek Sø ved Ø. Nykirke! *Sl.* mellem Limsig og Schwabstedt (Didr.); *Sj.* Flommen ved Sorø (12). Denne sidste svarer omtrent til Bekr. af *J. lagenarius* Laharp., Gren. & Godr. fl. Fr. III, 346; (*J. repens* Req.), men forekommer mig ikke tilstrækkelig adskilt fra *J. lamprocarpos*.

473. **J. atricapillus** [Drej. i Krøyt. Tidsskr. II, 182] (Sorthoved-S.) *J. atratus* H. N. XI, 68 (ikke Krock.).

Rodstokken vandret; *Stænglerne* oprette, 2—3-bladede, svagt fladtrykte; *Bladskederne* paa Ryggen kjølede; *Bladene* med tydelige *Skillevægge*, ved Tørring fint sribede paalangs; *Blomsterstanden* en dobbelt sammensat Qvast med oprette *Grene*; de indre *Perigonblade* budte, de ydre lidet længere, spidse, kortere end den æg-lancetformede, braadspidsede *Kapsel*.

1 — $1\frac{1}{2}'$ høi. Nærmest beslægtet med følgende, tra hvilken den dog er let kjendelig ved *Perigonbladene* og et aldeles forskjelligt Ha-

bitus, ikke ulig rigblomstrede Former af *J. compressus*. Blomster og Kapsel mørkbrune. 8—9 (meget senere end de beslægtede Arter). 4.

Forekommer under 2 Former:

α , *congestus*! Lavere; Qvasten kortgrenet og tætblomstret, med større Nøgler.

β , *sparsiflorus*! (*J. anceps* Laharp., Gren. & Godr. Fl. fr. III, 347; *J. nigricans* Rehb. 911), høiere af Væxt, med længere og finere Grene, færre Blomster i Nøglerne.

I *Halvøens* Sandklitter langs Vesterhavet ikke sjelden fra Skagen (Drej.) til Eidersted (16), samt paa de vestlige Øer: Rømø (16), Amrom (20)! Sild (28)! følger paa enkelte Steder Sandstrækningerne længere ind i Landet: Øland, Holstebro (16), Varde! De 2 Former synes hos os at være lige hyppige. (Fra Vestfrankrigs sandige Kystr har jeg Expl. under Navn af *J. anceps* Laharp.? (Letourneux), som aldeles svare til Formen β). [5]

Anm. *J. atratus* Krock., Fr. mant. 3, p. 23, Rehb. 909—10, med 2—3' høie, opstigende Stængler, tydeligt og i tørret Tilstand dybt sribede Blade, Perigonbladene braadspidsede (de indre længere), omtr. ligelange med den ægformede, braadspidsede Kapsel, kunde muligviis findes i vor Flora. Den synes (efter Beskr. og Afbildn. hos Rehb.) at være nærmere beslægtet med *J. acutiflorus* og *lamprocarpos* end med foreg.

474. ***J. alpinus*** [Vill. Dauph. II, p. 233] (Sodfarvet S.) H. II, 169; F. D. 2171; Rehb. l. c. fig. 896—900; H. N. VI, 66 og VII, 71 (*J. acutiflorus*); *J. ustulatus* Hpp., Drej. n. 370; Lge. Hndb. 1 Udg. n. 461.

Rodstokken vandret; *Stænglerne* oprette eller opstigende, 2—3-bladede, næsten trinde; *Bladskederne* paa Ryggen kjølede; *Bladene* ved Tørring fint sribede paalangs; *Blomsterne* i enkelt eller sammensat Qvast med oprette *Grene*; *Perigonbladene* budte, de ydre med en Braad nedenfor Spidsen, ligelange, kortere end den æg-lancetformede, braadspidsede *Kapsel*.

$1\frac{1}{2}$ —1' høi, finere end de foreg., Perigonbladene sodfarvede, Kapslerne glindsende sortbrune. 7—8. 4.

β , *rariflorus* Hartm. (H. N. VII, 72). Qvasten fjernblomstret, med 2—5-blomstrede Nøgler og blegere Blomster.

I fugtige Enge og Klitmoser: i *Halvøens* vestlige og nordlige Deel paa flere Steder (Drej., N.), *Als* (10); *Sj.* sjældnere: Bidstrupgaard (N.), Fuursøen ved Kaningaarden (9), Mosen mellem Ermelund

og Ordrups Krat! (Fra de andre Øer er den mig ikke bekjendt).
 β, ved Gurre Sø (8)! [*

475. **J. supinus** [Moench Pl. bass. n. 296] (Liden S.)
 H. 386; F. D. 1099; Rchb. l. c. fig. 882—86; H. N. V, 72;
 J. bulbosus L. Sp. ed. 1; J. uliginosus Roth, Drej. n. 367.

Tueformet, med sammentrængt, ofte knollet *Rodstok*, *Bladene* traadsmale, paa Overfladen rendede, utydeligt leddede paatværs; *Blomsterstanden* en enkelt eller sammensat Qvast med faae og fjerntsiddende Nøgler; *de ydre Perigonblade* spidse, *de indre* budte, alle ligelange og lidet kortere end den budte, braadspidsede *Kapsel*; 3—6 *Støvdragere*; *Støvknapperne* af Længde med Støvtraadene.

2—8" høi. Stænglerne traadformede. 7—8. 4. En meget foranderlig Plante i Henseende til Stængelens Retning, Blomsterstanden, Nøglernes Størrelse, Blomsternes Farve o. s. v. De vigtigste Former ere:

α, terrestris. Stænglerne oprette eller opstigende; Blomsterne bruunagtige.

β, repens. Stængelen krybende.

γ, fluitans (J. subverticillatus Wulf., F. D. 817; H. N. II, 64). Stængelen flydende, med forlængede Blomsterstilke; Nøglerne omgivne af Bladknipper; Blomsterne grønlig.

Alm. udbredt i alle Provindser: α, paa fugtig Hedejord, tørvholdige Enge; β, paa oversvømmede Steder; γ, i selve Vandet, især i Tørvmoser.

β. Bladene uden Tværskilleægge.

αα. *Perigonbladene af Længde med eller kortere end Kapselen.*

476. **J. squarrosus** L. (Børstebadet S.) H. 383; Drej. n. 372; F. D. 430; Rchb. l. c. fig. 893; H. N. XV, 72.

Tueformet; *Rodbladene* talrige, stive, børsteformede, rendede, de ældre udspærrede eller opstigende; *Stænglerne* oprette, fladtrykte eller svagt kantede, ved Grunden enbladede, forøvrigt bladløse; *Blomsterstanden* en sammensat Qvast, med en eller faablomstrede *Blomsterstilke*; *Perigonbladene* budte, af Længde med den omvendt-ægformede eller ovale, budte, braadspidsede *Kapsel*; *Støvknapperne* 4 Gange længere end Støvtraadene.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kapsel og Perigonblade glindsende graabrune, de sidste, ligesom de rødlige Dækblade, i Randen hvidhinede. 6—8. 4.

I Tørv- og Hedemoser, paa tørre og magre Enge, alm. udbredt, især hyppig i *Halvøens* Hedeegne og paa *Bornholm*; sjældnere i *Fyen*! og paa *Falst.* (14), ikke funden i *Loll.* (19).

477. **J. compressus** [Jacq. Enum. stirp. agr. vind. p. 60] (Fladstraaet S.) Drej. n. 373; Rehb. l. c. fig. 890—92; *J. bulbosus* L. Sp., ed. 2; H. 387; F. D. 431; H. N. IX, 71.

Rodstokken krybende eller sammentrængt; *Stænglerne* trindt-fladtrykte, med 1 Blad omtrent paa Midten; *Bladene* linieformede, rendede; *Blomsterstanden* en enkelt eller sammensat Qvast med oprette Grene; *Perigonbladene* budte, omtrent halvt saa lange som den næsten kugleformede, kort braadspidsede *Kapsel*; *Griffelen* halvt saa lang som Frugtknuden.

$\frac{1}{4}$ —1' høi. Stænglerne ofte forneden knolleformigt opsvulmede. Perigonbladene brune med hindeagtig Rand og grøngul Midtnerve. 7—8. 4.

Paa Enge saavel i Nærheden af Havet som inde i Landet, alm.

478. **J. Gerardi** [Lois. Not. p. 60] (Botnisk S.) Rehb. l. c. fig. 888—89; H. N. X, 63; *J. bottnicus* Wahlenb., Drej. n. 374; F. D. 2411; *J. bulbosus maritimus* H. 387.

Stænglerne næsten trinde, oventil trekantede; *Perigonbladene* budte, næsten af Længde med den ovale, svagt trekantede *Kapsel*; *Griffelen* af Frugtknudens Længde, forøvrigt som foreg., hvilken den meget ligner, og af hvilken Mange ansee den for en Afart. 7—8. 4.

Paa Strandenge ikke sjelden, især hyppig paa Øerne og ved Fjordene paa Halvøens Østkyst.

ββ. *Perigonbladene længere end Kapselen.*

479. **J. tenuis** [Willd. Sp. pl. II, p. 214] (Tue-S.) F. D. 2468; Rehb. l. c. fig. 887.

Rodstokken sammentrængt, tueformet, *Stænglerne* flere, oprette, fine, kun forneden bladbærende; *Bladene* linie-traadformede, rendede, oprette; *Blomsterstanden* en kortgrenet Qvast omgivet af 2—3 lange Dækblade ved Grunden og med 3—5 tæt

sammenhobede Blomster paa Grenene; *Perigonbladene* ligelange, lancetformede, tilspidsede, trenervede, lidet længere end den ægformet-ovale *Kapsel*.

6—10" høi, med talrige Blade fra Rodstokken. *Perigonbladene* guulgrønne med hvidhindet Rand; *Kapselen* blegbrun. 7—8. 4.

Expl. fra mager Jord paa *Ærø* (10) findes i J. Vahls Herbarium. Da den ogsaa voxer i Holsteen, kunde den maaskee findes paa flere Steder i Landet. [3]

Anm. Fra *J. bufonius fasciculatus* kjendes den ved en vedvarende Rodstok og kortgrenet Qvast, fra yngre Former af *J. compressus* ved de tilspidsede *Perigonblade*, som ere længere end *Kapselen*.

480. **J. Tenageja** [Ehrh. Beitr. 4, 148] (Tyndstænglet S.) H. 388; F. D. 1160; *Tenageja Vaillantii* Thuill., Rechb. l. c. fig. 923.

Stænglerne trinde, 1—2-bladede; *Bladene* børsteformede, forneden rendede; *Blomsterstanden* qvastformet, med udstaaende *Grene* og spredte, enlige *Blomster* (paa tydelige *Blomsterstilke*); *Perigonbladene* æg-lancetformede, sylspidsede, de indre af Længde med de ydre, længere end den budte, næsten kugleformede *Kapsel*.

2—8" høi; fleerstænglet, med traadfine *Stængler*; *Kapsler* og *Perigonblade* brune, de sidste med grøn Midtnerve. 6—8. ☉.

Tørv- og Hedemoser, sandige Overdrev, kun funden paa Halvøen: Fra *Jyll.* (hvorfra den angives af H.) er mig intet Voxested bekendt; *Sl.* Rødemis ved Husum, Wittensee (16). [3]

481. **J. bufonius** L. (Tudse-S.) H. 388; Drej. n. 375; F. D. 1098; Rechb. l. c. fig. 872—76.

Stængelen trind, en-fleerbladet; *Bladene* børsteformede, forneden rendede; *Blomsterstanden* en Qvast med oprette *Grene* og enlige, spredte *Blomster* (siddende eller meget kortstilkede i Vinklerne og langs Siderne af Grenene); *Perigonbladene* lancet-sylformede, tilspidsede (de ydre længst), alle længere end den omvendt-ægformede, budte *Kapsel*.

4—8" høi, fleerstænglet og fleerblomstret; *Perigonbladene* hvidhinde med grøn Midtnerve. 6—8. ☉.

β , *fasciculatus* Koch, H. N. VII, 73; (*J. insularis* Viv.,

Rehb. l. c. fig. 877—81). 1—4" høi, Blomsterne 2—3 samlede i Nøgler.

Paa fugtig Grund meget alm.; β , ved Sø- og Aabredde: *Sj.* Damhuussøen (27), Flaskekroen! *F.* Martofte paa Hindsholm! *J.* Skjern Aa ved Lønborg! Rørbæk Sø! Nebbegaard! Ørnsø ved Ribe (12); *Sl.* Seemühle ved Rendsborg! St. Peter i Eidersted (16).

482. *J. pygmæus* [Thuill. Fl. par. 178] (Dværg-S.) H. II, 171; F. D. 1871; H. N. XI, 69; *J. triandrus* Rehb. l. c. fig. 864.

Stængelen opret; *Bladene* børsteformede, rendede, samlede ved Roden; *Blomsterne* i 3—4-blomstrede Nøgler, som sidde enlige eller 2—3 samlede i Enden af *Stængelen* (det ene stilket, det andet siddende); *Perigonbladene* lancet-sylformede, lidet længere end den trekantede, pyramideformede *Kapsel*; 3 *Støvdragere*.

1—3" høi. En—fleurstænglet. 7—8. ☉.

Paa fugtig Sandjord i Klitterne mod Vesterhavet paa *Halvøen*: Thy (Dr.), Løkken (7), Langslade Rende ved Blaavandshuk (30)! *Sl.* List paa Sild, Eidersted (N.). ☒

483. *J. capitatus* [Weig. Obs. bot. p. 28] (Fiinbladet S.) H. 389; F. D. 1690; Rehb. l. c. fig. 862; H. N. I, 71.

Stængelen opret, traadformet, bladløs, ved Grunden omgivet af børsteformet-haarformede, rendede *Blade*, som ere kortere end *Stængelen*; *Blomsterne* 3—6 samlede i 1—2 endestillede Nøgler (det ene stilket, det andet siddende); de indre *Perigonblade* ægformede, spidse, lidet kortere end de ydre (langt tilspidsede), næsten dobbelt saa lange som den budte, ægformede *Kapsel*; 3 *Støvdragere*.

1—6" høi. En—fleurstænglet, Perigonbladene rødbrune med hindeagtig Rand og grøn Rygnerve. 6—8. ☉.

Sandige Overdrev og fugtige Steder mellem Klitterne samt ved Veie i Hedeegnene; hist og her i *Halvøens* Sandstrækninger, paa Øerne sjelden: *Sj.* Adserbo Overdrev ved Frederiksværk! *Bornh.* ved Veie N. for Rønne og mellem Rønne og Pythuset! ☞

Ann. J. triandrus Gouan (*J. pygmæus* Rehb. l. c. 863) adskilles efter Koch væsenligt kun ved udstaaende Dækblad og hele Plantens rødbrune Farve. Denne findes muligen ogsaa i vor Flora, men er neppe en fra foreg. adskilt Art.

17. Luzula. Frytle.

a. Blomsterne i Halvskjærm med enblomstrede eller qvastformet 2—3-blomstrede Blomsterstilke.

Frøene med en seglformet Frøhud i Spidsen.

484. **L. pilosa** [Willd. En. hort. berol. I, 393] (Haaret F.) H. 395; Drej. n. 359; F. D. 2533; Rchb. l. c. fig. 848—49; L. Herb. VIII, 145; *Juncus pilosus* L.; *L. vernalis* DC.

Bladene linie-lancetformede, langhaarede; *Blomsterstilkene* efter Afblomstringen tilbagebøiede; *Perigonbladene* ligelange; *Kapselen* trekantet, pyramideformet, budt med en Braad.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Perigonbladene sortbrune, glindsende, med hindeagtig Rand. 4—5. 4. Var.

β , *simplex* Sonder Fl. Hamburg. p. 199. Rodbladene næsten linieformede, Blomsterstilkene oprette (ved den bøiede Frøhud forskjellig fra *L. Forsteri* DC., som den noget ligner).

Almindelig i Løvskove. β , Haven Skov i Vendsyssel (12).

Anm. *L. Forsteri* DC., som adskilles ved linieformede Rodblade, Blomsterstilkene efter Afblomstringen oprette, Frøhuden ret, kunde muligviis forekomme i vor Flora. (Den er funden af Prof. Nolte i Holsteen).

b. Blomsterne i faa- (3—5-) blomstrede Nøgler, samlede til en 2—3-dobbelt sammensat Halvskjærm, Frøene uden eller med en svag, vorteformet Frøhud i Spidsen.

485. **L. maxima** [DC. Fl. fr. III, p. 160] (Stor F.) H. 396; H. N. XIV, 74; *L. silvatica* Gaud., Rchb. l. c. fig. 861; *Juncus pilosus* δ , L., F. D. 441.

Bladene bredt-linieformede, i Randen langhaarede; *Stængelbladene* kortere end Ledstykket ovenfor samme; *Dækbladene* kortere end Blomsterstanden; *Perigonbladene* ligelange, tilspidsede, omtrent af Længde med den ægformede, braadspidsede *Kapsel*.

1—2' høi. Perigonbladene mørkbrune, med blegere hindeagtig Rand. 5—6. 4.

I høitliggende Bøgeskove, forekommer kun i den vestlige Deel

af Landet og synes her at have sin Østgrændse: **J.** Hald Bøgeskov ved Viborg (H.), Kalbygaard (12), Himmelbjerget, Silkeborg! og derfra med **S.** ikke sjelden i Skovene paa Halvøens Østkyst; **F.** Strandkliner ved Kongebroen (12)! Fænø (8)! *

486. **L. albida** [DC. l. c. p. 159] (Blegblomstret F.) H. 395; Drej. n. 358; F. D. 2467; Rehb. l. c. fig. 854; H. N. XII, 74.

Bladene linieformede, langhaarede; *Stængelbladene* længere end Ledstykkerne; *Dækbladene* længere end Blomsterstanden, hvis nederste Green er langt fjernet fra de øvre; *Perigonbladene* æg-lancetformede, spidse (de ydre kortere), alle lidet længere end den trekantede, spidse *Kapsel*.

1—1½' høi. Perigonbladene hvide eller i Midten kjødfarvet-blegbrune. 6—7. 4.

I Skove, meget sjelden i Danmark: **Sj.** Gjels Skov (9)! **SL.** Schwabstedter Holz (16). [*]

c. Blomsterne i mangeblomstrede (axformede) Nøgler, samlede til en Halvskjærm. Frøene med en kegleformet Frøhud ved Grunden.

487. **L. multiflora** [Lejeune Fl. de Spa. I, 169] (Mangeblomstret F.) Rehb. l. c. fig. 838; L. Herb. III, 54; L. erecta Desv., Drej. n. 357; L. campestris erecta H. II, 172; Juncus campestris F. D. 1333.

Rodstokken forkortet, med tueformet samlede *Stængler*, uden Udløbere; *Bladene* linieformede, i Randen, især ved Grunden, langhaarede, tilsidst glatte; *Nøglerne* oftest talrige, *det øvre* siddende, *de øvrige* stilkede, med oprette *Stilke*; *Perigonbladene* tilspidsede, længere end den afrundede, braadspidsede *Kapsel*; *Støvdragerne* omtr. halvt saa lange som Kapselen, *Støvknapp* og *Støvtraad* ligelange; *Griffelen* tidligt affaldende, neppe halvt saa lang som *Arrene*.

½—1' høi. 5—7. 4.

β, *pallescens* (Hopp.) H. N. VI, 67; L. campestris *pallescens* H. 393; Blomsterne blegere, Nøglerne mindre.

γ, *congesta* Fr. (L. congesta Lejeune, H. 394; F. D. 1692).

Nøglerne kortstilkede eller næsten siddende (samlede til et tæt Hoved).

Paa Enge og i Skove alm. udbredt; β , i Skygge, mindre hyppig; γ , Hedemoser og Klitter: *Sj.* omkring Sønder søen ved Jonstrup (14); *J.* Klitter ved Henne! *Sl.* Hedemoser mellem Flensborg og Lyksborg (H.); Husum (F. Müll.), Schulendamm ved Rendsborg (20).

488. *L. campestris* [DC. l. c. p. 161] (Mark-F.) H. 392, Drej. n. 356; F. D. 1386 (var.), Rechb. l. c. fig. 831—33, H. N. XII, 73, L. Herb. III, 53; *Juncus campestris* L.

Rodstokken krybende; *Nøglerne* 3—5 samlede i en Halvskjærm paa tilsidst nikkende *Blomsterstilke*; *Støvdragerne* omtr. af Kapselens Længde, Støvknapperne længere end Støvtraadene; *Griffelen* vedblivende, lidet kortere end de langt fremragende *Ar.*

3—8" høi. 4—5 (har næsten fuldvoxne Frugter naar foreg. begynder at blomstre). 4.

Paa Græsmarker, Fælleder og høie Enge meget alm.

18. *Acorus. Kalmus.*

489. *A. Calamus* L. (Almindelig K.) H. 378; Drej. u. 355; F. D. 1158; Rechb. l. c. X, 956.

Rodstokken krybende; *Bladene* sværdformede; *Stængelen* fladtrykt-vinget, med et linieformet, opret *Hylsterblad* ovenfor Kolben.

Hele Planten har en behagelig og stærkt krydret Lugt, *Bladene* paa Midten paatværs bølgede. 6—7. 4.

Ved Sø- og Aabredde, ikke sjelden i de fleste Egne af Danmark, dog ikke overalt (f. Ex. sjelden i Kolding-Eggen (28) og paa Lolland-Falster! ikke funden paa Bornholm (Hoff).

19. *Calla. Mysse.*

490. *C. palustris* L. (Kjær-M.) H. 902; Drej. n. 876; F. D. 422; Rechb. l. c. VII, 13.

Rodstokken skjævt opstigende, leddet; *Bladene* falsk-fjernervede, hjerteformede, tilspidsede, stilkede og omskedende med en i den øvre Halvdeel fri *Skede*; *Kolben* overalt beklædt med Blomster.

Hylsteret udvendig grønt, indvendig hvidt, Bær røde. 6—7. 4.

I Tørvmoser og Sumper; i flere Egne hyppig, f. Ex. det nordøstlige *Sjæll.* og vestlige *Jyll.* fra Ringkjøbing til Ribe, forøvrigt sporadisk og i enkelte Egne (f. Ex. det sydvestlige Sj., F. og Øerne) sjelden! ikke bemærket paa *Bornh.* (Hoff.) !*

III. Trigynia.

20. Polygonum. Skedeknæ.

a. *Bistorta* Tournef. 1 enkelt Ax eller axformet Klasse i Spidsen af den udeelte Stængel. Kræmmerhusene valseformede, heelt omfattende Stængelen, 3 Grifler, Nød trekantet. 4.

491. *P. viviparum* L. (Topspirende S.) H. 442; F. D. 13.

Rodstokken vandret; *Bladene* lancetformede eller linie-lancetformede, med tilbagerullet Rand; *Bladstilken* uvinget; *Axet* smalt, linieformet, med *Løgknopper* i de nedre og *Blomster* i de øvre Dækblades Hjørner; *Støvdragere* 8, længere end *Blomsterdækket*.

4—8" høi. Blomsterne hvide eller bleggrøde, Støvknapperne violette, Løgknopperne spire ofte medens de endnu sidde paa Planten. 6—7.

I Moser mellem S. Tranders og Romdrup ved Aalborg (H.), mellem N. Tranders og Gudumlund (16), Neufing Mose S. for Aalborg (Juel), Aalborg Exerceerplads (Branth)! de eneste bekendte Voxesteder i Danmark.

492. *P. Bistorta* L. (Tvevreden S.) H. 441; F. D. 421; H. N. XI, 52.

Rodstokken vandret, krumbøiet; *Bladene* aflang-hjerteformede, de øvre siddende, de nedre stilkede med vinget *Bladstilk*; *Klasen* tætblomstret, elliptisk eller valseformet; *Støvdragere* 8, længere end *Blomsterdækket*.

1—1½' høi. Blomsterne bleggrøde. Støvknapperne hvide. 6—7.

Paa Enge, sjelden i Danmark: *J.* Podehuset ved Aalborg (H.), Boller Skov (16), Haraldskjær (12); *Sl.* en Eng ved Flensborg (25), Nyvæk ved Slesvig, Slotsengen og Süderholz ved Husum (16). Paa Øerne angives den fra flere Steder, hvor den enten senere er forsvunden eller maaskee udvandret fra Haver (f. Ex. *Sj.* Gurre Vang

(Heiberg), Dronninggaard (H.), Leersøen (19), Vedbæk, Roeskilde; *Loll.* (Kylling); *Falst.* paa en Eng ved Kirkeby (14). $\frac{1}{4}$

b. *Persicaria* Tournef. Stængelen grenet, med Ax fra Bladhjørnerne; Kræmmerhusene valseformede, heelt omfattende Stængelen; Nød trekantet eller fladtrykt.

aa. *Axene* tæt blomstrede, valseformede.

α. 5 Støvdragere. 4.

493. **P. amphibium** L. (Tveformet S.) H. 438; Drej. n. 399; F. D. 282.

Rodstokken krybende; *Bladene* bredt lancetformede, med afrundet eller hjerteformet Basis; *Axene* oval-valseformede, oftest enlige (tilsyneladende endestillede), *Grifterne* 2, i $\frac{1}{3}$ af deres Længde sammenvoxne.

Blomsterne rosenrøde. 7—9. Var. efter Voxestedet, især under 2 Former:

α, *terrestre* Leers. Stængelen opret, Bladene kortstilkede, overalt haarede og rue; Kræmmerhusene tiltrykt-stivhaarede.

β, *natans* Moench. Stængelen flydende; Bladene langstilkede, i Randen rue, forøvrigt tilligemed Kræmmerhusene glatte; Axene kortere og mere afrundede.

Alm. udbredt: α, paa dyrket Jord, især fugtig Leerjord, ved Randen af Grøfter, β, i Damme og Søer.

β. 6—8 Støvdragere. ☉.

494. **P. lapathifolium** L. (Blegbladet L.) H. 439; Drej. n. 398; H. N. IV, 69; Rehb. ic. crit. V, 688.

Stængelen opret eller nedliggende; *Bladene* elliptiske eller lancetformede; *Kræmmerhusene* kort-randhaarede, forøvrigt næsten glatte; *Axene* valseformet-ovale (foroven afrundede); *Blomsterstilke* og *Blomsterdække* beklædte med Kirtler; *Grifterne* 2, næsten til Grunden adskilte; *Nødden* fladtrykt med concave Sider.

Bladene grønne eller hvidgraae af tiltrykte Haar, med eller uden en trekantet Plet paa Midten. Var. med hvide, bleggrøde eller skiden-

gule Blomster. 7—9. Blandt de talrige Former ere de meest udmærkede:

β , *pallidum* Fr. mant. 2 p. 24; (*P. pallidum* With., F. D. 2412; H. N. IV, 70). Axene tykke og korte, Endeaxet ovalt, Sideaxene kugleformede, siddende. Hele Planten bleggrøn. Blomsterne oftest hvide.

γ , *incanum* Koch (*P. incanum* DC., Fr. H. N. IV, 73; *P. lapathifolium* δ , procumbens Sond.). Bladene lancetformede, især paa Underfladen hvidfildede; Stængelen fra Grunden af grenet, med nedliggende Grene.

Paa dyrkede, især fugtige Agre et meget almindeligt Ukrud (den hvidgraa Form især paa tør Grund); β , med Hovedarten temmelig almindelig; γ , ikke sjelden og paa lignende Steder som Hovedarten.

* 495. **P. nodosum** [Pers. Enchir. I, p. 440] (Ophovnet S.) Meisn. i DC. prodr. XIV, p. 118; Fr. nov. mant. 2, p. 25; F. D. 2648; Rechb. ic. crit. V, 686 og 689; *P. laxum* E. B. 2822; *P. lapathifolium* γ , *nodosum* (autt. plur.) Lge. Haandb. 1 Udg. S. 221.

Stængelen opret, med opsvulmede Led og udspærrede Grene; Axene linie-valseformede, foroven tilspidsede, talrige og mere tæt samlede; Griflerne som hos foreg., med tilbagebøiede Grene, Dækbladene bredt ægformede, oftest glatte, forøvrigt som foreg., men høiere, med ofte stærkt rødplettet Stængel og smukt rosenrøde Blomster.

Alm. høiere end foreg. Art. Var. med flere eller færre Kirtler eller næsten glat. 7—9.

Ved Randen af Grøfter og Vandløb hist og her, f. Ex. i Kjøbenhavns Omegn paa mange Steder, Tryggerød Mose! Jonstrup (14); *F.* Østerøen ved Nyborg (Lund); *Bornh.* Vægerne ved Rønne (Hjorth).

Anm. Ligner i Udseende *P. Persicaria*, i Characterer *P. lapathifolium*, og har af forskellige Forff. været henført snart til denne, snart til hiin. Maaskee er den kun en ved Voxestedet frembragt Form af *P. lapathifol.*, men paa Grund af dens eiendommelige Udseende har jeg ikke taget i Betænkning med Meisner i det citerede monografiske Arbeide (DC. prodr.) at opstille den særskilt.

496. **P. Persicaria** L. (Færskensbladet S.) H. 438; Drej. n. 397; F. D. 702; Rechb. l. c. 684; H. N. IV, 74.

Kræmmerhusene tiltrykt-haarede og langt randhaarede; *Axene* valseformet-ovale, foroven afrundede; *Blomsterstilke* og *Blomsterdække* uden Kirtler; *Griflerne* 2, til Midten sammen-
voxne; *Nødderne* fladtrykt-convexe med en hvælvet og en flad Side eller budt-trekantede; forøvrigt som de foreg., og var., ligesom hine, i Henseende til Blomsternes og Bladenes Farve, Beklædning og Form. 7—9.

β , *biforme* (Wahlenb.) Fr. m. 2, p. 28; H. N. X, 57. Opret; Bladene grønne; *Axene* i Begyndelsen tæt samlede, alle Dækladene randhaarede; *Blomsterdækket* utydeligt nervet.

Paa dyrkede Marker et alm. Ukrud mellem Sæden. β , paa mere fugtige Steder.

bb. Axene traadformede, afbrudte ved Mellemrum mellem Blomsterne.

497. **P. strictum** [All. Fl. ped. II, 207] (Liden S.) Fr. mant. 2, p. 32; H. N. XI, 53.

Stængelen tynd; *Bladene* linie-lancetformede, kortstilkede eller næsten siddende; *Kræmmerhusene* stivhaarede og langt randhaarede; *Axene* mod Frugtmodningen oprette; *Blomsterstilke* af Længde med eller kortere end de randhaarede *Dækblade*; *Blomsterdækket* glat; *Støvdragere* 5—6; 2—3 til Midten sammenvoxne *Grifler*; *Nødderne* smaae, glindsende, trekantede eller fladtrykte med convexe Sider. 7—9. ☉.

α , *elatum* Fr. l. c. (P. minus Rechb. l. c. 686; P. mite nonn. autt., H. N. VII, 53). Opret, 1—1 $\frac{1}{2}$ ' høi, oventil grenet; Blomsterne hvide eller blegrode.

β , *pusillum* Fr. (P. pusillum Lam., P. minus H. 440; Drej. n. 396; F. D. 2230; H. N. IV, 75 og (P. mite) IV, 76?). Lavere (3—8"), fra Grunden af grenet, med nedliggende eller opstigende Grene; Blomsterne rosenrøde.

Paa fugtig og tør Jordbund; β , forekommer hist og her i alle danske Provindser, især paa Tørvgrund; α , sjelden og især paa skyggefulde Steder: *Sj.* Nyrup Hegn ved Helsingør (Heiberg), Frederiksborg (12), Rudersdal (1), Vedbæk! Pedersborg ved Sorø! *Falst.* ved S. Kirkeby (Koch), N. Vedby (19); *Loll.* ved Juellinge og Sølle-

sted (19); *F.* Ollerup Kohave! *J.* Rydhave ved Holstebro (Schmidt!), Eveldrup (herb. Drej.); *Sl.* Flensborg! ☞

498. *P. laxiflorum* [Whe. i Flora 1826 p. 746] (Fjernblomstret S.) Fr. l. c. p. 31; *P.* mite Pers., Koch.; *P.* dubium Stein; *P.* intermedium Ehrh., Hansens Herb. Nr. 1219.

Stængelen opret, *Bladene* lancetformede, kortstilkede eller næsten siddende; *Kræmmerhusene* tiltrykt haarede og langt randhaarede; *Axene* fjernblomstrede, nikkende; *Blomsterstilkene* omtrent af Længde med de randhaarede *Dækblade*, *Blomsterdækket* glat; *Støvdragere* 6—8, *Griffelen* 2—3-deelt, *Nødderne* glindsende, trekantede eller plan-convexe.

Fra den større Form af foreg. kjendes den ved tykkere Stængel, nikkende Ax og større Frugter. I Udseende ligner den mere den følgende, men adskilles let ved de anførte Kjendetegn og mangler desuden den bidende Smag. Blomsterne rosenrøde. 7—9. ☉.

Paa fugtige Steder, sjelden: *Sj.* Ledreborg (Weilbach)! *F.* Rødskebølle (12); *Sl.* Hollingsted (Didr.)! (I Holsteen har jeg fundet den ved Glückstadt). ☞

Anm. Navnene *P. mite* Schrank og *P. minus* Huds. ere af forskjellige Forfattere tillagte forskellige Arter, og derfor tvivlsomme. Af de talrige Bastardformer mellem denne og de øvrige Arter af Gruppen *Persicaria*, som anføres (sml. Gren. & Godr. fl. Fr. III, p. 49—50) har jeg ingen bemærket i vor Flora.

499. *P. Hydropiper* L. (Bidende S.) H. 440; Drej. n. 395; F. D. 1576; Rehb. l. c. 687.

Stængelen opret eller opstigende; *Bladene* lancetformede, næsten siddende; *Kræmmerhusene* kort-randhaarede, forøvrigt glatte; *Axene* fjerntblomstrede, nikkende; *Blomsterstilkene* ved Frugtmodningen fremragende udenfor de ikke randhaarede *Dækblade*; *Blomsterdækket* kirtlet-punkteret; *Støvdragere* 6; *Griffelen* næsten til Grunden todeelt; *Nødderne* glandsløse, trekantede eller fladtrykte med convexe Sider.

Bladene og Frugterne have en skarp Smag. Blomsterne hvidgrønne med rødt Anstrøg. 7—9. ☉.

Paa fugtige Steder almindelig.

c. *Avicularia* Meisn. Stængelen grenet med spredte Blomster i Bladhjørnerne; Kræmmerhusene tve-deelte eller uregelm. fligede; 8 Støvdragere; 3 Griffler med hovedformede Ar; Nødden trekantet.

500. **P. aviculare** L. (Udstrakt S.) H. 443; F. D. 803; Centinodium Rehb.; Drej. n. 434.

Bladene lancetformede eller elliptiske; *Blomsterne* 1—3 i Bladhjørnerne; *Kræmmerhusets* Flige tilspidsede, tilsidst laset-mangedeelte; *Nødderne* glandsløse, fint stribede, omtrent af Blomsterdækkets Længde.

Blomsterne blegrøde med grøn Rygnerve, sjældnere hvide eller mørkrøde. 7—9. ☉. En yderst foranderlig Plante; dens vigtigste Former ere:

α, prostratum. (*ε, depressum* Meisn.) Stænglerne talrige, meget grenede, tiltrykte til Jorden; *Bladene* linie-lancetformede.

β, littorale. Stængelen med korte Ledstykker; *Bladene* brede, saftige.

γ, erectum (latifolium). Stængelen opret, *Bladene* bredt lancetformede eller elliptiske, noget budte.

δ, angustissimum Meisn. Stænglerne nedliggende eller opstigende, tynde, med forlængede Ledstykker, *Bladene* linieformede, *Kræmmerhusene* længere, *Blomsterne* faae og fjernt-siddende.

En meget almindelig Ukrudsplante, *α*, paa Gader og Veie; *β*, ved Strandbredder; *γ*, paa dyrkede Marker; *δ*, mellem Sæden, især paa Sandgrund.

d. *Tiniaria* Meisn. Stængelen slyngende; *Blomsterne* i mellembrudte Klaser; *Kræmmerhusene* korte, skraat afskaarne; 8 Støvdragere; 1 Griffel med 3 hovedformede Ar; Nød trekantet.

501. **P. Convolvulus** L. (Snerle-S.) H. 445; F. D. 744; *Tiniaria* Drej. n. 435.

Stængelen kantet furet; *Bladene* pilformet-hjerteformede, tilspidsede; *Blomsterstilkene* kortere end Blomsten og tilledede

til denne tæt nedenfor sammes Basis; *Blomsterdækkets* 3 ydre Flige budt-kjølede efter Afblostringen; *Nødderne* glandsløse, fint punkterede.

Hele Planten svagt beklædt af et melet-dunet Overtræk. Blomsterne rødlig-grønne, indvendig og i Randen hvide. 7—8. ☉.

Almindelig paa dyrket Jord, især mellem Sæden.

502. **P. dumetorum** L. (Vingebægeret S.) H. 446; F. D. 756; H. N. XIII, 68, *Tiniaria* Drej. n. 436.

Stængelen trind, sribet; *Bladene* som hos foreg.; *Blomsterdækkets* 3 ydre Flige med tilsidst brede, hindeagtige Vinger paa Ryggen, nedløbende i en Blomsterstilk omtrent af Blomsterdækkets Længde; *Nødderne* glindsende, jævne.

Glat. Blomsternes Farve som foreg. De tidligst udsprungne Blomster have stundom uvinget Blomsterdække (23)! 7—9. ☉.

I Udkanten af Skove og Krat, ved Gjærder, forekommer i alle danske Provindser, men sporadisk, hyppigst i Fyen og paa Thorseng!

21. Rumex. Skræppe.*)

a. *Lapathum* Tournef. Blomsterne tvekjønnede (eller enbo), (Skræpper).

aa. *Hydrolapathum* Fr. *Krandsene* tæt samlede, i *Spidsen* bladløse; *Kronbladene* brede, næsten hjerteformede, *heelrandede* eller *svagt takkede*.

503. **R. Hydrolapathum** [Huds. Fl. angl. p. 154] (Vand-S.) H. 401; Drej. n. 409; F. D. 2348; H. N. VI, 52.

*) Arterne af denne Slægt maa undersøges henimod Frugtens Modenhed, da Blomsterdækkets indre Blade (Kronbladene), som afgive vigtige Kjendetegn, først paa denne Tid have naaet deres fuldkomne Udvikling, idet de hos alle Arter, undtagen Nr. 517, tiltage i Størrelse og forandres i Form efter Afblostringen. Ogsaa de modne Nødder have Betydning for Artens Bestemmelse. Til Kundskaben om de nordiske Arter af denne vanskelige Slægt ere de vigtigste Kilder: E. Fries, Nov. ed. 2, p. 94, mant. 3, p. 24, S. Veg. Sc. p. 202, Hartm. Skand. Fl. 8 Uppl. p. 93 og F. W. Areschoug, adnot. crit. de Rum. (i Öfvers. af K. Vet. Acad. Förhandl. 1862 p. 57).

Bladene lancetformede, tilspidsede, bølget-rundtakkede; »*Bladstilkene* paa Overfladen flade uden Rand«; *Kronbladene* trekantet-ægformede, alle bruskbærende, heelrandede eller forneden svagt tandede; *Nøddernes* Sider elliptiske, med kort Spids.

3—5' høi. Rodbladene meget lange, paa Underfladen ofte blaa-grønne. De nedre Krandsse ofte langt adskilte. 7—8. 4.

I Aaer og Bække, dybe Tørvgrave og Moser alm. udbredt.

504. **R. maximus** [Schreb. i Schweigg. & Kört. fl. Erlang. I, 152] (Stor S.) Drej. n. 408; F. D. 2347; H. N. VI, 53; *R. heterophyllus* Schultz.

Rodbladene og *de nedre Stængelblade* forlænget-ægformede med hjerteformet Basis; *de øvre Stængelblade* æg-lancetformede, alle *Bladene* spidse, fint bølget-rundtakkede; »*Bladstilkene* paa Overfladen rendede eller flade med en fremstaaende Rand paa hver Side«; *Kronbladene* trekantet-hjerteformede, heelrandede eller forneden svagt tandede, alle bruskbærende; *Nødderne* større, men af samme Form som hos foreg.

3—6' høi. 7—8. 4.

Ved Aa- og Søbredder sjelden: *J.* Bonderup og Ferslev ved Aalborg (Branth), Ormholt (12)! Volstrup (8)! Faurholt (Grønlund)! Hjermelevgaard og Høgholt i Vendsyssel, Simested Aa (Dr.); *Sl.* Syderhøft ved Trenefloden (F. Müll.); *Sj.* Paulinelyst ved Helsingør (21), mellem Rudersdal og Birkerød! *Bornh.* Nexø (11). [3]

505. **R. Hippolapathum** [Fr. Mant. 3, p. 28] (Dynd-S.) Areschoug, Öfvers. K. Vet. Acad. förh. 1862, p. 61, H. N. V, 55.

Rodbladene flade, vedblivende, frisk grønne, ægformet- eller triangelformet-hjerteformede, budte; *Bladstilkene* sammentrykte fra Siden eller trinde, foroven rendede; *Kronbladene* ægformede med næsten lige afskaaren Basis, heelrandede, uden Bruskorn; *Nøddens* Sider elliptiske.

3—5' høi. Bladstilke og Nerver ofte mørkrøde. 7. 4.

* *Helolapathum* (R. *Helolapathum* Drej. i Krøyl. Tidsskr II, 183; Lge. Haandb. 1—2 Udg., F. D. 2288; R. *aquaticus* β Drejeri Sond. fl. hamb. p. 207; M. Lange i Naturh. Foren. vid. Medd. 1861, p. 5).

Bladene smelere, aflang-ægformede med hjerteformet Basis, *Bladstilkene* ved Grunden flade, foroven med en svag Rand af den nedløbende Bladplade, *Kronbladene* muurskeeformet-ægformede, meget budte, mindre end hos Hovedarten.

I Sumpe, kun funden i det nordlige *Jyll.*: Estrup (12)! og mellem Sulsted og Ø. Brøndersløv i Vendsyssel (Drej.). * Hjermsløvgaard og Hammelse, ved Grøfter mod Vildmosen (Drej.)! Hørby (Grønlund)! og Haven i Vendsyssel (12)!

Anm. R. *Helolapathum* Drej. er vistnok ikke lidet forskjellig i Habitus fra den typiske (svenske) R. *Hippolapathum* Fr., navnlig udmærker denne sig fremfor de jydskke Expl. ved høiere Væxt, bredere Blade og større, mere uddragne Kronblade, men Charactererne ere dels af underordnet Værdi, dels neppe tilstrækkelige til at begrunde en virkelig Artsforskjel, saameget mindre som Kronbladenes Form (efter M. Langes Iagttagelse) variere, endog paa samme Individ, og hos flere Expl. nærme sig mere den typiske Form. Jeg er derfor nu tilbøielig til med flere Forff. at forene disse under een Art.

506. R. *domesticus* [Hartm. Sk. Fl. 1 Uppl. p. 148] (By-S.) Drej. n. 419; F. D. 2349; H. N. VII, 55.

Rodbladene længe vedblivende, tilligemed *de nedre Stængelblade* bredt oval-lancetformede med afrundet eller hjerteformet Basis, næsten heelrandede, bølgede; »*Bladstilkene* halvt valseformede, paa Overfladen flade med en svagt ophøiet Rand paa hver Side«; *Kronbladene* nyreformede eller bredt hjerteformede, heelrandede eller svagt rundtakkede, alle uden Brusk; *Nøddernes* Sider bredt elliptiske, med kort Spids.

1— $\frac{1}{2}$ ' høi. Bladene frisk og lys grønne. Blomsterstanden tæt og rigtblomstret. Undtagelsesviis findes Kronbladene undertiden bruskbærende og de nedre Krandsen langt fjernede fra hverandre (F. D. 2350). 7—8. 4.

β , *latifolius* Hartm. (*aquaticus* Fr.) Høi af Væxt, med bredere, ved Grunden hjerteformede, næsten ikke bølgede Blade.

Paa Græsmarker og ved Veie, især i Nærheden af beboede Steder : paa *Halvøen* alm. udbredt fra Skagen (Drej.) saavel i de østlige frugtbare Egne som mod V. (Skjern! Ribe, Rødding, Fanø, Sild (16)); i *Sj.* ikke sjelden i den nordøstlige Deel, f. Ex. Hellebæk, Helsingør! Donze (23), Rungsted! Kjøbenhavns Omegn! mod S og paa de øvrige Øer ikke iagttaget. — β , i det nordlige *Jyll.* (Dr.), Lundehehusmosen!

Anm. Meisner (DC. prodr. XIV, p. 44) forener denne Art med *R. Hippopolathum* Fr. under Navn af *R. longifolius* DC. En slig For- ening kan jeg ingenlunde antage for rigtig. *R. domesticus* forekommer mig at have langt mere Lighed med *R. Patientia* end med *R. Hippo- lathum*, og denne sidste er desuden en Vandplante.

? 507. **R. propinquus** [J. E. Areschoug, Bot. not. 1840 p. 22] F. W. Aresch. l. c. p. 69.

Bladene mørkgrønne, bølget-krusede, *Rodbladene* aflange eller elliptiske, tidligt henvisnende, *de nedre Stængelblade* lancet- formede med hjerteformet Basis, *Bladstilkene* sammentrykte fra Siden, foroven flade; *Kronbladene* nyreformet-hjerteformede, budte eller med en kort afstumpet Spidse svagt-bølgeformet- rundtakkede, med eller uden Bruskorn; *Nøddernes* Sider kort og bredt elliptiske, med kort Spids.

I Nærheden af Øresundet mellem Kalkbrænderierne og Classens Have!

Anm. Den af mig samlede Plante, bestemt af Adj. Areschoug, stemmer ikke aldeles overens med Beskrivelsen, men endnu mindre med nogen af de andre her forekommende Arter. Den staaer omtrent midt imellem *R. domesticus*, *crispus* og *conspersus*, men jeg kan neppe antage den for en Hybridform, da den er rigeligt frugtbærende og alle Nødderne fuldmodne.

508. **R. crispus** L. (Kruset S.) H. 401; Drej. n. 407; F. D. 1334; Rehb. ic. crit. VI, 783; H. N. VII, 56.

Bladene lancetformede, spidse, bølget-krusede, *Rodbladene* tidligt henvisnende; »*Bladstilkene* halvtrinde, paa Overfladen flade uden Rand, foroven vingede af den nedløbende Plade«; *Kronbladene* bredt hjerteformede, budte, heelrandede eller svagt tandede, alle bruskbærende (*Bruskornene* ægformede, det ene større end de øvrige); *Nøddernes* Sider kort og bredt elliptisk- ægformede, med kort Spids.

1½–2' høi. Bladene mat- og mørkgrønne. Undertiden ere de

2 Kronblade uden Brusk, undertiden ere Kornene hos dem alle lige-store. 7—8. 4.

Ved Gjærder, paa Græsmarker og omkring Byer, meget alm.

509. **R. conspersus** [Hartm. Sk. Fl. 3 uppl. p. 85] (Rødbroget S.) Fr. m. 3, p. 26; H. N. VII, 54.

Bladene aflang-ægformede med hjerteformet Basis; »*Bladstilkene* forneden halvtrinde, foroven sammentrykte fra Siden og rendede«; *Kronbladene* bredt hjerteformede, fint tandede, det ene fortrinsviis, de andre svagt bruskbærende; *Nøddernes* Sider elliptiske, med lang Spids.

Stængelen 2—3' høj, tilligemed Blomsterne rødligt anløben; Toppen stor med tætblomstrede Grene. 7—8. 4.

Ved Søbredder sjelden: **Sj.** Hellebæk (12), udenfor Kjøbenhavns Nørreport mellem Farimagsvæien og Sorte Sø! **J.** Hørby og Estrup i Vendsyssel (12), Fjaltring ved Lemvig! Eveldrup (Drej. herb.) ¹³

bb. *Oxylapathum* Fr. *Krandsene*, idetmindste de nederste, adskilte, *Kronbladene* (typisk) forlænget-tilspidsede.

α, Rodbladene med afrundet eller hjerteformet Basis. (Kronbladenes Bruskorn rundagtige).

αα, *Kronbladene* under *Blomstringen* heelrandede, imod *Frugtmodningen* tandede.

510. **R. acutus** L. [Fr. S. Veg. Sc. p. 52] (Spidsbladet S.) *R. pratensis* M. & K., Drej. n. 405, H. N. IX, 58; *R. cristatus* Wallr., H. II, 173.

De nedre Blade tidligt henvisnende, aflange med hjerteformet Basis, spidse; »*Bladstilkene* halvtrinde, foroven svagt furede med ophøiet Midtnerve«; *Blomsterstandens* Grene oprette, forlængede, med mangeblomstrede Krands; *Kronbladene* trekantet hjerteformede, nætformigt aarede, ved Grunden kort sylspidset-tandede, det ydre (større) fortrinsviis, de andre svagt bruskbærende; *Nøddernes* Sider elliptiske (bredest paa Midten), med kort Spids.

3—5' høj. Stængelen huul, tilligemed Blomsterne ofte rødligt anløben; Bladene mørkgrønne. 7—8. 4.

Paa Græsmarker og ved Gjærder, sporadisk: **Sj.** Helsingør (Dr.); Hørsholm ved Forstplantagen! Donze (23), Søllerød (Petersen), Kjø-

benhavns Omegn alm.! *Falst.* Gaabense! *Loll.* hist og her (19); *F.* Ørkilds Slotsbakke ved Svendborg! o. fl. St. mod S. (12); *J.* Hjermelevgaard, Hammelmose og Aalbæk i Vendsyssel, Viborg udenfor Skottenborg Port, Evelstrup (Dr.), Randers ved Hvidemølleport (7), Aarhus (Dr.).

511. *R. obtusifolius* L. (Budtbladet S.) Drej. n. 404; *F. D.* 1335 (ikke god); *H. N.* V, 54 og X, 56; *R. acutus* *H.* 402 (?) *R. silvestris* Wallr., Sturm *D. Fl.* 73, 10—11.

De nedre Blade længe vedblivende, æg-hjerteformede eller afrundet-ovale med hjerteformet Basis; »*Bladstilkene* sammentrykte fra Siden, foroven flade med en nedløbende Rand«; *Grenene* opret-aabne med tæt- og mangeblomstrede Krandse; *Kronbladene* nætformigt aarede, ægformet-triangelformede med heelrandet Spidse, ved Grunden tandede af sylformede Tænder, alle (eller fortrinsviis det ene) bruskbærende; *Nøddernes Sider* ægformede (bredest nedenfor Midten), med lang Spids.

β, divaricatus (*R. divaricatus* Fr. mant. 3, *H. N.* VII, 57; *Lge. Hdb.* 1 Udg. n. 494 (ikke L.); *R. obtusifolius* Wallr., *R. Friesii* Gren. & Godr.). *Grenene* mere udspærrede, *Kronbladene* bredere, med mere forlænget Spidse og længere Tænder.

1¹/₂—3' høi. Var. glat eller duunhaaret, frisk grøn (*α, concolor*) eller med mørkrøde Blomster og Bladnerver (*β, discolor* Wallr.). Nødderne som oftest kun halvt saa store som hos foreg. 7—8. 4.

Omkring Byer og ved Gjærder alm. udbredt.

Ann. Afarten formaaer jeg ikke med Sikkerhed at adskille fra Hovedarten. Grenenes Retning og Kronbladenes Form og Størrelse forekomme mig yderst foranderlige; jeg har derfor ikke troet at burde beholde den som egen Art. (Min Tvivl i denne Henseende er senere bekræftet ved F. W. Areschougs Undersøgelse (l. c. p. 58), ifølge hvilke *R. divaricatus* Fr. kun er en af de mange Former, hvorunder *R. obtusifolius* L. optræder). Navnet *R. divaricatus* er i hvert Fald ikke heldigt, da det af Linné ogsaa har været anvendt paa en Afart af den sydeuropæiske *R. pulcher*.

ββ, Kronbladene heelrandede.

512. *R. conglomeratus* [Murr. Prodr. fl. Goett. p. 52] (*Nøgleblomstret* S.) Drej. p. 142; *F. D.* 2228; *Rchb. ic. crit.* IV, 551; *H. N.* IX, 57; *R. Nemolapathum* Ehrh.; *R. nemorosus* *H.* 400 (tildeels).

Bladene i Randen bølgede, *de nedre* lancetformede, med ægformet Basis; *Grenene* udspærrede eller opstigerde; *Krandsene* rigtblomstrede, alle adskilte og med Dækblade; *Kronbladene* aflang-linieformede, budte, alle bruskbærende; *Nødderne* skarp-kantede, med lang Spids og ægformet-elliptiske Sider.

1½—2' høi. 7—8. 4.

Ved Grøfter, Søbredder og paa fugtige Steder i Udkanten af Skove: *J. Ølands Skov* (16), fra Veile af mod S. ikke sjelden i Østkystens Skovegne; i *Fyen* og paa de mindre Øer (Bornh. indbefattet) hist og her; sparsommere i *Sj.*: Hammermølleskoven! Raavaddam! ved Fuursøen (19), Frederiksberg Allee! Sorø! Bækkeskov (Lund), Basnæs, Skjelskør (Nielsen).

513. **R. nemorosus** [Schrad. i Willd. hort. berol. I, 397] (Skov-S.) H. 400 (tildeels); *R. Nemolapathum* Wallr., H. 400; Drej. n. 406; F. D. 2229; Rchb. ic. IV, 552; H. N. I, 53.

De nedre Blade aflange med hjerteformet Basis (ofte ovenfor Basis indsnørede) *de øvre* æg-lancetformede; *Grenene* opret-aabne; *Krandsene* faablomstrede, alle adskilte, kun de nedre med Dækblade; *Kronbladene* aflang-linieformede, budte, kun det ene bruskbærende; *Nødderne* mindre end hos foreg., budt-kantede, forøvrigt af samme Form.

1½—2' høi. 7—8. 4. — Var. med udeelt Stængel og desuden:

α, *viridis* Sm. Hele Planten grøn.

β, *sanguineus* (*R. sanguineus* L.) Stængel og Bladnerver røde.

I Skove paa fugtige, skyggefulde Steder alm. udbredt. **β**, paa mere solaabne Pladser, sjældnere.

β, Rodbladene med afsmalnet Basis. (Kronbladene allerede under Blomstringen tandede, med smale og oventil spidse Bruskkorn).

514. **R. palustris** [Sm. Fl. brit. p. 394] (Sump-S.) H. 404 (undtagen Voxestederne); Drej. n. 403; F. D. 1873; H. N. II, 52.

Bladene forlænget-lancetformede, *de øvre* næsten linieformede; *Krandsene* adskilte, alle med Dækblade; *Kronbladene* ægformet-elliptiske, alle bruskbærende, i Spidsen heelrandede, ved Grunden med (oftest) 3 børsteformede Tænder, der ere

kortere end selve Kronbladene; *Nødderne* større end hos følgende, med ægformede Sider.

Lettest kjendelig fra følg., som den meget ligner, ved de kortere og bredere Tænder paa Kronbladene og næsten dobbelt saa store Nødder. De nedre Krandsse stedse langt adskilte fra hinanden, de øverste stundom samlede. 7—9. ☉ eller 4.

Paa fugtige Steder, f. Ex. Randen af Søer og Grøfter, meget sjeldnere end følg.: *Sj.* Skovshoved (12), Valdby! St. Jørgens Sø, gl. Pesthuus, Classens Have og Kastellet ved Kbhvn! *Møen* ved Stege (12); *Falst.* Stubbekjøbing (19); *Loll.* Errindlev (5)! Sørup (Rasmussen); *F.* mellem Nyborg og Sophienberg (Lund); *J.* Ødstedgaard! *Sl.* Heilsbugt (28)! Haderslev (7), Aabenraa! Gelting (16), Egernførde (18). De hos Horn. angivne Voxesteder høre sandsynligviis til følg.). *

515. **R. maritimus** L. (Strand-S.) H. 404; Drej. n. 402; F. D. 1208; H. N. I, 54.

Bladene linie-lancetformede, *de øvre* linieformede; alle *Krandsene* (med Undtagelse af de nederste) tæt samlede, alle med Dækblade; *Kronbladene* ægformet-rudeformede, alle bruskbærende, i Spidsen heelrandede, ved Grunden med (oftest) 2 børsteformede Tænder, der ere længere end Kronbladene; *Nødderne* smaae, med elliptiske Sider.

Planten gulgrøn; Bladene ofte i Randen krusede. 6—9. ☉ eller 4.

Bemærket i alle danske Provindser og ikke sjelden, men sporadisk; forekommer saavel ved Strandbredder som ved Randen af Søer og Moser inde i Landet.

b. *Acetosa* Tournef. Blomsterne tvebo (Syrer).

516. **R. Acetosa** L. (Syre). H. 405; Drej. n. 401; F. D. 2534; H. N. XI, 54; L. Herb. VI, 119.

Bladene æg-lancetformede med piilformet Basis; *Kræmmerhusene* fliget-tandede, brunt hindeagtige; ♀ *Bægerbladene* tilbagebøiede; *Kronbladene* rundagtigt-nyreformede, heelrandede eller bølgede, med et meget lidet, nedbøiet, skjælformet Brusk-korn ved Grunden.

1—1½' høi. Bladene have en behagelig syrlig Smag; Blomsterne ofte smukt røde. Var. i Henseende til Bladformen. 5—7. 4.

Paa Græsmarker, Enge, ved Veigrøfter o. s. v. alm.

517. **R. Acetosella** L. (Rødknæ). H. 406; Drej. n. 400; F. D. 1161.

Bladene linie-lancetformede, med spydformet Basis og tilbagerullet Rand; *Kræmmerhusene* forlængede, lasede, hvid-hindeagtige; ♀ *Bægerbladene* tiltrykte; *Kronbladene* ægformede, heelrandede, uden Bruskorn.

$\frac{1}{2}$ —1' høi; Rodstokken ofte krybende, med Udløbere. Stænglerne og Blomsterne mørkrøde. Kronbladene forstørres ikke mærkeligt efter Blomstringen. Bladene mangle ofte de spydformede Lapper ved Grunden. 6—7. 4.

Paa udyrkede, især tørre og sandige Marker, alm. udbredt.

22. Colchicum. Tidløs.

518. **C. autumnale** L. (Høst-T.) H. 410; F. D. 1642; Rchb. ic. fl. germ. X, 949—50.

Rodstokken knolleformet, omgivet af bruunt-hindeagtige Bladskeder; *Bladene* lancetformede; *Blomsterdækket* tragtformet; *Kravens Flige* budt-lancetformede, meget kortere end Røret.

Blomsterne lila eller hvide, udgaae umiddelbart fra Rodstokken (8—10); Bladene udvikles tilligemed Frugterne i det paafølgende Foraar (6). 4.

Paa Enge og forvildet omkring beboede Steder, sjelden: *J.* Eng ved Barritskov (H.); *Sl.* Nyværk ved Slesvig (16), Egernførde (H.); *Loll.* ved Thiersted (H.), Christianssæde (2). 3

23. Scheuchzeria.

519. **S. palustris** L. (Kjær-S.) H. 408; Drej. n. 414; F. D. 76; Rchb. ic. fl. germ. X, 927—29; H. N. XV, 71.

Stængelen opret, tilligemed den vandrette *Rodstok* leddet; *Bladene* omskedende, linieformede, halvtrinde, noget kjødfulde, indadtil rendede, med en Pore i Spidsen og en budt Skedehinde ved Grunden af Pladen; *Blomsterne* i en faablomstret Klase; *Smaafrugterne* skjævt ægformet-kegleformede, oppustede.

6—8" høi. Blomsterne grønlig-brune. 6. 4.

I dybe Tørvmoser og Hængedynd mellem Sphagnum: i det østlige *Sjæll.* hist og her, f. Ex. Ramløse (H.), N. f. Helsingør (21), Jonstrup (14), Ruderhegn, Birkerød, Dronninggaard, Bagsværd (H.),

Lyngby Mose! Søholm i Stevns (9). I de andre Provindser er det mig ikke bekendt at den er funden.

24. Triglochin. Trehage.

520. **T. palustre** L. (Kjær-T.) H. 409; Drej. n. 412; F. D. 490; Rchb. ic. fl. germ. VII, 90—91; L. Herb. VIII, 158.

Bladene traadformet-linieformede, halvtrinde, paa Overfladen svagt rendede; *Arrene* 3, fryndset-haarede, udstaaende eller oprette; *Frugten* kantet, linieformet, tredelelig, paa en til Axen tiltrykt Blomsterstilk.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Blomsterne grønlige. 6—7. 4.

Paa Enge og i Tørvmoser alm.

521. **T. maritimum** L. (Strand-T.) H. 409; Drej. n. 413; F. D. 306; Rchb. l. c. 92—93; L. Herb. V, 100.

Bladene linieformede, halvtrinde, paa Overfladen næsten plane; *Arrene* 6, tilbagebøiede; *Frugten* ægformet, kantet, sexdelelig, paa en efter Afblostringen udstaaende *Blomsterstilk*.

1— $1\frac{1}{2}$ ' høi. Klasen mere tætblomstret end hos foreg. Blomsterne grønlige. 6—9. 4.

Paa Strandenge ved alle Danmarks Kyster, især meget hyppig i det vestlige Slesvig, hvor den er en af de vigtigste Planter paa den nye (udendigs) Marsk (16), sjældnere ved Indsøer og paa Færskvandsenge inde i Landet, f. Ex. Tiissø! Sorø! Leersøen!

V. Polygynia.

25. Alisma. Skeeblad.

522. **A. Plantago** L. (Veibredbladet S.) H. 411; Drej. n. 416; F. D. 561; Rchb. l. c. VII, 100.

Bladene (alle ved Grunden) 5—7-nervede, hjerteformet-ægformede; *Skafte* opret, budt trekantet; *Blomsterstanden* en Top, sammensat af flere Rækker krandsstillede Skjærme; *Frugt-*

samlingen budt trekantet, med fladtrykte, afrundede, paa Ryggen 1—2-furede *Smaafrugter*.

1—3' høi. Kronbladene hvide eller blegt lila. 6—8. Var. især i Henseende til Bladformen. Nedenstaaende Former ere de mærkeligste:

β, *lanceolatum* With., Rchb. l. c. 101. Bladene lancetformede.

γ, *graminifolium* Ehrh., Rchb. l. c. 102. Bladene linieformede (fladtrykte Bladstilke uden Plader).

δ, *latifolium*! meget høi, Bladene bredere end hos Hovedarten, 9—11-nervede.

Ved Bredderne af Søer, Bække og Grøfter, alm. udbredt. *β*, sjeldnere og især ved sandige Søbredder, f. Ex. *Sj.* Kjør paa Nordsiden af Amager! Høie Sandbjerg! Damhuussøen (12); Tiissø (11); *F.* Fæstningsgravene ved Nyborg (Lund); *J.* Staby ved Nissum Fjord! *Sl.* Bistensee (20); *γ*, i selve Vandet: *J.* Flade Sø ved Agger i Thy! *Sl.* Eideren ved Rendsborg! *δ*, *F.* Vindinge ved Nyborg (Lund).

523. *A. ranunculoides* L. (Smalbladet S.) H. 413; Drej. n. 415; F. D. 122; Rchb. l. c. 97; H. N. IV, 87.

Bladene (alle ved Grunden) trenervede, linie-lancetformede; *Skaffet* opret eller opstigende; *Blomsterne* i enkelt Skjærm eller 2 ovenfor hinanden stillede Krands-; *Frugtsamlingen* kugleformet, med elliptiske, spidse, femkantede, furede *Smaafrugter*.

4—10" høi. Kronbladene lila eller blegrøde, større end hos foreg. 6—7. 4.

β, *repens*. Rchb. l. c. 98; *A. repens* Cav. Skaffet nedliggende, ved Skjærmen rodslaaende.

Ved Bredderne af Søer og Tørvmoser, sporadisk, men bemærket i alle danske Provindser; *β*, ved grusede og lerede, af og til oversvømmede Søbredder, f. Ex. Maribo Sø! *

524. *A. natans* L. (Svømmende S.) H. 412; F. D. 1573; Rchb. l. c. 95.

Rodbladene linieformede (Bladstilke uden Plade); *Stængelen* flydende, ved Leddene udskydende Rødder og langstilkede *Blade* med trenervet, oval Plade; *Blomsterne* langstilkede, krandsstillede eller enlige fra Leddene; *Frugtsamlingen* næsten kugle-

formet, med omvendt-ægformede; budte, af den vedblivende Griffel braadspidsede, mangestribede *Smaafrugter*.

Kronbladene hvide. 6—8. 4.

I Aaer og Grøfter, kun bemærket i Halvøens vestlige Egne: J. mellem Skjermbro og Ringkjøbing, ved Stauning (H.), Hee og Thim pr. Ringkjøbing (2), Skjern Aa ved Lønborg! S. Vium!

7^{de} Klasse. Heptandria (Syvhannede).

1. Orden. Monogynia (Enhunnede).

1. *Æsculus* L. Bægeret uregelret femdeelt; Kronen uregelret 4—5-bladet; Støvdragerne opstigende; Frugten en pigget, trerummet, oftest enfrøet Kapsel med rumdelende Opspringning. 2. (N. F. Hippocastaneæ).

2. *Trientalis* L. Bæger og Krone regelmæssigt syvdeelte (Kronen hjulformet); Frugten en enrummet, mangefrøet Kapsel med 5—7 hurtigt affaldende Klapper. 4. (N. F. Primulaceæ).

I. Monogynia.

1. *Æsculus*. Hestekastanie.

† 525. *Æ. Hippocastanum* L. (Almindelig H.) Rehb. ic. fl. germ. V, 4822.

Bladene modsatte, 5—7-koblede, med omvendt-ægformede, tilspidsede, dobbelt saugtakkede Smaablade; *Blomsterne* i oprette, pyramideformede Klaser.

Høit Træ; Kronbladene hvide, randhaarede, med en gul, tilsidst rød Plet ved Grunden af Pladen; Støvknapperne rustfarvede; Frøet stort, brunt med hvid Navle. $\frac{5}{2}$ — $\frac{6}{1}$.

Oprindelig indført fra Asien, alm. plantet i Alleer og Lystskove, og nu at betragte som acclimatiseret.

2. Trientalis. Skovstjerne.

526. **T. europæa** L. (Almindelig S.) H. 414; Drej. n. 417; F. D. 84; Rchb. ic. fl. germ. XVII, tab. 1083.

Bladene (oftest 6—7) næsten krandsstillede, i Spidsen af Stængelen, elliptiske, utydeligt tandede eller næsten heeltandede; *Blomsterne* 1—3, paa fine Blomsterstilke fra de ydre Bladhjørner.

3—6" høi. Kronen hvid med en grønlig eller guul Ring ved Grunden. (Var. med 6—8-deelt Blomst). 6. 4.

Paa Lyngheder og i Skove, saavel Løv- som Naaleskove, hyppig paa *Halvoen* og i det nordøstlige *Sjæll.*, sjeldnere i det sydvestlige *Sj.*, i *Fyen* (f. Ex. Hals ved Hofmangave, Nyborg (H), Skaarup (19), og de mindre Øer: *Falst.* i Horreby Lyng (5), Hanenov Skov (14); *Bornh.* i Almindingen!

8de Klasse. Octandria (Ottehannede).

1. Orden. Monogynia (Enhunnede).

A. Kronen fribladet.

a. Frugten undersædig.

1. **Chamænerium** Scop. Bægerrøret ikke forlænget ovenfor Frugten; Kronbladene 4, lidet uregelmæssige; Støvdragerne nedbøiede; Griffelen hagekrummet; Frugten en firekantet, linieformet, firerummet, fireklappet Kapsel med rumdelende Opspringning; Frøene med Frøuld.

2. **Epilóbium** L. Bægerrørets Forlængelse 0 eller meget kort; Kronbladene regelmæssige; Støvdragerne oprette; Griffelen ret; Frugt og Frø som foregaaende.

3. **Oenothéra** L. Bægerrørets Forlængelse ovenfor Frugten længere end Bægerfligene; Krone, Støvdragere og Griffel som foregaaende; Kapselen budtkantet, ved Grunden bredere, forøvrigt som foreg.; Frø uden Frøuld. (1—3. N. F. *Oenagrariæ*).

b. Frugten oversædig.

4. **Acer** L. Bægeret regelret fembladet; Kronbladene 5, befæstede tilligemed Støvdragerne paa en undersædig Skive; Frugten en todelelig Spaltefrugt, Smaafrugterne Vingefrugter, befæstede til en fælles, todelelig Frugtaxe. (Træer med modsatte, haandnervede Blade; Blomsterne ofte særkønnede). (N. F. *Acerineæ*).

5. **Monótropa** L. Bæger og Krone regelm. 4—5-bladede; Støvdragerne 8—10, befæstede paa Frugtbunden, hveranden med en hestekoformet Kirtel ved Grunden; Frugten en 4—5-klappet, mangefrøet Kapsel. (Snyltende Urter med skjælformede, bruungule Blade). (N. F. *Monotropææ*).

(*Vaccinium Oxycoccus*).

B. Kronen sambladet. Støvknapperne opspringe ved Huller i Spidsen. (Lave Halvbuske).

a. Frugten oversædig, kapselagtig (Støvknapperne ved Grunden tohornede).

6. **Erica** L. Bægeret urteagtigt, kortere end den krukkeformede Krone; Kapselen med rundelende Opspringning.

7. **Calluna** Salisb. Bægeret farvet, længere end den klokkeformede Krone; Kapselen med skillevægbrydende Opspringning. (6—7. N. F. *Ericineæ*, b.).

b. Frugten undersædig, bæragtig (Støvknapperne i Spidsen tohornede).

8. **Vaccinium** L. Bæger og Krone 4—5-deelte; Støvdragerne befæstede paa Randen af en oversædig Skive; Bærret kugleformet. (N. F. *Ericineæ*, a.).

C. Blomsterdækket enkelt, sambladet. (Busk).

9. **Daphne** L. Blomsterdækket farvet, med firedeelt Krave; Støvdragerne tilvoxne til Røret (4 kortere, 4 længere); Frugten oversædig, enfrøet Steenfrugt. (N. F. *Thymeleæ*).

2. Orden. *Digynia* (Tohunnede).

10. **Chrysosplénium** L. Blomsterdækket enkelt, firedeelt, halvt-oversædigt, udvendig grønt, indvendig guult; Støvknapperne enrummede; Frugten en toklappet, mangefrøet Kapsel*). (Saf-tige Urter med Blomster i Qvast. N. F. Saxifragaceæ).

Scleranthus. Blomsterdækket femdeelt, omkringsædigt; Frugten nødagtig (10, 2).

Ulmus effusa (5, 2).

Polygonum. Blomsterdækket femdeelt, undersædigt; Frugten Nød (6, 3).

Acer. Bæger- og Kronblade 5, undersædige; Frugten Vingefrugt (8, 1).

3. Orden. *Trigynia* (Trehunnede).

11. **Fagopyrum** Moench. Blomsterdækket enkelt, dybt femdeelt; de 3 indre Støvdragere med Kirtler ved Grunden; 3 Grifler med hovedformede Ar; Frugten trekantet Nød med midtliggende Kim og sammenfoldede Frøblade. (N. F. Polygoneæ).

Polygonum. Kimen sideliggende, Frøbladene flade (6—3).

4. Orden. *Tetragynia* (Firehunnede).

12. **Paris** L. Bæger og Krone firebladede; Frugten et firerummet, oversædigt Bær. (Blomsten enlig, endestillet). (N. F. Smilaceæ, c.).

13. **Adóxa** L. Bægeret 2—3-deelt; Frugten et 4—5-rummet Bær, beklædt med det halvt-oversædige Bæger. Blomsterne i et endestillet, femblomstret Hoved; Endebloomsterne med 4 Kronblade og Grifler, 8 Støvdragere; Sideblomsterne femdelelige. (N. F. Araliaceæ).

14. **Elatine** L. Bægeret firedeelt; Kronen firebladet;

*) Forekommer undertiden med femdeelt Blomsterdække og 10 Støvdragere.

Frugten firerummet, oversædlig Kapsel med flere valseformede, mere eller mindre bukrummede Frøe i hvert Rum. Blomsterne i Bladhjørnerne*). (N. F. Elatineæ).

I. Monogynia.

1. Chamænerium. Gederams.

527. *C. angustifolium* [Scop. Fl. carn. I, p. 271] (Smalbladet G.) Drej. n. 424; *Epilobium* L., H. 419; F. D. 289.

Bladene spredte, (sjeldnere krandsstillede), lancetformede, heelrandede eller utydeligt tandede; *Blomsterne* i Klase; *Kronbladene* omvendt-ægformede, med Negl.

3—4' høi. Kronbladene smukt violet-røde. 7—8. 4.

I Skove, især paa aabne Pladser efter Bortrydning, ved Gjærder o. s. v., ikke sjelden, og i enkelte Egne i Mængde, f. Ex. Almindingen paa Bornholm!

2. *Epilobium*. Dueurt.

a. Blomsterknopperne før Udspringningen nikkende.

aa. *Stængelen* med 2—4 ophøjede Linier (af den nedløbende *Bladsubstans*).

528. *E. roseum* [Schreb. Spic. fl. lips. 147] (Rosenbladet D.) H. 423; Drej. n. 430; F. D. 1815; Rchb. ic. crit. II, 329; H. N. III, 34; *E. nudum* Schum. n. 360.

Rodstokken (om Efteraaret) med kugleformede *Bladknopper***), dannede af kjødfulde, taglagt-tiltrykte Blade; *Stængelen* oventil

*) Til denne Slægt høre Arter med tredeelt Blomst og 6 Støvdragere, af hvilke dog ingen er funden i vor Flora.

**) Knopperne, som hos Arterne i denne Slægt afgive gode Kjendtegn, maa undersøges i det sildige Efteraar, naar de have opnaaet den Form og Størrelse, de under Vintertilstanden skulle beholde. Uagtet samtlige Arter angives som vedvarende, er

duunhaaret; *Bladene* elliptiske, tæt og skarpt tandet-saugtakkede, alle tydeligt stilkede, de nedre modsatte; *Bægerfligene* kort tilspidsede; *Arrene* (oftest) kølleformigt sammenklæbede; *Frøene* næsten jævne, omvendt-ægformede.

1—2' høi. Stængelen alm. stærkt grenet; Bladene frisk grønne (ofte rødligt anløbne); Kronbladene rosenrøde eller blegrøde. 8—9. 4.

Ved Grøfter, Randen af Damme o. a. fugtige Steder ikke sjelden.

bb. Stængelen trind (uden ophøiede Linier).

529. **E. montanum** L. (Glatbladet D.) H. 423; Drej. n. 427; F. D. 922; Reh. ic. crit. II, 328.

Rodstokken med *Bladrosetter* af langstrakt-oval Form; *Stængelen*, især oventil, duunhaaret; *Bladene* ægformede eller æglanceformede, tæt og skarpt tandet-saugtakkede, de nedre modsatte (sjeldnere 3 krandsstillede), kortstilkede, de øvre spredte, stilkløse; *Bægerfligene* budte; *Arret* tilsidst firekløvet; *Frøene* (under Lupen) fint kornet-vortede, ovale.

1—2' høi; Stængelen oftest grenet; Bladene graagrønne, i Randen og paa Nerverne duunhaarede, Kronbladene rosenrøde eller lila. Var. i Henseende til Bladenes Brede, Behaaringen, Kronbladenes Størrelse og Farve. 7—8. 4.

Ved Gjærder og i Skove, meget alm.

530. **E. palustre** L. (Kjær-D.) H. 424; Drej. n. 428; F. D. 1574.

dette ikke strængt Tilfældet, idet Moderplanten hos flere bortdør naar den har frembragt Knopper eller Bladrosetter. Især er dette Tilfældet med *E. palustre*, som kun fortsættes ved løglignende Knopper. Denne Forskjellighed hos Vinterknopperne kan ret vel benyttes som Inddelingsgrund ved Arternes Opstilling, og jeg har forsøgt dette i en tidligere Afhandling (Vidensk. Medd. af Naturhist. Foren. 1849 S. 97), men da en Haandbog, som for en stor Deel benyttes af Begyndere, forneentlig bør undgaae at benytte til Arternes Gruppering Forhold, som kun undtagelsesviis kunne erkjendes paa den Tid, da Planterne sædvanligt undersøges, har jeg kun opført de fra Knopperne hentede Kjendetegn ved Beskrivelsen af de enkelte Arter, men ikke benyttet dem til Slægtens Inddeling.

Rodstokken udskyder traadfne Udløbere med meget smaae Blade og forlængede Ledstykker, i hvis Spidse dannes en kugleformet-oval Knop med fireradet-taglagte, kjødfulde, skjælformede Blade; *Stængelen* duunhaaret; *Bladene* linieformede eller lancetformede, heelrandede eller fjernt og svagt tandede, stilkløse, indtil ovenfor Midten af Stængelen modsatte; *Bægerfligene* budte; *Arrets* Flige kølleformigt sammenklæbede; *Frøene* jævne, langagtige, forneden tilspidsede, foroven afsmalnede.

$1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi; Stængelen mere eller mindre grenet; Bladene oftest glatte, paa Underfladen glindsende. Kronbladene blegrøde eller lila. 7—8. 4.

I Tørvmoser og Kjær, især i Hængedynd mellem Sphagnum, alm.

b. De uudsprungne Blomster oprette.

aa.* *Stængelen kantet af 2—4 nedløbende Linier.*

531. *E. virgatum* [Fr. Nov. p. 113] (Riisdannet D.) H. II, 175; Drej. p. 149; F. D. 2528; H. N. X, 46; *E. tetragonum* F. D. 1029 (?)

Stængelen ved Grunden opstigende og udskydende traadformede *Udløbere* med udviklede Blade og forlængede Ledstykker; de *ophøiede* Linier 4 (af de nedløbende Bladrande); *Bladene* stilkløse, lancetformede med bredere, afrundet Basis, fjernt og svagt tandede, fra Grunden til ovenfor Midten af Stængelen modsatte; *Bægerfligene* budte; *Arrets* Flige kølleformigt sammenklæbede; *Frugtknuden* tæt duunhaaret; *Frøene* kornet-vortede, omvendt-ægformede, ved Grunden spidse.

1—2' høi; Stængelen grenet; Bladene glandsløse, glatte eller paa Underfladens Nerver svagt duunhaarede. Kronbladene rødagtig-lila. 7—8. 4.

Ved Randen af Tørvgrave, Hedemoser og Grøfter: paa *Halvøen*, især dens midterste Deel alm., sjeldnere paa Øerne: *F. Søbo* (24), Ollerup! Egense, St. Jørgensgaard 12), Skaarup (19); *Thorseng* ved Bregninge! *Langel* ved Henninge (19); *talst* Liselund (Koch); *Sj.* Helk bæk's Vang, Høie Sandbjerg! Vedbæk! Skjolden ved Sorø (12); *Bornh.* ved Rønne o. fl. St.! $\frac{3}{4}$

Anm. Denne Art har af flere, især tyske Botanikere været anfægtet, men sikkert med Uret; den adskilles let fra foreg. foruden de angivne Kjendetegn ved et aldeles forskjelligt Udseende; fra følg.

afviger den saavel ved Bladene som ved aldeles forskjelligt Voxested og Voxemaade. Om den, ligesom *E. palustre*, overvintrer ved løgformede Knopper, frigjorte fra Moderplanten, hvilket synes rimeligt paa Grund af Udløbernes Lighed, har jeg ikke med Vished kunnet udfinde.

532. *E. tetragonum* L. (Firekantet D.) H. 424; Drej. n. 429; Rechb. ic. crit. II, 340; H. N. VIII, 41.

Rodstokken med tætbladede Bladrosetter; Stængelen kantet af 4 ophøiede Linier; Bladene stilkløse (de midterste nedløbende), lancetformede med smalere Basis, tæt saugtakkettandede, de nedre modsatte; Bægerfligene tilspidsede; Arrets Flige sammenklæbede; Frugtknuden svagt duunhaaret; Frøene kornet vortede, omvendt-ægformede, ved Grunden budte.

1—2' høi. Stængelen stærkt grenet; Bladene glindsende, næsten glatte; Rosetternes Blade om Efteraaret fuldt udviklede. Kronbladene som foreg. 7—9. 4.

β, obscurum Schreb. (F. D. 1267; H. N. VIII, 42). Stængelen høiere, Bladene bredere, glandsløse og duunhaarede.

Ved Grøfter og lignende fugtige Steder, især i Strandegne: hyppig paa de sydlige Øer, sporadisk i *Sj.* og *F.* paa *Halvøen* sjeldnere: mellem Rye og S. Vissing! Husum (16); *β*, paa *Bornholm* ved Hammershuus (H.).

533. *E. purpureum* [Fr. Fl. hall. p. 65] (Rødstænglet D.) Fr. mant. 3, 185; S. Veg. Sc. 178.

Rodstokken med tætbladede Rosetter af langstrakt Form; Stængelen med 2 nedløbende Linier af Bladnervens Fortsættelse; Bladene bredt lancetformede, med smalere Basis, saugtakkede, stilkløse, modsatte, de øvre afvejlende; Bægerfligene tilspidsede; Arret udeelt eller firekløvet; Frugtknuden duunhaaret; Frøene fiint kornet-vortede, omvendt-ægformede, ved Grunden budte.

Stængelen 1—3' høi, stærkt grenet, tilligemed Bladene fiint duunhaaret og ofte rødagtig. 7—8. 4.

Ved Gjærder udenfor Kolding! Hidtil ikke funden andensteds i Danmark. [E]

Anm. Arret er paa alle de af mig samlede Expl. firekløvet, hvorimod det beskrives udeelt paa de svenske Expl. af Prof. Fries. Vor Plante mangler aldeles Kronblade. Sonder (fl. hamburg.) anseer denne Art for en Form af *E. montanum*, men ved de oprette Blomster-

knopper, tilspidsede Bægerflige og Stængelens nedløbende Linier forekommer den mig tilstrækkeligt adskilt fra denne. Paa Grund af dens Sjældenhed kunde man fristes til at antage den for en Bastardform (f. Ex. af *E. montanum* og *tetragonum*), men den sidstnævnte Art findes neppe i Egnen om Kolding. Jeg har desuden fundet Frøene fuldt udviklede og modne.

bb. Stængelen trind (uden ophøiede Linier).

534. *E. pubescens* [Roth Tent. I, p. 167] (Dunet D.) H. 422; Drej. n. 426; F. D. 347; H. N. VIII, 43; *E. parviflorum* Schreb.; *E. hirsutum* β , L.

Vinterknopperne danne tætbladede Rosetter; *Stængelen* duunhaaret; *Bladene* stilkløse, lancetformede, fjernt og svagt tandede; de nedre modsatte, kortstilkede; *Bægerfligene* budte; *Arret* firekløvet; *Frøene* fint kornet-vortede, omvendt-ægformede, ved Grunden budte.

1—3' høi. Kronbladene lila, alm. af Længde med Bægerfligene, Bladene paa Rosetterne om Efteraaret fuldt udviklede, paa Underfladen violette. 7—8. 4.

β , *subglabrum* Koch (*E. rivulare* Wahlenb., Rehb. ic. crit. 301; H. N. V, 40.) Stængel og Blade glatte eller svagt haarede.

I Moser, Grøfter, ved Aa- og Søbredder, alm. udbredt. β , Thaersminde paa Thorseng!

535. *E. hirsutum* L. (Laaden D.) H. 421; Drej. n. 425; F. D. 326; H. N. V, 39.

Rodstokken udskyder *underjordiske Udløbere* med forlængede Ledstykker og ufuldstændige, skjælformede Blade; *Stængelen* haaret af længere Haar og kortere Kirtelhaar; *Bladene* stilkløse og omfattende med lidet nedløbende Basis, elliptiske eller æg-lancetformede, tandet-saugtakkede, modsatte, de øvre afvexlende; *Bægerfligene* kort braadspidsede, *Arret* firekløvet; *Frøene* fint kornet-vortede, omvendt-ægformede, ved Grunden spidse.

Stængelen 3—5' høi, grenet, Ledstykkerne undertiden oventil med svage Linier af de nedløbende Bladrande. Kronbladene store, 2—3 Gange længere end Bægerfligene, smukt røde, sjældent hvide

(Sj. Kongens Møller, Lund). 7—8. 4. Var. i Henseende til Belædningen o. s. v.

β , *micranthum*! Stængel og Blade tæt fløielshaarede; Blomsterne mindre, Kronbladene neppe $\frac{1}{2}$ Gang længere end Bægerfligene.

Ved Sø- og Aabredder, i Tørvmoser, alm. udbredt. β , ved Bredderne af Sorø Sø! ☞

(\sim) *E. roseo-pubescens*! Bastardform af *E. roseum* og *E. pubescens*. Forskjellig fra førstnævnte ved oprette Blomsterknopper, fra Grunden til Spidsen duunhaaret Stængel og større Blomster, fra sidstnævnte ved stilkede, skarpt saugtakke Blade, tilspidsede Bægerflige og nedentil svagt kantet Stængel. Alle Expl. med golve Frøe.

Mellem Stamarterne paa fugtige Steder i St. Jørgens Præstegaards Have!

3. *Oenothera*. Natlys.

† 536. *Oe. biennis* L. (Toaarig N.) H. 418; Drej. p. 150; F. D. 446.

Bladene spredte, utydeligt tandede; *Rodbladene* (det første Aars) elliptiske, langstilkede; *Stængelbladene* (det andet Aars) elliptiske eller bredt lancetformede, kortstilkede; *Kronbladene* længere end Bægerfligene og Støvdragerne, omtrent halvt saa lange som Bægerrøret.

Stængelen 2—3' høj, svagt haaret og ru af Haarenes udvidede, vedblivende Basis; Kronbladene store, lysgule, kun aabne om Natten. 6—8. ☺.

Oprindelig indført som Siirplante, forekommer nu som Ukrud i og omkring Haver og stundom længere fra dyrkede Steder, f. Ex. Nexlø (Baagøe); *Falst.* i Strandsandet ved Hesnæs! *Langel.* ved Hou (H.). ☞

† *Oe. muricata* L. (Rødstænglet N.) H. II, 175; F. D. 1752.

Stængelen mere haaret og ru, rødt anløben; *Bladene* smalle, mere tydeligt tandede; *Kronbladene* mindre, $\frac{1}{3}$ af Bægerrørets Længde, ligelange med Støvdragerne, forøvrigt som foreg.

Oprindelig indvandret fra Nordamerika; forvildet ved Gjærder imod Stranden ved Hellebæk!

4. Acer. Løn.

537. **A. Pseudoplatanus** L. (Æretræ, Valbirk). H. 435; Drej. n. 431; F. D. 1575; Rchb. ic. fl. germ. V, 4829.

Bladene femfligede, med grovt og uregelmæssigt budt-tandede *Flige*; *Blomsterne* i hængende Klaser; *Frugtknuden* udvendig duunhaaret, indvendig silkehaaret, med opstigende *Vinger*; *Støvdragerne* omtrent af Kronens dobbelte Længde.

Smukt og høit Træ med glat Bark, *Bladene* paa Underfladen glandsløse, blaagrønne og (i yngre Tilstand langs Nerverne) duunhaarede, udvikles før *Blomsterne*. 5. $\frac{1}{2}$.

Forekommer alm. plantet i Alleer og Lystskove, udbreder sig med Lethed og angives allerede af Kyll. som voxende i Skove, men sandsynligviis er den ikke oprindelig indenlandsk: *Sj.* ved Herlufsholm; *Loll.* i Skovene hist og her alm.; *F.* Skjoldemose og Hundstrup (H) og fl. St. i det sydlige (12); *Als*; *Sl.* Aabenraa, Sundevad, Flensborg o. fl. St. (12, 28!).

538. **A. platanoides** L. (Tandbladet L.) H. 436; Drej. n. 432; F. D. 2586; Rchb. l. c. 4828.

Bladene femlappede med afrundede Bugter mellem de dybt og spidst 3—5-tandede *Lapper*; *Blomsterne* i opret Halvskjærm; *Støvdragerne* af Længde med Kronen; *Frugtknuden* udvendig og indvendig glat, med udspærrede *Vinger*.

Smukt Træ, alm. af lavere Væxt end foreg.; *Bladene* glindsende, paa begge Sider frisk grønne og glatte; *Blomsterne* guulgrønne, udvikles førend eller samtidigt med *Bladene*. 5. $\frac{1}{2}$.

Vildvoxende i Skovene paa Østkysten af *Bornholm*; (i Granit-Terrainet)! sjelden i de øvrige Provindser: *Sj.* Kulaas Skov i Ods herred! Nexelø (Baagøe), Svenstrup, Bregentved (28); *J.* Haraldslund! Estrup mellem Kolding og Ribe (28). Forekommer desuden, ligesom foreg., men sjældnere, plantet. $\frac{1}{2}$

539. **A. campestre** L. (Naur). H. 437; Drej. n. 433; F. D. 1288; Rchb. l. c. 4825; H. N. I, 37.

Bladene 3—5-lappede; *Lapperne* budte, hele eller trelappede; *Blomsterne* i opret Halvskjærm; *Støvdragerne* i ♂ *Blomsten* lidt længere, i ♀ kortere end Kronen; *Frugtknuden* udvendig duunhaaret, indvendig glat, med vandret udspilede, ved Grunden ikke indtrykte *Vinger*.

Busk eller lavt Træ; de ældre Grene kantede, med revnet, korkagtig Bark; Bladene paa Underfladen mat-grønne og, idetmindste langs Nerverne, duunhaarede; Blomsterne grønne, udvikles efter Bld. Var. med glat Frugtknude. $\frac{5}{2}$ — $\frac{6}{1}$. **h.**

I Skove, alm. i de sydlige Egne af Landet, f. Ex. Sydsjælland, Fyen, Øerne fra Møen til Als! I de nordligere Egne sjeldnere, f. Ex. Mariager (28), Randers (7), Haraldslund! Skanderborg (7) Mangler paa Bornholm! ³

5. Monotropa. Snylterod.

540. **M. hirsuta** [Hornem. oec. Pl. II, p. 179] (Haaret S.) Drej. n. 443; M. Hypopitys L., Wallr., F. D. 232; M. Hypopitys α , hirsuta Nolt. nov. p. 43, Rchb. ic. fl. germ. XVII, tab. 1152.

Stængelen opret, udeelt, tæt beklædt med skjælformede Blade; *Klasen* før Udspringningen nikkende; *Bægeret* i Randen, *Krone*, *Støvdragere* og *Støvvei* haarede; *Frugtknuden* oval; *Griffelen* forlænget.

6—8" høi; hele Planten saftig, bleg-bruungul, ved Tørring sortbruun. 6—7. **4.**

I skyggefulde Løvskove, især Bøgeskove, snyltende paa Trærødder mellem Løvet; ikke sjelden, men sporadisk og hyppigst i fugtige Sommere.

541. **M. glabra** [Bernh.] (Glat S.) H. II, 179; Drej. n. 444; M. Hypopitys β , glabra Roth, Nolte l. c., F. D. 2051; Rchb. l. c. XVII, 1152; M. Hypophegea Wallr., Rchb. ic. crit. V, 675.

3—6" høi; *Klasen* opret eller nikkende, faablomstret; *Blomstens Dele*, undtagen Støvtraadene og Arret, glatte; *Frugtknuden* kugleformet; *Griffelen* kort (omtr. halvt saa lang som Frugtknuden), forøvrigt som foreg., af hvilken flere Forfattere ansee den for en Afart.

Alm. lavere end foreg. 7. (**4**. \odot ?).

I Skove, især Naaleskove, sjeldnere end foreg.: **Sj.** Sørup Hegn ved Fredensborg (Jørg.), Hesttangs Mølle (Wroblevsky), Ledreborg Dyrehave (15), Alindelille (1), Sønderskoven ved Sorø (12), Asnæs Skov ved Kalundborg (Baagøe); **Møen** ved Dronningstolen (9); **Falst.** ved Kringelborg (14); **Loll.** ved Vesterborg, Steensgaard (19),

Erikstrup (Krebs); **J.** Lilleø i Juul Sø ved Silkeborg (16); **Sl.** Kobbermølleskoven ved Flensborg (Stisgaard).

6. *Erica*. Lyng.

542. **E. Tetralix** L. (Klokke-L.) H. 432; Drej. n. 419; F. D. 81; Rchb. ic. fl. germ. XVII, tab. 1163.

Bladene krandsstillede, linieformede med tilbagerullet, stivhaaret Rand, paa Overfladen og Midtnerven af Underfladen duunhaarede; *Blomsterne* nikkende, samlede til en tætblomstret *Skjærm* i Enden af Grenene.

Lav Halvbusk med oftest 4 Blade i Krandsene. Kronerne smukt rosenrøde, sjældnere hvide, efter Afbloomstringen henvisnende. 7—8. *h.*

I Hedemoser, hyppig paa *Halvøen*, især dens midterste Deel, i *Nordsjælland* og paa *Bornholm*; sjældnere i *Sydsjæll.* (Holmegaard! Fedet ved Lindersvold (H.), Kongsted (9)) og paa de øvrige Øer: **F.** Hofmansgave! V. Hæsing! Steenstrup (H.); **Loll.** Engestofte; **Falst.** Horreby Lyng (H., ikke bemærket i de senere Aar).

7. *Calluna*. Hedelyng.

543. **C. vulgaris** [Salisb. i Linn. trans. VI, p. 317] (Almindelig H.) Drej. n. 418; Rchb. l. c. XVII, tab. 1162; *Erica* L., H. 430; F. D. 677.

Bladene korsviis-modsatte, tæt taglagte, linie-sylformede, med püilformet Basis; *Blomsterne* i ensidig Klase paa Siden af Grenene.

Halvbusk med talrige, af de tætsiddende Blade frekantede Grene; Kronerne rødviolette, sjældnere hvide, efter Afbloomstringen vedblivende uforandrede. 8—9. *h.*

***β*, pubescens** Koch. *Bladene* tæt duunhaarede.

I Skove og Tørvmoser, men især paa tørre Heder, af hvilke den selv danner den væsentligste Bestanddeel; har sin største Udbredelse paa Høideryggen i Midten af Halvøen, det nordøstlige *Sjæll.* og Høilyngen paa *Bornh.*, men forekommer hist og her i de øvrige Provindser, hvor en mager og ufrugthar Jordbund eller Mangel paa Dyrkning begunstiger dens Fremtræden; sjældnest paa Lolland Falster! ***β***, i Hedemoser ved Ørsholt i *Sjæll.* (9), Hellebæks Vang! Teglstup Hegn, Humletofte (Heiberg); **Falst.** Horreby Lyng; **Loll.** Karleby Mose pr. Nysted (19); **F.** Skaarup (19).

8. *Vaccinium*. Bølle.

a. *Myrtillus*. Bladene affaldende; Kronen krukke- eller kugleformet, Støvknapperne med 2 hornformede Tilhængsler ved Grunden.

544. *V. Myrtillus* L. (Blaabær). H. 426; F. D. 974; Rchb. l. c. XVII, tab. 1169; *Myrtillus silvaticus* Drej. n. 420.

Grenene kantede; *Bladene* ægformede, fint saugtaktede, paa begge Flader grønne; *Blomsterne* nikkende, enlige i Bladhjørnerne; *Bægerranden* smal, udeelt; *Kronen* kugleformet.

$\frac{1}{2}$ —1' høj. Kronen grønlig med kjødfarvet Anstrøg. Bær sorte med blaa Dug, indvendig røde. 5. h.

Paa Lyngbakker og i høitliggende Skove, alm. paa *Halvøen*, i *Sjæll.* og paa *Bornh.*, sjældnere i *Fyen*: Assens, Steenstrup (H.), Højbjerg (12), Holsteenshuus, Søbo (24), og paa de mindre Øer: *Loll.* Fyrrevænget ved Saxkjøbing (5), Bøllesminde (19); *Falst.* i Horreby Lyng (Rasm.); *Moen*!

545. *V. uliginosum* L. (Mose-B.) H. 427; F. D. 231; Rchb. l. c. tab. 1168; *Myrtillus uliginosus* Drej. n. 421.

Grenene trinde; *Bladene* omvendt-ægformede, heelrandede, paa Underfladen blaagraae; *Blomsterne* nikkende, sammenhobede; *Bægeret* budt firetandet; *Kronen* krukkeformet.

$\frac{1}{2}$ —3' høj; Kronen hvid eller voxgul med rødligt Anstrøg. Bær som foreg., men indvendig hvide. 5—6. h.

β , *macrocarpum* Drej., F. D. 2469. Bærrene oval-pæreformede, alm. større end hos Hovedarten.

I Tørv- og Hedemoser: i *Halvøens* nordlige Egne alm., sjældnere mod S.: Varde! Vonsild, Dravitskov ved Lygumkloster (28), Gram (1), Rødding (16), Amrom (Jessen); i *Nordsjælland* ikke sjelden, sparsonimere i *Sydsjæll.* og paa de øvrige Øer. β , *Sj.* Tiisvilde (Drej.), Store Hareskov (14).

b. *Vitis idæa*. Bladene stedsegrønne; Kronen klokkeformet, Støvkapperne uden eller med utydelige Tilhængsler ved Grunden.

546. *V. Vitis idæa* L. (Tyttebær). H. 428; Drej. n. 422; F. D. 40; Rchb. l. c. tab. 1168.

Bladene omvendt-ægformede, med tilbagebøiet, utydeligt rundtakket Rand; paa Underfladen punkterede; *Blomsterne* i nikkende *Klaser* fra Enden af Grenene; *Bægerfligene* ægformede.

6—8" høi. Bladene paa Overfladen mørkgrønne, glindsende; Kronen hvid eller blegrød; Bærret høirødt. 6—7. *h.*

Paa Lyngheder og i Hedemoser; alm. i de Egne af Halvøen, Bornholm og Nordsjælland, hvor Lyngen spiller Hovedrollen, i de andre Egne sporadisk: *Sj.* Frederiksdals Skov! Særløse Overdrev (14), Fedet ved Lindersvold! Aamosen (15); *Falst.* Horreby Lyng (14); *F.* Assens, Steenstrup (H.).

c. *Oxycoccos*. Bladene stedsegrønne; Kronen hjulformet; Støvknapperne uden Tilhængsler ved Grunden.

547. **V. *Oxycoccos* L.** (Tranebær). F. D. 80; *Oxycoccos palustris* Pers., H. 429; Drej. n. 423; Rchb. l. c. tab. 1169.

Stængelen traadformet, krybende; *Bladene* ægformede, heelrandede med tilbagerullet Rand, paa Underfladen blaagraae; *Blomsterne* langstilkede, enlige eller samlede til en faablomstret *Halvskjærm* i Enden af Grenene; *Bægerfligene* nyreformede; *Kronfligene* tilbagebøiede.

Kronerne rosenrøde, Støvknapperne brandgule. Bær *carmoisin*. 6—7. *h.*

I Tørv- og Hedemoser, især mellem Sphagnum, alm. udbredt.

9. *Daphne*. Kjælderhals.

548. **D. *Mezereum* L.** (Pebertræ). H. 434; F. D. 268; Rchb. l. c. XI, 556.

Bladene lancetformede, med størst Brede ovenfor Midten, heelrandede; *Blomsterne* i afbrudte *Ax*, dannede af 2—3-blomstrede Nøgler langs opad de aargamle Grene; *Blomsterdækket* med udvendig haaret Rør og ægformede Flige.

En lav Busk med rosenrøde, vellugtende Blomster, som udspringe før de i Spidsen af Grenene fremkommende Blade. Frugten høirød. 3—4. *h.*

Er neppe oprindelig vildvoxende i Danmark, men dyrkes alm. i Haver, fra hvilke den stundom forekommer forvildet: *Sj.* Frydenlund (H.); *Loll.* Knuthenborg Skov (Holten), Bøllesminde (19); *F.* St. Jørgensgaard! *J.* Enge mellem Krat ved Kjærsholm S. for Viborg (7),

Kolding (H.); *Sl. Eibøl* Slotsbanke ved Haderslev (Grønlund), Ballastbakken ved Flensborg (16).

II. Digynia.

10. Chrysosplenium. Milturt.

549. *C. alternifolium* L. (Almindelig M.) H. 467; Drej. n. 453; F. D. 366.

Stængelen opret, udeelt; *Bladene* nyreformede, rundtakket-lappede; *Rodbladene* langstilkede; *Stængelbladene* kortstilkede, afvejlende; *Blomsterstanden* en endestillet, fladtrykt Qvast.

4—5" høi. Blomsterne og de dem omgivende Blade gule. 4—5. ♀.

I fugtige Skove, især ved Kildevæld, alm.

550. *C. oppositifolium* L. (Smaabladet M.) H. 467; Drej. n. 452; F. D. 365; H. N. XIV, 47.

Stængelen opstigende, ved Grunden rodslaaende, ofte grenet; *alle Bladene* modsatte, ægformet-kredsrunde, ved Grunden afsmalnede til en kort Bladstilk, rundbugtede; *Blomsterstanden* en endestillet, fladtrykt Qvast.

4—6" høi. Bladene mindre end hos foreg.; Blomsterne grøngule. 5. ♀.

Paa lignende Steder som foreg., men mindre hyppig: i *Halvøens* østlige Skove ikke sjelden, sparsommere mod V.; *F.* sporadisk: Vissenberg (H.), Nyborg (4), Caroline-Amalielund ved Svendborg! Ollerup Kohave! o. fl. St. mod S. (12); i *Sj.* sjelden: Gisselfeldt (H.), Hæsede! Steensby Skov (Rosenørn-Lehn), Langebæk (Knæckenborg).

III. Trigynia.

11. Fagopyrum. Boghvede.

551. *F. tataricum* [Gärtn. fruct. II, p. 182, t. 119] (Tatarisk B.) Drej. p. 152; F. D. 2649; Polygonum L.

Bladene hjerteformet-piilformede, tilspidsede; *Blomsterne* i tætte Klaser; *Frugten* spids, trekantet med bugtet-udrandede Kanter og graaagtig, rynket Overhud.

Blomsterne grønlig-hvide. 7—8. ☉.

Ukrud mellem Boghvede og anden Sæd, sjældnere paa Øerne end paa Halvøen, hvor den tillige undertiden dyrkes. !*

† *F. esculentum* [Moench. Meth. p. 290] (Almindelig B.) Drej. p. 152; Polygonum Fagopyrum L., H. 444.

Bladene langt-tilspidsede; *Frugten* tilspidset, trekantet, med heelrandede Kanter og jævn, sort, ofte glindsende Overhud; forøvrigt som foreg.

Blomsterne hvide eller rosenrøde. 6—7. ☉.

Dyrkes alm., især i sandige Egne, og forekommer af og til forvildet. *

IV. Tetragynia.

12. Paris. Fireblad.

552. *P. quadrifolia* L. (Almindelig F.) H. 447; Drej. n. 439; F. D. 139; Rchb. ic. fl. germ. X, 957.

Rodstokken vandret; *Skaflet* opret, bladløst med Undtagelse af 4 krandsstillede, grundnervede, elliptiske, heelrandede *Blade*; *Blomsten* enlig, endestillet; *Bægerbladene* lancetformede, længere end de traadformede *Kronblade*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Blomsterne grønne, med mørkrød Frugtknude og Grifler. Bær blaaagtig-sort. Var. med 3—6 Blade og Blomstens Dele i tilsvarende Antal. 5. 4.

I Skove, alm. udbredt.

13. Adoxa. Desmerurt.

553. *A. moschatellina* L. (Almindelig D.) H. 448; Drej. n. 438; F. D. 94; Rchb. ic. fl. germ. XVII, tab. 1172.

Rodstokken med hvide, tandformede Skjæl og udskydende *Udløbere*; *Bladene* dobbelt haandsnitdeelte, med lappede Afsnit; *Stængelen* opret, udeelt, med 1 Par modsatte Blade ovenfor Midten; *Blomsterhovedet* kantet.

3—4" høi. Blomster og Bær grønne. Hele Planten lugter af Moskus. 4—5.

I Skove og Krat alm., især i løs og fugtig Muldjord.

14. Elatine. Bækarve.

554. **E. Hydropiper** L. (Bidende B.) H. 448; Drej. n. 437; F. D. 156.

Stængelen krybende eller rodslaaende, med oprette *Grene*; *Bladene* modsatte, ovale eller omvendt-ægformede, Pladen kortere end Stilken; *Blomsterne* afvekslende, siddende eller meget kortstilkede.

1—2' høi, under Vandet grøn, ovenfor samme rødlig. Var. med Bladpladen længere end Bladstilken. Kronbladene rosenrøde. 6—9. ☉.

α , *gyrosperma* (Düb. i Bot. not. 1839). H. N. IX, 41. Kapselen fladtrykt, Frøene kredsformigt eller hesteskoformigt bøiede.

β , *orthosperma* (Düb. l. c.) Kapselen afrundet; Frøene bøiede i en svag Bue.

I rindende Vand og ved Randen af Søer, hyppigst under, sjældnere ovenfor Vandet, ikke alm., skjøndt ofte overseet paa Grund af dens Lidenhed. α , den almindeligere Form: Sj. Hørsholm (23), Frueskov ved Bagsværd, Frederiksdal, Frederiksberg (F. D.), Damhuussøen (Drej.)! Sl. Seemühle ved Rendsborg! β , forekommer i Slesvig (16), f. Ex. i Eiderslikken mellem Rendsborg og Süderstapel.

X 555. **E. Alsinastrum** L. (Krandtbladet B.) H. 449; Drej. p. 153; F. D. 2239; H. N. XIII, 55.

Stængelen opret eller opstigende; *Bladene* krandsstillede, siddende, *de nedre* (under Vandet) ennervede, linieformede, 8—10 i Krandsen, *de øvre* (ovenfor Vandet) 3—5-nervede, lancetformede, 3—5 i Krandsen; *Blomsterne* krandsstillede, siddende eller kortstilkede; *Frøene* meget svagt bøiede.

4—6" høi. Kronbladene hvide. 6—9. ♀.

Et Exemplar i Schumachers Herbarium angives at være samlet i en Sø ved Frederiksberg. Senere er den hverken funden der eller andetsteds i det egenlige Danmark. [2]

9de Klasse. Enneandria (Nihannede).

1. Orden. Hexagynia (Sexhunnede).

1. **Butomus** L. Blomsterdækket farvet, sexbladet, dets Blade i 2 Rækker; Frugterne 6 ved Grunden forenede Bællekapsler med talrige, vægstillede Frøe. (N. F. Alismaceæ).

I. Hexagynia.

1. Butomus. Brudelys.

556. **B. umbellatus** L. (Skjærmblostmestret B.) H. 451; Drej. n. 440; F. D. 604; Rchb. ic. fl. germ. VII, 103.

Bladene talrige fra den forkortede Rodstok, linieformede, trekantede; *Skafte* bladløst med en af et trebladet Svøb omgivet mangeblomstret *Skjærm* i Spidsen.

2—3' høi. Blomsterne rosenrøde. 6—7. 4.

Ved Bredderne af Aaer og Søer, funden i alle danske Provindser, men ikke lige alm. overalt: f. Ex. sjelden i *Halvøens* nordlige og østlige Egne: **J. S. Tranders**, Gistrup (H), Als ved Mariager Fjord (Branth), Aarhus! Østbirk (2); Horsens (Jørg.), Fredericia (1); **S. L. Hoptrup** (Grønlund), Aabenraa (Hempel), Flensborg Mølleødem (16) og i det sydlige *Fyen*: (Søbo! Lydinge Mølle (12), hyppigst i Marskegnene og langs Aaerne paa Halvøens Vestkyst samt paa Loll-Falster.

10de Klasse. Decandria (Tihannede).

1. Orden. Monogynia (Enhunnede).

A. Kronen fribladet.

1. **Geranium** L. Bæger og Krone fembladede; 10 knapbærende Støvdragere (hos *G. rotundifolium* de 5 golde); Griffelens Strænge ved Modenheden nedenfra sneglehuusformigt tilbage-rullede, Frugten femdelelig Spaltefrugt, Smaafrugterne enfrøede, indvendig glatte Hindefrugter (Blomsterstilkene 1—2-blomstrede).

2. **Erodium** L'Herit. Bæger og Krone fembladede; 5 knapbærende Støvdragere og 5 gølge Bistøvdragere; Griffelens Strænge ved Modenheden spiralformigt snoede; Frugten som foreg., med indvendig haarede Smaafrugter (Blomsterne i Skjærm). (1—2. N. F. Geraniaceæ *).

3. **Pyrola** L. Bægeret femdeelt; Kronen fembladet, regelret; Støvknapperne opspringe ved Huller i Spidsen; Frugt femrummet, mangefrøet Kapsel med rundelende Opspringning. (N. F. Pyrolaceæ).

Monotropa (8, 1).

B. Kronen sambladet.

4. **Andrómæda** L. Blomsten undersædig; Støvknapperne med hornformede Tilhængsler og opspringende ved Huller i Spidsen; Frugt femrummet, femklappet, mangefrøet Kapsel med rundelende Opspringning.

5. **Arctostaphylos** Adans. Blomsten undersædig; Støvknapperne som foreg.; Frugten et Steenbær med 5—7 enfrøede Stene. (4—5. N. F. Ericineæ, b.).

Vaccinium. Blomst oversædig, Frugten et Bær. (8, 1).

Lysimachia thyrsoflora. Blomsten undersædig. Frugten Kapsel. (5, 1).

2. Orden. *Digynia* (Tohunnede).

A. Blomsterdækket enkelt.

6. **Scleranthus** L. Bægeret femdeelt, omkringsædigt; Krone 0; Frugten en Nød, tæt omsluttet af det vedblivende Bæger. (N. F. Paronychieæ).

*) Slægterne *Geranium* og *Erodium* henregnes af de Fleste (ogsaa af L.) til Klassen Monadelphia, men hos de danske Arter, som jeg har undersøgt, har jeg fundet Støvdragerne enten aldeles ikke eller kun saa svagt sammenvoxne, at man, uden iforveien at være underrettet derom, ikke let falder paa at søge dem iblandt de Enknippede. Jeg har henført disse Slægter efter Støvdragernes Antal til Decandria.

Herniaria. } Blomsten undersædig, 5 frugtbærende og 5 gølge
Illecebrum. } Støvdragere. (5, 2).

Chrysosplenium. Blomsten halvt oversædig. Frugten torummet Kapsel. (8, 2).

B. Blomsterdækket dobbelt.

7. **Saxifraga** L. Bægeret femdeelt, undersædigt eller halv-oversædigt; Kronblade 5; Frugten torummet Kapsel med 2 Horn i Spidsen (de vedblivende Grifler), og opspringende ved et Hul mellem disse. (N. F. Saxifragaceæ).

8. **Gypsophila** L. Bægeret tragt- eller klokkeformet, uden Bibæger; Kronbladene uden Bikrone; Frugten enrummet, freklappet Kapsel med midtstillet Frøstol.

9. **Saponaria** L. Bægeret rørformet, uden Bibæger; Kronbladene med skjælformede Bikronblade i Svælget; Frugt som foreg.

10. **Dianthus** L. Bægeret rørformet, med Bibæger; Kronbladene uden Bikrone, ofte med Haar i Svælget; Frugt som foreg. (8—10. N. F. Silenaceæ)*).

3. Orden. Trigynia (Trehunnede).

A. Bægeret sambladet, Kronbladene med lange Negle.

11. **Silene** L. Bægeret femtandet eller femfliget, uden Bibæger; Kronbladene hele eller indskaarne, med eller uden Bikrone; Kapselen sextandet, ved Grunden trerummet. (N. F. Silenaceæ).

Melandrium noctiflorum Fr. (10, 4).

*) Slægterne 8—25, som høre til de naturlige Familier Silenaceæ, Alsineæ og Paronychieæ, have alle modsatte (eller krandsstillede), hele Blade samt en ved Tænder eller Klapper opspringende Kapsel med midtstillet Frøstol.

B. Bægeret fribladet, Kronbladene med korte eller ingen Negle.

a. Bladene med hindeagtige Axelblade (Kronbladene røde eller rødlig-hvide).

12. **Lepigonum** Fr. Kronbladene udeelte; Kapselen treklappet. (N. F. Paronychieæ).

b. Bladene uden Axelblade (Kronbladene hvide.
13—17. N. F. Alsinnaceæ).

aa. Kapselen treklappet.

13. **Alsine** Wahlenb. Kronbladene udeelte eller svagt udrandede; Støvdragernes ydre Kreds med svage Honningkirtler ved Grunden; Frøene talrige, smaae.

14. **Haliánthus** Fr. Kronbladene hele; Støvdragernes ydre Kreds med (10) tydelige Honningkirtler ved Grunden; Frøene faae og store.

bb. Kapselen sexklappet.

15. **Arenária** L. (part.) Kronbladene udeelte; Frøene nyreformede, uden Frøhud.

16. **Moehringia** (L.) Kronbladene udeelte (eller svagt udrandede); Frøene nyreformede, omgivne af en Frøhud ved Grunden.

17. **Stellária** L. Kronbladene i Spidsen tokløvede; Frøene nyreformede (uden Frøhud).

Holosteum. Frøene skjoldformede (3, 3).

4. Orden. *Pentagynia* (Femhunnede).

A. 1 Frugtknude, 5 Grifler; Frugten en Kapsel.

a. Bægeret sambladet. (18—21. N. F. Silenaceæ).

18. **Agrostemma** L. Bægeret læderagtigt, femfliget; Fli-gene længere end Kronen; Kronbladene udrandede, uden Bikkone, Kapselen enrummet, femtandet.

19. **Melandrium** Roehling. Bægeret femtandet; Kron-

bladene tokløvede, med Bikronblade i Svælget; Kapselen opspringende ved Tænder af Griflernes dobbelte Antal.

20. **Lychnis** L. (part.) Bægeret femtandet, Tænderne kortere end Kronen; Kronbladene dybt fligede, med Bikronblade i Svælget; Kapselen enrummet, opspringende ved Tænder af Griflernes Antal.

21. **Viscaria** Roehl. Bægeret femtandet, Tænderne kortere end Kronen; Kronbladene udrandede, med tokløvet Bikrone i Svælget; Kapselen ved Grunden femrummet, opspringende ved Tænder af Griflernes Antal.

b. Bægeret fribladet. (22—24. N. F. Alsinaceæ).

aa. *Kronbladene i Spidsen udrandede eller tofligede.*

22. **Cerastium** L. Blomsten 4—5-delelig; Kronbladene udrandede eller til Midten tofligede; Kapselen titandet.

23. **Malachium** Fr. Blomsten femdelelig; Kronbladene dybt todeelte; Kapselen femklappet med totandede Klapper.

bb. *Kronbladene i Spidsen hele.*

24. **Sagina** L. Blomsten 4—5-delelig; Kapselen 4—5-klappet; Frøene nyreformede, uvingede. (Bladene modsatte, uden Axelblade; Kronbladene mangle undertiden).

25. **Spérgula** L. (part.) Blomsten femdelelig; Kapselen femklappet; Frøene kugleformet-lindseformede, vingede (Bladene krandsstillede, med hindeagtige Axelblade.—N.F. Paronychææ).

Oxalis. Støvdragerne ved Grunden sammenvoxne (16, 2).

B. 1 Frugtknude, 5 Grifler, Frugten et Bær.

Adoxa. Bægeret 2—3-bladet, halvt oversædigt (8, 4).

C. 5 Frugtknuder, Frugterne 5 Bællekapsler.

26. **Sedum** L. Bæger og Krone fembladede; 5 Skjæl ved Grunden af Frugtknuden (Safrige Urter. N. F. Crassulaceæ).

I. Monogynia.

1. Geranium. Storkenæb.

a. *Batrachium* Koch. Rodstokken tyk, vandret eller skjæv, snoet, knudret, foroven skjældækt. 4.

aa. *Smaafrugternes Klapper* (*Frøggjemmet*) jævne.

α, Blomsterstilkene enblomstrede.

557. *G. sanguineum* L. (Blodrød S.) H. 740; Drej. n. 682; F. D. 1107; Rehb. ic. fl. germ. V, fig. 4884.

Bladene kreds rundt-nyreformede, dybt haandfligede eller -snitdeelte, med omtrent 7, 3—5-fligede Afsnit; *Bægerbladene* trenervede, ægformede, hule, braadspidsede, halvt saa lange som de omvendt-hjerteformede, udrandede *Kronblade*; *Støvtraadene* med udvidet Basis, randhaarede; *Frøggjemmerne* kirtlet-duunhaarede, oventil langhaarede; *Frøene* fiint-punkterede.

Stængler og Blomsterstilke stivhaarede af vandret udstaaende Haar. Kronbladene mørk-rosenrøde, ovenfor Neglen skjægghaarede. 6—8. 7.

Paa Bakker og Skrænter, især mellem Krat: i enkelte Egne ikke sjelden, f. Ex. det nordl. *Jyll.* (til Aarhus), *Nordsjælland* og *Bornh*; i de andre Egne sparsommere: *Falst.* Gaabense! *Loll.* (5); *F.* Hofmansgave (H.), Kjerteminde (Heiberg); *Sl.* Gelting Birk, Königsmark og mellem Schauendal og Olderup ved Husum (16).

β, Blomsterstilkene toblomstrede.

558. *G. palustre* L. (Kjær-S.) H. 736; Drej. n. 694; F. D. 596; Rehb. l. c. fig. 4892.

Stængelen udstrakt eller opstigende, med udspilede *Grene* tilligemed Blomsterstilkene stivhaarede af nedadvendte Haar; *Bladene* haandformigt femfligede med indskaaret-saugtakke Flige; *Åxelbladene* urteagtige; *Blomsterstilkene* efter Afblostringen tilbagebøiede; *Bægerbladene* femnervede, ægformet-ovale, braadspidsede, halvt saa lange som de omvendt-ægformede *Kronblade*; *Støvtraadene* ved Grunden udvidede, randhaarede; *Frøggjemmerne* og *Næbet* tiltrykt-haarede, uden Kirtler; *Frøene* fiint punkterede.

Kronbladene mørk rosenrøde eller rødviolette, ovenfor Neglen skjægghaarede. 7.

Paa Enge mellem Buske, i fugtige Kratskove: i *Sjæll.* (især mod S. V.) samt paa *Loll.-Falster* ikke sjelden; *Ærø* (10); *Sl.* Ensted ved Aabenraa, mellem Teesbæk og Bommerlund, mellem Kappel og Egernførde, Selker Mose (16), Enge ved Gottorp Slot! (I *Jyll.* og *Fyen* er det mig ikke bekjendt at den er funden). [3]

559. *G. pratense* L. (Eng-S.) H. 737; Drej. n. 693; Rchb. l. c. fig. 4883.

Stængelen opret, med opret-aabne, foroven, tilligemed Blomsterstilkene, kirtlet-duunhaarede *Grene*; *Bladene* haandsnitdeelte, med omtrent 7 dobbelt fjerfligede Afsnit; *Axelbladene* hindeagtige; *Blomsterstilkene* efter Afblomstringen tilbagebøiede; *Bægerbladene* trenervede, ægformet-ovale, langstakkede, halvt saa lange som de omvendt-ægformede *Kronblade*; *Støvtraadene* ved Grunden brede, randhaarede; *Frøggjemmerne* og *Næbet* kirtelhaarede; *Frøene* fint punkterede.

Hele Planten større end foreg. og følg., *Kronbladene* blaaagtig-violette, ovenfor Neglen randhaarede. 7—8.

I Krat og ved Gjærder, sjelden: *Sj.* Brede (H.)? *Falst.* mellem Horbeløv og Meelse (14), Stubbekjøbing (19); *F.* Kratskov mellem V. Hæsing og Tørringe! Svendborg (H.); *J.* Skjærup! Findes desuden forvildet omkring Haver og Byer, f. Ex. *Sj.* paa flere Steder i Kjøbenhavns Omegn, *Loll.* ved Pederstrup (19); *F.* ved Landsbyer hist og her (19); *J.* Ødstedgaard! *Sl.* Husum, Tønning (F. Müll.), mellem Knoop og Holtenau!

560. *G. silvaticum* L. (Skov-S.) H. 736; Drej. n. 692; F. D. 124; Rchb. l. c. fig. 4882.

Stængelen opret, med opret-aabne, tilligemed Blomsterstilkene kirtlet-duunhaarede *Grene*; *Bladene* dybt haandfligede, med omtrent 7 saugtakket-indskaarne (ofte trelappede) Flige; *Axelbladene* hindeagtige; *Blomsterstilkene* efter Afblomsringen oprette; *Bægerbladene* trenervede, ovale, braadspidsede, halvt saa lange som de omvendt-ægformede *Kronblade*; *Frøggjemmerne* og *Næbet* kirtelhaarede; *Frøene* fint punkterede.

Mindre end foreg., *Kronbladene* rødviolette, ovenfor Neglen skjæg-haarede. 6—7.

I Skove og Krat: i det østl. *Jyll.* (især fra Aarhus til Veile) ikke sjelden, sparsommere mod S. (fra *Slesv.* er mig intet Voxested bekjendt); paa *Øerne* sporadisk: *F.* Krat ved Lunde pr. Odense (18), Smallehave ved V. Skjerninge! *Sj.* Boserup, Ledreborg! Bernstorff (H.), Ørholm! Brede! Paa *Bornholm* alm.!

bb. Smaafrugternes Klapper paatværs rynkede.

† 561. **G. phæum** L. (Bølgekronet S.) H. 735; Drej. n. 685; F. D. 987; Rchb. l. c. fig. 4891; H. N. IX, 33.

Stængelen opret, især ved Leddene tilligemed Blomsterstilkene stivhaaret af udstaaende Haar; *Bladene* haandfligede eller -lappede, med omtrent 7 indskaaret-saugtakkede Lapper; *Kronbladene* rundagtige med kort Negl, bølget-rundtakkede, fladt udbredte, lidet længere end de femnervede, ovale eller elliptiske, kort braadspidsede *Bægerblade*; *Frøggjemmerne* tiltrykt-haarede; *Frøene* fint sribede.

Stgl. alm. rødprykket, Kronbladene mørkt violetbrune. 6—7.

β, *lividum* Koch (G. *lividum* L'Herit.), Haarene blødere, Kronbladene skident lila.

I Skove og Krat, især omkring beboede Steder, sandsynligviis oprindelig forvildet fra Haver, hvor den dog nu ikke mere dyrkes: **Sj.** Sorgenfri i Krattet ved Aaen! Rosenborg Have, Sorø (H.); **Falsk.** Moseby Præstegaards Have (14), Hanenov (19); **F.** Bramstrup (18); **J.** Lyngbygaard ved Aarhus (16), Ødstedgaard! **Sl.** Bommerlund (16), Huusby (12) og Grumtoft i Angel, Nyværk ved Slesvig (16), Ascheffel (20). **β**, Et Gjærde ved »Lygteu» udenfor Kjøbenhavn (12). *

b. Batrachioides Koch. Roden tapformet, ingen Rodstok. 4.

562. **G. pyrenaicum** L. (Pyrenæisk S.) Drej. n. 688; F. D. 2240; Rchb. l. c. fig. 4881; H. N. IX, 34.

Stængelen opret, duunhaaret; *Bladene* nyreformede, haandfligede, (de nedre 7—9-, de øvre femfligede), Fligene rundtakket-lappede; *Blomsterstilkene* efter Afblomstringen tilbagebøiede; *Kronbladene* omvendt-hjerteformede, tokløvede, ovenfor den korte Negl skjægghaarede, næsten dobbelt saa lange som de randhaarede, kort braadspidsede *Bægerblade*; *Frøggjemmerne* jævne, tiltrykt-duunhaarede; *Næbet* kirtelhaaret; *Frøene* jævne.

Kronbladene rosenrød-lila eller hvide. 7—9.

Ved Gjærder, omkring Haver og Byer, ikke alm. og paa de fleste Steder, som det synes, oprindelig forvildet: **Sj.** Helsingør (21), Søllerød (Petersen), Dronninggaard, Sophienholm ved Frederiksdal, Roeskilde, Bidstrup! Ledreborg (24), Sorø! Bregentved, Nysø (9); **F.** Svendborg (12), Langeskovs Kro (16), Hofmangsgave (18); **J.** Veile! **Sl.** Ha-

derslev (Grønlund), Vonsbæk (Nielsen), Hesteberger Schützenkoppel ved Slesvig (16). ⁸

c. *Columbinum* Koch. Roden tynd, pæleformet, ingen Rodstok. ☉.

aa. *Smaafrugternes Frøggjemme jævnt.*

α, Frøene jævne.

563. **G. rotundifolium** [L. Fl. Suec., Fr. Nov. p. 212] (Rundbladet S.); H. N. XIV, 35; G. pusillum H. 734; Drej. n. 687; F. D. 1994; Rchb. l. c. fig. 4877.

Bladene kreds rundt-nyreformede, haandfligede, med 5—9, trelappede Flige; *Blomsterstilkene* efter Afblostringen tilbagebøiede; *Kronbladene* omvendt-hjerteformede, udrandede, med svagt randhaaret Negl, ligelange med de kort-braadspidsede *Bægerblade*, de 5 *Støvdragere* golde; *Frøggemmet* tiltrykt-haaret.

Hele Planten meget fint duunhaaret af udstaaende Haar, *Blomsterstilkene* kirtelhaarede, *Kronbladene* lila ell. skidenrøde. 6—8.

β, minus Fr. l. c. (G. pusillum L. sp.) Lavere og med mere spidst-lappede Blade.

Ved Gjærder, paa Marker o. a. dyrkede Steder meget alm. β, med Hovedarten, paa magrere Jord.

β, Frøene grubet-punkterede.

? *G. viscidulum* [Fr. Nov. p. 216] (Klæbrig S.) *G. rotundifolium* L. Sp., H. 739 (undt. Voxest.); Drej. n. 689; Rchb. l. c. fig. 4878; H. N. XII, 52.

Bladene nyreformede, haandfligede, med 5—7 rundtakkettrelappede Flige; *Blomsterstilkene* som hos foreg. (kortere end *Bladene*); *Kronbladene* omvendt-ægformede, heelerandede, med glat Negl, lidet længere end de kirtelhaarede, braadspidsede *Bægerblade*; *Frøggemmet* duunhaaret af udstaaende Haar.

Stængler og *Blomsterstilke* kirtelhaarede, *Kronbladene* lysrøde. 6—8.

Ved Gjærder og Mure. Angives af Hornem. som forekommende hist og her, hvilket vel berøer paa en Forvexling med den større Form af foreg. Det er mig ikke bekjendt at den er funden i Danmark, men da den forekommer saavel i Skåne som i Tydskland og England, kunde den muligviis ogsaa findes her, og anbefales derfor til nærmere Eftersøgning.

564. **G. dissectum** L. (Kløftbladet S.) H. 739; Drej. n. 691; F. D. 936; Rehb. l. c. fig. 4876; H. N. XIV, 36.

Bladene nyreformede, de nedre 5—7-fligede med trelappede Flige, de øvre haandsnitdeelte med 3—5 dybt trefligede Afsnit (Fligene linieformede); *Blomsterstilkene* som hos foreg., kortere end *Bladene*; *Kronbladene* omvendt-hjerteformede, udrandede, med svagt randhaaret Negl, ligelange med de langt braadspidsede *Bægerblade*; *Frøggjemmerne* tilligemed *Bæger* og *Blomsterstilke* beklædte med udstaaende Kirtelhaar.

Stængelen med nedadvendt Haar. *Kronbladene* carmoisin- eller mørk-rosenrøde. 6—7.

Paa dyrkede Marker, Grøftevolde o. s. v., ikke sjelden.

565. **G. columbinum** L. (Storbægret S.) H. 740; Drej. n. 690; F. D. 1222; Rehb. l. c. fig. 4875; H. N. XV, 37.

Bladene haandsnitdeelte, Afsnittene 5—7, dybt 3—5-fligede, med linieformede Flige; *den fælles Blomsterstilk* længere end *Bladene*, med efter Afblostringen tilbageboiede Smaa-blomsterstilke; *Bægeret* femkantet; *Kronbladene* omvendt-hjerteformede, med randhaaret Negl, ligelange med de langstakkede *Bægerblade*; *Frøggjemmerne* fjernt- og tiltrykt-haarede (eller næsten glatte).

Stængelen svagthaaret af nedad tiltrykte Haar; *Blomsterne* større end hos de andre Arter af Afdelingen c., *Kronbladene* lila-rosenrøde.

Paa dyrket Jord, ved Gjærder, i aabne Kratskove, ikke sjelden.

bb. Smaafrugternes Klapper paatværs rynkede.

566. **G. molle** L. (Blød S.) H. 738; Drej. n. 686; F. D. 679; Rehb. l. c. fig. 4879; H. N. I, 36.

Stængelen opstigende; *Bladene* kreds rundt-nyreformede, haandfligede; *Fligene* 7—9, budt trelappede; *Blomsterstilkene* som foreg.; *Kronbladene* omvendt-hjerteformede, udrandede, med randhaaret Negl, længere end de kort braadspidsede *Bægerblade*; *Frøggjemmerne* glatte; *Frøene* jævne.

Hele Planten blødt-duunhaaret af udstaaende Haar. *Kronbladene* smukt røde. 5—8.

Paa tørre Marker, Grøftevolde og Diger meget alm.

567. **G. lucidum** L. (Skinnende S.) H. 738; Drej. n. 684; F. D. 218; Rchb. l. c. fig. 4872.

Stængelen opret, tilligemed Blomsterstilkene ensidigt haaret, forøvrigt glat; *Bladene* fjernt-haarede eller næsten glatte, kreds rundt nyreformede, haandfligede, Fligene 5—7, rundtakket-lappede, med budte, braadspidsede Lapper; *Blomsterstilkene* som foreg.; *Bægeret* femkantet, med paatværs rynkede, braadspidsede Bægerblade, lidet kortere end Kronen; *Kronbladene* Plade omvendt-ægformet, heelrandet, kortere end den glatte Negl; *Frøggjemmerne* sribede paalangs, foroven duunhaarede; *Frøene* jævne.

Hele Planten glindsende, ofte rødligt anløben. Kronbladene rosenrøde. 6—8.

I Skove og Krat, sjelden: *Sj.* Helsingør (H.)? Tjustrup ved Sorø! mellem Taarnholm og Dyrehovedgaard ved Korsør (29); *Bornh.* ved Ruinerne af Gamleborg (H.) og Lilleborg, Lindholmsklipperne i Røe Sogn (19), Randklevn (8), Ringbjerget (21).

568. **G. robertianum** L. (Stinkende S.) H. 737; Drej. n. 683; F. D. 694; Rchb. l. c. fig. 4871.

Stængelen opret eller opstigende, tilligemed Blomsterstilkene langhaaret af udstaaende, glindsende Haar; *Bladene* til Grunden haandsnitdeelte, Afsnittene 3—5, fjersnitdeelte med saugtaket-fligede Afsnit; *Blomsterstilkene* som foreg.; *Bægeret* tikantet-stribet, med langstakkede Bægerblade; *Kronbladene* som foreg.; *Frøggjemmerne* svagt duunhaarede; *Frøene* jævne.

Stængelen alm. rødligt anløben. Hele Planten har en stærk, ikke behagelig Lugt. Kronbladene rosenrøde. 7—8. Var. i Henseende til Beklædningen, Bladenes Indskjæringer o. s. v. En afvigende Form er:

β, rubricaula Hornem. (b. *purpureum* Rchb. l. c. fig. 4871). Stængelen nedliggende, meget grenet, mørkrød; Bladene mindre, med finere Flige; Frøggjemmerne glatte, mere rynkede.

I fugtige Skove og omkring dyrkede Steder alm. *β*, ved Strandbredder mellem Sand og Stene paa Havstokken: *Sj.* Strandbredder S. for Kjøge! Bredderne af Kattegattet ved Veirhøi! Nykjøbing i Ods herred (9); *Samso* (2); *F.* Havstokken Ø. for Hersnap paa Hinds-holm! Avernakø (12); Søby Batteri paa *Ærø* (10); *Moen* ved Kappellet (14); *J.* Boeslum Strand ved Ebeltoft (Ørting).

2. Erodium. Tranchals.

569. *E. cicutarium* [L'Herit. i Ait. h. kew. ed. 1, II, 414] (Almindelig T.) Drej. n. 690; Rchb. l. c. fig. 4864; *Geranium cicutarium* L., H. 733; F. D. 986.

Bladene dobbelt-fjersnitdeelte, med saugtakket-fligede Af-snit; *Frøbladene* 3—5-lappede; *Bægerbladene* hule, budte med en Braad nedenfor Spidsen, langs Nerverne stivhaarede, i Randen finthaarede; *Kronbladene* uligestore, længere end Bægeret, omvendt-ægformede med skjægshaaret Negl; *Støvdragerne* glatte, de 5 frugtbare nedentil udvidede, med en mørkrød Kirtel ved Grunden; *Næbet* tiltrykt-haaret.

Stængel og Blade stivhaarede af udstaaende Haar. Kronbladene rosenrøde, de 2 kortere med en hvid, sortprikket Plet ved Grunden. Var. i Henseende til Bladenes Indskjæring. 4—7. ☉.

Paa tørre Steder, f. Ex. sandige Marker, Grøftevolde, Mure, alm.

Anm. *E. pimpinellæfolium* Willd. (Drej. n. 681; Rchb. 4865), som beskrives med udeelte Frøblade og Kronblade af Bægerets Længde, er en tvivlsom Form og maaskee neppe andet end en Afændring af foreg. Den angives fra Baarse og Lundbygaard ved Præstø.

3. Pyrola. Vintergrøn.

a. *Moneses* Salisb. Stængelen enblomstret; Kronbladene horizontalt udbredte, Kapselen opspringende ovenfra, uden Trævlenæt mellem Sømmene.

570. *P. uniflora* L. (Enblomstret V.) H. 466; Drej. n. 445; F. D. 8; Rchb. l. c. XVII, tab. 1156; *Chimaphila* Fr. Bot. not. 1840 p. 37; *Moneses grandiflora* Salisb.

Rodbladene omvendt-ægformet-kredsrunde, saugtakkede; *Skaflet* bladløst eller med et Dækblad ovenfor Midten; *Blomsterne* nikkende; *Støvdragerne* opstigende og tiltrykte til Kronen; *Arret* straaleformet, *Griffelen* ret, omtrent af Længde med den ved Modenheden oprette Frugt.

2—6" høi. Blomsterne hvide, vellugtende. 6—7. ♀.

I Naaleskove, sjelden: *Sj.* Hornbæks Plantage (17!), Rungsted (Fru Pingel), Rudergaard (Frisenette), Rudersdals Skov (14), Bagsværd ved Teglgaarden (9), Frederiksdal (15); *J.* Skyum Krat, Skjörping (H.).

b. *Pyrolæ genuinæ*. Blomsterne i Klase, Kronblade og Støvdragere opadrettede; Kapselen opspringende nedefra, med Trævlenæt mellem Sømmene.

aa. *Pyrola Alefeld*, Linnæa 1856 p. 18. *Klasen ensidig; Støvknapperne fremragende, 2 Kirtler ved Grunden af hvert af Kronbladene.*

571. **P. secunda** L. (Ensidig V.) H. 465; Drej. n. 446; F. D. 402; Rchb. XVII, tab. 1155.

Bladene ægformet-elliptiske, spidse, saugtakkede; *Bægerfligene* ægformede, afrundede; *Kronbladene* sammensluttende; *Griffelen* fremragende og længere end Kapselen; *Arret* femlappet uden Ring forneden.

4—6" høi. Kronbladene grønlig-hvide. 7. 4.

I høitliggende Skove, funden i alle Landets Provindser, men sporadisk og ikke alm.

bb. *Amelia Alef. l. c.* *Klasen alsidig; Støvknapperne indsluttede, ingen Kirtler ved Grunden af Kronbladene, Griffelen ret, smalere end det skiveformede Ar.*

572. **P. minor** L. (Liden V.) H. 464; Drej. n. 447; F. D. 55; Rchb. XVII, tab. 1155; *Amelia minor Alef. l. c.* p. 25.

Bladene ovale eller elliptiske, rundtakke; *Bægerfligene* ægformede, tilspidsede; *Kronbladene* under Blomstringen sammensluttende; *Griffelen* indsluttet i Kronen og kortere end Kapselen, *Arret* femlappet, uden Ring forneden.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronerne rosenrøde eller hvide 7. 4.

I høitliggende Løvskeve hist og her i alle danske Provindser, sjældnere i Tørvmoser, f. Ex. Estrup i Vendsyssel (12) og paa Sandgrund, f. Ex. J. Klitter ved Blaavandshuk (30); *Bornh.* Frydenlund ved Rønne!

573. **P. media** [Sw. Vet. ac. handl. 1804 p. 257, t. 7] (Klokkeblomstret V.) H. 464; Rchb. XVII, tab. 1154; H. N. IX, 56; *P. rotundifolia* F. D. 110; *Amelia media Alef. l. c.* p. 30.

Bladene ovalt-kredsrunde, utydeligt rundtakke; *Bæger-*

fligene ægformede, spidse; *Kronbladene* under Blomstringen tilsluttende, *Griffelen* fremragende udenfor Kronen og længere end Kapselen; fra hvilken den udgaaer i en skraa Retning, *Arret* femlappet, udvidet forneden til en Ring.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronbladene rødlig-hvide, meget større end hos foreg. 6—7. 4.

I Skove og paa Bakker mellem Krat, meget sjelden: *Bornh.* i Almindingen! *J.* Bonderup Bakker (Branth), i Krattet Skatskov ved Eveldrup (Dr.).

cc. Thelaia Alef. l. c. Griffelen fra en nedbøiet Basis buformigt opstigende, tykkere end Arret, forøvrigt som foreg.

574. **P. rotundifolia** L. (Aabenblomstret V.) H. 463; Drej. n. 449; F. D. 1816; Rchb. l. c. XVII, tab. 1153, fig. 1; *Thelaia rotundifolia* Alef. l. c.

Bladene budt-ægformede eller kreds rundt-ovale, heelrandede eller utydeligt rundtakkede; *Bægerfligene* lancetformede, spidse, af Kronbladenes halve Længde; *Kronen* under Blomstringen aaben; *Griffelen* længere end Kronbladene og Kapselen, foroven udvidet til en Ring, der er bredere end det opret-femlappede Ar.

6—9" høi. Kronbladene hvide. 6—7. 4.

β , *arenaria* Koch, Rchb. l. c. fig. 2 (*Thelaia intermedia* Alef. l. c.) Lavere, med talrige, brede og budte Skjæl paa Blomsterskaffet, budte Bægerflige, kortere og mindre bøiet Griffel.

I Hængedynd og Hedemoser, ikke alm.: *Sj.* Tibirke Mose! Jonstrup Vang (14), Lyngby Mose! Heder ved Kjøge Bugt (15); *J.* Hjesbæk Mølle S. f. Aalborg (Dr.), Svenstrup (Branth), Fusing Vasehuus, Klausholm (7), Boller (Jørg.); *Sl.* Gremmerup Kjær i Angel (16), Olderup ved Husum (F. Müll.); *Bornh.* Hasle (11), Rytterknægten (20). β , paa fugtig Sandgrund, f. Ex. Adserbo Overdrev ved Frederiksværk!

575. **P. chlorantha** [Sw. Vet. ac. handl. 1810, p. 190] (Grønblomstret V.) H. 464; Drej. n. 448; F. D. 1693; Rchb. l. c. XVII, tab. 1154; H. N. XIII, 65; *Thelaia chlorantha* Alef. l. c.

Bladene kredsrunde eller ovale (ofte med større Brede end Længde), i Spidsen afrundede eller svagt udrandede, heelrandede eller utydeligt rundbugtede; *Bægerfligene* ægformede

med en kort Spids, $\frac{1}{4}$ af Kronbladenes Længde; *Kronen* under Blomstringen aaben; *Støvknapperne* rørformigt forlængede; *Griffelen* som foreg.

$\frac{1}{2}$ ' høi. Bladstilkene rødbrune. Kronen bleggryn (Blomsterknopperne til det følgende Aar ere allerede tydelige i Blomstrings-tiden). 6—7. 4.

I Naaleskove meget sjelden: *Sj.* Hornbæks Plantage (Heiberg)! Granskov ved Bagsværd Sø (27!). 1*

4. *Andromeda. Rosmarinlyng.*

576. *A. polifolia* L. (Vild Rosmarin) H. 461; Drej. n. 441; F. D. 54; Rchb. l. c. XVII, tab. 1161.

Bladene linie-lancetformede, heelrandede med tilbagerullet Rand, glatte og paa Underfladen hvidgraae; *Blomsterne* langstilkede, skjærmformigt samlede i Spidsen af Grenene; *Kronen* ægformet-krukkeformet.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Halvbusk med stedsegrønne Blade. Kronen bleg-rød. 6—7. 2.

I Hedemoser: ikke sjelden paa *Halvøen*; i *Sjæll.* sporadisk, paa de øvrige Øer sparsom: *Falst.* Horreby Lyng! Lidstrup Lyng (Koch); *Loll.* Karleby ved Nysted (19), Søholt (5); *Langel.* ved Tranekjær (H.); *F.* Steenstrup, Fyenshoved (H.).

5. *Arctostaphylos. Meelbærriis.*

577. *A. Uva ursi* [Spr. Syst. II, pag. 287] (Stedsegrøn M.) *Arbutus Uva ursi* L., H. 462; F. D. 33; *Arctostaphylos officinalis* W. & Gr., Drej. n. 442; Rchb. l. c. XVII, tab. 1167.

Stængelen nedliggende, stærkt grenet; *Bladene* omvendt-ægformede, heelrandede, glindsende, stedsegrønne, nætformigt-aarede; *Blomsterne* i sammentrængte, kortstilkede Klaser fra Spidsen af Grenene.

Kronen rosenrød ell. hvid med rød Krave. Bærret høirødt. Bladene ligne Tyttebærblade. 5—6. 2.

Paa Lyngheder: alm. paa *Halvøen* fra Hederyggen mod V., sjældnere Ø. for samme; paa *Øerne* meget sjelden: *Samsø* (Jacobsen), *Sj.* Tiisvilde (H.).

II. Digynia.

6. Scleranthus. Knavel.

578. *S. annuus* L. (Enaarig K.) H. 479; Drej. n. 450; F. D. 504.

Stængelen leddet, gaffeldeelt-grenet; *Bladene* sylformede, alsidigt vendte, modsatte, med knippestillede Blade (forkortede Grene) fra Bladhjørnerne; *Bægerfligene* ægformede, spidse, grønne med en smal hindeagtig Rand, mod Frugtmodningen aabne.

Hele Planten grøn. 5—7. ☉. Var. med mere eller mindre grenet Stængel og

β, *biennis* Fr. (Fl. Scan. p. 118; H. N. XII, 61). Bægeret mod Frugtmodningen aabent. ☉.

Paa dyrkede Marker, et alm. Ukrud. *β*, paa tørre Bakker: *Loll.* ved Grønnegade (5).

579. *S. perennis* L. (Fleeraarig K.) H. 479; Drej. n. 451; F. D. 563; H. N. XII, 62.

Bladene ensidigt vendte; *Bægerfligene* ovale, budte, med bred, hindeagtig Rand og grøn Midtnerve, mod Frugtmodningen lukkede, forøvrigt som foreg.

Stængelen ofte rødlig. Forekommer hyppigst med korte Ledstykker og tæt sammentrængt, knippeformet Blomsterstand, men var., som foreg., med forlængede Ledstykker og stærkt forgrenet Qvast. 6—8. 4.

Paa udyrkede, sandige Marker og Bakker, ikke sjelden paa Halvøen, i det vestlige Fyen, Nordsjælland og Bornholm; i de øvrige Egne, især paa de mindre Øer, sparsom.

7. Saxifraga. Steenbræk.

a. *Hirculus* Tausch. Bægeret undersædigt, med tilbagebøiede Flige; Kronbladene gule. (Bladene heelrandede; overvintrer ved bladbærende Rodskud).

580. *S. Hirculus* L. (Filtstænglet S.) H. 472; Drej. n. 454; F. D. 200; H. N. I, 45.

Stængelen opret, i Spidsen beklædt med rustfarvet Filt, tilligemed de fremliggende eller opstigende Rodskud tætbladet; *Bladene* lancetformede; *Blomsterne* 1—3 i Spidsen af *Stængelen*; *Bægerfligene* budte, randhaarede; *Kronbladene* omvendt-ægformede, med 2 bruskagtige Punkter (og flere brandgule Prikker) ved Grunden.

4—8" høi. 7—9. 4.

I Hængedynd, fugtige Enge, ikke alm. og kun bemærket i Nord-sjælland og paa Halvøen: *Sj.* Løvenborg, Slangstrup (H.), Skjæremøllen ved Fredensborg (9), Tryggerød Mose! Terkelskov! Gjeddevad Mose ved Farum (14), Jonstrup, Langholmsmosen ved Dronninggaard (H.), Lyngby Mose (14), mellem Ermelund og Kongekilden! *J.* Estrup og Haven i Vendsyssel, Vildmosen, Gravens Mose (12), Ferslev og Gravlev ved Aalborg (Branth), Ravnstrup Mose mellem Viborg og Skive, Tange (16), Dalsgaard, Taastrup i Rindsherred (Dr.), fl. St. ved Viborg (Morville), Thorsted (2), Ringkjøbing (H.), Torslev, V. Velling (Dr.), Haraldslund, Kalbygaard! Nørup N. V. for Veile (30); *Sl.* Pulverholz ved Slesvig (16).

b. *Nephrophyllum* Gaud. Bægeret halvt-oversædigt, med oprette Flige; *Kronbladene* hvide ell. rødlige; (*Bladene* indskaarne; ingen Rodskud).

581. *S. granulata* L. (Kornet S.) H. 473; Drej. n. 455; F. D. 514.

Rodstokken med kugleformede, duunhaarede Løgknopper; *Stængelen* opret, faabladet; *Rodbladene* langstilkede, nyreformede, rundtakket-haandlappede; *Stængelbladene* næsten siddende, 3—5-lappede; *Blomsterstanden* qvastformet; *Kronbladene* omvendt-ægformede, 2—3 Gange længere end Bægeret.

Hele Planten kirtelhaaret, $\frac{1}{2}$ —1' høi. *Kronbladene* hvide. 5—6. 4.

Paa høie Enge, Bakker og mellem Krat, meget alm.

582. *S. tridactylites* L. (Trekløvet S.) H. 476; Drej. n. 456; F. D. 1517; H. N. XIII, 58.

Stængelen opret, udeelt eller fra Grunden af grenet; *Bladene* omvendt-ægformede eller kileformede, treffigede (eller -lappede); *Dækbladene* parvise, lancetformede, heelrandede; *Blomstertilkene* spredte, enblomstrede, 3—4 Gange længere end den fuldvoxne Frugt.

2—4" høi. Hele Planten rødagtig, klæbrig-kirtelhaaret, Kronbladene smaae, hvide. Var. (paa smaae Expl.) med alle Bladene heelrandede (β , *exilis* Gaud.). $\frac{4}{2}$ — $\frac{6}{1}$. ☉.

Paa tørre, sandige Marker og Bakker. Fra *Slesvig* har jeg ikke seet Expl., forøvrigt forekommer den i alle Provindserne, men sporadisk og ikke i alle Egne; hyppigst i det nordl. *Jyll.* og *Nord-sjælland*.

8. Gypsophila. Gipsurt.

583. *G. muralis* L. (Muur-G.) H. 480; Drej. n. 461; F. D. 1268; Rehb. ic. fl. germ. VI, tab. 239, fig. 4997 (og *G. serotina* 4998); H. N. XV, 40.

Stængelen fra Grunden af gaffeldeelt-grenet; *Bladene* linieformede; *Blomsterne* enlige, paa haarfine Blomsterstilke i Gaffeldelingerne; *Bægeret* femtandet, med afrundede Tænder; *Kronbladene* rundtakkede eller udrandede.

2—6" høi. Kronbladene rosenrøde. 7—8. ☉.

Paa Marker og Steengjærder sjelden: *Sj.* Kronborg (H.). Hestkjøbgaarden ved Birkerød (Schum.), Kollekolle, Rudersdal (H.), Lyngbygaard ved Skjelskør (West); *Loll.* Nebbelunde (H.). (Er sandsynligviis paa flere af de angivne Steder nu forsvunden). ☞

† *G. Vaccaria* [Sibth. et Sm. fl. græc. I, 279]; *Saponaria Vaccaria* L. *Vaccaria pyramidata* Fl. Wett., Rehb. l. c. VI, tab. 245.

Stængelen foroven gaffeldeelt-grenet; *Bladene* æg-lancetformede, spidse, ved Grunden sammenvoxne; *Blomsterne* langstilkede, i fjerntblomstret Qvast; *Bægeret* opblæst, kantet-vinget med tilspidsede Tænder; *Kronbladene* i Spidsen uregelmæssigt tandede.

1—1½' høi. Kronbladene rosenrøde. 7—8. ☉.

Ukrud mellem Hør ved Jonstrup (14), indvandret fra det sydlige Europa.

9. Saponaria. Sæbeurt.

584. *S. officinalis* L. (Læge-S.) H. 481; Drej. p. 160; F. D. 543; Rehb. l. c. VI, 4995; *Silene Saponaria* Fr. bot. not. 1842 p. 10.

Stængelen opret, udeelt eller i Spidsen grenet; *Bladene*

elliptiske eller lancetformede, spidse, trenervede; *Blomsterne* i Knipper fra Spidsen af Stængelen og Grenene, samlede til en Halvskjærm eller Top; *Kronbladene* omvendt-ægformede, ofte udrandede i Spidsen.

1—2' høi. Hele Planten glat ell. oventil duunhaaret; *Kronbladene* bleg-rosenrøde eller hvide. 7—8. 4.

Ved Gjærder, især omkring Byer, ikke sjelden, men sandsynligvis i ældre Tider udvandret fra Haver, hvorom det ogsaa synes at vidne, at den hyppigst forekommer med fyldte Blomster.

10. *Dianthus*. Nellike.

a. *Kohlrauschia* Kth. Bægeret femkantet, med vingeformigt fremstaaende Kanter.

585. **D. prolifer** L. (Knop-N.) H. 482; Drej. n. 457; F. D. 221; Rchb. l. c. fig. 5009; H. N. II, 44; *Tunica* Scop.

Stængelen oventil firekantet, glat, udeelt eller grenet; *Bladene* linieformede; *Blomsterne* i tæt Hoved, omgivet af (alm.) 3 Par hindeagtige *Svøbblade*, af hvilke det ydre Par ere korte, braadspidsede, de indre budte, af Længde med eller længere end *Blomsterne*; *Bibægeret* af Form med de indre *Svøbblade*; *Kronbladene* udrandede.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi; hele Planten glat; Hylsterbladene blegbrune; *Kronbladene* smaae, blegbrøde (I hvert Hoved udspringer kun 1 Blomst ad Gangen). 7—8. ☉.

Paa sandige Bakker og Skrænter, sjelden i Danmark: *Bornh.* v. Hammershuus (8), Sorthat ved Hasle (Hjorth), paa Skrænterne mod Havet fra Boderne til Pythuset! *Sj.* Refsnæs (15); *Moen* v. Kjelby! Magleby og Ulfshale (Dr.); *F.* mellem Hessem og Gjerskov ved Hofmangsgave (4), Samsø ved Maarup (2); *J.* Arnage Høi mellem Grenaa og Ebeltoft (H.). ☼

b. *Caryophyllum* Endl. Bægeret trindt, stribet.

aa. *Blomsterne* knippeformigt sammenhobede.

586. **D. Armeria** L. (Knippeblomstret N.) H. 482; Drej. n. 458; F. D. 230; Rchb. l. c. 5011.

Stængelen trind, duunhaaret, i Spidsen grenet; *de nedre Blade* lancetformede med smalere Basis, *de øvre* linieformede, budte, ved Grunden sammenvoxne til et kort, ligesaa bredt

som langt Rør; *Blomsterne* i Knipper fra Spidsen af Stængelen og Grenene; *Bibægerbladene* lancetformede, sylspidsede, tæt-haarede, næsten af Længde med Bægerrøret, tilligemed de ydre kortere Svøbblade bladagtige; *Kronbladene* i Spidsen tandede, Pladen omtrent halvt saa lang som Neglen.

1—1½' høi. Bladene (idetmindste de øvre) tilligemed Bægeret haarede. Kronbladene mørkrøde med hvide Pletter, kun aabne i Sol-skin. 7—9. ☉.

Paa Bakker, tørre Marker og i Udkanten af Kratskove, alm. i de sydligere Egne af Landet, især i det sydl. *Fyen* og paa *Øerne* i Østersøen (Bornh. indbefattet), i de nordlige Egne af *Sj.* og *F.* sjeldnere og kun sporadisk; *Samsø* ved Nordby (2), i *J.* meget sjelden: Kalø (16), Palsgaard (H.). ☞

587. *D. Carthusianorum* L. (Kartheuser-N.) H. 481; F. D. 1694; Rehb. l. c. fig. 5013.

Blomsterløse Bladknipper fra Rodstokken; *Stængelen* firekantet, glat, udeelt eller i Spidsen kortgrenet; *Bladene* smalt og spidst linieformede, ved Grunden sammenvoxne til et forlænget Rør; *Blomsterne* i tætte Knipper fra Spidsen af Stængelen; *Bibægerbladene* omvendt-ægformede, pludseligt tilspidsede i en sylformet Braad, halvt saa lange som Bægerrøret, tilligemed Svøbbladene (1—2 Par) bruunt-hindeagtige; *Kronbladene* saugtakke, Pladen og Neglen omtrent ligelange.

½—1½' høi. Hele Planten glat; Bæger og Svøbblade i Spidsen randhaaret rue; Kronbladene røde. 6—8. ♀.

Ved Diger og Veikanter paa Amrom (Nolt., Schiøtz!). [2]

† *D. barbatus* L. (Busk-N.) Rehb. l. c. fig. 5013.

Rodstokken udskyder talrige blomstrende og blomsterløse trinde Stængler; *Bladene* lancetformede; *Blomsterknipperne* tæt- og mangeblomstrede, hovedformede, omgivne af lange, tilspidsede Dækblade, *Bibægerbladene* og *Bægerfligene* sylformet tilspidsede, bladagtige; *Kronbladene* Plade rundtakket, kortere end Neglen.

Kronbladene lysere eller mørkere røde, hvide med røde Punkter o. s. v. 7—8. ♀.

Dyrkes alm. i Haver som Siirplante, og forekommer hist og her

forvildet: *Sj.* Næsgaard ved Dronninggaard; *Falst.* Hanenov (14); *F.* hist og her i det sydlige (19); *J.* Venneberg, Aalborg (Grønlund)!

bb. *Blomsterstanden fjerntblomstret med tydeligt stilkede Blomster i Qvast eller Top.*

588. *D. deltoides* L. (Rundtakket N.) H. 483; Drej. n. 459; F. D. 577; Rchb. l. c. fig. 5040.

Rodstokken med blomsterløse Rodskud og (alm.) flere opstigende, grenede, duunhaaret-rue blomsterbærende Stængler; *Bladene* linieformede, de nedre budte, paa Rodskuddene linie-lancetformede; *Grenene* gaffeldeelte, en- eller faa- og fjerntblomstrede; *Bibægerbladene* oftest eet Par (uden Svøbblade), ægformet-elliptiske, sylformet tilspidsede, halvt saa lange som Bægerrøret; *Kronbladene* med omvendt-ægformet, tandet-rundtakket Plade kortere end Neglen.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Bladene frisk grønne, i Randen og paa Rygnerven fint haaret-rue. Kronbladene roseurøde med en mørkere Plet (i Form af en Vinkel) ved Grunden. 6—8. 4.

β, glaucus. H. N. VII, 31 (*D. glaucus* L., Rchb. ic. crit. VI, 748). Mangestænglet, med kortere og mere tætbladede Stængler; Bladene budte, blaagraae; 2 Par Bibægerblade; Kronbladene hvide eller bleggrøde, med en mørkere Plet.

Paa tørre, især sandige Marker og Bakker, alm. udbredt. *β*, sjeldnere: *Sj.* Sandmarker N. for Tiissø ved Halleby! Næstved, Kjøge (Dr.); *Møen* paa Mannehøiene (16); *Loll.* (5); *F.* Signenæs ved Horne (12); *Bornh.* ved Boderne (Rafn).

589. *D. superbus* L. (Strand-N.) H. 484; Drej. n. 460; F. D. 578; Rchb. l. c. fig. 5032.

Rodstokken med flere blomsterløse Rodskud og alm. 1 opstigende, grenet, glat Blomsterstængel; *Bladene* lancet-linieformede, tilspidsede; *Grenene* oprette, gaffeldeelte, 2—5-blomstrede, danne en Top eller Qvast; *Bibægerbladene* 2 Par, de indre omvendt-ægformede, budte, kort braadspidsede, $\frac{1}{4}$ af Bægerrørets Længde; *Kronbladenes* Plade indtil nedenfor Midten deelt i mange traadformede Flige, omtrent lige lang med Neglen.

$1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}'$ høi. Blomsterne vellugtende; Kronbladene rød-lila, i Svælget gualgrønne med mørkrøde Haar. 7—9. 4. Var. med Grene næsten fra Grunden af og med faae, i Spidsen samlede Grene, samt

β , *cæspitosus* Drej. (l. c.) Finere; Bladene smalere; Kronbladene hvide.

γ , *micropetalus*! Kronbladene smaae (Neglen 2—3 Gange længere end Pladen).

Paa Bakker, Græsmarker og Fællede, især i Nærheden af Stranden, funden i alle danske Provindser (undtagen Bornh.), men ikke alm., sjeldnest paa Halvøen: *J.* Vissegaard ved Aalborg (Branth), Skinnarsbro (H.), Bakker mellem Randers og Riis Mølle (7); *Sl.* Hede-bakker ved Læk pr. Husum (16). — β , ved Flaskekroen med Hovedarten (16); γ , Ulfshale paa Møen (Holst). *

III. Trigynia.

11. Silene. Liimurt.

a. Bægeret blæreformigt opblæst, med talrige (20—30) Striber.

* *Behen Moench.* Blomsterne i regelmæssig Qvast (eller enlige i Spidsen af Stængelen).

590. *S. inflata* [Sm. Fl. brit. τ , 467] (Blære-Smelle) Drej. n. 464; Rechb. l. c. fig. 5120; Cucubalus Behen L., H. 485; F. D. 914.

Stængelen opret eller opstigende, grenet; *Bladene* lancet-formede; *Blomsterne* nikkende, i en alm. mangeblomstret Qvast; *Blomsterstilkene* længere end eller af Længde med det under Blomstringen ovale, ved Grunden navleformigt indtrykte, mod Frugtmodningen ægformet-kugleformede Bæger; *Bægertænderne* spidse, trekantet-ægformede; *Kronbladene* med kileformigt udvidet Negl, dybt tokløvet Plade og utydelig, topuklet *Bikrone*; *Kapselen* ægformet-kugleformet, omtrent $\frac{2}{3}$ længere end Frugtholderen*).

*) Ved Frugtholderen forstaaes den hos flere Arter i denne Familie forekommende, mere eller mindre forlængede Frugtbund, som har Form af en Stilk, ved hvilken Kapselen er fjernet fra Bægeret.

1—2' høi. Planten glat, blaagrøn; Bægeret blegt (ofte rødagtigt) med mørkere Aarenæt; Kronbladene hvide. 6—8. 4.

β, *petræa* Fr.! (Cucubalus Behen—petræus Fr. fl. Scan., H. N. IV, 51). Stænglerne talrige, nedliggende eller opstigende; en-, sjeldnere 2—3-blomstrede; Bladene korte, linie-lancetformede.

Ved Veie, paa tørre Enge, Marker og Bakker, alm. (I det sydlige Fyen og det vestlige Lolland meget sjelden; paa Smaaøerne Syd for F. ikke bemærket (12). *β*, Møens Klint nedenfor Sommerspiret (14); Hammeren paa Bornholm (Baagøe).

Anm. Støvdragerne alm. fremragende, omtr. af Længde med Griflerne; en Form med mindre Kronbld. og indsluttede Støvdr. meget kortere end Bægeret, er funden paa Kjøbenhavns Volde!

591. *S. maritima* [With. Bot. arr. II, 414] (Strand-L.) Rchb. l. c. fig. 5119; Cucubalus Lam., H. 486; H. N. IV, 52; Cucub. Behen *β*, L. F. D. 857.

Stænglerne (talrige, saavel blomsterbærende som blomsterløse, fra Rodstokken) ved Grunden nedliggende, tilsidst træagtige, med vedblivende, smalt lancetformede, i Spidsen tilbagebøiede, kjødfulde *Blade*; *Blomsterne* i faablomstret Qvast (eller enlige), oprette; *Kronbladene* mindre dybt kløvede, med tydelig, totandet *Bikrone*; *Kapselen* næsten kugleformet, omtrent dobbelt saa lang som *Frugtholderen*, forøvrigt som foreg.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronbladene hvide. Var. med utydelig *Bikrone* (Hartm.). 6—8. 4.

Paa Strandklinter, især paa Kalk, sjelden og kun bemærket ved de nordlige Kyster af Vesterhavet, Liimfjorden og Kattegattet: *J.* Bulbjerg (Fangel)! Løkken, Hirtsholmen, Frederikshavn (H.), Agger, Ottesund paa Thyholm! Løgstør, Bjørnsholm (12); Hesseløen (Brix i Kamphøv. Herb.). 2.

b. Bægeret valseformet eller tragtformet,
10-stribet.

** *Atocion* Fr. *Blomsterne i regelret Qvast i Spidsen af Stængelen.*

† 592. *S. Armeria* L. (Knippeblomstret L.) H. 489; Drej. p. 161; F. D. 559; Rchb. l. c. fig. 5079; H. N. X, 39.

Stængelen opret; *Bladene* ægformede eller ovale; *Qvasten*

tæt blomstret, med oprette Blomster, der alle naae omtrent lige høit; *Bægeret* forlænget-valseformet, mod Frugtmødningen tragt- eller kølleformet, med korte og budte Tænder; *Kronbladene* udrandede, med 2 sylformede *Bikronblade*; *Frugtholderen* af Længde med eller længere end *Kapselen*.

Hele Planten glat, blaagrøn; Stængelen under de øvre Led klæbrig; *Bægeret* blegrodt med mørkere Striber, *Kronbladene* rosenrøde, *Støvknapperne* violette. 7—8. ☉.

Ukrud i Haver og paa Marker, sjelden og neppe oprindelig indenlandsk, men tilfældigt forvildet: *Sj.* Frederiksborg (Kyll.), Tryggerød, Taarbæk (19), Flaskekroen (H.), Boserup (Albrecht), Valø (Kyll.); *Falst.* S. Kirkeby (Koch); *Loll.* (Kyll. og Heerforth's Herb.), Svinsbjerg o. fl. St. (19).

*** *Otites* Fr. Blomsterne i Klase eller Top, dannet af modsatte, *qvastblomstrede* Grene.

593. *S. Otites* [Sm. Fl. brit. 469] (Smaakronet L.) Rehb. l. c. fig. 5094; H. N. XI, 40; *Cucubalus* L., H. 487; F. D. 518.

Stængelen opret, med korte, blomsterløse Bladknipper ved Grunden; *de nedre Blade* omvendt-ægformede, langstilkede, *de øvre* linie-lancetformede; *Blomsterstanden* alsidigt klaseformet, med forkortede *Grene* og derved tilsyneladende krandsblomstret (med mange Blomster i Krandsene), eller *de nedre Grene* forlængede, oprette; *Blomsterne* oprette, oftest tvebo; *Bægeret* tragtformet-klokkeformet, med budte Tænder; *Kronbladene* hele, uden *Bikrone*; *Frugtholderen* meget kort eller 0.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Stængelen, fornemlig i Midten, klæbrig, forøvrigt glat eller fint haaret; *Bladene*, især Dækbladene, randhaarede; *Blomster* og *Frugter* meget mindre end hos de to følg. *Kronbladene* guulgrønne, *Støvdragerne* bleggule. 6—7. ♀.

I Klitter og paa sandige Marker sjelden og kun bemærket i Halvøens vestlige Egne: *J.* fra Nymindegab til Skallingen (H.), Bordrup Sande (30), Varde (10), Ribe (6); Fanø, Romø, Sylt, Amrom (N., 16). ☼

594. *S. nutans* L. (Nikkende L.) H. 488; Drej. n. 463; F. D. 242; Rehb. l. c. fig. 5108.

Stængelen opret, med korte Bladknipper ved Grunden;

Bladene omvendt-ægformede eller lancetformede med størst Brede ovenfor Midten; *Blomsterstanden* ensidigt klaseformet, med udstaaende, 3—5-blomstrede (paa fattige Expl. ofte en-blomstrede) *Grene*; *Blomsterne* nikkende under Blomstringen; *Bægeret* kølleformet, mod Modenheden tragtformet, med spidse Tænder; *Kronbladene* tokløvede, med 2 sylformede *Bikronblade*; *Frugtholderen* $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ af Kapselens Længde.

1— $1\frac{1}{2}$ ' høi. Duunhaaret, oventil klæbrig. Bægeret grønlighvidt med violette Striber. Kronbladene guulhvide, (aabne sig om Aftenen), Støvdragerne violette. 6—7. 7.

Paa Bakker, Skrænter og i høitliggende Kratskove, bemærket i alle danske Provindser, men ikke overalt; hyppigst i Nordsjælland, paa Stevns og Møens Klint samt Bornholm!

Anm. Den glatbladede Form (*S. infracta* W. K., H. N. IV, 50; Rchb. l. c. fig. 5109) er, saavidt mig bekjendt, ikke funden i Danmark.

595. **S. viscosa** [Pers. Syn. I, 497] (Klæbrig L.) Drejn. 462; Rchb. l. c. fig. 5099; H. N. XIII, 53; Cucubalus L., H. 487; F. D. 1209.

Stængelen opret; *Bladene* lancetformede eller elliptiske, med bredere Basis, i Randen bølgede; *Blomsterstanden* alsidig, med 1—5-blomstrede, oprette *Grene*; *Blomsterne* oprette; *Bægeret* valseformet, mod Modenheden indsnøret i Spidsen, med budte Tænder; *Kronbladene* tokløvede, uden Bikrone; *Frugtholderen* $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ af Kapselens Længde.

1— $1\frac{1}{2}$ ' høi, hele Planten klæbrig-haaret. Bladene, især de øvre, var. fra linie-lancetformede til bredt-ægformede. Kronbladene hvide. 6—7. ☉.

Ved sandige Strandbredder, sjelden: *Sj.* Oxholm i Isefjorden (H.); *Loll.* Hyldekrog (5), Bredfjed (H.!); *F.* Fyenshoved, Romsø ved Hofmangave (4)! *J.* Øerne i Horsens Fjord, Palsgaard (H.) (de vestligste bekjendte Voxesteder i Europa). ☞

**** *Viscago* Fr. *Blomsterne* enlige, afvexlende, danne fjernt-blomstrede Klaser.

596. **S. anglica** L. (Engelsk L.) H. 488; F. D. 1643; Rchb. l. c. fig. 5056; H. N. VII, 32. (*S. gallica* og *quinquevulnera* L. og *S. silvestris* Schott (Rchb. 5054—55) høre til samme Art).

Stængelen opret eller opstigende, (ofte gaffeldeelt-grenet med enlige Blomster i Gaffeldelingerne; *Bladene* lancetformede, de nedre omvendt-ægformede; *Bægeret* med sylformede Flige, valseformet, mod Frugtmodningen ægformet, af Længde med eller lidet længere end de til samme Tid forlængede og udstaaende *Blomsterstilke*; *Kronbladene* omvendt-ægformede, heelrandede, tandede eller udrandede, med *Bikrone*.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ høi. Hele Planten, især oventil, klæbrig-duunhaaret; Bægeret grønstribet, Kronbladene smaae, hvide, sjeldnere rosenrøde. 7—8. ☉.

Ukrud mellem Sæden, sjelden: *Sj.* Svenstrup ved Kalundborg (Baagøe)! Kartoffelagre S. V. for Magleby paa Amager! og paa Amager Fæled (19). *

12. Lepigonum. Hindeknæ. *)

a. Frøene ru-punkterede. **)

597. **L. rubrum** [Fr. Mant. 3, p. 33] (Mark-H.) *Arenaria rubra* α, L., *Alsinella rubra* Sw., H. 497; *Alsine Wahlenb.*, Drej. n. 472; *Spergularia* Pers.

Stænglerne talrige, nedliggende eller opstigende, i Gjennemsnit trinde; *Bladene* traadformet-linieformede, flade, kort-braad-

*) De meget foranderlige Arter i denne Slægt trænge endnu til fortsat Opmærksomhed og Undersøgelse. Jeg har indtil videre i det Væsenlige fulgt *Kindbergs* »synoptisk framställning af växtsläktet Lepigonum» 1856 og det senere Værk af samme Forf., »Monographia generis Lepigonorum» Upsaliæ 1863.

**) Om Frøenes jævne eller ru Overflade, som *Kindberg* antager for Hovedsagen ved Arternes Adskillelse, er et virkelig constant Kjendetegn, forekommer mig tvivlsomt. Undersøgelsen af flere Arter fra Sydeuropa foranledige mig til at troe, at Frøene kunne variere i denne Henseende ligesaavel som i Henseende til den vingede eller uvingede Rand, og i saa Fald vilde man f. Ex. neppe være istand til at adskille *L. neglectum* og *L. leiospermum*. (Forekomsten af jævne og ru Frøe hos en og samme Art uden andre væsenlige Forskjelligheder er ogsaa bemærket hos andre Slægter, f. Ex. *Linaria*). Jeg er imidlertid ikke istand til at fremføre mere end en Formodning i denne Henseende og har derfor indtil videre beholdt den tidligere Opstilling af Arterne.

spidsede; *Axelbladene* sølvglindsende, ægformede, tilspidsede, indbyrdes frie og i Spidsen alm. kløvede; *Blomsterstilkene* længere end Bægeret, efter Afblomstringen tilbagebøiede; *Bægerbladene* lancetformede, budte, omgivne af en smal hindeagtig Rand, omtrent af Længde med Kapselen; *Frøene* meget smaae, pæreformede, hvælvede, med ophøiet Rand, men uden Hindekant.

Bladene paa Grund af forkortede Grene i Bladhjørnerne tilsyneladende krandsstillede, alm. blaaagtig-grønne. Var. i Henseende til Beklædningen (glat eller kirtelhaaret), Ledstykernes og Blomsterstilkens Længde o. s. v. Kronbladene rød-lila. 5—7. ☉ eller ☺. Følgende Former kunne adskilles:

α, *campestre* (Fenzl.) Bladene kortere end Ledstykkerne, Stænglerne langstrakte, Qvastens Grene fjerntblomstrede, foroven klaseformede.

β, *radicans* (Presl.) Kdbg. (*Arenaria media* F. D. 2232; *L. rubrum β*, *arenarium* Lge. Haandb. 2 Udg. p. 301). Lavere, nedliggende og stundom rodslaaende; Ledstykkerne meget korte (kortere end Bladene), Axelbladene stærkt udviklede, Qvasten kort og mere tætblomstret, Blomsterne mindre.

α, paa tørre Marker, Overdrev og ved Veie alm., *β*, paa mager Sandjord, især ved Strandbredder.

* 598. **L. neglectum** [Kindb. Bot. not. 1857 p. 84] (Kjød-bladet H.) H. N. XV, 46; *L. salinum* (Presl.) Kindb. Monogr. p. 36; *Spergularia rubra β*, *pinguis* Gren. & Godr. Fl. Fr. I, 275; *Lepigon. rubr. β*, *pingue* Lge. Haandb. 1 Udg. p. 268 (excl. Syn. *L. medium* Fr.); *Alsinella marina* F. D. 2231.

Bladene halvtrinde, kjødfulde, *Axelbladene* korte, bredt ægformede, mindre glindsende; *Kronbladene* bleggrøde ell. hvide, *Støvdragerne* ofte 5; *Kapselen* længere end Bægeret, forøvrigt som foreg.

Ved Strandbredder, sjældnere end de øvrige Arter, f. Ex. *Sj.* Flaskekroen (Didrichsen)! *Loll.* paa inddæmmede Steder ved Nakskov og Rødby Fjorde (19)! *Bornh.* S. O. for Rønne (14). ☼

Anm. Denne Art danner et Overgangsled fra foreg., som den ligner i Frøenes Bygning, til den følgende, som den i Habitus og de fleste øvrige Kjendetegn nærmer sig. Muligviis ere denne og følgende kun 2 Former af samme Art, for hvilken da Navnet *L. salinum* maatte beholdes, skjøndt dette Navn ikke er heldigt, da det passer for de

fleste Arter. Jeg har beholdt det ældre kindbergske Navn for denne Art, som han nu henfører til *L. salinum* (Presl) Fr., men saavidt jeg kan skjønnere har Fries, idetmindste for en Deel, under sin *L. salinum* havt følgende Art, der er saa hyppig ved de nordiske Strandbredder, for Øie. *L. medium* Fr. (mant. 3, 34; H. N. VIII, 37) som jeg tidligere urigtig henførte hertil, adskilles efter Fr. og Kindb. (l. c.) ved en vedvarende Rod, trinde Stængler, ikke tilbagebøiede Blomsterstilke omtrent af Bægerets Længde, jævne Frøe. Denne findes muligen ogsaa hos os, men jeg er ikke istand til at angive noget bestemt Voxested.

b. Frøene jævne.

599. ***L. leiospermum*** [Kindb. Monogr. p. 23] (Glatfrøet H.) *L. salinum* Fr. ex p., H. N. XIV, 42; Kindb. l. c. p. 43; *Arenaria marina* F. D. 740 (ikke god).

Stængelen enlig, ved Grunden udeelt og opret, eller flere fra Grunden og nedliggende, i Gjennemsnit fladtrykt; *Bladene* kjødfulde, trindt-fladtrykte, linieformede; *Axelbladene* forneden sammenvoxne, med bredt triangelformede, spidse Flige; *Blomsterstilken* lidet længere end Bægeret, efter Afblomstringen tilbagebøiede; *Bægerbladene* ovale, budte, $\frac{1}{3}$ kortere end den budt trekantede *Kapsel*; *Frøene* omvendt-ægformede, med ophøiet Rand (af den bøiede Kim), alle (eller de fleste) uden Hindekant.

Frøene større end hos Nr. 597, mindre end hos følg. De unge Bladknipper i Bladhjørnerne faabladede eller 0. Var. desuden, ligesom de øvrige Arter, glat og kirtlet-duunhaaret. Kronbladene bleg-røde. 7—9. ☉. De vigtigste Former af denne mangeformede Art ere følgende:

α , *cymosum*! Blomsterstanden med indtil Spidsen blad-bærende Grene.

1, *apterum*. Alle Frøene uvingede.

2, *heterospermum*. Vingede og uvingede Frøe (endog i samme Kapsel) blandede indbyrdes.

3, *alatum*. Alle Frøene vingede.

β , *racemosum*! Qvastens Grene forlænget-klaseformede, i Spidsen bladløse.

Alm. ved Havkysterne paa feed Leer- eller Marskbund. Formen α 1, er den meest udbredte, 2, sjeldnere, 3, ved Dragør! Formen β har jeg kun seet fra Flaskekroen (Didr.); den er ogsaa funden i *Loil.* ved Næbbelunde (19).

600. **L. marinum** [Wahlb. Fl. gothob. p. 47] (Vingefrøet H.) Fr. l. c. p. 35; H. N. VIII, 38; *Arenaria rubra* β , *marina* L., *A. marina* E. B. 958; *Alsine* Drej. n. 473; *Alsinella* H. 497 (indbefatter tillige foreg.); *Aren. marginata* DC.

Stænglerne talrige (udgaaende fra en tyk og kjødfuld Pælerod), udstrakte eller opstigende, i Gjennemsnit fladtrykte; *Bladene* halvtrinde, kjødfulde, linieformede; *Axelbladene* forneden sammenvoxne, med bredt-triangelformede, spidse Flige; *Qvastens* Grene foroven bladløse; *Blomsterstilkene* udvidede under Bægeret og længere end dette, efter Afblomstringen tilbagebøiede; *Bægerbladene* ægformet-elliptiske, halvt saa lange som den trindt-ægformede, opblæste *Kapsel*; *Frøene* rundagtige, med svagere ophøiet Rand, alle (elller de fleste) med en (under Lupen) sribet-tandet Hindekant.

Er i alle Dele større og kraftigere end de foreg. Hele Planten glat med Undtagelse af Blomsterstanden, som var. mere eller mindre kirtelhaaret. Kronbladene blegrøde. 7—9. 4.

β , *fasciculare* (L. fasciculare Lönnroth, Observ. crit., Ups. 1854, p. 13) med tæt og tueformigt samlede Stængler, mere sammentrængt Blomsterstand, oprette, mod Frugtmodningen vandret udspærrede (ikke tilbagebøiede) Blomsterstilke, Kapselen neppe $\frac{1}{2}$ Gang længere end Bægeret, Frøene omvendt-ægformede, med ophøiet Rand og uden Hindekant.

Paa lignende Steder som (og i Selskab med) foreg., ikke sjelden, især hyppig i Marskegnene paa Halvøens Vestkyst. β , Marskenge paa Føhr (20)! †

Anm. Den under β , beskrevne Form er i Udseende og flere Characterer væsenlig forskjellig fra Hovedarten, og de paa Føhr samlede Exemplarer staae navnlig saa nær ved *L. azoricum* Kindb., at kun de jævne (ikke ru-punkterede) Frøe synes at adskille dem fra denne. Ved Udsædsforsøg i botanisk Have med Frøe, samlede paa det nævnte Voxested, har den imidlertid tabt flere af de Eiendommeligheder, som adskilte den vildvoxende Plante fra *L. marinum*, og jeg maa altsaa antage den for en blot Localform af denne, hvilket ogsaa Fries og Kindberg (Monogr. p. 21) antage. Saafremt den af mig fremsatte Formodning om Uholdbarheden af en skarp Adskillelse mellem Arterne med jævne og ru-punkterede Frøe skulde bekræfte sig, antager jeg at *L. azoricum* Kindb. ogsaa maa forenes med *L. marinum*.

13. Alsine. Norel.

601. **A. viscosa** [Schreb. Spicil. p. 30] (Klæbrig N.) H. N. I, 41; *A. tenuifolia* β , *viscosa* Koch Syn. 125; *Alsinella* Hartm. Sk. Fl. 1 Uppl. p. 176, H. 498; F. D. 389 (*Arenaria tenuifolia*) og 1754; *Sabulina* Rehb. ic. fl. g. V, fig. 4917.

Stængelen enkelt, næsten fra Grunden af gaffeldeelt-grenet og dannende en spredtblomstret *Qvast*; *Bladene* sylformede; *Blomsterstilkene* i Gaffeldelingerne, traadfine, oprette, mod Frugtmodningen længere end *Bladene* og 2—3 Gange længere end *Bægeret*; *Bægerbladene* lancet-sylformede, trenervede, længere end *Kronbladene*, af Længde med eller længere end den valseformede *Kapsel*.

1—3" høi. Blomsterstilke og Bæger kirtelhaarede; *Kronbladene* hvide, meget smaae. 6—7. ☉.

Paa tørre Marker og Bakker, sjelden: *Møen* mellem Aborrejberget og Liselund! Steengaard (20); *Sl.* (N.)? Hovedarten (*A. tenuifolia* Wahlenb.), som er glat og alm. større af Væxt, med *Kapselen* oftest længere end *Bægeret*, er ikke funden i Danmark. ☞

14. Halianthus. Strandarve.

602. **H. peploides** [Fr. Fl. Hall. p. 75] (Tykbladet S.) Drej. n. 474; *Arenaria* L., H. 500; F. D. 624; *Honkenya* Ehrh., Rehb. l. c. fig. 3670.

Stængelen udstrakt, modsat-grenet (den ene Green mindre); *Bladene* tætsiddende, korsviis-modsatte, ægformet-elliptiske, kjødfulde med en bruskagtig Rand; *Blomsterne* i faablomstret *Qvast* i Spidsen af *Stængelen* og *Grenene*; *Bægerbladene* ovale, budte, ennervede; *Kapselen* kugleformet.

Hele Planten glat og glindsende. *Kronbladene* hvide, var. uden *Kronblade* (β , *apetalum* Rostr.).

Alm. ved Strandkysterne paa den yngre sandige Havstok. β , ved Skaarupør i Fyen (19).

15. Arenaria. Sandvaaner.

603. **A. serpyllifolia** L. (Smaakronet S.) H. 502; Drej. n. 475; F. D. 977; Rehb. l. c. fig. 4941.

Mangestænglet, med opstigende, oventil gaffeldeelte *Stængler*; *Blomsterstanden* qvastformet; *Bladene* stilkløse, ægformede, spidse, i tørret Tilstand fleernervede; *Blomsterstilkene* $\frac{1}{2}$ Gang længere end Bægeret; *Bægerbladene* lancetformede, tilspidsede, trenervede, længere end *Kronen* og af Længde med eller lidet længere end *Kapselen*.

6—8. ☉. Var. betydeligt i Henseende til Beklædningen, Stængernes og Ledstykkernes Længde o. s. v. De meest iøinefaldende Former ere:

α , *scabra* Fenzl. Graaagtig af meget korte og fine Haar-

* *tenuior* Koch. 4—6" høi; Ledstykkerne mange Gange længere end Bladene, Stængel og Blomsterstilke meget fine; Qvasten fjernt- og mangeblomstret.

** *condensata*! 1—2" høi; Bladene bredt-ægformede, længere end Ledstykkerne og derved taglagte; Stænglerne nedliggende, 1—3-blomstrede.

β , *glutinosa* Koch. Blomsterstilke og Bæger beklædte med kirtelbærende Haar.

Alm. paa Græsmarker, Bakker o. s. v. α , den hyppigere Form, β , sjældnere, f. Ex. ved Sorø! ** paa tørre Sandmarker: *Sj.* Veirhøi! *Bornh.* ved Rønne!

16. Moehringia. Skovarve.

604. *M. trinervia* [Clairv. Man. herb. 150] (Trenervet S.) Rehb. l. c. fig. 4943; *Arenaria* L., H. 501; Drej. n. 476; F. D. 429.

Mangestænglet, med opstigende, oventil gaffeldeelt-grenede *Stængler*; *Bladene* ægformet-elliptiske, trenervede, de nedre stilkede; *Blomsterstilkene* i Spidsen nikkende, 2—3 Gange længere end Bægeret; *Bægerbladene* længere end *Kronen* og *Kapselen*, lancetformede, spidse, trenervede, med stærkere og randhaaret Midtnerve.

Bladene randhaarede, forøvrigt er Planten mere eller mindre beklædt med korte Haar eller glat. 5—6.

I fugtige Kratskove, ved Gjærder o. s. v. alm. udbredt.

17. Stellaria. Fladstjerne.

a. Bladene siddende, Stængelen glat.

aa. De nærmeste Blade ved Blomsterne urteagtige.

605. **S. Holostea** L. (Skarpbladet F.) H. 491; Drej. n. 470; F. D. 2650; Rchb. l. c. fig. 4908.

Stængelen nedliggende, med opstigende, skarpt firekantede *Grene*; *Bladene* lancet-linieformede, fra en bredere Basis efterhaanden tilspidsede, i Randen og paa Rygnerven rue; *Blomsterne* i Qvast fra Spidsen af Grenene; *Bægerbladene* lancetformede, nerveløse, halvt saa lange som de til Midten kløvede *Kronblade*; *Kapselen* kugleformet, opblæst, omtrent af Længde med Bægeret.

Stængel (og Grene) meget skjør, forneden beklædt med vedblivende, henvisnede Blade og alm. skjult under Løvet, Blomsterne store. 5—6. 4.

I Skove, Krat og ved Gjærder, alm. udbredt.

Anm. Den i F. D. tab. 598 under Navn af *Stellaria Holostea* afbildede Plante hører neppe hertil, men snarere til *St. graminea* eller *palustris*, og er forøvrigt for slet til med Sikkerhed at kunne bestemmes.

606. **S. crassifolia** [Ehrh. Beitr. 3, p. 60] (Tykbladet F.) H. 494; Drej. n. 466; F. D. 2114.

Stængelen firekantet, oventil gaffeldeelt-grenet; *Bladene* noget kjødfulde, linie-lancetformede eller elliptiske, med smalere Basis; *Blomsterne* enlige i Gaffeldelingerne; *Blomsterstilkene* under Bægeret udvidede og dannende en undersædig Skive, flere Gange længere end de lancetformede, i tørret Tilstand svagt trenerede *Bægerblade*; *Kronbladene* næsten til Grunden todeelte, lidet længere end Bægeret; *Kapselen* ægformet, $\frac{1}{2}$ Gang længere end Bægeret.

6—8. 4. Var.

α , *elodes* (M. Bieb.) Rchb. l. c. fig. 4909. Udløbere fra Grunden, Stængelen opret eller opstigende, oventil grenet, med forlængede Ledstykker og mindre kjødfulde Blade.

β , *brevifolia* [Rafn II, p. 763] H. N. V, 33; *S. graminea* c, F. D. 415; *S. crassifolia* Rchb. l. c. fig. 3667. Stængelen fra

Grunden af grenet, med nedliggende Grene og forkortede Ledstykker.

Sporadisk og ikke alm., men bemærket i alle Provindserne (hyppigst i det østl. *Sjælland*): α , i Moser og fugtige Enge, β , paa Strandenge og ved Strandbredder mellem fugtig Tang. !*

bb. Bladene ved Blomsterne hindeagtige.

607. **S. uliginosa** [Murr. Prodr. stirp. goett. p. 55] (Sump-F.) H. 494; Drej. n. 467; F. D. 2535; Rchb. l. c. fig. 3669; H. N. III, 32.

Mangestænglet, med firekantede, svage, opstigende eller udsprede *Stængler*; *Bladene* lancetformede, ved Grunden svagt randhaarede; *Blomsterne* i Qvast fra Green- eller Bladvinklerne; *Dækbladene* glatte, *Blomsterstilkene* udspærrede, under Bægeret udvidede; *Bægerbladene* lancetformede, trenervede, meget længere end de næsten til Grunden todeelte *Kronblade*; *Støvdragerne* omkringsædige; *Kapselen* ægformet, af Længde med Bægeret.

Bladene mat-blaagrønne, ofte bølgede, Kronbladene meget smaae. 5—7. ☉.

Ved Kildevæld og paa sumpige Steder ikke sjelden.

608. **S. palustris** [Retz. Prodr. p. 106] (Kjær-F.) Drej. n. 468; H. N. VII, 33; S. *glauca* With., H. 493; F. D. 2115; Rchb. l. c. fig. 4909.

Stængelen firekantet, fra Grunden af grenet, med oprette Grene; *Bladene* smalt- eller lancet-linieformede, med tilbagebøiet Rand. tilligemed *Dækbladene* glatte; *Blomsterne* 1—2 fra Spidsen af Grenene eller flere qvastformigt samlede i Green- eller Bladvinklerne, *Blomsterstilkene* efter Afblostringen udspærrede; *Bægerbladene* æg-lancetformede, tilspidsede, svagt trenervede, kortere end de næsten til Grunden tokløvede *Kronblade*; *Kapselen* oval, omtrent af Længde med Bægeret.

6—7. ♀. Kronbladene snart dobbelt saa lange, snart kun lidet længere end Bægeret. Var. desuden:

α , *glauca*. Hele Planten blaagrøn.

β , *viridis*. Bladene frisk-grønne.

I Hængedynd, Tørvmoser og fugtige Enge alm. (α , hyppigere end β).

609. **S. graminea** L. (Græsbladet F.) H. 492; Drej. n. 469; F. D. 2116; Rehb. l. c. fig. 4911.

Stængelen firekantet, fra Grunden af grenet, med svage, opstigende eller udstrakte *Grene*; *Bladene* lancetformede eller linieformede, tilligemed *Dækbladene* ved Grunden ofte randhaarede; *Blomsterne* i endestillet, fjernt- og mangeblomstret Qvast med efter Blomstringen udspærrede *Blomsterstilke*; *Bægerbladene* lancetformede, trenervede, af Længde med eller kortere end de næsten til Grunden kløvede *Kronblade*; *Kapselen* ellip-tisk eller oval, lidet længere end Bægeret.

Bladene mørkgrønne, glindsende. 6—8. 4. Var.

α , *grandiflora* (σ). Blomsterne større; Kronbladene næsten dobbelt saa lange som Bægeret; Støvdragerne lidet kortere end Kronbladene, med rødt Støv.

β , *parviflora* (φ). Blomsterne mindre; Kronbladene omtrent af Længde med Bægeret, Støvdragerne kortere end Frugtknuden, med guult Støv; Griflerne næsten ligelange med Kronbladene.

γ , *spatulata* Rehb. l. c. fig. 4910. Bladene paa de blomsterløse Rodskud omvendt-ægformet-elliptiske, kortstilkede.

Paa Græsmarker, høie Enge og ved Gjærder, alm. udbredt (α , og β); γ , *Sj.* i en Grøft ved Flaskekroen! F. Ø. Aaby (19).

b. Bladene stilkede, med ved Grunden afrundet Bladplade; Stængelen (idetmindste for en Deel) haaret.

610. **S. media** [Vill. delph. 3, 615] (Fuglegræs). Drej. n. 465; Rehb. l. c. fig. 4904; Alsine L., H. 348; F. D. 525.

Mangestænglet; *Stænglerne* opstigende eller udstrakte, trinde, ensidigt haarede; *Bladene* æghjerteformede, med randhaaret Bladstilk, forøvrigt glatte, de øverste (1—3 Par) stikløse, elliptiske; *Blomsterstanden* qvastformet; *Blomsterstilkene* ensidigt haarede, efter Afblostringen tilbagebøiede; *Bægerbladene* budte,

elliptiske eller ovale, længere end de til Grunden kløvede Kronblade, kortere end den ovale Kapsel.

Stængelen meget skjør. Blomstrer hele Aaret igjennem. ☉. Var.

α, *vulgaris*. Stængelen fin, Støvdragere 3—5; Kronbladene alm. kortere end Bægeret.

β, *neglecta* Koch; (S. neglecta Whe., Rchb. l. c. fig. 4905; *Alsine media decastemon* H. 349; F. D. 438). Høiere og kraftigere, med noget kjødfulde Blade; Kronbladene næsten af Længde med Bægerbladene; 10 Støvdragere.

γ, *apetala*! uden Kronblade.

Alm. Ukrud overalt paa løs, især dyrket Jord; *β*, især paa fugtige Steder i Skove; *γ*, Juellinge paa Lolland, Vresen i Storebælt (19); *Bornh.* Fævagtten ved Rønne (Zahrtmann).

611. *S. nemorum* L. (Skov-F.) H. 491; Drej. n. 471; F. D. 271; Rchb. l. c. fig. 4906; H. N. VI, 28.

Stængelen fra en krybende *Rodstok* opret, alsidigt haaret (idetmindste foroven); *Bladene* hjerteformede eller ægformede, tilligemed Bladstilken randhaarede, de øverste Par stilkløse; *Blomsterne* i endestillet Qvast; *Blomsterstilkene* duunhaarede, før Blomstringen nikkende, efter samme udspærrede; *Bladene ved Blomsterne* grønne; *Bægerbladene* elliptiske, halvt saa lange som de næsten til Grunden kløvede *Kronblade*, kortere end *Kapselen*.

Bladene meget tynde. *Var.* med glat eller ensidigt haaret Stængel og glatte Blomsterstilke (Heiberg)! $\frac{6}{2} - \frac{7}{1}$. 4.

I Løvskove sporadisk, men ikke sjelden, bemærket i alle Provindser.

IV. Pentagynia.

18. Agrostemma. Klinte.

612. *A. Githago* L. (Almindelig K.) H. 511; Drej. n. 480; F. D. 576; *Githago segetum* Desf., Rchb. l. c. fig. 5132.

Bladene og *Bægerfligene* linieformede, de sidste dobbelt saa lange som det ægformede, tinervede *Bægerrør*.

1 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ ' høi, med store, fjerntsiddende Blomster. (Expl. paa mager Jord lavere, $\frac{1}{2}$ —1' høie, ofte enblomstrede og med mindre Blomster). Hele Planten, især Bægeret, langhaaret. Kronbladene violetrøde med blaaagtige Striber. Frøene store, knudret-rue. 6—7. ☉.

Alm. Ukrud i Vintersæden.

19. Melandrium. Pragtstjerne.

a. Støvtraadene ved Grunden haarede; 5 Grifler, Blomsterne tvebo.

613. *M. diurnum* [Fr., Lychnis Sibth. Fl. oxon. p. 145] (Dag-P.) Rehb. l. c. fig. 5126; Lychnis silvestris Rafn II, 790; H. 513; Drej. n. 484; F. D. 2172; L. dioeca α , L.

De nedre Blade omvendt-ægformede eller elliptiske, langstilkede, *de øvre* ægformede eller elliptiske, stilkløse; *Blomsterstanden* en endestillet Qvast; ♀ *Bægeret* ægformet eller elliptisk, med lancet-triangelformede Tænder; *Kapselen* ægformet-oval, med tilbagerullede Tænder; *Frugtholderen* meget kort eller 0.

Hele Planten langhaaret, Haarene uden Kirtler; Kronen mørk-rosenrød, aaben om Dagen og uden Lugt. 5—6. ♀.

β , *expallens*. Kronbladene blegrøde eller hvide.

Ved Aabredder, i fugtige Kratskove, ikke sjelden (yderst almindelig ved levende Hegn i Angel! mindre hyppig i det sydlige og vestlige Sjæll.). β , *Sj.* Ordrup! Jonstrup (14); *Falst.* Hallerup Skov (Koch); *Loll.* Nakskov (19); *J.* Veile!

614. *M. vespertinum* [Fr., Sibth. l. c.] (Aften-P.) Lychnis pratensis Rafn 792; H. 514; Drej. n. 483; L. dioeca β , L., F. D. 792; Rehb. l. c. fig. 5125.

Bladene elliptiske eller lancetformede, de nedre kortstilkede, de øvre stilkløse; *Blomsterstanden* en endestillet, fjerntblomstret Qvast; ♂ *Bægeret* ovalt, ♀ *Bægeret* opblæst ægformet, med forlænget-linieformede Tænder; *Kapselen* kugleformet-ægformet, med oprette, i Spidsen svagt udbøiede Tænder; *Frugtholderen* 0.

Stængler og Blade korthaarede, Blomsterstilke og Bæger kirtelhaarede; Blomsterne større end hos foreg., udspringe om Aftenen, og have en svag, men behagelig Lugt. Kronbladene hvide. 6—9. ♀.

β , *laciniatum*! Kronbladene dobbelt tokløvede.

γ , *coloratum* Rostr. Kronbladene blegrøde.

Ved Gjærder, paa Græsmarker og høie Enge alm. β , *Bornh.* ved Ø. Larsker (Baagøe)! γ , *F.* Skaarupør; *Loll.* Steensgaard (19).

b. Støvtraadene glatte; 3 Grifler; Blomsterne $\text{\textcircled{X}}$.

615. *M. noctiflorum* [Fr. Bot. not. 1842 p. 170] (Nat-P.) H. N. IX, 37; *Silene* L., F. D. 2470; *Rechb.* l. c. fig. 5063.

De nedre Blade omvendt-ægformede, kortstilkede, *de øvre* lancetformede eller elliptiske, stilkløse; *Blomsterne* i endestillet, fjerntblomstret Qvast; *Bægeret* før Udspringningen valseformet, mod Frugtmodningen elliptisk, med forlænget-sylformede Tænder; *Kapselen* ægformet med tilbagebøiede Tænder, 6—8 Gange længere end *Frugtholderen*.

Hele Planten klæbrig-kirtelhaaret; Kronen blegt-kjødfarvet, vel-lugtende, aabner sig om Aftenen. 7—9. \odot .

Ukrud mellem Sæden, ikke alm. og oprindelig indført: *Sj.* Hille-rød Ladegaard (A. Rafn), Taarbæk (15)! Marker mellem Svanemøllen og Kalkbrønderiet! Bakkehuset! Amager paa fl. St., f. Ex. Sundby-vester, Kastrup! *Falst.* N. Ørsløv, Øverup (14), Karleby (Koch); *Bornh.* Rønne (14); *J.* Aalborg (Grønlund)!

20. *Lychnis*. Trævlekrone.

616. *L. Flos cuculi* L. (Eng-T.) H. 512; *Drej.* n. 482; F. D. 590; *Rechb.* l. c. fig. 5129.

Stængelen furet; *Bladene* smalt-lancetformede; *Blomsterstanden* qvastformet i Spidsen af Stængelen og de modsatte Grene; *Bægeret* klokkeformet, med korte, spidst triangelformede Tænder; *Kronbladene* dybt haandformigt kløvede i 4 linieformede Flige; *Bikronbladene* sylformede, hindeagtige; *Kapselen* oval-kugleformet; *Frugtholderen* meget kort eller 0.

1—2' høi. Stængelen ru og beklædt med fjerne, nedadvendte Haar. Kronbladene rosenrøde, sjeldnere hvide. 6—7. γ .

Alm. paa Enge.

21. *Viscaria*. Tjærenellike.

617. *V. purpurea* [Wimm. Fl. v. Schles. p. 67] (Almindelig T.) *Lychnis Viscaria* L., H. 512; *Drej.* n. 481; F. D. 1032; *Rechb.* l. c. fig. 5131.

Stængelen opret, jævn, under Ledene mørkrød-klæbrig, med mangebladede Bladknipper ved Grunden; *Bladene* lancet-linieformede; *Blomsterstanden* klaseformigt forlænget, dannet af modsatte, kortstilkede, 3—5-blomstrede Knipper; *Bægeret* tragtformet, med korte, spidst triangelformede Tænder; *Kapselen* oval, $\frac{1}{2}$ Gang længere end *Frugtholderen*.

1' høj, glat. Stængelbladene ved Grunden uldet-randhaarede. Kronbladene rosenrøde, sjældnere hvide. 5—6. 4.

Paa tørre Marker og Bakker, især paa sandig Grund, ikke sjelden og bemærket i alle Provindser, dog sjældnere i det sydlige *Fyen*, *Loll.* og *Falst.* end i de andre Egne.

22. *Cerastium. Hønsetarm.*

(Kronbladene hos alle Arterne hvide).

- a. Enaarige. Hele Planten dør efter Frugtmodningen.

618. *C. tetrandrum* [Curt. Fl. lond. fasc. 6 t. 31] (Firehannet H.) H. II, 187; F. D. 2117; H. N. XV, 44; Lindeberg Novit. fl. Scand. I, p. 8; Esmarchia cerastoides Rchb. l. c. fig. 4954.

De nedre Blade spadeformede, *de øvre* ovale eller omvendt-ægformede, budte; *Dækbladene* helt grønne, bredt ægformede; *Blomsterstilkene* 2—4 Gange saa lange som *Bægeret*, efter Afblomstringen lidet bøiede, mod Frugtmodningen aldeles oprette; *Støvdragere* og øvrige Blomsterdele 4; *Kapselen* ret, lidet længere end *Bægeret*.

Klæbrig-kirtelhaaret, gulgrøn; Bladene kødfulde, aftage i Størrelse fra Stængelens første Gaffeldeling nedefter.

I Sandklitterne paa Manø og List (N.). *

619. *C. pumilum* [Curt. l. c. t. 30] (Lav H.) Rchb. l. c. fig. 4969.

Bladene ægformet-ovale; *Blomsterstilkene* først nikkende, efter Afblomstringen udstaaende eller oftest oprette, lidet længere end *Bægeret*; *de øvre Dækblade* og *Bægerbladene* smalt hindekantede; *Kronbladene* neppe halvt saa lange som *Bæger-*

bladene; *Støvdragere* 5—10; *Kapselen* dobbelt saa lang som Bægeret, ret eller i Spidsen svagt bøiet.

Stængelen lav (1—2" høi), var. nedliggende eller opret, overalt tilligemed Bægeret korthaaret og mere eller mindre kirtelhaaret. 5—7.

β, *abortivum*! Blomsterstilkene meget korte, Blomsterne golde.

Sjelden i Danmark: *Bornh.* paa sandige Marker mellem Pyt-
huset og Stampen! Rønne (14), Nexø (20), Christiansø (Didr.); Salt-
holm (Hoffmeyer)! *β*, Kongelunden paa Amager (19)!

Anm. Efter Lector Lindebergs nøiagtige Undersøgelser (l. c. p. 8) om denne og foreg. Art synes det yderligere at bekræftes, hvad jeg ogsaa (Haandb. 2 Udg. p. 311) formodede, at denne Art ikke, som Gren. (fl. Fr. I, 269) antager, bør forenes med *C. tetrandrum* Curt., men derimod med *C. glutinosum* Fr. (nov. p. 132, H. N. IV, 54; F. D. 2537; *C. obscurum* Chaub., *C. varians β*, *obscurum* Coss. & Germ. atl. tab. V). Denne Form, som adskilles ved kraftigere, mere klæbrige Stængler, Dækbladene aldeles uden Hindekant og Kronbladene alm. større, forekommer paa enkelte Steder i Sverige og er hyppig i Syd-europa, men hidtil ikke bemærket i vor Flora. Fra følg. er den let kjendelig ved en meget mere sammentrængt Qvast, kortere og efter Afblomstringen oprette Blomsterstilke og smalere Hinder paa Bæger- og Dækblade. Fra foreg. Art adskilles den let ved sildigere Blomstringstid, femdelelige Blomster, meget kortere Blomsterstilke og længere Kapsel m. m.

620. *C. semidecandrum* L. (Femhannet H.) Fr. nov. p. 134; H. 517; Drej. n. 490; F. D. 1212; Rehb. l. c. fig. 4968.

Stængelen fin; *Bladene* ovale eller elliptiske med kort Spids, de nedre omvendt-ægformede, kortstilkede; *Blomsterstilkene* efter Afblomstringen tilbagebøiede, efter Frøspredningen oprette, 2—4 Gange længere end Bægeret; *Dækbladene* med en bred hvid hindeagtig Rand; *Bægerbladene* længere end Kronbladene, med en bred, hindeagtig, i Spidsen gnavet-tandet, glat Rand; *Støvdragere* alm. 5; *Kapselen* ret eller i Spidsen svagt bøiet, neppe dobbelt saa lang som Bægeret.

5—6. En meget foranderlig Art i Henseende til Beklædningen, Bladformen, Blomsterstanden, Støvdragernes Antal (indtil 10) o. s. v.

α, *vulgare*. Hele Planten graaagtig-duunhaaret.

β, *viscidum* Fr., H. N. I, 39; *C. viscosum* H. 516; F. D. 1211, *C. glutinosum* Rehb. l. c. (ikke Fr.) Planten, især Blomsterstilke og Bæger, klæbrig-kirtelhaarede.

Alm. paa tørre Marker, Steengjærder o. s. v. (saavel α som β).

Anm. Den glatte Form — *macilentum*, Fr. nov. p. 135 (*C. macilentum* Aspeg.) er mig ikke bekjendt at være funden i Danmark. (Arterne af denne Afdeling i vor Flora fortjene en nærmere Efter-søgning og Undersøgelse).

621. **C. viscosum** L. (Opret H.) Fr. Nov. p. 128; F. D. 1931; H. N. XIV, 41; C. ovale Pers., H. 516; C. glomeratum Thuill., Drej. n. 487; C. vulgatum Sm. (Linn. Herb.), Rchb. l. c. fig. 4970.

Stængelen opret eller opstigende; *Bladene* rundagtigt-ovale med en meget kort Spids, de nedre omvendt-ægformede; *Blomsterne* i sammentrængt Qvast; *Blomsterstilkene* kortere end eller af Længde med Bægeret, efter Afblomstringen udstaaende, tilsidst oprette; *Dækbladene* heelt grønne; *Bægerbladene* paa Ryggen og i Spidsen haarede, med hindeagtig Raud, omtrent af Længde med de ved Grunden randhaarede *Kronblade*; *Kapselen* buet krummet, neppe dobbelt saa lang som Bægeret.

Hele Planten bleggrøn, senere guulgrøn, beklædt med lange, udstaaende Haar (*eglandulosum* Koch), undertiden, især oventil, med Kirtelhaar. Kapselen glindsende straaguul. 5—8. ☉ eller ☉.

Paa dyrket Jord i Mark og Have, saavel paa aabne som skyggefulde Steder, ikke sjelden og funden i alle Provindser, men sporadisk. (Den haarede Form er hos os meget hyppigere end den kirtelbærende).

622. **C. strigosum** [Fr. Fl. hall. p. 78] (Stivhaaret H.) Fr. nov. p. 131; H. 517; F. D. 2536; H. N. I, 38; C. brachypetalum Desport., Drej. n. 488; Rchb. l. c. fig. 4971.

Stængelen opret, fra Grunden af grenet eller udeelt; *Bladene* elliptiske eller ovale med en kort Spids; *Qvasten* fjernblomstret; *Blomsterstilkene* (ved Frugtmodningen) 2—3 Gange længere end Bægeret, i Spidsen nikkende; *Dækbladene* heelt grønne, tilligemed de smalt hindekantede *Bægerblade* i Spidsen skjæghaarede; *Kronbladene* kortere end Bægeret; *Kapselen* valseformet, næsten ret, lidet længere end Bægeret.

Hele Planten graaagtig og stivhaaret af tiltrykte Haar. 5—6. ○.

Paa tørre Marker og Bakker, meget sjelden i Danmark: *Moen* (H.), *Bornh.* ved Hammershuus Fyrtaarn (Hjorth), Krat ved Lind-

holms-Klipperne i Røe Sogn (20)! mellem Allinge og Gudhjem, Randklevn (8). \overline{a}

b. Vedvarende (☉ eller 4).

623. **C. vulgatum** L. Sp. (Almindelig H.) Fr. Nov. p. 125; H. 515; F. D. 1645; H. N. X, 40; C. *triviale* Link, Drej. n. 489; Rehb. l. c. fig. 4972; C. *viscosum* Sm. (Linn. Herb.).

Mangestænglet; *Stænglerne* fra en nedliggende og ofte rodslaaende Basis knæbøiet-opstigende; *Bladene* elliptiske eller lancetformede, de nedre omvendt-ægformede; *Blomsterstilkene* efter Afbloomstringen udstaaende, omtrent dobbelt saa lange som Bægeret; *Dækbladene* og *de indre Bægerblade* i Randen og Spidsen hindekantede (uden Rand- eller Skjæghaar); *Kronbladene* af Længde med eller lidet længere end Bægeret; *Kapselen* bukrummet, lidet længere end Bægeret.

Stænglerne forneden alm. mørkrøde, Planten tæthaaret, Stængelens Haar udstaaende, Bladenes tiltrykte. 5—9. 4 (eller sjeldnere ☉). Forekommer under mange Former, af hvilke den meest afvigende er:

β , *holosteoides* Fr. l. c.; H. N. XV, 42. Stængelen (af-
vexlende) ensidigt haaret; hele Planten forøvrigt glat.

Meget alm. paa Græsmarker, Enge, ved Grøfter o. s. v. β , paa Strandenge, sjelden: *Sj.* Svinninge Veile ved Lammefjorden! Amager Fælle ved Kongelunden (19); *Loll.* Lidsø ved Rødby! *J.* Agger og Ottesund i Thy!

624. **C. arvense** L. (Storblomstret H.) H. 518; Drej. n. 486; F. D. 626; Rehb. l. c. fig. 4980; H. N. XV, 41.

Stænglerne nedliggende eller krybende, med oprette eller opstigende Grene og tætbladede, blomsterløse Rodskud; *Bladene* linie-lancetformede; *Qvasten* fjerntblomstret; *Blomsterstilkene* efter Afbloomstringen oprette, i Spidsen nikkende; *Dækbladene* randhaarede, tilligemed *Bægerbladene* bredt-hindekantede; *Kronbladene* dobbelt saa lange som Bægeret; *Kapselen* svagt bøiet, lidet længere end Bægeret.

Stængelen alm. korthaaret; Bladene var. duunhaarede, randhaarede eller aldeles glatte; i Stængelbladernes Hjørner ofte knippe-

stillede Blade af en uudviklet Green. (Ved den store Krone let kjendelig fra de øvrige Arter). 5—8. 4.

Ved Gjærder og Randen af Veie, paa lerede Marker: *Sj.* i det østlige ikke sjelden, sparsommere mod V., f. Ex. Kongens Møller, Strædet ved Sorø! Faardrup ved Skjelskør (Nielsen); i de øvrige Provindser sjelden: *Falsl.* Ourupgaard, Hallerup (Koch); *F.* Vindinge ved Nyborg! Dalum ved Odense, V. Hæsing (24!), Qverndrup, Rødkilde, Ollerup (12); *J.* Aalborg (Juel), Gudumlund! Søndermølle ved Viborg (Feddersen), Tarp (16), Nørup pr. Veile (30); *Sl.* Gram (1), Taarnum, Agerskov (12), Haderslev, Cosel ved Slesvig (16), Rendsborg! *Bornh.* ved Rønne!

23. Malachium. Kløvkrone.

625. *M. aquaticum* [Fr. Fl. hall. p. 77] (Vand-K.) Drej. n. 485; Rechb. l. c. fig. 4967; H. N. VI, 27; Cerastium L., H. 520; F. D. 1337.

Stængelen foroven trind, forneden firekantet, nedliggende eller opstigende, ved Grunden rodslaaende; *Bladene* æg-hjerteformede, tilspidsede, stilkløse, de nedre kortstilkede; *Blomsterne* i en fjerntblomstret, udspærret Qvast; *Blomsterstilkene* efter Afblomstringen vandret udstaaende eller nedbøiede, i Spidsen nikkende; *Bægerbladene* lidet kortere end Kronbladene og den femkantet-ægformede *Kapsel*.

Stængelen skjør, foroven tilligemed Blomsterstilkene og Bægerbladene kirtelhaaret; Bladene ofte i Randen bølgede. 6—7. 4.

β, *saxatile* Fr. Stængelen firekantet, med korte Ledstykker, Bladene mindre og smalere, næsten alle stilkede, med randhaaret Stilk, forøvrigt glatte, Qvasten faablomstret.

Ved Grøfter og Bække, paa fugtige Enge o. s. v. hist og her. *β*, ved Bredderne af Tiissø (paa Gruus)!

24. Sagina. Fiirling.

a. Bæger og Kronblade, Støvdragere og Kapselens Klapper 4. (*Sagina* L.)

aa. Ingen midtstillede Bladrosetter. ☉.

626. *S. stricta* [Fr. Nov. ed. I, p. 47] (Rank F.) H. 187; Drej. n. 494; H. N. I, 43; *S. maritima* Rechb. l. c. fig. 4960; F. D. 2104.

Stængelen udeelt, opret eller fra Grunden af grenet med knæbøiet-opstigende, opadtil ranke *Grene*; *Bladene* kødfulde, glatte, linieformede, budte (i tørret Tilstand med en kort Braad); *Blomsterstilkene* under og efter Blomstringen oprette; *Bægerbladene* ovale, afrundede, udhulede; *Kronblade* 0.

Stængelen, især nedentil, mørk-violetbrun. 5—8.

β , *maritima* Fr. l. c. (H. N. X, 42; *S. maritima* Don, *S. erecta* F. D. 845). Stængelen spædere, af mere grøn Farve, ofte nedliggende, senere Blomstringstid.

Paa Strandenge, ikke sjelden og forekommer i alle danske Provindser.

627. *S. ciliata* [Fr. l. c.] (Randhaaret F.) Rehb. l. c. fig. 4956; H. N. I, 42; *S. apetala* β , *decumbens* F. D. 2102 (nederste Fig.).

Mangestænglet; *Stænglerne* nedliggende eller bueformigt opstigende; *Bladene* linie-sylformede, braadspidsede, ved Grunden randhaarede; *Blomsterstilkene* efter Afblostringen i Spidsen krummede, efter Frøspredningen rette; *Bægerbladene* af Længde med og tiltrykte til den modne Kapsel, de 2 ydre lancetformede, braadspidsede, de 2 indre budte, ovale; *Kronbladene* meget smaae, hurtigt affaldende.

Stænglerne rødlige, finere, Blomsterne mindre end hos foreg. Var. (*S. depressa* Schultz) med Blade uden Randhaar. 6—7.

Paa tørre Marker og ved Veie, saavel paa Sand- som Leergrund: *Bornh.* ved Gudhjem og Vældensby! *Sj.* Jersie ved Kjøge, Lindholm (15), Sorø paa Marker mellem Parnas og Skjelskørveien! *Møens* Klint ved Aborrebjerg (var.)! *Falst.* Stubbekjøbing (Rasm.), Meelse (14); *Loll.* Steensgaard (19); *Thorseng* ved Bregninge; *F.* Hofmansgave (18), Nyborg (Lund), Ollerup o. fl. St. i det sydlige (12); *J.* Agre ved Apotheke i Hanherred (16), Bjergets Kro i V. Hanherred! Løgstør (A. Lange)! Braband, Gjellerup, Gjeding (16), Thyrsbæk (15), Brøndsted! Taulov! 4

628. *S. apetala* L. (Kronløs F.) H. II, 136; F. D. 2102 (øverste Fig.); Rehb. l. c. fig. 4958; H. N. XIII, 54.

Mangestænglet; *Stænglerne* opstigende eller oprette; *Bladene* linie-sylformede, braadspidsede, randhaarede; *Blomsterstilkene* før og efter Frøspredningen rette; *Bægerbladene* kortere end

og udstaaende fra den modne Kapsel, ægformet-ovale, budte, udhulede, de 2 ydre med en kort, indadbøiet Braad; *Kronbladene* meget smaae eller 0.

Fiin som foreg., mere grøn. 7—8.

Paa tørre Marker i dyrket Jord: *Sj.* Soderup og Øde-Hastrup ved Roeskilde (15), Lillehedinge i Stevnsl. *Falst.* og *Loll.* almindelig; *F.* Hofmansgave (18), Nyborg (Lund), Ollerup (12), Kogtved ved Svendborg! Lyø (12); *Sl.* Dybbøl, Husum (16). *

bb. *Stænglerne* udgaae fra Grunden af en midtstillet *Bladrossette* (den forkortede *Hovedstængel*). 4.

629. *S. procumbens* L. (Fremliggende F.) H. 187; Drej. n. 495; F. D. 2103; Rehb. l. c. fig. 4959.

Stænglerne nedliggende, rødslaaende; *Bladene* smalt linieformede, braadspidsede, glatte; *Blomsterstilkene* efter Afblostringen i Spidsen nikkende, efter Frøspredningen oprette; *Bægerbladene* ægformede, budte, lidet kortere end og udstaaende fra den modne Kapsel; *Kronbladene* neppe halvt saa lange som Bægeret, ofte 0.

β, *crassifolia* Nolte (maritima Fr.), F. D. 2103 n. 3. *Bladene* saftige, uden Braad.

γ, *spinosa* Gibson (Bab. man. p. 47). *Bladene* randhaarede.

Var. desuden med femdelelige Blomster, kortere og længere Blomsterstilke o. s. v. 5—8.

Dyrkede og udyrkede Marker, saavel paa Sand- som Leergrund alm. *β*, ved Strandbredder; *γ*, en tørholdig Eng ved Bagsværd! Knudsbølle paa Thorseng, Avernakø (12).

b. Bæger, Krone og Kapsel femdelelige, Støvdragere 10. (*Spergella* Rehb.)

630. *S. subulata* [Torr. and. Gray Fl. of N. Am. I, 178] (Sylbladet F.) *Spergula* Sw., H. 523; H. N. IV, 56; *Spergella* Rehb. l. c. fig. 4963; Drej. n. 492; *Spergula laricina* F. D. 858.

Stænglerne udstrakte eller tueformigt sammentrængte; *Bladene* linie-sylformede, langt braadspidsede, kirtlet-randhaarede;

Blomsterstilkene meget lange, efter Afblomstringen nikkende, efter Frøspredningen oprette; *Bægerbladene* ægformede, budte med en indbøiet Braad, omtrent ligelange med de budte *Kronblade*, kortere end Kapselen.

Blomsterstilke og Bægerblade kirtelhaarede. Kronbladene hvide. 6—8. 4.

Sandige Marker og Klitter paa *Halvøen*: Klitter i Thy (Dr.), Agger, Thorsted! Provstlund (13), Tange (16), Raavad ved Kolding (28), Obbekjær ved Ribe (6), Hjortlund (12), Romø (16), alm. paa Sylt, Føhr og Amrom (N.), Torreskov (16), Lygumkloster (28), Hyttener Bjerge (Jessen), Mielberg S. for Slesvig, St. Peter i Eidersted (16), Immingsted ved Husum (F. Müll.); *F.* Nyfæste (16). (Angives ogsaa fra Flaskekroen af H., men er ikke senere gjenfunden, og forøvrigt ikke bemærket i Sjælland og de sydlige Øer).

631. *S. nodosa* [Torr. and Gray l. c.] (Knudret *F.*) *Spergula* L., H. 522; *F. D.* 96; *Spergella* Rehb. l. c. fig. 4965; *Drej.* n. 493.

Stænglerne talrige, fra Grunden af et midtstillet Bladknippe opstigende; *Bladene* linieformet-traadformede, halvtrinde, tilsyneladende krandsstillede (især oventil) paa Grund af forkortede Grene i Bladhjørnerne; *Blomsterstilkene* oprette, enlige; *Bægerbladene* ægformede, budte, 2—3 Gange kortere end Kronbladene, omtrent af Længde med Kapselen.

Bladene aftage i Længde nedenfra opad. Kronbladene hvide. 7—8. 4. *Stænglerne* var. enkelte eller gnedede, glatte eller (især oventil) kirtelhaarede (*β*, *glandulosa* Bess.) og desuden:

β, *moniliformis*! *Stænglerne* udstrakte, med meget forkortede Ledstykker, *Bladene* paa de forkortede Grene i Bladhjørnerne og de øvre Stængelblade korte og kjødfulde, rundagtig-ægformede.

I fugtige Enge og Tørvmoser alm., sjelden paa høitliggende sandige Steder, f. Ex. Møens Klint! *β*, *J.* Sandklitter ved Henne nær Vesterhavet!

25. *Spergula*. *Spergel.*

632. *S. arvensis* L. (Almindelig *S.*) H. 520; *Drej.* n. 491; *F. D.* 1033.

Bladene linieformet-traadformede, paa Overfladen hvælvede, paa Underfladen furede; *Blomsterne* i Qvast, det øverste Led-

stykke nedenfor Blomsterstanden neppe længere end de øvrige; *Blomsterstilkene* efter Afblostringen tilbagebøiede; *Støvdragerne* oftest 10; *Frøene* kugleformet-lindseformede, vortet-rue, omgivne af en smal hindeagtig Rand.

Planten mørkgrøn, klæbrig-kirtelhaaret, $\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronbladene hvide. ☉. Var.

α, vulgaris (Boenn., Rechb. ic. crit. VI, 705). Frøene belædte med hvidagtige, ophøiede Vorter.

β, sativa (Boenn.; S. arvensis Rechb. ic. crit. VI, 704). Frøene sorte, fiint punkterede.

Paa tørre, sandige Marker, alm. udbredt, især i Halvøens magrere Egne; *β*, dyrkes hyppig som Fodervæxt og forekommer stundom forvildet.

* 633. *S. maxima* [Whe. i Boenn. Prodr. fl. Monast. n. 570] (Stor S.) Nolt. nov. p. 46; Rechb. ic. crit. VI, 706; Hansens Herb. No. 674.

Høiere ($1\frac{1}{2}$ —3') med mere forlængede Ledstykker, Grene og Blomsterstilke; hele Planten glat eller kun foroven svagt haaret; Frøene 2—3 Gange større end hos foreg., tæt belædte med hvide, ophøiede Vorter, forøvrigt som foreg.

Ukrud i Hørsæden: *Sl.* Schauendal ved Husum (F. Müll.); *Bornh.* ved Vester Mariæ Skole (Hamann), Enesgaard i Ruthsker Sogn (Hjorth)! *F.* Skaarup (19, en Form med svagere, ikke hvide Vorter paa Frøene)!

634. *S. vernalis* [Willd. Prodr. fl. Berol. p. 158] (Femhannet S.) S. Morisonii Boreau, Rev. bot. p. 123, Lge. D. Fl. 2 Udg., p. 318; S. pentandra H. 521; F. D. 1930; H. N. IV, 55.

Bladene kortere, næsten trinde, uden Fure paa Underfladen; *Stængelens* øverste Ledstykke nedenfor Qvasten flere Gange længere end de øvrige; *Kronbladene* ovale, budte; *Støvdragerne* oftest 5; *Frøene* fladtrykt-kredsrunde med en ru-punkteret Rand og udenfor samme omgivne af en bred, straaelformigt stribet, lysbruun Hinde; forøvrigt som foreg., men af mere blaagrøn Farve.

3—6" høi. Var. glat eller kirtelhaaret. Kronbladene hvide.
5—7. ☉.

Paa sandige Marker, sjelden: *Bornh.* paa Klipperne ved Hammershuus Fyrtaarn! *Sl.* Brinker paa N. O. Siden af Wittensee (20), Sorgwohld N. for Rendsborg (16). [*

Anm. Willdenows Navn *S. vernalis*, som efter Vidnesbyrd af A. Braun og Ascherson (Bot. Zeit. 1859, p. 291) hører til *S. Morisonii*, bør, som det ældste (allerede givet 1787), gjenoptages for denne Art. Den ægte *S. pentandra* L. (Bor. 1. c.), adskilles ved lancetformede, spidse Kronblade og jævne Frøe med en bredere, sølvhvid-glindsende Rand. Denne Art er ikke funden hos os, den forekommer sparsomt i Nord- og Mellemtyskland, hyppigere i Sydeuropa.

26. Sedum. Steenurt.

a. Bladene trinde, heelrandede, Planten overvintrer ved bladbærende overjordiske Rodskud.

aa. *Kronbladene hvide.*

635. *S. album* L. (Hvid S.) H. 507; Drej. p. 164; F. D. 66.

Stængelen krybende, de blomsterbærende og bladbærende *Grene* oprette eller opstigende; *Bladene* spredte, udspærrede, valseformede, paa Underfladen lidet fladtrykte, budte; *Blomsterne* i mangeblomstret og flere Gange gaffeldeelt Qvast; *Kronbladene* lancetformede, budte, 2—3 Gange længere end Bægeret.

Hele Planten glat, Stængel og Blade rødprikkede, Kronbladene hvide med røde Punkter, Støvdragerne mørkrøde. 7—8. 4.

Klipperne ved Gudhjem paa Bornholm (H.)! I de andre danske Provindser er den neppe vildvoksende, men forekommer flere Steder plantet eller tilfældigt forvildet, f. Ex. paa Møens Klint og i Mængde ved Strandveien o. fl. Veie N. for Kjøbenhavn!

† *S. cruciatum* [Desf. Cat. h. par. 162; *S. monregalense* Balb., Rechb. ic. crit. III, 438] Bladene krandsstillede ($\frac{1}{4}$); Qvasten faablomstret, dens *Grene* kirtelhaarede; Kronbladene æg-lancetformede, tilspidsede, forøvrigt som foreg.

Forvildet eller plantet ved Dyrehavegjærdet mod Ordrup Mose (Heiberg) og tidligere i Frederiksdals Skov ved Kilden!

bb. Kronbladene gule.

636. **S. acre** L. (Bidende S.) H. 505; Drej. n. 477; F. D. 1457.

Stænglerne krybende, meget grenede; de blomsterbærende og golde *Grene* opstigende; *Bladene* tætsiddende og taglagt-tiltrykte, uregelm. spredte (paa de golde Rodskud i 4—6 Rader), ægformede, budte, med plan Overflade, ved Grunden nedenfor Tilhæftningspunktet afrundede; *Blomsterne* i Qvast med 2—3, under Blomstringen tilbagekrummede *Grene*, hver *Green* med 2—5 næsten siddende *Blomster*; *Bægerbladene* ægformede, budte, nedenfor Basis forlængede; *Kronbladene* lancetformede, spidse, udspilede, dobbelt saa lange som *Bægeret*; *Bællekapslerne* udspærrede.

6—7. 4. Var.

α, genuinum Godr. *Bladene* spredte, af bidende Smag.

β, sexangulare Godr. (*S. sexangulare* L. Sp.) *Bladene* tæt taglagte, paa de golde *Stængler* i 5—6 Rader, *Blomsterne* færre og mindre, *Planten* af mindre bidende Smag.

Meget alm. paa sandige Marker, hist og her paa Straatage og især paa Steengjærder, som den ofte beklæder i store Tuer. *β, Sj.* ved sandige Bredder af Tiissø! *F.* Ballen (12); *J.* paa Kalkgrund ved Aalborg (12).

637. **S. boloniense** (Lois. Not. p. 71] (Sexkantet S.) Gren. & Godr. fl. Fr. 626; Koch. Syn. II, 1024; Rehb. ic. crit. IX, p. 18; *S. Forsterianum* ib. f. 1135; *S. sexangulare* DC. fl. fr., H. 506; Drej. p. 164; F. D. 1644; H. N. IX, 43.

Stænglerne krybende, med opstigende, færre og mere spredte *Grene*; *Bladene* tætsiddende i 6 Rader, linieformede, budte, med en spids Forlængelse ved Grunden; *Qvasten* som hos foreg., men med 6—10-blomstrede *Grene*; *Bægerbladene* lancetformede, budte, ved Grunden ikke forlængede, halvt saa lange som *Kronbladene*; *Bællekapslerne* udspærrede.

Smagen ikke bidende. 7. (Blomstrer omtrent 14 Dage senere end foreg.). 4.

Paa tørre Marker og Skrænter, sjelden: *Falst.* ved Grønsunds

Færgested! Græsskrænter ved Næsgaard! Abelvig (14), Gaabense (H.); Sl. Nyværk (16). !*

Anm. Da den linneiske Beskrivelse af *S. sexangulare* (fol. subovata, flor. in corymbo 2 v. 3) ikke passer paa denne Art, som alm. gaaer under Navnet *S. sexangulare*, har jeg efter Godron forandret dens hidtil almindelige Benævneise. I Linnés Herb. findes ogsaa (ifølge C. Hartm.), under Navn af *S. sexangulare*, en Form af *S. acre*. Expl. i Hornemanns Herbarium, meddeelte af Roth under Navn af *S. sexangulare* L. (samlede ved Vegesack) tilhøre ogsaa denne Form (*S. acre* β,) og ikke *S. boloniense*.

638. *S. rupestre* L. (Bjerg-S.) H. 509; Rchb. ic. crit. III, 439; H. N. IV, 58; *S. reflexum* F. D. 113.

Stængelen krybende, de golde og blomsterbærende *Grene* spredte, opstigende; *Bladene* spredte, paa de golde *Grene* tætsiddende, udstaaende eller tilbagebøiede, trindt-sylformede, spidse, med en sporeformet Forlængelse ved Grunden; *Qvasten* 3—5-grenet, med tilbagebøiede, ofte todeelte *Grene*; *Blomsterne* kortstilkede; *Bægerfligene* lancetformede, spidse, ved Grunden ikke forlængede, halvt saa lange som Kronbladene; *Bællekapslerne* oprette.

7—9. 4. Var.

α, *glaucum* Koch (*S. rupestre* L., Fr.), Bladene blaa grønne.

β, *viride* Koch (*S. reflexum* L., H. 508; F. D. 1818). Større, med mere grønne Blade.

Angives fra *Als* (Fr. S. veg. Sc. p. 254); forekommer forøvrigt forvildet paa Steengjærder og omkring Haver, hvor den stundom dyrkes.

b. *Telephium* Koch. Bladene flade, tandet-rundtakkede; Roden knollet, overvintrer ved underjordiske Knopper.

639. *S. Telephium* L. (Fr.) (St. Hansurt). H. 504; F. D. 2174; *S. maximum* Suter, Drej. n. 479; Rchb. ic. crit. VIII, 969.

Bladene modsatte eller krandsstillede ($1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{3}$), ægformet-ovale med hjerteformigt omfattende Basis, fra Grunden af saugtakket-tandede; *Blomsterne* i bladet, tæt og mangeblomstret

Qvast; *Kronbladene* udstaaende, nærved Basis sammenvoxne med de ydre Støvdragerne.

Planten alm. større, med længere Ledstykker og mere grøn end følgende. *Kronbladene* hvidgule eller gualgrønne. 8—9. (Senere end følg.). 4.

Ved Gjærder og i Kratskove alm., især meget hyppig i Granit-Terrainet paa Bornholm.

* 640. *S. purpurascens* [Koch Syn. II, 284] (Rødstænglet S.) *S. Telephium* Drej. p. 322; Rchb. ic. crit. VIII, 968.

Bladene spredte (eller de nedre modsatte), omvendt-ægformede eller ovale, med afrundet Basis, fra Grunden af saugtakkettandede; *Blomsterne* i bladløs, tæt- og mangeblomstret Qvast; *Kronbladene* ovenfor Midten udbøiede, i $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{6}$ af deres Længde forneden sammenvoxne med Støvdragerne.

Stængelen mørkrød, *Kronbladene* bleggule med rødligt Anstrøg (aldeles røde har jeg ikke fundet dem i vor Flora). Støvdragerne røde. 7—8. 4.

Paa tørre Marker ved Ordrup og Charlottenlund! Stevns! sydlige Fyen (12), sandsynligviis vil den ved nærmere Undersøgelse findes paa flere Steder.

Anm. De af mig samlede Expl. stemme aldeles overeens med Fig. hos Rchb., som af Koch (l. c.) henføres til denne Art, og da de fleste Kjendetegn tillige svare til Kochs Beskrivelse (med Undtagelse af *Kronbladene*, som hos den sydeuropæiske Plante ere skidenrøde med blegere Midtnerve), har jeg her indtil videre beholdt den som egen Art. Flere af de hos Koch angivne Kjendetegn (f. Ex. de udhulede Blomsterknopper og hvælvede Frugtknuder hos *S. Telephium*, plane Blomsterknopper og furede Frugtknuder hos *S. purpurascens*) ere neppe constante. Fra følg. er den meget forskjellig.

† 641. *S. lividum* [Willd. Enum. suppl. p. 24?] (Blaagraa S.) Drej. n. 478; *S. Telephium* β , *purpureum* F. D. 686.

Bladene spredte, omvendt-ægformet-ovale, ved Grunden smalere, heelrandede, fra nedenfor Midten til Spidsen tandet-rundbugtede; *Blomsterne* i bladet, mangeblomstret Qvast; *Kronbladene* udstaaende, i $\frac{1}{3}$ af deres Længde nedentil sammenvoxne med Støvdragerne.

Bladene blaagrønne, Qvasten med mere spredte Blomster og oprette Grene end de foreg., Stængelen fiint rødprykket. *Kronbladene* mørk-rosenrøde. 8—9. 4.

Meget sjelden: *Sj.* mellem Gurre og Helsingør (Heiberg), mellem Hillerød og Fredensborg (Münster), Asminderød (Hoff), Egelund! en Mose ved Dumpedals Mølle! Kobbermøllen (?) ved Kjøbenhavn (O. F. Müll.), Louisenborg Skov o. fl. St. ved Storehedinge (Visby)! Sophiehøi ved Gisselsfeld (Lund), Snoldeløv (14); *F.* Strandbredder ved Kjertemunde (O. F. Müll.); *Føhr* ved Alkersum (20). Maaskee ikke oprindelig indenlandsk. Findes ofte som Siirplante i Haver. *

Ann. Navnet *S. lividum* er brugt af Drej. og her beholdt som passende for Planten skjøndt det er uvist om Willdenows Navn skal betegne denne. Fra *S. Fabaria* Koch (Syn. II, 258), H. N. XIV, 48 adskilles den ved at Planten er mindre, Bladene smalerte hos sidstnævnte end hos vor, og at denne blomstrer seent paa Efteraaret, medens Koch angiver Blomstringstiden for *S. Fab.* til Juni.

11^{te} Klasse. Dodecandria (Tolvhannede).

1. Orden. Monogynia (Enhunnede).

1. *Asarum* L. Blomsterdækket enkelt, trekløvet, oversædigt, farvet; Støvknapperne med et i en Spids udenfor Rummene forlænget Knapbaand; 6 Ar; Kapselen sexrummet. (N. F. Aristolochiææ).

2. *Lythrum* L. Bægeret tolv tandet (hveranden Tand kortere), omkringsædigt; Kronbladene 6, farvede, befæstede til Bægerrøret; Arret hovedformet; Kapselen torummet, omgivet af det vedblivende Bæger. (N. F. Lythrarieæ).

2. Orden. Digynia (Tohunnede).

3. *Agrimonia* L. Bægeret omsluttende Frugtknuden, beklædt med Hagebørster nedenfor den femfligede Krave; Kronbladene 5, tilligemed Støvdragerne befæstede paa Bægeranden; Frugten 1—2-rummet, tæt omgivet af Bægerrøret. (N. F. Rosaceæ, a).

3. Orden. Trigynia (Trehunnede).

4. *Reseda* L. Bægeret 4 (—6)-bladet; Kronbladene uligestore, fligede; Støvdragerne befæstede til en udvidet

Skive ovenfor Kronbladene; Frugten en (før Modenheden) i Spidsen aaben Kapsel. (N. F. Resedaceæ).

Euphorbia. Blomsterne nøgne (i Blomsterkop), tredelelig Spaltefrugt (21, 1).

4. Orden. *Dodecagynia* (Tolvhunnede).

5. *Sempervivum* L. Bæger- og Kronblade 12; Frugterne ligesaamange Bællekapsler; undersædige Skjæl ved Grunden af Frugtknuderne. (N. F. Crassulaceæ).

I. Monogynia.

1. *Asarum*. Tveblad.

642. *A. europæum* L. (Europæisk T.) H. 525; Drej. p. 171; F. D. 633; Rchb. ic. fl. g. XII, fig. 4339; H. N. XI, 55.

Rodstokken krybende, grenet, paa hver Green 2—3 nyreformede, heelrandede *Blade* og 1 før Udspringningen nikkende *Blomst*; *Blomsterstilken* kortere end *Bladene*; *Blomsterdækket* klokkeformet (udvendig bruunlig-grønt, indvendig mørkrødt, haaret).

Bladene langs *Nerverne* finthaarede, forøvrigt glatte og glindsende. 5. 7.

Paa skyggefulde Steder, meget sjelden: Forhen i Rosenborg Have (H.); J. Gjøl i Limfjorden (Mortens. Herb.), Kidholm i Kolding Fjord (H., nu forsvunden: 28); Sl. Slotsvolden ved Gelting i Angel (16), Mörel (Seehusen), Nyværk ved Slesvig (Esmarch).

2. *Lythrum*. Kattehale.

643. *L. Salicaria* L. (Pilebladet K.) H. 526; Drej. n. 496; F. D. 671.

Stængelen opret, firekantet; *Bladene* korsviis-modsatte ($1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$), lancetformede med hjerteformet Basis; *Blomsterne* falskt krandsstillede i Bladbjørnerne; de øvre Krandsse tæt samlede og derved dannende et Ax; *Bægerets* indre Tænder

triangulære, flere Gange kortere end de ydre, sylformede; de 6 *Støvdragere* kortere, de 6 længere.

2—4' høi, var. glat eller duunhaaret, Kronbladene purpurrøde. 7—8. 4.

β , *triphyllum*. Stængelen sexkantet; Bladene krandsstillede ($\frac{1}{3}$).

γ , *tetraphyllum*. Stængelen firekantet; Bladene krandsstillede ($\frac{1}{4}$).

Ved Bredderne af Søer, Grøfter og Aaer alm. udbredt.

II. Digynia.

3. Agrimonia. Agermaane.

644. **A. Eupatoria** L. (Almindelig A.) H. 527; Drej. n. 497; F. D. 588; H. N. XI, 44.

Bladene mellembrudt- og uparret-fjersnitdeelte, med lancetformede eller elliptiske, dybt saugtakke Afsnit; *Axelbladene* halvmaaneformede, fligede; *Blomsterne* i forlængede Klaser, paa korte, under Blomstringen oprette, mod Frugtmodningen nikkende *Blomsterstilke*; *de ydre Hagebørster* udstaaende; *Bæger-røret* (ved Modenheden) omvendt-kegleformet, med Længdefurer til Grunden.

1—2' høi, stivhaaret, især paa Stængelen og Bladenes Underflade. Blade og Blomster vellugtende. Kronbladene gule. 7—8. 4.

Ved Gjerder og paa solaabne Steder alm. udbredt.

645. **A. odorata** [Mill. Dict. n. 2] (Vellugtende A.) F. D. 2471; H. N. XIV, 51; *A. procera* Wallr.

Bæger-røret klokkeformet, kun foroven, omtrent til Midten, furet; *de ydre Hagebørster* tilbagebøiede, forøvrigt som foreg., men alm. høiere (2—3'); *Bladenes* Afsnit længere tilspidsede; *Stængelen* mere ru, men (tilligemed Bladene) med svagere Haarbeklædning, hvoriblandt Kirtelhaar, som give Bladene en stærk Lugt.

Hos denne Art har jeg hyppigst fundet 2, hos foreg. kun 1 Frugt indsluttet i Bægerrøret. 7—8. 4.

Ved Gjærder og i Kratskove hist og her, bemærket i alle Provindserne, og i enkelte Egne alm., f. Ex. i *Lolland* og det sydlige *Fyen*.

III. Trigynia.

4. Reseda. Vau.

646. *R. luteola* L. (Farve-V.) H. 528; Drej. n. 498; F. D. 864; Rchb. ic. fl. germ. II, fig. 4442; H. N. I, 32.

Stængelen rank-opret; Bladene spredte, lancetformede, heelerandede; *Blomsterne* i forlængede, tætblomstrede Klaser; *Blomsterstilkene* omtrent af Længde med det firebladede *Bæger*; *Kronbladene* alm. 3—4, det øvre (større) 4—7-fliget; de mellemste 2—3-fligede, det nedre udeelt; *Kapselen* klokkeformet, 3—4-kantet, rynket paatværs.

1—2' høi, glat, Kronbladene bleggule. 7—8. ☉.

Ved Veie, især omkring Byer, paa Marker og Bakker, sporadisk, men forekommer i alle Provindser, hyppigst paa Bornholm! *

IV. Dodecagynia.

5. Sempervivum. Huusløg.

647. *S. tectorum* L. (Tag-H.) H. 532; Drej. n. 499; F. D. 601.

Rodskuddene med rosetteformigt samlede, tykke og saftrige, elliptiske eller omvendt-ægformede, braadspidsede, randhaarede *Blade*; *Stængelen* opret, med spredte, lancetformede eller elliptiske *Blade*, oventil deelt i en qvastformet *Blomsterstand* med eensidige *Blomster* paa Grenene; *Kronbladene* stjerneformigt udbredte, lancetformede, spidse, dobbelt saa lange som *Bægeret*; de undersædige *Skjæl* smaae, kirtelformede.

Stængelen 1—1½' høj, oventil kirtelhaaret. Kronbladene rosenrøde. De indre Støvdragere omdannes ofte til Frugtblade. 7—8. 7.
Paa Straatage i Landsbyer, ikke sjelden.

12^{te} Klasse. Icosandria (Bægerhannede).

1. Orden. Monogynia (Enhunnede).

1. **Prunus** L. Bægeret omkringsædigt, femfliget, Kronbladene 5*), Frugten fri, en saftig Steenfrugt. (Træer eller Buske med spredte Blade. N. F. Drupaceæ).

† *Philadélphus* L. Bægerrøret sammenvoxet med Frugtknuden, Bægerets Krave firefliget, Kronbladene 4, Frugten en undersædig, firerummet Kapsel. (Busk med modsatte Blade. N. F. Philadelphææ).

Cratægus monogyna (12, 2).

2. Orden. Di-Pentagynia (To-Femhunnede).

A. Blomsten oversædig eller halvt oversædig, Frugterne uopspringende, mere eller mindre omgivne af det kjødfulde »Underbæger« (3: det mod Frugtmodningen tilvoxende Bægerrør). (2—6. N. F. Pomaceæ).

a. Frøgjemmets Vægge beenhaarde (Steenfrugt).

2. **Cratægus** L. (part.) Blomsten oversædig; Frugt Steenæble med 1—5 Stene (3: Frugtknudens Rum 1—5, enfrøede og heelt omsluttede af Underbægeret).

3. **Cotoneaster** Lindl. Bægeret halvt oversædigt; Frugtknudens Rum 3—4, enfrøede, foroven frie, nedtil sammenvoxne med det tilsidst kjødfulde Underbæger.

*) De Slægter i denne Klasse, som høre til Familiernes Drupaceæ, Pomaceæ og Rosaceæ, have alle femdeelt Bæger og 5 Kronblade.

b. Frøggjemmets Vægge hindeagtige eller bruskagtige (Kjærnefrugt).

4. **Sorbus** L. Bægerfligene henvisnende; Frugten et bærformigt Kjærneæble med 5 enfrøede Rum, omgivne af Frøggjemmets hindeagtige Vægge og heelt omsluttede af Underbægeret.

5. **Pyrus** L. Bægerfligene henvisnende; Frugten et paa Overfladen glat Kjærneæble med 5, 1—2-frøede Rum, omgivne af læderagtige Vægge og heelt indsænkede i Underbægeret.

† 6. **Cydonia** Tourn. Bægerfligene grønne (vedblivende uforandrede); Frugten et paa Overfladen filtet-duunhaaret Kjærneæble med 5 fleerfrøede Rum, omgivne af bruskagtige Vægge og heelt indsænkede i Underbægeret.

Poterium L. (21, 6).

B. Blomsten omkringsædig, Frugterne opspringende, frie.

7. **Spiræa** L. Frugterne 5 eller flere, 2—6-frøede Bællekapsler. (N. F. Rosaceæ, e).

3. Orden. *Polygynia* (Mangehunnede).

A. Bægeret fembladet eller femdeelt, uden Yderbæger; (Buske med Barktorne).

8. **Rosa** L. Frugterne mange Nødder, omsluttede af det kjødfulde, bægerformigt udhulede Underbæger (Hybenfrugt). Bægerfligene vedblivende eller affaldende, hele eller fligede. (N. F. Rosaceæ, b).

9. **Rubus** L. Frugterne mange Steenfrugter, tilhæftede udenpaa den kegleformede Frugtbund; Bægeret vedblivende. (N. F. Rosaceæ, c).

Spiræa (12, 2).

B. Bægeret fembladet, dets Blade afvejlende med et fembladet Yderbæger. (Urter uden Barktorne).

(9—12. N. F. Rosaceæ, d).

10. **Fragaria** L. Griffelen affaldende; Frugterne Nødder, befæstede paa den kjødfulde, ved Modningen affaldende Frugtbund. (Kronbladene hvide).

11. **Potentilla** L. Griffelen affaldende; Frugterne Nødder, befæstede paa den tørre, vedblivende Frugtbund. (Kronbladene gule eller hvide).

12. **Cómarum** L. Griffelen affaldende; Frugterne Nødder, befæstede paa den svampagtigt opsvulmede, vedblivende Frugtbund. (Kronbladene brunnrøde).

13. **Geum** L. Griffelen vedblivende i Spidsen af Nødderne og tilvoxende mod Modningen under Navn af Frøhale; Frugterne befæstede paa den tørre, vedblivende Frugtbund.

I. Monogynia.

1. Prunus. Kræge.

a. *Prunus* s. s. Blomsterne enlige eller parvise, udvikles før eller samtidigt med Bladene; Frugtens Overhud beklædt med Dug; Stenen fladtrykt.

648. **P. spinosa** L. (Slaaentorn). H. 541; Drej. n. 500; F. D. 926.

De unge Grene duunhaarede; *Bladene* lancetformede eller elliptiske, saugtakke, paa begge Flader glatte; *Blomsterne* enlige; *Blomsterstilkene* glatte; *Frugterne* kuglerunde, oprette.

En lav Busk med talrige og stærke Vedtorne; de yngre Blade duunhaarede; Kronbladene hvide; Blomsterne udvikles før Bladene. Frugten blaadugget, dens Smag sammensnærende. 4—5. $\frac{1}{2}$.

β , *coætanea* W. & Gr. F. D. 2590; *P. fruticans* Whe.; *P. insititia* Drej. n. 501 (efter Voxestedet), Blade og Blomster

udvikles samtidigt, Stammen høiere end hos Hovedarten; Blomsterne større, ofte parvise.

I Krat og ved Gjærder, udbredt overalt i Danmark. *β*, sjeldnere: *Sj.* et Gjærde mellem Helsingør og Egebæksvang (21), Frederiksdals Skov (14), Sundbyøster paa Amager (19), Philosophgangen ved Sorø! *Falst.* S. Kirkeby, Korselitze (Koch); *Bornh.* Rønne Vang (Hjorth); *Sl.* Haderslev (Grønlund), Flensborg (16).

649. *P. insititia* L. (Almindelig K.) H. 540; Drej. n. 501 (undt. Voxest.); F. D. 2651; H. N. V, 48.

De unge Grene fløielsehaarede; *Bladene* omvendt-ægformet-elliptiske, saugtakkede, paa Underfladen duunhaarede; *Blomsterne* parvise, med finthaarede *Blomsterstilke*; *Frugterne* kuglerunde, nikkende.

En større Busk med færre Vedtorne; Kronbladene hvide; Frugten større end hos foreg., dens Smag sød eller syrlig. (Er ifølge Koch Stamarten til de runde Blommer). 4—5. *h*.

Ved Gjærder og i Kratskove, i vild Tilstand sjelden: *Sj.* Frydenlund (Frk. Rieffestahl)! mellem Grøndal og Brøndshøj, Amager (19); i det sydl. *Fyen* hist og her (12), *Langeland* (H.); *Falster* alm. (Koch); Hasseløen ved Nykjøbing p. F.! *J.* Ødstedgaard! Dyrkes hyppigt i flere Afændringer.

† 650. *P. domestica* L. (Blommetræ). H. 539; Drej. p. 173; Sv. bot. t. 193.

De unge Grene glatte; *Bladene* omvendt-ægformet-elliptiske, saugtakkede, paa Underfladen duunhaarede; *Blomsterne* parvise med duunhaarede *Blomsterstilke*; *Frugterne* aflange, nikkende.

En høi Busk eller Træ, uden Vedtorne; Kronbladene guulagtigt-hvide; Frugten af sød Smag (Stamart til de aflange Blommer, f. Ex. Svedsker). 5. *h*. (Var. med glatte *Blomsterstilke*).

Dyrkes alm. og forekommer hist og her forvildet: *Langeland*, *Als* (H.); *Sj.* Bernstorfsveien ved Lundehuset (Dr.), Roeskilde (19!).

b. *Cerasus* DC. Blomsterne i en sammentrængt Halvskjærm, udvikles samtidigt med Bladene; Steenfrugten uden Dug, Stenen kugleformigt opblæst (Ingen Vedtorne).

† 651. *P. Cerasus* L. (Kirsebærtræ). H. 536; *Cerasus Caproniana* DC., Drej. p. 172.

Bladene elliptisk-ægformede, saugtakke, glatte, jævne, uden Kirtler; *de indre Knopskjæl* bladbærende. Underjordiske *Udløbere*.

Træ af Middelstørrelse. Kronbladene hvide. Frugtens Smag syrlig (de sure Kirsebær nedstamme fra denne Art). 5. *h*.

Dyrkes alm. og forekommer hist og her forvildet: *Sj.* ved Bernstorfsveien, hvor Teglovnene har været (Schum.), Kaningaarden ved Fuursø (14), Fægangsveien ved Sorø! *Falst.* en Høi V. for Stubbe-kjøbing (Benzon); *F.* Skrænt ved Ladegaardsøen ved Nyborg (Lund); *Sl.* Vonsbæk (Nielsen).

652. *P. avium* L. (Fuglekirsebærtræ). H. 538; F. D. 1647; Cerasus DC., Drej. n. 503.

Ingen Udløbere; *Bladene* elliptisk-ægformede, dobbelt-saugtakke, paa Underfladen duunhaarede, med 2 Kirtler ved Grunden af Pladen; alle *Knopskjællene* bladløse.

Høit Træ. Kronbladene hvide. Frugterne af sød Smag (flere dyrkede søde Kirsebær nedstamme fra denne Art). 5. *h*.

Forekommer hist og her vildvoxende i Skove, i nogle Egne hyppig, f. Ex. paa *Bornh.*! *Møens* Storeklint! *Langeland*, sydlige *Fyen* (12); *J.* ved Ødstedgaard!

c. *Padus* Koch. Blomsterne i Klase, udvikles efter *Bladene*. Frugt som foreg. (Ingen Vedtorne).

653. *P. Padus* L. (Hægebærtræ). H. 535; F. D. 205; Cerasus DC., Drej. n. 502.

Bladene elliptiske, fint saugtakke, rynkede, med 2 Kirtler ved Grunden af Bladpladen; *Klaserne* hængende; *Kronbladene* tandede.

Et Træ af Middelstørrelse. Kronbladene hvide; Frugterne smaae, sorte, af sammensnæpende Smag. 5. *h*.

I Skove, alm. i *Fyen* og paa Østkysten af *Halvøen*, sjelden i det Indre og mod V., f. Ex. Bølling, Estrup (28), Rødning, Husum (16). I *Sjæll.* og paa de øvrige Øer sporadisk og ikke hyppig.

† *Philadelphus. Pibeved.*

† *Ph. coronarius* L. (Falsk Jasmin). Schk. Handb. t. 121.

Bladene ægformet-elliptiske, tandet-saugtakke, tilspidsede; *Blomsterne* i en kort, klaseformet Qvast; *Bægerfligene* tilspidsede;

Griffelen til henimod Grunden firedeelt. Kronbladene hvide.
6. h_2 .

Dyrkes i Haver paa Grund af dens stærke Lugt, og forekommer hist og her forvildet, f. Ex. i *F.* hyppig omkring Gudme og Hesselager (19).

II. Di-Pentagynia.

2. Cratægus. Hvidtorn.

654. *C. monogyna* [Jacq. Fl. austr. t. 292, f. 1] (Engriflet H.) Drej. n. 507; F. D. 1162; Mespilus Willd., H. 547; *C. Oxyacantha* (L.) Fr. H. N. IX, 45.

Bladene fjernervet-3—5-fligede; *de nedre Sidenerver* udadbøiede fra Hovednerven; *Blomsterne* i Halvskjærm, med duunhaarede *Blomsterstilke*; 1 *Griffel* og 1 *Steen* i Frugten; *Bægerfligene* tilbagebøiede.

Kronbladene hvide. (En rød blomstret Afart, den saakaldte Rødtjørn, dyrkes alm. i Haver). Bladfligene heelrandede eller fjernt saugtakkede. 6. (omtrent 14 Dage senere end følg.). h_2 .

β , *denudata* Schum. Enum. p. 155. Blade og Bladstilke dunede, Blomsterstilkene glatte.

I Kratskove og ved Gjærder, bemærket i alle Provindser og ikke sjelden, dog mindre hyppig end følg. β , anføres af Schum. uden Angivelse af Voxested. *

655. *C. Oxyacantha* [Jacq. l. c. f. 2] (Almindelig H.) Drej. n. 506; F. D. 634; Mespilus Gärtn., H. 545; *M. oxyacanthoides* Thuill.

Bladene fjernervet-3—5-lappede; *de nedre Sidenerver* indbøiede mod Hovednerven; *Blomsterne* i Halvskjærm, med glatte *Blomsterstilke*; 2—5 *Grifler* og ligesaamange *Stene*; *Bægerfligene* opret-udstaaende, i Spidsen tilbagebøiede.

Kronbladene hvide. Bladets Lapper saugtakkede. Antallet af Støvveie var., undertiden er ved Reduction kun 1 tilstede, men er dog stedse en fra foreg. ved de mindre indskaarne Blade, Nervernes Retning og den forskjellige Blomstringstid vel adskilt Art. $\frac{5}{2}$ — $\frac{6}{1}$. h_2 .

I Krat og ved Gjærder, alm. udbredt i Danmark. Sædvl. busk-

agtig, men undertiden, f. Ex. paa Dyrehavesletten ved Eremitagen og paa Bornholm forekommer den som høit Træ med udeelt Stamme og tæt Krone.

† *C. punctata* Ait. Bladene omvendt-ægformet rudeformede, skarpt- og dobbelt-saugtakkede, forekommer forvildet ved et Gjerde mellem Jægersborg og Lyngby og i Philosophgangen ved Sorø!

3. Cotoneaster. Mispel.

656. *C. vulgaris* [Lindl. Trans. linn. soc. 13 p. 101] (Smaabladet M.) *Mespilus Cotoneaster* L., H. 517; F. D. 112.

Bladene ægformet-ovale, heelrandede, paa Underfladen (ligesom de unge Grene) hvidfildede; *Blomsterstilkene* 1—3-blomstrede, fra Bladhjørnerne, tilligemed *Bægerranden* duunhaarede.

Lav Busk. Bladene var. spidse, budte med en Braad eller ud-randede. Kronbladene hvide eller blegeøde; Frugterne røde. 5. (7—8-fr.). h.

Paa Klipper. I Danmark kun funden paa *Bornholm* i Granit-Terrainet paa Østkysten fra Hammershuus til Svanike.

4. Sorbus. Røn.

a. Bladene saugtakkede eller lappede.

657. *S. torminalis* [Crantz Austr. fasc. 2 p. 45] (Tarmvrid-R.) Drej. n. 511; Cratægus L., F. D. 798; *Pyrus* Ehrh., H. 551.

Bladene æg-hjerteformede, 5—7-lappet-fligede, Fligene saugtakkede, spidse, det nedre Par større, udstaaende; *Underbægeret*, *Blomsterstilkene* og *de yngre Blade* paa Underfladen dunet-graafildede.

Blomsterne i Halvskjærm (ligesom hos de øvrige Arter). Kronbladene hvide, Frugterne mørkrøde. 6. h.

I Kratskove, meget sjelden i Danmark: *Bornh.* Helligdommen ved Røe (8), paa Lindholms-Klipperne ved Bobbeaen (20)! *Moen* ved Ulfshale (9); *Loll.* (Viborg). *

658. *S. Aria* [Crantz. l. c. fasc. 2 p. 46] (Axelbær-R.)

H. 544; H. N. VI, 38; *Cratægus Aria* β , L. fl. Suec., F. D. 302.

Bladene omvendt-ægformede eller ovale, dobbelt saugtakkede med nedadtil efterhaanden svagere Takker, ved Grunden heelrandede, paa Underfladen ligesom *Blomsterstilkene* og *Underbægeret* sølvhvid-filtede.

Buskagtig. Kronbladene hvide, Frugterne røde, af sød Smag. 5—6. h.

Paa Klippegrund: i Danmark kun vildvoxende paa *Bornh.* Hammershuus (11)! Helligdommen i Rø Sogn! ved Bobbeaen og Lindholmsklipperne (Baagøe). Plantet og forvildet omkring Byer, f. Ex. Farumgaard (H.).

659. *S. scandica* [Fr. Fl. hall. p. 83] (Selje-R.) Fr. nov. p. 138, H. N. VI, 39; *S. intermedia* H. 544; *Cratægus Aria* α , L. fl. Suec.

Bladene ægformet-ovale, fjerlappede (Lapperne saugtakkede, Indsnittene tiltage i Dybde nedad mod Grunden af Bladet), paa Underfladen graafiltede.

Større Træ. Kronbladene hvide. Frugterne som foreg., men mindre. 5—6. h.

I Skove paa Klippegrund: alm. i Skovene paa *Bornholm*! I de øvrige Provindser er den ikke vildvoxende, men forekommer stundom i Plantager.

Anm. Dette Træ findes i Bursers Herbarium, under Navn af *Sorbus Herloviana*, fra Herlufsholms Skoles Have, med den Bemærkning at Ingen veed hvorfra det er kommet eller hvorlænge det har voxet der.

† 660. *S. fennica* [Kalm Fl. fenn.; Fr. S. Veg. Sc. p. 42] (Blandet R.) H. N. VI, 40; *S. hybrida* L. fil., H. 543, *Cratægus Aria* F. D. 301.

Forskjellig fra foreg. ved de foroven fjerfligede, forneden fjersnitdeelte *Blade* med (især i Spidsen) saugtakkede Flige, *Frugterne* af syrlig Smag.

Angives fra *Bornh.* (F. D., H.), men er forgjæves eftersøgt der af Alle som senere have besøgt Øen, saa at Angivelsen muligviis turde hidrøre fra en Forvexling med foreg. Findes, ligesom de foreg., undertiden plantet omkring beboede Steder.

b. Bladene uligefinnede.

661. **S. aucuparia** L. (Almindelig R.) H. 542; Drej. n. 510; F. D. 1034.

Smaabladene (6—8 Par) oval-lancetformede, saugtakke, paa Underfladen duunhaarede, i ældre Tilstand næsten glatte; *Knopperne* fildede.

Træ af Middelstørrelse. Kronbladene hvide. Frugterne røde, mindre end hos de foreg., af syrlig Smag. $\frac{5}{2}$ — $\frac{6}{1}$. **h.**

β, *integerrima*! *Smaabladene* heelrandede.

I Skove, ikke sjældent vildvoxende i Danm.; hyppigt plantet i Skove og Haver. ***β***, *Bornh.* ved Helligdommen i Rø Sogn (Baagøe).

5. **Pyrus. Abild.**

662. **P. communis** L. (Pæretræ). H. 548; Drej. n. 509; F. D. 2118.

Bladene ægformede eller ovale, budte eller kort tilspidsede, heelrandede eller fint saugtakke, med ligelang Stilk og Plade; *Blomsterne* i Halvskjærm; *Grifterne* frie.

I vild Tilstand ofte buskagtig med Vedtorne; i dyrket Tilstand et anseeligt Træ uden Vedtorne. Frugten ved Grunden afsmalnet (***α***, *Achras* Wallr.) eller afrundet (***β***, *Pyraster* Wallr.), ikke indtrykt; mellem de saftige Celler findes Korn (γ: saftløse Celler med stærkt fortykkede Vægge). Blomsterstilke, Underbægeret og Bladene i Randen og paa Underfladens Nerver duunhaarede. Kronbladene hvide. $\frac{5}{2}$ — $\frac{6}{1}$. (fr. 8—9). **h.**

I Skove og Krat sporadisk og ikke alm.: *Sj.* Kjøbenhavns Glacier (12), Eremitagen (25), Ermelundsskoven (Schum.), Bognæs Vester-skov (20), Kjøge (9), Herlufsholm (H.), Sorø (12), Holsteinborg Strand-skov (Nielsen); *Møens* Storeklint ved Taleren! *Falst.* Nøisomhed (14), Gaabense! *Loll.* Bjerremark (5), i stor Mængde paa Veilø i Nakskov Fjord (19); *F.* St. Jørgensgaard! Lindskov, Skjoldemose, Lyø (12); *J.* Mariager (7); *Sl.* Rylskov i Angel (12), Hadeby ved Slesvig (16). Paa de fleste af disse Steder synes den at være virkelig vildvoxende. Dyrkes desuden i Haver under mange Af-ændringer. $\overline{\text{w}}$

663. **P. Malus** L. (Æbletræ). H. 549; F. D. 1101; *Malus silvestris* Moench, Drej. n. 508.

Bladene ægformet-ovale, tilspidsede eller afrundede, saugtakke, Stilken halvt saa lang som Pladen; *Blomsterne* i Skjærm;

Griflerne ved Grunden sammenvoxne; *Frugten* ved Grunden navleformigt indtrykt.

Høit Træ, i vild Tilstand stundom med Vedtorne. Kronbladene lysrøde eller hvide. $\frac{5}{2}$ — $\frac{5}{1}$. (fr. 8—9). \mathfrak{h} . Var.

α , *austera* Wallr. (P. acerba DC.) Bladene og Underbægeret glatte; *Frugten* af sammensnærpande Smag.

β , *mitis* Wallr. De yngre Blade og Underbægeret duunhaarede; *Frugtens* Smag sød eller syrlig.

I Skove, Krat og ved Gjærder, alm.; β , sjeldnere, f. Ex. *Sj. Charlottenlund!* Krat ved Sundbyøster paa Amager (19); *F. Nyborg Vold* (Lund). Dyrkes i mange Afændringer.

6. Cydonia. Qvæde.

† 664. *C. vulgaris* [Pers. Syn. II, p. 40] (Alm. Q.) *Pyrus Cydonia* L., Jacq. Fl. austr. t. 342.

Bladene ovale eller budt-ægformede, heelrandede, paa Overfladen glatte, paa Underfladen guulhvid-filtede; *Blomsterne* enlige, kortstilkede; *Bægerfligene* kirtlet-tandede, Kronbladene indvendig, ligesom Grifler og Støvdragere, ved Grunden filtede; *Frugten* pæreformet.

Træ af Middelstørrelse. Kronbladene hvide ell. bleggrøde. *Frugtens* Smag sammensnærpande. 5. (fr. 9). \mathfrak{h} .

Dyrkes undertiden i Haver (oprindelig indført fra Asien), og forekommer forvildet, f. Ex. Horbeløv og Bønnit paa Falst. (Koch)!

7. Spiræa. Mjødurt.

a. Urteagtige, med tandede Axelblade. Blomsterstanden qvastformet.

665. *S. filipendula* L. (Knollet M.) H. 552; Drej. n. 504; F. D. 635.

Roden trævlet, Trævlerne hist og her knolleformigt opsvulmede; *Bladene* paa begge Flader glatte, mellembudt-fjersnitdeelte, Afsnittene bredere eller smalere lancetformede, fjersfligede (Endeafsnittet lige stort med de øvrige); *Frugterne* krandsstillede, haarede, rette Bællekapsler.

1—1½' høi. 5—7. Kronbladene hvide, i Knoptilstanden rødlig (da den røde Farve forsvinder efter Udspringningen, er Navnet »rødblomstret«, som Hornem. har tillagt den, mindre passende).

Paa Bakker og høie Enge, funden i alle danske Provindser, og i enkelte Egne alm., f. Ex. paa *Bornh.*, i *Sj.* omkring Roeskilde! og Skjelskør (Nielsen); *J.* i Hanherrederne (16) og Aalborg-Eggen (Branth); i andre Egne sjelden, f. Ex. i den sydlige Deel af Halvøen; ved Helsingør ikke bemærket (21).

666. *S. ulmaria* L. (Almindelig M.) H. 553; Drej. n. 505; F. D. 547.

Rodtrævlerne ikke opsvulmede; *Bladene* mellembrudt-fjersnit-deelte, Afsnittene elliptisk-ægformede, uregelm. og dobbeltsaugtakkede (Endeafsnittet trelappet, større end de øvrige); *Frugterne* glatte, krandsstillede, snoede Bællekapsler.

2—3' Fod høi. Kronbladene mindre end hos foreg., hvide (ogsaa i Knoptilstanden), vellugtende; hele Planten har en stærk krydret Lugt naar den gnides. 6—7. 4.

α, *discolor* Koch. Bladene paa Overfladen glatte, paa Underfladen tæt hvidfiltede.

β, *concolor!* (*S. denudata* Hayne). Bladene paa begge Flader grønne og næsten glatte.

Paa Enge og i fugtige Skove alm. udbredt. Formen *α*, er den hyppigste; *β*, sjeldnere, f. Ex. *Sj.* Hellebæk! *Loll.* Steensgaard o. fl. St.; *F.* Odense, Skaarup alm. (19); nordl. *Jyll.* (Drej.); *Sl.* Husum (F. Müll.).

b. Buskagtige, uden Axelblade. Blomsterstanden klaseformet.

† 667. *S. salicifolia* L. (Pilebladet M.) Engl. bot. t. 1468.

Bladene lancetformede, skarpt saugtakkede, glatte; *Blomsterstanden* en sammensat Klase med korte Grene.

Kronbladene hvide eller lysrøde. Var. med Blomster i pyramideformet Top (*β*, *paniculata* Willd.). 7—8. *h.*

Opriindelig indført som Siirbusk, men forekommer hist og her forvildet i Skove og ved Gjærder, f. Ex. *Sj.* Ruderhegn! Mose S. for Dronninggaard, Jonstrup Vang (14), Gamle Mose ved Lyngby (20); *Falst.* Nykjøbing (Koch); *Loll.* Holmegaard (19); *F.* Tvede, Dongs-hørup, Ollerup, Rødkilde (12); *J.* Kolding (28); *Sl.* Terp (1), alm. ved levende Hegn i Angel! *Bornh.* Sandflugten ved Rønne (Baagøe).

† *S. tomentosa* L. *Bladene* elliptiske, grovt saugtakke, paa Underfladen hvidfiltede; *Blomsterstanden* en pyramideformet Top med længere Grene.

Kronbladene rosenrøde, mindre end hos foreg. $\frac{6}{2}$ —7. h.

Forvildet i Ruderhegn (24)!

III. Polygynia.

8. Rosa. Rose.*)

a. *Spinosissimæ*. Aarsskuddene tæt beklædte med Torne. Bægerfligene (oftest) hele.

668. *R. pimpinellæfolia* L. (Pimpinelle-R.) Fr. nov. p. 156; H. N. X, 52; *R. spinosissima* L. sp., H. 554; F. D. 398.

Stængelen og *Grenene* (især de yngre) tæt beklædte med kortere og længere, rette eller svagt krummede *Torne* og *Børster*; *Smaablade* rundagtigt-ovale, saugtakke; *Hybenet* sammentrykt-kugleformet, kødfuld-læderagtigt; *Bægeret* vedblivende, dets Flige mod Modningen oprette og sammenstødende.

Lavere og med mindre Smaablade end de følg. Arter. Kronbladene bleggule eller hvide, Hybenet sortrødt, sildigt modnende. 6. (Fr. 9). h.

I Sandklitterne paa *Halvøen* langs Vesterhavet fra Skagen til Blaavand (H.) og paa de vestlige Øer: Romø (16), Sylt, Amrom (H.); Sj. Sandbakkerne ved Tibirke mod Arresø! forøvrigt ikke funden paa Øerne. *]

*) Alle danske Arter af denne Slægt have uligefinnede Blade med en i omtrent dens halve Længde tokløvet Bladskede. Et af de vigtigste Kjendetegn mellem Arterne er (efter Fries) at søge i Underbægerets (Hybenets) Beskaffenhed, idet dette snart er læderagtigt, snart kødfuldt eller melet, snart tidligere, snart senere modnende. Behandlingen af denne vanskelige Slægt skylder jeg for en stor Deel Pastor M. T. Lange.

† 669. **R. cinnamomea** L. (Mai-R.) H. 554; Fr. l. c. p. 153; F. D. 868 (*R. fluvialis*) og 1214; H. N. VII, 45—46.

Aarsskuddene med talrige, rette, de ældre Grene med faae, bøiede *Torne* (alm. parvise under Bladene); *Smaabladene* lancetformet-ovale, saugtakkede, paa Underfladen graaagtigt duunhaarede; *Hybenet* kugleformet, melet; *Bægerfligene* vedblivende, opret-sammenstødende.

Barken kanelbrun; Aarsskuddenes *Torne* smaae og tidligt affaldende, ofte 0. Kronbladene rosenrøde, *Hybenet* tidligt modent, rødt. 5—6. (fr. 8). *h*.

Findes paa flere Steder forvildet, f. Ex. *Sj. Frederiksberg*! *J. Dyrehavegaard* ved Kolding (30), og dyrkes alm. (med fyldt Blomst) i Haver.

Anm. Den af H. fra Aalborg angivne *R. cinnamomea* (Beck) er, ifølge Expl. i Drej. Herb., *R. lucida* Ehrh., som hist og her findes plantet i Haver (M. T. Lange i Naturh. Foren. Vid. Medd. 1861 p. 6).

b. *Caninæ*. Aarsskuddene med færre *Torne*, *Bægerfligene* (oftest) fligede.

α, Frugterne læderagtige, sildigt modne (sædv. i October); *Tornene* seglkrummede.

670. **R. rubiginosa** L. (Viin-R.) H. 556; Drej. n. 514; Fr. nov. p. 148; H. N. III, 41; *R. suavifolia* Lightf., F. D. 870.

Tornene stærke, seglkrummede, paa de unge Grene uligeformede; *Smaabladene* ovale eller rundagtigt-ægformede, dobbeltsaugtakkede, med udstaaende, kirtelbærende Takker, paa Underfladen og Bladstilken kirtelhaarede; Blomsterskjærmen oftest fleerblomstret; *Blomsterstilkene* rette, stivhaarede, *Hybenet* rundagtig-ovalt, kirtelhaaret eller glat; *Bægerfligene* tilbagebøiede, temmelig snart affaldende.

Bladene vellugtende (omtr. som *Æbler*), klæbe ved Tørringen fast til Papiret. Kronbladene mørk-rosenrøde. 6—7. *h*.

β, *horrida*! Stængelen i hele sin Længde beklædt med stærkere, mindre seglkrummede *Torne*.

Ved Gjærder, paa udyrkede Marker, hist og her i alle Provindser, men ikke overalt lige hyppig; sjeldnere i Klitter. *β*, *Sj. Frederiks-*

værk (27)! Hellebæk (Heiberg)! *F.* Nyborg (Lund); *J.* Svinekløv (Grønlund)! og Hjortels i Hanherred (Drej.).

671. *R. inodora* [Fr. Fl. hall. p. 85] (Lugtløs R.) H. N. III, 41.

Smaabladene langstrakt-ægformede eller elliptiske, skarpt saugtakkede med faae Kirtelhaar paa Takkerne og Underfladen, forøvrigt glatte, *Bladstilkene* tæt kirtelhaarede; *Blomsterstilkene* glatte, *Hybenet* glat, forøvrigt som foreg.

Bladene have en svag Lugt. Kronbladene hvide (?). 6—7. *h.*

Ved Gjærder og i Krat: *Sj.* Aalsgaard ved Helsingør (12); paa Østenden af Lyø; Nyborgs Volde med foreg.? (12); *Børnh.* Seiersgaarden ved Rønne (Hoff), Blykobbeaaen (14), Dynddalen ved Rø (Hjorth). *

Anm. Denne Art, som synes at variere meget, nærmer sig i Udseende meest følgende, i Characterer foregaaende Art.

672. *R. canina* L. (Vild R.) H. 556; Drej. n. 512; F. D. 555 og 1695.

Stængelens *Torne* stærke, seglkrummede; *Smaabladene* elliptiske, jævne, skarpt enkelt saugtakkede med opret-tiltrykte Takker uden Kirtler; *Hybenet* ved Modenheden opret, ovalt eller omvendt-ægformet, med efter Blomstringen tilbagebøiede, hurtigt affaldende *Bægerflige*.

Kronbladene lys-rosenrøde. 6—7. *h.* En meget foranderlig Art med Hensyn til Bladenes Form og Indskjæring, Takkernes Retning, Frugtens Form o. s. v. De vigtigste Former ere:

* *genuina*. Bladene glatte og jævne.

α, nitida Fr. H. N. VI, 41. Bladene paa Underfladen frisk grønne, paa Overfladen glindsende.

β, opaca Fr. H. N. VIII, 45. Bladene paa Overfladen matgrønne, paa Underfladen blaagrønne.

** *dumetorum* H. N. VII, 43. (*R. dumetorum* Thuill.) Bladene rynkede, paa Underfladen eller begge Flader tiltrykt-duunhaarede, med mere udstaaende Takker paa *Smaabladene*. (Nærmer sig *R. coriifolia*).

*** *collina* H. N. VI, 42. (*R. collina* Jacq., H. 558). *Blomsterstilkene* kirtlet-stivhaarede; *Hybenet* omvendt-ægformet, beklædt med enkelte Kirtelhaar, mindre læderagtigt og tidligere

modent; Bægerfligene længere vedblivende. (Nærmer sig *R. tomentosa*).

Ved Gjærder og i Kratskove alm. udbredt (α og β), især meget hyppig paa Bornholm. ** sjældnere: *Sj.* Hellebæk (12), Helsingør (11), Sandbjerg! *Falst.* N. Kirkeby, Ønsløv, Torkildstrup (Koch); *F.* Ollerup, Lyø (12), *Bornh.* ved Bodilsker (20); *J.* i Hedeegnene. *** paa Bakker, ikke alm., f. Ex *Sj.* Hellebæk (12); *Loll.* Steensgaard (19); *F.* Ollerup (12); *J.* Akkedal og Vildsund i Thy (Dr.).

β , Frugterne kjødfulde eller meledede, tidligere modne. Stængelens og Grenenes Torne typisk rette (undtagen hos Nr. 673).

673. *R. coriifolia* [Fr. Fl. Hall. p. 85] (Stivbladet *R.*) H. 557; Fr. nov. p. 147; H. N. VI, 43.

Tornene stærke, seglkrummede, *Smaabladene* ægformede, enkelt saugtakke med udstaaende Takker, læderagtige, rynkede, paa Underfladen (eller begge Flader) og Bladstilkene haarede; *Blomsterstilkene* meget korte, glatte; *Hybenet* næsten kugleformet, kjødfuldt, glat, med vedblivende, tilsidst oprette *Bægerflige*.

Kronbladene mørk-rosenrøde. 6—7. (fr. 8—9). $\frac{1}{2}$.

Paa Marker og ved Gjærder, sjelden: *Sj.* Hellebæk (12!), Helsingør (11)! Gurre (Heiberg), Københavns Ladegaard ved Vandmøllen (9), Amager (8); *Loll.* Nakskov (19); *F.* Nyborg (Lund); *J.* Frederikshavns Kirkegaard (Drej. Herb.); *Syllt* (Grønlund), *Føhr* (20). [*

Ann. Denne Art er nærmest beslægtet med *R. mollissima*, men deler de fleste Characterer med *R. canina* (dumetorum).

674. *R. tomentosa* [Sm. Fl. brit. 2, 539] (Filthaaret *R.*) Koch Syn. II, 253; H. N. IX, 46; *R. mollissima* α , Drej. n. 515.

Tornene stærke, rette eller noget krummede; *Smaabladene* elliptiske, skarpt og dobbelt saugtakke, med udstaaende Takker, paa begge Flader tiltrykt-duunhaarede; *Blomsterstilkene* rette, kirtlet-stivhaarede, *Hybenet* rundagtigt-aflangt, kjødfuldt-læderagtigt, med blaa Dug som let afgnides og let affaldende Kirtelhaar; *Bægerfligene* udstaaende, temmelig snart affaldende; *Kronbladene* i Randen glatte.

Bladene graagrønne. Kronbladene mørk-rosenrøde. 6—7. (fr. 9). $\frac{1}{2}$.

β, *alba* (R. alba H. 558; F. D. 1215; R. canina—alba Lge. Haandb. 1 Udg. S. 300). Kronbladene hvide.

I Hegn og Kratskove, ikke sjelden i de frugtbarere Egne af Landet. **β**, F. Hofmangave (4), Juelsberg (H.), Nyborg (Lund), mellem Østrup og Daugstrup (19), Sørup (12); **J**. Ørebro i Hanherred (16); **Sl**. Gjærder ved Haderslev (Grønlund)?

Ann. Nærmest beslægtet med R. canina (collina), men deler de fleste Characterer med R. mollissima. *

675. **R. mollissima** [Willd. Prodr. fl. Berol. n. 1237] (Hyben-R.) Fr. S. Veg. I, 174; H. N. VII, 42; R. villosa Linn. fl. Suec. & herb. (ex C. Hartm.), H. 555; R. mollissima **β** (R. mollis Sm.) Drej. n. 515; R. ciliatopetala Koch l. c.

Tornene rette; *Smaabladene* elliptisk-ovale eller omvendtægformede, dobbelt saugtakke, tykke, paa begge Flader stærkt haarede, med ophøiede Nerver paa Underfladen; *Blomsterstilkene* rette, kirtlet-stivhaarede; *Hybenet* næsten kugleformet, med stive Kirtelhaar, melet; *Bægerfligene* vedblivende, tilsidst sammenstødende; *Kronbladene* glatte eller »kirtlet-randhaarede«.

Bladene graaagtige, Kronbladene mørk-rosenrøde. 6—7. Frugterne (8—9) hørøde, glindsende. **h**.

β, *nemoralis*! Bladene mere grønne og mindre haarede, Blomsterne enlige, Hybenet glat (Ligner R. cinnamomea).

γ, *arenaria*! Bladene meget smaac, Hybenet glat, ved Grunden afsmalnet, mindre end hos Hovedarten.

I Kratskove og ved Gjærder, ikke sjelden, hyppigst i de magrere Egne af Landet. **β**, i Skove: *Bornh.* Echodalen (20), Allinge! **J**. Haven i Vendsyssel! **γ**, Jædderen ved Kjøge (9)!

Ann. Koch o. fl. Forff. angive Kronbladene som kirtlet-randhaarede, men hos os forekommer den oftest, om ikke altid, uden Randhaar.

676. **R. pomifera** [Herm. Ros. p. 16] (Spansk Hyben). Fr. nov. p. 150; Koch l. c.; Drej. n. 516; H. N. IX, 47; R. villosa pomifera H. 555.

Smaabladene oval-lancetformede, tynde og bløde; *Hybenet* beklædt med tykke Kirtelhaar; *Kronbladene* kirtlet-randhaarede; *Frugterne* meget store, melet-kjødfulde, paa nikkende *Blomsterstilke*; forøvrigt som foreg., men i alle Dele større.

Frugterne mørkrøde, Bladene blaagrønne, klæbe ved Tørringen fast til Papiret. 6—7. (fr. 8—9). **h.**

Ved Gjærder og omkring Byer, funden i alle Provindser, men sparsommere end foreg., og paa mange Steder forvildet fra Haver, hvor den ofte dyrkes paa Grund af de spiselige Frugter.

9. Rubus. Klynger.

a. Urteagtige, med ægformede Axelblade.

677. **R. Chamæmorus** L. (Multebær). H. 565; Drej. n. 517; F. D. 1; Whe. & N. Es. Rubi germ. t. 49.

Rodstokken krybende; *Stænglerne* (saavel de blomstrende som blomsterløse) oprette, 2—3-bladede; *Bladene* nyreformede, femlappede, med dobbelt-saugtakke Lapper; *Axelbladene* tilvoxne til Stængelen; *Blomsterne* enlige og endestillede, tvebo; *Bægerbladene* under Blomstringen tiltrykte; *Kronbladene* rundagtige eller omvendt-ægformede.

3—8" høi. Kronbladene hvide, Frugterne brandgule. $\frac{5}{2}$ — $\frac{6}{1}$. 4.

I Tørvmoser, sjelden i Danmark og kun funden i det nordl. *Jyll.* (store Hammelse i Vendsyssel, lille Vildmose, Tørsløv H., Ulsted N. for Hals (Grønlund) og i *Nordsjælland*: Helsingør ved Lade-gaarden (21), mellem Ørsholt og Gurre, paa Tuerne ved Gurre Sø (11!).

678. **R. saxatilis** L. (Fruebær). H. 564; Drej. n. 518; F. D. 134; Whe. & N. E. l. c. t. 9.

De *blomsterbærende Stængler* oprette, de *blomsterløse* nedliggende eller krybende; *Bladene* trekoblede, med rudeformet-ægformede, grovt og dobbelt saugtakke *Smaablade*; *Blomsterne* 3—5 samlede i en kortstillet Halvskjærm; *Bægerbladene* under Blomstringen tilbagerullede; *Kronbladene* oprette, linie-spadeformede.

Kronbladene hvide, meget mindre end hos foreg., Bær høirøde, sure. 6—7.

I Skove, funden i alle Provindser, men sporadisk.

b. Buskagtige, med linie-lancetformede Axelblade.

aa. *Idæi*. *Stænglerne* oprette, *Bladene* paa Aarsskuddene uligefinnede, *Frugtsamlingen* løsnes ved Modenheden fra *Frugtbunden*.

679. **R. idæus** L. (Hindbær). H. 560; Drej. n. 519; F. D. 788; Whe. & N. Es. l. c. t. 47.

Stængelen trind, beklædt med talrige Naalebørster; *Bladene* paa *Aarsskuddene* alm. med 5, paa de blomsterbærende *Stængler* med 3, paa *Underfladen* sølvgraa-filtede, *Smaablade*; *Blomsterstilkene* 2—3-blomstrede, i *Bladhjørnerne* eller halvsjærmformet samlede i *Spidsen* af *Grenene*; *Kronbladene* omvendt-ægformede, omtrent halvt saa lange som de ægformede, langt tilspidsede *Bægerblade*.

Stængelen overtrukken med en blaagraa Dug; *Kronbladene* hvide, *Bær* røde (ell. gule). 6.

β , *microphyllus* Wallr. *Bladene* meget smaae, de nedre trekoblede, de øvre haandfligede.

I Skove og Krat meget alm., dyrkes i Haver (med større Frugter). β . *Sj.* Holmegaardsmosen ved Broxø!

bb. Fruticosi. *Bladene* (typisk) fingrede, *Frugtsamlingen* fastvokset til *Frugtbunden**).

α . *Genuini.* *Aarsskuddene* næsten oprette eller i *Spidsen* svagt bøiede, glatte, ikke duggede; *Bladene* paa begge Flader grønne; *Blomsterstanden* alm. enkelt; *Bægerbladene* paa *Ryggen* grønne, i *Randen* og paa *Inderfladen* hvidfiltede, langt tilspidsede.

680. **R. suberectus** [Anders. Trans. linn. soc. XI, p. 218 t. 16] (Opret K.) H. 563; Arrh. monogr. Rub. p. 19; F. D. 1992; H. N. VI, 44.

Aarsskuddene oprette, i *Spidsen* lidet bøiede, forneden trinde, foroven svagt kantede, med faae, svage og rette Torne;

*) Ved Undersøgelsen af denne Afdeling, hvis Arter fremtræde i saa stor Mangfoldighed, bør man lægge Mærke saavel til *Aarsskuddene* (de blomsterløse *Stængler*) som de blomstrende *Stængler* og *Grene*, da disse saavel i Gjennemsnit som i Henseende til Torne og Blade ere indbyrdes meget afvigende. De Dele af Planten, som afgive de mindst foranderlige Kjendetegn, ere *Stængelens* Gjennemsnit, *Tornene*, *Blomsterstanden*, *Bægerbladene* og de modne *Frugter*. Ved enhver Art har jeg søgt at angive det typiske Forhold uden at tage Hensyn til de tilfældigt afvigende, især de i Skygge forekommende Former, som ofte ere saa forskellige fra Hovedarten, at de blive ukjendelige eller idetmindste vanskelige at henhøre til en bestemt Art (Skyggeformerne have alm. tyndere og mere grønne Blade).

Bladene tynde, tæt og alm. enkelt saugtakkede, med udstaaende Takker, 5—7-koblede, *paa de blomsterbærende Stængler* 3—5-koblede, de nedre Smaablade næsten siddende; *Blomsterstanden* halvskjærmformet, faablomstret; *Kronbladene* omvendt-ægformede.

Kronbladene hvide eller bleggrøde, Frugterne mørkrøde, glindsende, ofte feilslaaende. 6—7.

β , *fissus* (R. fissus Lindl., Bab. man. 3 ed. p. 93!) Aarskuddene mindre oprette, med talrigere Torne; Bladene paa Blomsterstænglerne trekoblede, med kileformede, forneden heelfrandede, foroven dybt saugtakkede Smaablade.

I Krat, ved Gjærder og paa udyrkede Marker, hyppig i Landets magre Egne, hvor den ofte er den eneste forekommende Art, især paa Halvøen og i Nordsjælland. β , i Skove ved Rands pr. Fredericia!

681. **R. plicatus** [Whe. & N. l. c. p. 15, t. 1] (Brombær). F. D. 2589; R. fruticosus L. Fl. Suec., Arrh. p. 23; Drej. n. 520; H. N. V, 51. (R. nitidus Whe. t. 4 hører til samme Art).

Aarskuddene oprette, i Spidsen bøiede, femkantede, med stærke, fjerne, paa Midten af Stængelen skjævt nedbøiede, foroven og paa de blomsterbærende Stængler seglkrummede Torne; *Bladene* femkoblede, foldet-rynkede, næsten læderagtige, glindsende, paa Overfladen næsten glatte, paa Underfladen duunhaarede eller tiltrykt-silkehaarede, Endebladet hjerteformet, de øvrige ægformede, tilspidsede, de 2 nedre kortstilkede, alle dobbelt saugtakkede, alm. med udstaaende Tænder; *Blomsterstænglernes Blade* 3—5-koblede, med ægformet elliptiske Smaablade; *Blomsterstanden* halvskjærmformet; *Bægerbladene* mod Frugtmodningen tilbagebøiede; *Kronbladene* rundagtigt-ovale eller omvendt-ægformede.

Kronbladene hvide ell. lys-rosenrøde, Frugterne sorte, glindsende, velsmagende, noget syrlige. $\frac{6}{2}$ — $\frac{7}{1}$. (14 Dage tidligere end R. discolor, dumetorum o. fl. Arter).

β , *fastigiatus* (R. fastigiatus Whe. l. c. t. 2). Aarskuddene udstrakte; Smaabladstilkene forlængede; Smaabladene og Bægerbladene meget langt tilspidsede.

Ved Gjærder og i Udkanten af Skove, alm. paa *Bornh.*, i *Sjæll.* og i den sydlige Deel af *Halvøen*, sparsommere i *Fyen* og det nordl. *Jyll.* til Aarhuus. *β*, i Skove: *Sj.* Helsingør (27); *J.* Brøndsted! *Sl.* Gjærder ved Aabenraa!

Anm. *R. fastigiatus* Whe. er aabenbart en Form af *R. plicatus*, og ikke, som Sond. (fl. hamb. p. 272) antager, synonym med *R. suberectus*.

* 682. *R. affinis* [Whe. & N. E. l. c. p. 18, t. 3] (Skarptakket K.) Arrh. p. 25; H. N. VI, 45; *R. plicatus* ** *adfinis* Lge. Haandb. 1 Udg. p. 305.

Aarsskuddene mere bøiede, femkantede med furede Sider; *Smaablade*ne elliptisk-ægformede, paa de blomsterbærende Grene sammenknæbne, skarpt og ofte dobbelt saugtaktede, med opadrettede Takker; *Blomsterstanden* forlænget, klase- eller topformet; *Bægerblade*ne mindre langt tilspidsede, mod Frugtmodningen udstaaende, forøvrigt som foreg.

Kronbladene hvide, Frugterne sorte. 7—8.

I Kratskove og ved Gjærder, meget sjældnere end foreg.: *Sj.* Hjulebækshuset ved Helsingør (9); *J.* Brøndsted ved Fredericia; *Sl.* Aabenraa!

Anm. Denne Art er nærmest beslægtet med *R. plicatus*, med hvilken jeg tidligere havde forenet den, men de fleste Forfattere erklære den for en selvstændig Art, og i flere Characterer staaer den nærved *R. thyrsoides*, med hvilken den ogsaa i Fl. dan. er forvexlet: den danner saaledes et Overgangsled til den følgende Gruppe. De her fundne Expl. staae midt imellem den hos Whe. afbildede og de svenske Former, som ere betydeligt afvigende.

β, Discolores. *Aarsskuddene* udstrakte eller overhængende (med alm. stærke Torne), *Bladene* alm. graafiltede paa Underfladen, det nedre Par *Smaablade* stilkede; *Blomsterstanden* forlænget (Klase eller Top); *Bægerblade*ne overalt graafiltede (typisk kort tilspidsede).

αα, *Aarsskuddene* glatte, femkantet-furede.

683. *R. thyrsoides* [Wimm. Fl. v. Schles. p. 131] (Duskblomstret K.) Arrh. p. 28; H. N. III, 42; *R. fruticosus* Whe. t. 7; *R. affinis* Lbm. i F. D. 2539.

Aarsskuddene ved Grunden oprette, i Spidsen bukrummede, dybt furede, med 5 budte, fremstaaende Kanter, glatte, med stærke, fjerne, forskjelligtformede Torne; *Bladene* fem-

koblede, med ægformet-elliptiske, ved Grunden sammenknebne, paa Overfladen glatte, paa Underfladen filtede Smaablade; *de blomsterbærende Grene* haarede; *Bladene* trekoblede, med lancetformet-omvendt-ægformede Smaablade; *Blomsterstanden* forlænget, top- eller klaseformet; *Bægerbladene* mod Frugtmodningen nedbøiede; *Kronbladene* omvendt-ægformede.

Kronbladene hvide eller bleggrøde. »Frugterne sorte, glindsende, velsmagende« (Arrh.). 7—8.

Følgende Former adskilles:

α , *candicans* Bl. & Fgh. (R. fruticosus Whe.) Bladene paa Underfladen hvidfiltede, Endebladet æg-hjerteformet.

β , *gracilis* Godr. (α , oblongifolius Metsch i Linnæa 28, p. 125) Bladene paa Underfladen graagrønt filtede, Endebladet ægformet, Klasen sammenkneben, næsten enkelt.

Ved Gjærder og Skovkanter, især i de sydlige Egne af Landet, ikke alm.: *Bornh.* ved Allinge! Gudhjem, Randkleven (8), Nexø (11); *Møen* ved Liselund (Dr.); *Sj.* Store Hareskov mellem Syvstjernen og Kulhusene (14), Gjorsløv Bøgeskov (9), *Sl.* Veersriis ved Rylskov! β , Holbæk (Dr.)! *Sl.* Aabenraa!

Ann. Til denne Art henføres desuden *R. cordifolius* Whe. t. 5 og *R. rhamnifolius* Whe. t. 6, men disse Former ere ikke hidtil fundne i vor Flora.

$\beta\beta$, *Aarsskuddene* haarede (ikke kirtlede), kantede, men ikke furede.

684. **R. vulgaris** [Whe. & N. E. l. c. p. 39 t. 14 (Skov-K.) Sond. fl. hamb. p. 275; Metsch i Linnæa 28 p. 144; R. fruticosus F. D. 1163; H. N. X, 53 (R. Sprengelii) og XIII, 60 (R. umbrosus).

Aarsskuddene budt femkantede, mere eller mindre haarede eller tilsidst næsten glatte; med næsten rette *Torne*, femkoblede, paa begge Flader grønne, paa Overfladen næsten glatte, paa Underfladen blødt duunhaarede *Blade*; Smaabladene bredt ægformede, Endebladet kreds rundt-hjerteformet; *Blomsterstanden* klaseformet, næsten enkelt; *Bægerbladene* mod Frugtmodningen tilbagebøiede.

Kronbladene hvide eller bleggrøde. »Frugterne store, sorte, velsmagende«. 6—7.

α, *umbrosus* Whe. & N. E. (Arrh. p. 31). Metsch l. c. p. 145; *R. discolor* * *umbrosus* Fr., Lge. Haandb. 1 Udg. S. 308). Aarsskuddene med rette Torne, større og bredere, paa Underfladen grønne Smaablade.

β, *carpinifolius* Bl. & Fgh. (Sond. l. c. p. 276; *R. carpinifolius* Whe. t. 13). Tornene noget bøiede, Smaabladene smalt ægformede, tilspidsede, paa Underfladen stundom graa-filtede, Blomsterne større.

Paa skyggefulde Steder, ikke alm.: *J.* ved Brøndsted; *Sl.* Aabenraa, Flensborg!

Anm. 1. Denne Art har jeg tidligere betragtet som en Underart af *R. discolor*, fra hvilken den i Characterer vanskelig kan sondres, skjøndt den i Udseende er meget forskjellig fra samme. Foruden de nævnte Former henføres (af Metsch l. c.) hertil endnu *R. silvaticus* Whe. t. 15 og *R. villicaulis* Whe. t. 17, men disse har jeg ikke med Sikkerhed kunnet erkjende i vor Flora.

Anm. 2. *R. macrophyllus* Whe. t. 12 (og dens Underart *R. Schlechtendalii* Whe. t. 11) forekommer uden Tvivl i vor Flora, og maa eftersøges. Den danner et forbindende Led mellem *R. vulgaris* og Gruppen *Corylifolii*.

685. ***R. discolor*** [Whe. l. c. p. 49 t. 20] (Forskjelligfarvet K.) F. D. 2414; H. N. VIII, 48; *R. vulgaris* * *discolor* Arrh. p. 32; *R. fruticosus* Sm. (L. herb.?, ikke Fl. Suec.)

Aarsskuddene skarpt kantede, tiltrykt-silkehaarede eller svagt haarede, med stærke, rette eller lidet bøiede Torne; *Bladene* femkoblede, læderagtige, med elliptisk-ægformede, tilspidsede, paa Underfladen grøn- eller hvidfiltede, *paa de blomsterbærende Grene* trekoblede Smaablade; *Blomsterstanden* forlænget, med talrige krummede Torne; *Bægerbladene* efter Afblomstringen nedbøiede; *Kronbladene* omvendt-ægformede.

Stængelen alm. rødbrun; Kronbladene blegrode eller hvide, Frugterne mørkviolette, søde, med talrige Smaafrugter. 7.

Forekommer hos os især under følgende 2 Former:

α, *genuinus* (*R. discolor* Whe.) De blomsterbærende *Grene* zigzagbøiede, svagt haarede, Bladene tætsiddende, med kortere Bladstilke, paa Underfladen graa- eller hvidfiltede, med finere Aarer.

β , *pubescens* Bl. & Fgh. (*R. pubescens* Whe. t. 16). De blomsterbærende Grene tæt haarede, næsten rette, Bladene fjernere, med meget lange Bladstilke, paa Underfladen grøn-filtede, med grovere Aarer.

Ved Gjærder og i Udkanten af Skove, bemærket i alle Provindser, men ikke i alle Egne lige hyppig; meest udbredt i det sydøstl. Jyll. Formen β , er hos os hyppigere end α .

686. **R. vestitus** [Whe. l. c. p. 90, t. 33] (Rundbladet K.) *R. discolor* Drej. n. 522 (ex part.); *R. leucostachys* β , *vestitus* Bab. Brit. Rub. p. 15.

Aarsskuddene budtkantede, tæt haarede af udstaaende Haar; *Tornene* stærke, rette; *Bladene* femkoblede, læderagtige, meget faste, paa Underfladen sølvglindsende af en tæt hvid eller gulgrøn Filt, *Smaablade* næsten kredsrunde, pludseligt, men kort tilspidsede, skarptandede og noget bølgede i Randen; *Blomsterstanden* forlænget, udbredt og rigblomstret, med lange og spidse, næsten rette Torne, *Bægerblade* efter Afblomstringen nedhængende; *Kronblade* som hos foreg.

Stærk og anseelig Væxt, Kronblade og Støvtraade mørk rosenrøde, sjeldnere hvide. Frugterne sortviolette, sødagtige, med smaae og talrige Smaافرugter. 7—8.

β , *viridis*! Bladene paa begge Flader grønne, med langstilkede Smaablade, Tornene meget lange, rette; Blomsterstanden faablomstret, bladet indtil Spidsen.

Ved Gjærder. En af de hyppigste Rubus-Arter paa *Halvoens* Østkyst, i det sydl. *Fyen* og især paa *Thorseng*, *Langel.* og *Loll.* *Falster* ved Gaabense! *Sj.* Pedersborg ved Sorø! *Moen*! β , *J.* i Skove ved Dyrehavegaard pr. Kolding! *F.* Veistrupgaard; *Loll.* Vesterborg (19); *Falst.* Lindeskoven ved Nykjøbing (14). (I Angel forekommer hyppigt den hvidblomstrede Form, som i det øvrige Danmark er sjelden. Denne Form er ogsaa bemærket i *Fyen* ved Skaarup (14). ☞)

yy, *Aarsskuddene* beklædte med talrige Haar, Kirtler og Naalebørster.

687. **R. Radula** [Whe. l. c. p. 100 t. 39] (Børstehaaret K.) *F. D.* 2413; *H. N.* VIII, 47; *R. vulgaris* * *Radula* Arrh. p. 34; *R. hirtus* Drej. n. 525 (ex loc., non W. K.).

Aarsskuddene skarpt kantede, med flade, stribede Sider, faae, men stærke og rette Torne; Bladene femkoblede, *Smaablade*

tilspidsede, tæt og dobbelt tandet-saugtakke, paa Underfladen graafiltede, Endebladet æg-hjerteformet, de øvrige ægformet-elliptiske; *Bladstilkene* og *Nerverne* paa Underfladen tæt beklædte med krumme Torne; *de blomsterbærende Grene* kantede, tæt kirtlet-haarede, med lange, rette Torne, som blive hyppigere op imod Spidsen, *Blomsterstanden* rigblomstret, forlænget, undertiden pyramideformet; *Blomsterstilkene* og de efter Afblomstringen nedbøiede *Bægerblade* beklædte med en tæt Filt og talrige Kirtelhaar; *Kronbladene* omvendt-ægformede.

Stærk og kraftig Væxt, let kjendelig fra de foreg. ved den rige Beklædning med Børster og Kirtelhaar, hvis øvre Deel tidligt af-falder, medens den nedre Deel er vedblivende og gjør Stængelen ru at føle paa; Kronbladene hvide, sjeldnere blegrode; Frugterne sorte, glindsende, søde, med talrige Smaafrugter. 7—8.

β, *Köhleri* (R. Köhleri Whe. t. 25). Aarsskuddene svagt kantede; Bladstilkene og Blomstergrenene beklædte med talrige Torne og Kirtler, Blomsterstanden indtil Spidsen bladbærende.

Ved Gjærder og i Randen af Skove meget alm. i Danmark. β, Gjærder ved Aabenraa!

Anm. Til denne Art høre *R. rudis*, *R. Reichenbachii* o. fl. af de hos Whe. l. c. afbildede og beskrevne Arter, hvilke jeg ikke engang som Former formaaer at adskille ved bestemte Kjendetegn.

γ, *Divergentes*. Aarsskuddene svagt kantede eller næsten trinde, haarede, uden Dug eller Kirtler; Bladene 3—5-koblede, eens paa begge Arter Stængler, de nedre Smaablade kortstilkede eller stilkløse; Blomsterstandens Grene udspilede; Bægerbladene langt tilspidsede.

688. **R. Sprengelii** [Whe. l. c. p. 33, t. 10] (Rødblomstret K.); H. 563; F. D. 1697 (Bladene t. 1696); H. N. XV, 49; R. Borreri Bell-Salt. (Bab. Brit. Rub. p. 16).

Aarsskuddene nedliggende og mangegrenede, budtkantede, med talrige, seglkrummede Torne; *Bladene* skarpt saugtakke, paa begge Flader grønne og haarede, *Nerverne* paa Underfladen stærkt fremtrædende, alm. trekoblede, med ægformet, tilspidset *Endeblad* og skjævt-ægformede, tolappede *Sideblade*, sjeldnere femkoblede med de nedre Smaablade elliptiske og Bladstilkene af de 2 nedre Smaablade paa hver Side sammenvoxne; *Bladene* paa *de blomsterbærende Stængler* trekoblede med rudeformet-

elliptiske Smaablade, *Blomsterstanden* halvskjærmformet, med faablomstrede *Grene*, faae og svage Torne; *Bægerbladene* efter Afblomstringen udstaaende; *Kronbladene* omvendt-ægformede.

Let kjendelig fra alle andre Arter ved Torne, Bladform og Blomsterstand. Kronbladene smukt og mørkt rosenrøde. Frugterne sorte, glindsende. 7—8.

I Skove sjelden, især paa Øerne: *Sj.* Hjortenæs Skov ved Sorø! *Falst.* Hanenov Skov (14); *F.* Hverringe (H.); *Sl.* Ostenfeld pr. Husum (Didr.), Aabenraa! Huusby i Angel (28), Holténau! og sandsynligviis flere Steder paa Østkysten. ☞

* 689. **R. Arrhenii** [Lge. Haandb. 1 Udg. S. 309 under *R. Sprengelii*].

Aarsskuddene trinde, med færre, svagere og mindre krumme Torne; *Bladene* paa begge Arter af Stængler femkoblede; Smaabladene tilspidsede, tæt og skarpt saugtaktede, *Endebladet* ægformet, de øvrige elliptiske (det nedre Par meget kortstilkede), Bladstilken og de paa Underfladen stærkt ophøiede, guulagtige *Nerver* haarede, forøvrigt næsten glatte; *Blomsterne* i Top med rigt blomstrede *Grene*; *Kronbladene* smaae, guulhvide, forøvrigt som foreg. (Frugterne ubekjendte).

I Marieskoven ved Flensborg (August 1846), Veersriis ved Rylskov i Angel! Uagtet jeg kun har fundet den paa disse faa Steder, kan jeg dog ved gjentagen Undersøgelse ikke andet end antage den for forskjellig saavel fra *R. Sprengelii* som fra *R. hirtus*, med hvilke den er meest beslægtet, og anbefaler den forøvrigt til nærmere Undersøgelse. Med ingen anden af de her forekommende Arter kan den forvexles; kun *R. scaber* Whe. t. 32 har endeel Lighed med den, men denne Art afviger ved en tæt Beklædning af Kirtler paa Stænglerne, trekoblede Blade paa de blomsterbærende Stængler o. s. v. ☞

♂, *Glandulosi*. *Aarsskuddene* trinde, nedliggende, ofte rodslaaende, tæt beklædte med Kirtelhaar og smaae Torne; *Blomsterstandens* *Grene* udspilede; *Bægerbladene* langt tilspidsede, med talrige Børster og Kirtelhaar; Frugterne glindsende, sorte (ikke duggede).

690. **R. hirtus** [Waldst. & Kit. Pl. rar. Hung. II, p. 150, t. 114] (Stivhaaret K.) H. II, 192; F. D. 2053! (ikke Drej.); Whe. t. 43.

Aarsskuddene stilkede, fornedet trinde, foroven svagt kantede, tæt beklædte med forskjelligtformede Torne, Naalebørster, Haar og Kirtler; *Bladene* 3—5-koblede, paa Overfladen svagt, paa

Underfladen tæt-haarede, graagrønne, med ægformet-elliptiske, langt, men ikke pludseligt tilspidsede *Smaablade*; *de blomsterbærende Grene* beklædte som Aarsskuddene, men med længere og stærkere Torne; *Blomsterstanden* forlænget, alm. bladet indtil Spidsen (*R. foliosus* Whe. t. 28), med udstaaende *Blomsterstilke*; *Bægerbladene* grønne med hvid Rand, efter Afblostringen udstaaende eller tilbagebøiede; *Kronbladene* smaae, omvendt-ægformede.

Kronbladene hvide. »Frugterne sorte, glindsende, med talrige Smaafrugter«. 7.

I Skove, sjelden, og hidtil kun funden i de sydlige Dele af *Halvøen*: Skamlingsbanken! Jels Skove (28), Lyksborg (12), Veersriis ved Rylskov! ³¹

Ann. Til denne Art henhøre endnu *R. Menkei* Whe. t. 22, *R. apiculatus* Whe. t. 24 og *R. Hystrix* Whe. t. 41, hvilke Former dog ikke ere fundne hos os.

691. **R. glandulosus** [Bell. App. fl. ped. 24] (Kirtelhaaret K.) H. 562; Arrh. p. 40; F. D. 1696 (undt. Bld.); H. N. V, 52.

Aarsskuddene overalt trinde, tæt beklædte af Naalebørster, Kirtelhaar og meget svage Torne; *Bladene* trekoblede, paa begge Flader grønne, glindsende af tiltrykte Haar, med ægformet-ovale, pludseligt og langt tilspidsede, fint saugtakke *Smaablade*; *Bladene paa de blomsterbærende Grene* trekoblede, med omvendt-ægformede, grovt saugtakke, budte eller kort tilspidsede *Smaablade* (de øverste under Blomsterne alm. enkelte, æg-hjerteformede), *Blomsterstanden* kort, halvskjærmformet, med udstaaende *Grene* og *Blomsterstilke*; *Bægerbladene* grønne med en hvid Rand, efter Afblostringen tiltrykte; *Kronbladene* smale, spadeformede.

Kronbladene hvide, Frugterne sorte, glindsende, velmagende. Bladene har jeg stedse fundet trekoblede (i det sydlige Europa forekommer den ogsaa med femkoblede Blade). 7—8.

α , *genuinus* Gren. & Godr. fl. Fr. p. 542, (R. Bellardi Whe. t. 44). Bladene mørkgrønne, læderagtige, Stængelen bruun.

β, *umbrosus* Godr., (R. Güntheri Whe. t. 21?). Bladene tynde, tilligemed Stænglerne lysgrønne; den blomsterbærende Stængels Blade med tilspidset-ægformede Smaablade, Blomsterstanden mere forlænget.

I Skove (*α*, paa solaabne Pladser, *β*, i Skygge), kun funden paa Halvøen: J. Mindstrup! Veile! Kolding (28); *Sl.* hyppigere, f. Ex. Jels (12), Flensborg! Lyksborg (12), Veesriis ved Rylskov! Schnellmarker Skov ved Egernførde (16). *

692. **R. serpens** [Gren. & Godr. Fl. Fr. p. 538] (Krybende K.) *R. cæsius* *ε*, *hispidus* Whe. t. 46.

Aarsskuddene ved Grunden trinde, foroven budtkantede, blaaduggede, beklædte med talrige Kirtelhaar og større eller mindre, alm. rette Torne; *Bladene* trekoblede eller femkoblede med Bladstilkene af de 2 nedre Smaablade paa hver Side sammenvoxne, *Smaabladene* rynkede, paa Overfladen grønne, næsten glatte, paa Underfladen graagrønne, duunhaaret-filtede, skarpt og dobbelt saugtakke; *Blomsterstanden* forlænget, 2—3-dobbelt sammensat, med halvskjærmformede Grene og talrigere og stærkere, ofte krumme Torne; *Bægerbladene* paa begge Sider graafiltede, efter Afblomstringen tiltrykte; *Kronbladene* omvendt-ægformede.

Ved Gjærder, sjelden: J. Kolding (28); F. Ollerup!

Anm. De Expl. jeg har seet herfra, have alle en stærkt blaadugget Stængel, hvilket ikke er Tilfældet med den fra Frankrig af Godr. beskrevne Art. Da den danske Form forøvrigt stemmer temmelig overeens med Bekr. (l. c.) og den citerede Fig. hos Whe., har jeg henført den hertil; i Beklædningen staaer den mellem *R. Radula* og *glandulosus*, i Habitus ligner den *R. dumetorum*, Bladene minde om *R. cæsius*, men fra enhver af disse Arter er den saa afvigende at den ikke kan indordnes under nogen af dem. Frugterne ere mig ubekjendte: de beskrives sorte, glindsende (Godr.).

ε. Corylifolii. Aarsskuddene fremliggende eller udstrakte, trinde eller svagt kantede, (uden Kirtler og oftest uden Haar, undertiden duggede); det nedre Par Smaablade stilkløse; Bægerbladene hvidfiltede, alm. kort tilspidsede.

* 693. **R. Wahlbergii** [Arrh. l. c. p. 43] H. N. IX, 49; *R. latifolius* Bab.! *R. corylifolius* *β*, *intermedius* Wahlb.

Aarsskuddene nedbøiede, budtkantede, glatte, med forskjelligtformede, større og mindre, ofte stærke, Torne; *Bladene*

femkoblede, Endebladet hjerteformet, de øvrige Smaablade ægformede, dybt og dobbelt tandet-saugtakkede, paa begge Flader grønne eller paa Underfladen hvidfiltede; *de blomsterbærende Grene* duunhaarede med stærke og talrige, oftest krumme Torne, store trekoblede *Blade* med rudeformet-ægformede, grovttandede Smaablade; *Blomsterstanden* en rigt-blomstret Top, sammensat af korte halvskjærmblomstrede Grene, de nedre Grene fjerne, i Bladhjørnerne; *Bægerbladene* kort tilspidsede, udstaaende fra den modne Frugt; *Kronbladene* rynkede, kreds rundt-ovale, smalere nedentil.

Kronbladene blegt rosenrøde ell. hvide, større end følg. og ofte i større Antal, saa at Blomsten bliver halvfylt (f. Ex. ved Hellebæk! Skaarup (19)! »Griflerne grønne«, Frugterne mørkblaae, sure. 7—8.

Ved Gjærder: *Sj.* Kongens Møller! Helsingør (Dr.); Hellebæk! *Falst.* Gaabense! *F.* Skaarup (19), Svendborg! Staagerup (12); *J.* Nebbegaard! *Sl.* Rylskov! og sandsynligviis ogsaa i de øvrige Provindser.

694. **R. corylifolius** [Sm. Fl. brit. 2, p. 542] (Hasselbladet K.) Drej. n. 524; F. D. 2538; Engl. Bot. 827; H. N. IX, 50.

Aarsskuddene buformigt nedbøiede, budtkantede eller næsten trinde, glatte eller svagt haarede, med ensformede, smaae og rette Torne; *Bladene* femkoblede, læderagtige, Smaabladene i Randen bølgede, paa Overfladen grønne, svagt haarede, paa Underfladen lysgrønne, tæt duunhaarede, Endebladet bredt hjerteformet, de øvrige ægformede; *de blomsterbærende Grene* furede, duunhaarede, med smaae, næsten rette Torne; *Blomsterstanden* halvskjærmformet; *Bæger-* og *Kronblade* som hos foreg.

Stængelen paa aabne Steder mørkrød; Bladene ofte meget store, *β, grandifolia* nob. (H. N. VII, 48), Smaabladene ligne Hasselblade; Kronbladene hvide; Griflerne grønne; Frugterne store, mørkviolette, saftfulde, men af vandet Smag. 7.

α, genuinus! (R. corylifolius Arrh. p. 16). *Aarsskuddene* budtkantede, ikke duggede, Kronbladene bredt omvendt-ægformede.

β , *pruinus* (R. pruinus Arrh. p. 15; H. N. VII, 47). Aarsskuddene trinde, beklædte med en blaagraa Dug; Bladene 5—7-koblede; Kronbladene kreds rundt-ovale, bredere nedentil.

γ , *appendiculatus*! Blomsterstandens Grene forlængede, udspærrede, 1—3-blomstrede; Bægerbladene i Spidsen bladagtigt forlængede.

I Skove og Krat, ved Gjerder, en af de almindeligste Arter i Danmark, især paa Halvøens Østkyst. β , paa solaabne Steder ikke sjelden. γ , *Sj.* Brede (27); *J.* Støvringgaard Skov ved Randers! Lindholmsklipperne paa *Bornh.* (20)!

* 695. **R. dumetorum** [Whe. & N. E. l. c. p. 111, tab. 45 A] (Lund-K.) Metsch l. c. 111 (tildeels); R. nemorosus Hayne Arn. 3, t. 10?, H. 561; Arrh. p. 45 (ikke Sond.); H. N. VI, 47.

Aarsskuddene nedliggende, trinde eller svagtkantede, alm. blaaduggede, med svage, ensformede, rette Torne; Bladene mindre læderagtige end hos foreg., 3—5-koblede, Endebladet ægformet, ved Grunden sammenknebet; Blomsterstanden faa-blomstret, halvskjærmformet; Bægerbladene tiltrykte til den modne Frugt; Kronbladene omvendt-ægformede, forøvrigt som foreg.

Adskilles fra foreg. ved de langstrakte, aldeles nedliggende Stængler, de tyndere Blade med mindre og anderledes formede Smaablade. Kronbladene hvide eller bleggrøde; »Grifferne bleggrøde«; Frugterne sorte, sylrlige med store, men faae Smaafrugter. 7—8.

α , *glabratus* Arrh. De blomsterbærende Grene og Bladenes Underflade svagt haarede.

β , *tomentosus* Arrh. (R. dumetorum β , tomentosus Whe. t. 45 A). De blomsterbærende Grene duunhaarede, Bladene rynkede, paa Underfladen hvidfildete.

I Skove og Krat, paa *Halvøen* alm., især i Aarhus-Egnen! sjeldnere paa *Øerne*. α , synes at være den typiske og hyppigst forekommende Form. β , i Skove ved Haraldslund i Jyll.!

Anm. Gruppen *Corylifolii* er sikkert den vanskeligste af hele Slægten at bestemme, og det er i mange Tilfælde ikke let muligt at afgjøre, til hvilken af disse tre Arter en given Form hører. Da imidlertid enhver af dem har i sine typiske Former et eiendommeligt Habitus, har jeg her vedligeholdt Adskillelsen, uden dog at ville lægge særlig Vægt paa denne Sondring. Tvertimod er jeg snarere tilbøielig til, med Sonder (Fl. hamb. p. 284), Areschoug (Bot. Not. 1855 p. 31)

o. Fl. at ansee *R. Wahlbergii* for en større og mere udviklet Form af *R. corylifolius*, men med ligesaa god Ret troer jeg da at man bør føre *R. dumetorum* ind under samme Art, da man ogsaa af denne kan paa vise talrige Overgangsformer til *R. corylifolius*. *R. Wahlbergii* danner, paa Grund af de stærkere Torne, den kantede Stængel, forlængede Blomsterstand og udstaaende Bægerblade, et Mellemlid til *R. vulgaris*, derimod nærmer *R. dumetorum* ved de vidtkrybende Aarskud, den halvskjærmformede Blomsterstand og tiltrykte Bægerblade sig til *R. cæsius*. *R. pruinosis* Arrh. er neppe nogen selvstændig Art; de for den angivne Kjendetegn har jeg ikke fundet constante, og navnlig er Stængelens Overtræk med blaa Dug en Egenskab, som for en stor Deel afhænger af Voxestedet og kan forekomme hos alle de 3 Former af Gruppen *Corylifolii*.

ζ. *Cæsii*. Stænglerne trinde, nedliggende, tilligemed Frugterne blaaduggede; Bægerbladene langt tilspidsede.

696. *R. cæsius* L. (Korbær-K.) H. 560; Drej. n. 523; Arrh. p. 50; Whe. t. 46; F. D. 1213.

Stænglerne glatte, blaaduggede, tæt beklædte med korte og svage, let affaldende Torne; Bladene trekoblede, paa Underfladen graafiletete, Smaaablade skjævt ægformede, grovt og dobbelt tandede, Endebladet alm. trelappet, Sidebladene to-lappede; Blomsterstanden kort og faablomstret; Bægerbladene tiltrykte til den modne Frugt; Kronbladene ovale, i Spidsen indtrykte.

Kronbladene hvide, Frugterne blaaduggede, af syrlig-vandagtig Smag. 6—7.

α, *umbrosus* Wallr. Stængelen svagt beklædt, Bladene paa Underfladen grønne.

β, *agrestis* Whe. t. 46 A. Stængelen tæt duunhaaret; Bladene læderagtige, paa Underfladen graafiletete.

γ, *aquaticus* Whe. t. 46 A. Bladene paa Overfladen glatte, paa Underfladen svagt haarede og grønne, Bægerbladene langt tilspidsede, Kronbladene omvendt-ægformede med lang Negl.

δ, *pseudo-idæus* Whe. t. 46 B. (*R. Idæus* β, *canescens* Metsch l. c. p. 105). Bladene finneede; Blomsterne sædvanligt afrugtbare.

Alm. udbredt i Danmark: α, i Skove; β, paa Marker og ved Gjerder; γ, paa fugtige Steder: Støvringgaard i *Jyll.* δ, ved Gjerder og i Krat: *Sj.* Vedbæk! *Falst.* Nykjøbing! Huulsø (Koch); *Loll.*

Stokkemarke, Steensgaard, Engestofte; **F.** i det sydøstlige alm. (19); **J.** Krybily (28) og Dyrehavegaard ved Kolding! **St.** Aabenraa!

10. *Fragaria*. Jordbær.

697. **F. vesca** L. (Almindelig **J.**) H. 566; Drej. n. 526; F. D. 2235.

Rodstokken udskyder *Ranker*; *Bladene* trekoblede, med rudeformet-elliptiske, dybt saugtakkele Smaablade; *Blomsterstilkene* tiltrykt-haarede; *Bægeret* ved Frugtens Modenhed udstaaende eller tilbagebøiet.

Skaftet 6—8" høit, omtr. af Længde med Bladene, Kronbladene hvide, Frugterne høirøde (sjeldnere hvide), syrligt-krydrede. 5—6 (fr. 6—7). 4.

Alm. ved Gjærder, paa Bakker og i aabne Skove. Dyrkes i flere Afarter.

698. **F. collina** [Ehrh. Beitr. 7, p. 26] (Bakke-J.) H. 569; Drej. n. 527; F. D. 1389; H. N. VI, 49.

Bægeret ved Modenheden tiltrykt til den mørk-rosenrøde, søde *Frugt*, forøvrigt som foreg. 5—6. (fr. 6—7). 4.

Paa Bakker og i høitliggende Skove, bemærket i alle danske Provindser, men sporadisk og ikke alm., hyppigst paa *Bornh.*

† 699. **F. elatior** [Ehrh. l. c. p. 23] (Spansk **J.**) H. 567; Drej. p. 183; H. N. VI, 48.

*Blomsterstilkene*s Haar udstaaende; *Bægeret* ved Modenheden tilbagebøiet eller udstaaende, forøvrigt som foreg., med *Skaftet* længere end Bladene ($1\frac{1}{2}$ —1' høit), *Blomsterne* større. (Ofte feilslaaer det ene Kjøn, saa at den bliver tvebo. 5—6. (fr. 6—7). 4.

Dyrkes alm. i Haver, og er derfra forvildet ved Gjærder og i Skove: *Sj.* Fredensborg, Frederiksborg (15), Ruderhegn! Gjels Bakke (14), Kanningaarden (9), Jægersborg Allee! Søndermarken! Philosophgangen ved Sorø! *Moen* ved Liselund! alm. i det østl. *Falst.* (14); *F.* Hvidkilde! *J.* Jungetgaard i Salling (16), Haraldslund! *St.* Haderslev, Nyværk ved Slesvig (16), Husum (F. Müll.).

Anm. Foruden de foreg. dyrkes i Haver: *F. virginiana* (engelsk **J.**), *F. grandiflora* (Ananas-J.) o. fl. Arter.

11. *Potentilla*. *Potentil*.

a. *Bladene fingrede*.

aa. Fragariastrum. Smaafrugterne ved Grunden haarede, Kronbladene hvide.

700. **P. Fragariastrum** [Ehrh. Herb. 146] (Jordbæragtig P.) *P. Fragaria* Sm., H. 577; Drej. n. 530; H. N. XIV, 54; *Fragaria sterilis* L., F. D. 1579.

Rodstokken krybende, med rankeformede blomsterløse og oprette eller opstigende blomsterbærende Grene; *Bladene* tre-koblede, med omvendt-ægformede, fra Midten til Spidsen rund- eller saugtakkelede Smaablade; *Blomsterne* parvise eller enlige i Spidsen af Grenene; *Frugtbunden* haaret; *Kronbladene* omvendt-hjerteformede, lidet længere end Bægeret.

Hele Planten silkehaaret, Haarene paa Bladene tiltrykte, paa Bladstilke og Stængelen udstaaende. 5. 4.

I Randen af Skove, paa Græsmarker, sporadisk og ikke alm.: *Sj.* Høirup paa Stevns (Balslev), Ny Tappernøje (9), Krat ved Nysø (Stampe); *Bornh.* Buskegaard ved Rønne (Hjorth), Skrænter ved Melsted Aa, Almindingen (Baagøe); *Moen* ved Marienborg (9); *Falst.* Stubbekjøbing (25) o. fl. Steder i det østlige (14); *Loll.* Nakskov (9); *F.* Vindinge (E. C. Lange); *Als* ved Mintberg (20); *Sl.* Haderslev (Grønlund), Sundeved (16), Aabenraa (Hempel), Grumtoft i Angel (12), Ballastbakken o. fl. St. ved Flensborg (12, 16), Grodersby, Kappel, Arnæs (Lund); *J.* Kolding (28), Thyrsbæk (10), Haraldslund (Meyer), Ebeltoft (Kyll.).

bb. Smaafrugterne glatte, Kronbladene gule.

α, Terminales. Blomsterne flere samlede i Spidsen af en qvast- eller halvskjærmformet Blomsterstand fra Spidsen af Stængelen eller Grenene.

αα, Blomsterstænglerne sidestillede (udgaae fra Grunden af en midtstillet, ikke blomsterbærende Bladrossette).

701. **P. opaca** L. (Matbladet P.) H. 573; Drej. n. 535; H. N. I, 51; *P. verna* F. D. 1648.

De blomsterbærende Stængler nedliggende, tilsidst opstigende; hele Planten tæt- og langhaaret af udstaaende Haar; *Rodbladene* 5—7-koblede, med langstrakt-kileformede, næsten fra Grunden

til Spidsen fliget-saugtakkede *Smaablade*; *Yderbægerets* Blade linieformet-ovale, kortere end de ægformede *Bægerblade*.

Stænglerne alm. rødlige. Kronbladene mindre end hos de 2 følg.
5. 4.

Paa Græsmarker, Diger, i Randen af Skove: *Sj.* i Egnen af Kjøbenhavn (f. Ex. Charlottenlund) og ved Roeskilde alm.! mellem Frederiksund og Havelse alm. (19), Slangerup, Næstved (H.), Lellinge ved Kjøge (16). Fra de øvrige Provindser har jeg ikke seet Expl. ³

702. **P. verna** L. (Vaar-P.) H. 573 (undt. Voxest.); Drej. n. 534; F. D. 2510; H. N. IV, 66.

De blomsterbærende Stængler opstigende eller nedliggende; *Bladene* 5—7-koblede; *Smaablade* omvendt-ægformede eller kileformede, fra Midten til Spidsen dybt saugtakkede, med bundte Takker, overalt beklædte med lange, rette Haar; *Yderbægerets* Blade ovale, omtrent af Længde med de ægformede *Bægerblade*.

Haarbeklædningen svagere end hos foreg., stærkere end hos følg., fra hvilken den desuden let adskilles ved Mangel af Stjernehaar.
 $\frac{5}{2} - \frac{6}{1}$. 4.

Paa tørre Bakker, sjelden: *J.* Skovbakken ved Aalborg (Branth); *F.* Hindsholm ved Hals Gab (18); *Møens* Klint ved Dronningstolen o. fl. Steder! *Sj.* Refsnæs (15); *Bornh.* Arnager, paa Østkysten alm. (20).

703. **P. incana** [Moench Meth. p. 249] (Graafiltet P.) H. N. III, 46; P. cinerea Koch Syn. p. 242, Lge. Haandb. 1 Udg., p. 355 (ikke Chaix), F. D. 2592.

Bladene 3—5-koblede, paa Underfladen tæt graafiltede af korte, stjerneformede Haar og tillige beklædte med længere, udstaaende Haar; *Smaablade* fra ovenfor Midten til Spidsen (eller kun i Spidsen) saugtakkede; *Yderbægerets* Blade linieformet ovale, kortere end de ægformede *Bægerblade*; forøvrigt som foreg., men blomstrer noget tidligere (5).

Frugterne var., saavel hos denne, som flere af de øvrige Arter, endog paa samme Plante, jævne eller rynkede. Kjendetegnene som hentes fra Smaafrugternes Beskaffenhed, ere derfor usikre.

Paa tørre Bakker, sjelden: *Sj.* Veirhøi! *Bornh.* Lindholms-Klipperne i Rø Sogn (20). ³

Ann. Ifølge Fries (Bot. not. 1858 p. 33) og Billot (i Herb. Fl. Gall. et Germ.) er vor Art forskjellig fra den sydeuropæiske *P. cinerea* Chaix.

ββ, *Blomsterstænglerne udgaae fra Midten af en Bladrosette.*

704. **P. collina** [Wib. Fl. Werth. p. 267] (Bakke-P.) Koch Syn. II, 238; Fr. S. Veg. Sc. p. 171; F. D. 2591; *P. sordida* Fr. mant. 3, p. 43; H. N. VII, 49—50; *P. Güntheri* Pohl.

De blomsterbærende Stængler nedliggende eller opstigende, stærkt grenede, med eller uden sidestillede Bladrosetter ved Grunden; *Bladene* femkoblede, paa Underfladen tiltrykt-duunhaarede eller graafiltede; *Smaabladene* kileformede, omtrent fra Midten til Spidsen dybt saugtakkede, i Randen ikke tilbagerullede; *Blomsterstanden* qvastformet; *Yderbægerets* Blade linie-lancetformede, kortere end Bægerbladene.

Paa Bakker og tørre Græsmarker: *Bornh.* ved Hammershuus (20)! Teign S. for Allinge, Arnager (Hjorth). [†]

Ann. Denne Art nærmer sig til foregaaende Afdeling, naar den, hvilket oftest er Tilfældet, er forsynet med blomsterløse Bladrosetter; men disse ere ikke, som hos αα, en Fortsættelse af Hovedaxen, men Begyndelse til nye Sideaxer.

705. **P. argentea** L. (Sølv-P.) H. 571; Drej. n. 536; F. D. 865; H. N. IV, 64.

De blomsterbærende Stængler oprette eller opstigende; *Bladene* femkoblede, paa Underfladen (tilligemed Stængelen) hvidfiltede; *Smaabladene* kileformede, fra nedenfor Midten til Spidsen fjerfligede, i Randen tilbagerullede, *Blomsterstanden* qvastformet; *Yderbægerets* Blade budt lancetformede, kortere end Bægerbladene.

Bladene alm. paa Overfladen mørkgrønne, tiltrykt-haarede, var. paa begge Flader graafiltede (*P. arg. γ, impolita* Lehm.; *P. impolita* Wahlenbg.). 6—8. 4.

Paa tørre, sandige eller kalkholdige Marker og Bakker, ved Grøftevolde o. s. v. alm. Afarten sjældnere, f. Ex. *Sj.* Sundbyøster paa Amager (27); *Bornh.* Hammershuus (19), Ypernestad (Baagøe), Lindholmsklipperne (Hoff), *Langel.* Steengade (19); *J.* Haraldslund!

† 706. **P. recta** L. (Rank P.) H. 2, 194; F. D. 1820; H. N. XI, 46.

Rodstokken vedvarende, *Stængelen* 1—2' høi, opret, langhaaret, *Bladene* 5—7-koblede, med omvendt-ægformede, næsten fra Grunden til Spidsen saugtakket-fligede Smaablade; *Blomsterne* i en endestillet Qvast; *Bægerbladene* ægformede, tilspidsede, af Længde med eller lidet kortere end de linie-lancetformede *Yderbægerblade*, *Kronbladene* store, bleggule.

Ved Gjærder, sandsynligviis forvildet: *Sj.* Overdrev Ø. for Charlottenlund (14)! Grøftevolde mellem Sorø og Krebshuset (Trojel); *Bornh.* Frydenlund og Vibegaard pr. Rønne (Hjorth, Hamann), Christiansø (Baagøe); *Sl.* Süderholz ved Husum (*P. pilosa* Willd.) F. Müll., *F. V.* Skjerninge (Kordt, forvildet fra Præstegaardens Have, hvor den i lang Tid dyrkedes)!

γγ, *Eenaarige Væxter uden Bladrossetter ved Grunden af Stængelen.*

707. *P. norvegica* L. (Norsk P.) H. 574; Drej. n. 533; F. D. 171; H. N. III, 45.

Stængelen opret; *Bladene* trekoblede (eller *Rodbladene* 2—3-parret-finnede); *Smaablade* lancetformede eller omvendt-ægformede, næsten til Grunden dybt saugtakkede, langhaarede; med tiltrykte Haar; *Blomsterne* i en stærkt forgrenet Qvast; *Yderbægerets* Blade lancetformede, omtrent af Længde med de æg-lancetformede *Bægerblade*; *Kronbladene* omvendt-ægformede, kortere end *Bægeret*.

Planten af grøn Farve, *Stængelen* langhaaret, med udstaaende Haar, noget ru. 6—7. ☉ eller ☉.

Ved sandige og grusede Søbredder, i fugtige Skove, sjelden og sporadisk: *Sj.* Frederiksborg Slotsgaard (12)! i de udtørrede Søer mellem Hørsholm og Rudersdal (H.), Storedam ved Donse (23)! Jonstrup Vang (20), en sumpig Eng ved Bernstorf (Schum.); *Bornh.* ved Veien mellem Ø. Larsker og Almindingen (20) og mellem Ø. Larsker og Clemensker (14). [*

Anm. Rodbladene ere stundom, men sjeldent, femkoblede eller finnedede, men dette Forhold er, ifølge Lehm. (Rev. Pot. p. 200) ikke normalt, men grunder sig paa Dyrkning eller Forekomst i frodig Jordbund.

β, *Axillifloræ*. Blomsterne enligé i Bladhjørnerne.

αα, *Blomsterne typisk firedeelte.*

708. *P. Tormentilla* [Scop. Fl. carn. 1 p. 360] (Opret P., Tormentil). Drej. n. 531; *Tormentilla erecta* L., H. 578; F. D. 589.

Stænglerne grenede, oprette, opstigende eller udstrakte (ikke rodslaaende); *Stængelbladene* siddende eller kortstilkede, trekoblede, *Rodbladene* langstilkede, 3—5-koblede, *Smaabladene* kileformede, fra Midten til Spidsen saugtakkede; *Axelbladene* 3—5 fligede; *Blomsterne* langstilkede; *Bægerbladene* efter Afblostringen udstaaende, kortere end Yderbægerets Blade; *Frugterne* svagt rynkede.

Rodstokken tyk, indvendig rød. Stængel og især Blomsterstilke meget fine, Rodbladene henvisnede ved Blomstringstiden. Var. meget i Henseende til Stængelens Retning, Bladene, Behaaringen (tiltryktilkehaaret ell. næsten glat) o. s. v., men er dog stedse vel adskilt fra den følgende Art. Tilfældigviis forekommer undertiden en femdeelt Blomst mellem de øvrige. ♀.

Paa Enge, Lyngheder, i Skove o. s. v. alm. udbredt.

709. **P. procumbens** [Sibth. Fl. oxon. 162] (Fremliggende P.) *Tormentilla reptans* L., H. 579; F. D. 1217 og 1819 (Potent. nemoralis Nestl.); H. N. II, 51.

Stænglerne grenede, udstrakte, ved Ledene ofte rodslaaende; *Stængelbladene* stilkede, 3—5-koblede; *Rodbladene* femkoblede, langstilkede; *Smaabladene* omvendt-ægformede, fra Spidsen til nedenfor Midten dybt-saugtakkede; *Axelbladene* hele eller faatandede; *Bægerbladene* efter Afblostringen indbøiede, kortere end eller af Længde med Yderbægerets Blade; *Frugterne* rynkede.

Var. med femdeelte Blomster. Rodstokken tyndere, Bladene alm. mere silkehaarede end hos foreg. 7—8. ♀.

⚭ *P. procumbenti-reptans* [Lehm. Rev. Pot. p. 206] (P. mixta Nolte i Rechb. f. g. exs. n. 1743). *Stænglerne* meget grenede, rankeformigt udstrakte, ikke rodslaaende, *Stængelbladene* alm. femkoblede; *Blomsterne* fire- og femdeelte; *Frugterne* især foroven vortet-rynkede.

Ved Gjærder, paa Græsmarker og høie Enge, paa Østkysten af Halvøens sydlige Deel ikke sjelden: J. Nebbegaard! Fredericia (16), Kongsted! Mørkholt (12), Seest! og især i *Slesv.*; mod V. sparsommere: Rødding, Rosendal og Ostenfeld ved Husum (16), Føhr (20). Paa Øerne sjelden: F. Skaarup, Keirup (19), mellem Hvidkilde og Rødskebølle (12); *Loll.* ved Sundby (Koch); *Falst.* mellem Bregninge

og Donnemose (14), paa Skrænter ved Næsgaard! *Sj.* Galgebakken ved Sorø (12), mellem Agershvile og Nærum (Blytt. i Drej. herb.), Fileværket! *Bornh.* Knudsker (Hjorth). \asymp *Sl.* ved Wittensee (16). *

Ann. *P. mixta* Nolte er i Udseende meget forskjellig fra *P. procumbens* og næsten mere lig *P. reptans*, men ved Udsæd i den botaniske Have af Frø taget fra det Noltiske Voxested: Einfelder Søen i Holsteen, ere Planter fremkomne aldeles overensstemmende med *P. procumbens*. Der synes ikke at være nogen Tvivl om at det er en Bastardform af denne og følg., saaledes som Nolte og Lehm. antage, saameget mere som den kun yderst sjældent bærer modent Frø.

ββ, Blomsterne femdeelte.

710. *P. reptans* L. (Krybende P., Femfingerurt). H. 574; Drej. n. 532; F. D. 1164.

Stængelen rankeformet, rodslaaende, oftest ugrenet; alle *Bladene* langstilkede, 5- (sjældnere 3- eller 7-)koblede; *Smaa-bladene* omvendt-ægformede, næsten til Grunden saugtakke; *Blomsterne* langstilkede; *Yderbægerets* Blade lancetformede, længere end de ægformede, spidse *Bægerblade*; *Frugterne* fint punkterede.

Bladene paa Underfladen silkehaarede, paa Overfladen alm. næsten glatte. Kronbladene store. 6—8. 4.

Paa Agre, ved Veie og Gjærder o. s. v., alm. udbredt.

b. Anserina. Alle Bladene fjersnitdeelte.

711. *P. anserina* L. (Gaase-P.) H. 569; Drej. n. 529; F. D. 544.

Stænglerne rankeformede, krybende; *Bladene* mellembrudt- og mangeparret-fjersnitdeelte; *Afsnittene* elliptiske, fra Grunden til Spidsen dybt saugtakke eller næsten halvfinnede, paa Underfladen tæt silkehaarede, sølvglindsende; *Axelbladene* fligede; *Blomsterne* enlige fra Bladhjørnerne; *Yderbægerets* Blade lancetformede, ofte fligede, af Længde med eller kortere end de ægformede *Bægerblade*.

Bladenes Overflade var. graaagtigt silkehaaret eller sjældnere næsten grøn. Rodens Grene har jeg alm. fundet i Spidsen opsvulmede. 5—7. 4.

β, tenella Lge. Alle Plantens Dele finere og spædere, Bladstilkene næsten ligelang med Pladen; Bladenes Afsnit 4—7

Par, dybt og skarpt saugtakket-fjerfligede, ved Grunden sammenknebne, paa Overfladen glatte og frisk grønne, paa Underfladen svagt tiltrykt-duunhaarede, Blomsterne meget smaae.

Alm. paa Græsmarker, ved Veie og Strandbredder. β , Nieblum paa *Føhr* (20)! Denne Varietet, som ikke findes omtalt i *Lehmans Revisio Potent.*, er meget afvigende fra Hovedarten og endnu mere udmærket end den grønlandske Form (*P. Egedii* Wormskj.) som i flere Henseender synes at staae midt imellem den typiske og den her beskrevne Form.

12. Comarum. Kragefod.

712. *C. palustre* L. (Kjær-K.) H. 582; Drej. n. 528; F. D. 636; *Potentilla palustris* Scop., *Lehm. Rev. Pot.* p. 73.

Bladene uligefinnede med alm. 5 lancetformede, dybt saugtaktede *Smaablade*; *Axelbladene* tilvoxne til Bladstilken, ved Grunden kræmmerhuusformigt omgivende Stængelen; *Kronbladene* omvendt-ægformede, tilspidsede, 3 Gange kortere end Bægerbladene.

Bladene paa Underfladen blaagrønne, glatte eller i yngre Tilstand duunhaarede. Krone og Bæger brunrøde. (Bægerbladene ofte fligede). 6—7. 4.

I Tørvmoser og dybe Kjær alm. udbredt.

13. Geum. Nellikerod.

713. *G. urbanum* L. (Feber-N.) H. 579; Drej. n. 537; F. D. 672.

Rodbladene lyreformet-fjersnitdeelte, med nedadtil aftagende Afsnit; *Stængelbladene* trefligede eller -snitdeelte, med spidse, grovt-tandede Flige; *Axelbladene* haandfligede; *Blomsterne* oprette; *Bægerbladene* under Blomstringen tilbagebøiede; *Kronbladene* rundagtige eller omvendt-ægformede, uden tydelig Negl, kortere end Bægerbladene; *Frugtbunden* siddende; *Frøhalen* toleddet: det øvre Led ved Grunden duunhaaret, omtr. 4 Gange kortere end det nedre.

1—2' høi. Bægerbladene grønne, Kronbladene gule. 6—8. 4.

Ved Gjærder, i Skove og Krat meget alm.

714. *G. intermedium* [Ehrh. Beitr. 6, 143] (Høi N.) H. II, 195; Drej. n. 538; F. D. 1874; H. N. VI, 90.

Blomsterne nikkende; *Bægerbladene* under Blomstringen udstaaende; *Kronbladene* omvendt-ægformede, med kort Negl, omtrent af Længde med Bægerbladene; *Frøhalens* øvre Led ved Grunden langhaaret, forøvrigt som foreg., men Blomsterne større, Kronbladene rødgule, sjældnere lysgule.

$1\frac{1}{2}$ —2' høi (høiere end følgende og kraftigere end foregaaende Art). 5—6. 4.

I fugtige Skove og Krat, sporadisk: i *Sj.* ikke sjelden; *Falst.* Riserup (Koch); *Loll.* Høibygaards Skov (5); *F.* Hunderup Skov ved Odense! Søbo (24), St. Jørgensgaard (12), Skaarup (19)! *J.* Lundbykrat, Ødstedgaard (12), Steenvad Mølle ved Kolding (30); *Sl.* mellem Dyttebøl og Pommerby ved Gelting (Lund), Nyværk ved Slesvig (16); Lundsmark paa Als (20).

Anm. Denne Art danner et tydeligt Mellemlid mellem foreg. og følg., men synes dog ikke, som flere Forff. antage, at være en ved Krydsning frembragt Bastardform, da foreg. neppe er udsprungen naar følg. har afblomstret. Skjøndt den vel oftest forekommer i faae Expl., har jeg dog ogsaa fundet den i Mængde, f. Ex. i Krattet ved Aaen nedenfor Sorgenfri.

715. *G. rivale* L. (Eng-N.) H. 580; Drej. n. 539; F. D. 722.

Rodbladene lyreformet- og mellemlid-fjersnitdeelte; *Stængelbladene* treffligede med grovt tandet-lappede, næsten budte Flige; *Axelbladene* tandet-fligede; *Blomsterne* nikkende; *Bægerbladene* opret-tiltrykte; *Kronbladene* omvendt-hjerteformede med lang Negl, af Længde med Bægerbladene; *Frugterne* befæstede til en efter Afblomstringen forlænget *Frugtholder*; *Frøhalen* toleddet, det øvre Led langhaaret, over halvt saa langt som det nedre.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi. 5—6. 4. Bægerbladene rødbrune, Kronbladene kjødfarvede, var. gule ell. hvidagtige. Desuden forekommer hyppigt en Misdannelse med store, dybt-fligede Bægerblade og topskydende Blomster (*G. riv. hybridum* H. 581).

Paa Enge og i fugtige Kratskove alm. udbredt.

13^{de} Klasse. Polyandria (Mangehannede).

1. Orden. Monogynia (Enhunnede).

A. Kronen firebladet. 2 eller ☉.

a. Bægeret tobladet. (1—3. N. F. Papaveraceæ).

1. **Papáver** L. Kapselen ufuldstændigt mangerummet, opspringende ved Huller under det siddende, mangestraalede, vedblivende Ar. (Enaarige Væxter med hvid Mælkesaft).

2. **Glaucium** Tournef. Kapselen skulpeformet, ved en svampagtig Frøstol deelt i 2 Rum paalangs, opspringende ved Klapper fra oven; Arret tolappet, trekantet-piilformet. (Toaarig Urt med gul Mælkesaft).

3. **Chelidonium** L. Kapselen skulpeformet, enrummet, opspringende fra neden med 2 Klapper paalangs; 1 Griffel, tolappet Ar. (Vedvarende Urt med gul Mælkesaft).

b. Bægeret firebladet.

4. **Actæa** L. Frugten et enrummet Bær med Frøene i 2 Rader paa en vægstillet Frøstol. (Vedvarende Urt. N. F. Ranunculaceæ, d).

B. Kronen fembladet. 2.

5. **Tilia** L. Bægerbladene 5, ligestore, i Knopleiet sideliggende; Frugtknuden femrummet, ved Modenheden enrummet, enfrøet, uoppringende. (Træer med spredte Blade, Blomster skjærmformet Qvast og den fælles Blomsterstilk i sin halve Længde sammenvoxet med et aflagt Dæklad. N. F. Tiliaceæ).

6. **Helianthemum** Tournef. Bægerbladene 5, uligestore (de 3 indre større), i Knopleiet foldede; Frugten en treklappet Kapsel. (Halvbusk med modsatte Blade. N. F. Cistineæ).

C. **Kronen mangebladet.** (Vandplanter med heelrandede Blade og enblomstrede Blomsterstilke. 7—8. N. F.

Nymphæaceæ).

7. **Nymphæa** L. Bægeret firebladet; Kronbladene uden Honninggjemmer; Frugtknuden mangerummet, mangefrøet; Arret siddende, mangestraalet; Frøene omgivne af en nætformet Frøhud.

8. **Nuphar** Sm. Bægeret fembladet, Kronbladene med Honninggruber paa Ryggen; Frøene uden Frøhud, forøvrigt som foreg.

Delphinium (13, 2).

2. Orden. *Di-Pentagynia (To-Femhunnede)*.

A. Bægeret farvet, Frugterne Bællekapsler. (9—11. N. F. *Ranunculaceæ*, c).

9. **Delphinium** L. Bægeret fembladet, uregelret, det øvre Bægerblad med Spore; Kronen 1—4-bladet, de 1—2 øvre Kronblade med Spore; Bællekapslerne 1—3.

Anm. De i vor Flora forekommende Arter af denne Slægt have kun 1 Kronblad (med Spore) og alm. 1 Frugtknude.

10. **Aconitum** L. Bægeret fembladet, uregelret, det øvre Bægerblad (Hjelmen) hætteformet, Kronbladene 2, S-formede, med lang Negl; Bællekapslerne alm. 3.

11. **Aquilegia** L. Bægeret fembladet, regelret; Kronbladene 5, kræmmerhuusformede, med sneglehuusformet, indad-rullet Spore; Bællekapslerne 5.

Helleborus (13, 3).

B. Bægeret grønt, Frugten en Kapsel.

Hypericum. Støvdragere i 3 Bundter (18, 1).

Reseda (11, 3).

3. Orden. *Polygynia* (*Mangekunnede*).

A. Frugterne enfrøede, nødagtige.

- a. Bægeret farvet, Krone 0. (12—14. N. F. *Ranunculaceæ*, a).

12. *Anemone* L. (part.) Frugtbunden kugleformet eller halvkugleformet; Bægerbladene 5—10; Nødderne uden Striber eller Ribber, med kort, uforandret vedblivende Griffel. (Blomsterne enlige, sjeldnere 2—3 samlede, omgivne af et trebladet Svøb).

13. *Pulsatilla* Mill. Nødderne med en haaret Frøbale (den udvoxende Griffel) i Spidsen, forøvrigt som foreg.

14. *Thalictrum* L. Frugtbunden liden, skiveformet; Bægerbladene 4—5, affaldende, Krone 0; Nødderne stribede eller ribbede paalangs, med kort, uforandret vedblivende Griffel. (Blomsterstanden mangeblomstret, uden Svøb).

- b. Blomsterdækket dobbelt. (15—18. N. F. *Ranunculaceæ*, b).

aa. Bægeret uden Spore.

15. *Batrachium* Wimm. (Fr. Mant. 3). Bægeret fembladet; Kronbladene 5, med en nøgen Honninggrube ved Grunden; Nødderne paatværs rynkede, opstigende, med skjæv Griffel. (Kronbladene hvide med gul Negl, gule hos Nr. 741).

16. *Ranunculus* L. (part.) Bægeret fembladet; Kronbladene 5, med en af et Skjæl bedækket Honninggrube ved Grunden; Nødderne oprette, med endestillet Griffel, uden Tværstriber (jævne eller vortede); (Kronbladene gule).

17. *Ficaria* Dill. Bægeret trebladet; Kronbladene (oftest) 8—10; Nødderne stumpe, med siddende Ar, forøvrigt som foreg.

bb. Bægerbladene med en Spore ved Grunden.

18. *Myosurus* L. Frugtbunden kegleformigt forlænget, Kronbladene med en traadformet Negl og en rørformet Honninggrube ved Grunden af Pladen.

B. Frugterne fleerfrøede, opspringende (Bællekapsler).
(19—21. N. F. Ranunculaceæ, c).

a. Blomsterdækket enkelt.

19. **Caltha** L. Bægerbladene 5, farvede; Kronbladene 0.

b. Blomsterdækket dobbelt.

20. **Tröllius** L. Bægerbladene i ubestemt Antal, farvede, hvælvede, affaldende; Kronbladene smaae, fladtrykt-tungeformede; Bællekapslerne stilkløse, talrige, i flere Kredse.

21. **Erānthīs** Salisb. Bægeret affaldende, farvet, 5—8-bladet; Kronbladene smaae, tolæbet-kræmmerhuusformede; Bællekapslerne 5—6, stilkede, i 1 Kreds. (Blomsten tæt omgivet af et bladagtigt, dybt fliget Svøb).

† 22. **Helléborus** L. Bægeret vedblivende grønt (eller farvet), alm. fembladet; Kronbladene som hos foreg.; Bællekapslerne stilkløse, 3—10 i en enkelt Kreds og ved Grunden lidet sammenvoxne.

I. Monogynia.

1. Papaver. Valmue.

a. Kapselen stivhaaret.

716. **P. Argemone** L. (Kølle-V.) H. 590; Drej. n. 541; F. D. 867; Rehb. ic. fl. g. III, tab. 14, fig. 4475.

Bladene dobbelt fjersnitdeelte med linieformede eller smalt lancetformede, haarspidsede Flige; *Støvtraadene* oventil udvidede; *Kapselen* langstrakt kølleformet, med 4—6-straalet *Ar*.

Stængel og Blomsterstilke tiltrykt-stivhaarede; Kronbladene højrøde med sortbruun Negl. 5—7. ☉.

β, *lejocarpum*! Kapselen glat.

Mellem Sæden, paa Grøftevolde o. a. dyrkede Steder, alm. udbredt. β, i Omegnen af Kjøbenhavn (Kph. herb.).

b. Kapselen glat.

717. **P. dubium** L. (Gjærde-V.) H. 591; Drej. n. 543; F. D. 902; Rehb. l. c. tab. 15, fig. 4477.

Bladene fjersnitdeelte, Afsnittene fjerfligede med lancetformede Flige; *Blomsterstilkene*, idetmindste foroven, tiltrykthaarede; *Støvtraadene* sylformede; *Kapselen* kølleformet med adskilte Straaler i *Arret*.

Bladene graagrønne, tilligemed Stængelen langhaarede af udstaaende Haar. Kronbladene mønnerøde. Arrets Straaler flere end hos foreg., færre end hos følg. 6—7. ☉.

Ved Gjærder, paa dyrkede Steder alm.

718. **P. Rhoeas** L. (Korn-V.) H. 592; Drej. n. 542; F. D. 1580; Rehb. l. c. fig. 4470.

Bladene fjersnitdeelte, med saugtakket-fligede Afsnit; *Blomsterstilkens* Haar udstaaende; *Støvtraadene* sylformede; *Kapselen* halvkugleformet eller omvendt-ægformet med afrundet Basis; under Frugtens Modenhed dække *Arrets* Straaler hinanden med Randene.

Stængel og Blade haarede. Kronbladene cinoberrøde, sjeldnere hvide, større end hos foreg. 6—7. ☉.

β, strigosum. Blomsterstilkens Haar tiltrykte.

Mellem Sæden og ved Veie, sjeldnere end de foreg.: *Sj.* Amager (19), Flaskekroen, Gundersløvholm! mod S. og V. hyppigere (H.); *Loll.* Stokkemarke, Nakskov o. fl. St. (19); *F.* i den nordøstlige Deel alm., især paa Hindsholm, ved Odense og Nyborg! *J.* mellem Frederikshavn og Sæby, Hasseriis (H.), Kalø (16), Ribe (16); *Sl.* Haderslev (21), Nyvæk ved Slesvig (16). *β*, dyrket og stundom forvildet mellem Sæden, f. Ex. *F.* Nyborg med Hovedarten (19), Lehnshøj, Olle-rup, Lindvads Mølle (12). ☼

† 719. **P. somniferum** L. (Opiat-V.) H. 593; Drej. p. 188; Rehb. l. c. tab. 17, fig. 4481.

Bladene bugtet-tandede, de øvre med hjerteformigt omfattende, de nedre med smalere Basis; *Støvtraadene* oventil udvidede; *Kapselen* næsten kugleformet, med adskilte Straaler i *Arret*.

Hele Planten glat, blaagrøn. Kronbladene violette, røde eller hvide. 6—7. ☉.

Oprindelig indført fra Orienten og Sydeuropa, forekommer alm. dyrket i Haver og ofte forvildet omkring beboede Steder.

2. Glaucium. Hornskulpe.

720. **G. luteum** [Scop. Fl. carn. I, 369] (Blaagraa H.) H. 590; F. D. 585; Rchb. l. c. tab. 11, fig. 4468; H. N. X, 29.

Bladene med omfattende Basis, fjerlappede; *Lapperne* bugtet-tandede; *Kapselen* meget lang, valseformet, knudret-ru, med piilformet *Ar*.

Kronbladene gule. Hele Planten blaagraa. 7—8. ☹.

Sandige Strandbredder, sjelden: **J.** Vestervig ved Limfjorden (H.), Harbøre (24), Dravet paa Thyholm! Ottesund (Nødskov), Lemvig (Kirchmann).

3. Chelidonium. Svaleurt.

721. **C. majus** L. (Almindelig S.) H. 588; Drej. n. 540; F. D. 542; Rchb. l. c. tab. 10, fig. 4466.

Bladene fjersnitdeelte, med rundtakket-lappede Afsnit; *Blomsterne* i Skjærm; *Støvtraadene* oventil udvidede; *Kapselen* linieformet, trind-fladtrykt, glat.

Kronbladene gule; Bladene blaagraae; hele Planten indeholder en brandguul Mælkesaft. 5—8. ♀.

β, *crenatum* (C. *laciniatum* Willd., H. 589; F. D. 676 og 2054; Rchb. l. c. fig. 4467). Afsnittene fjerfligede, spidse; Kronbladene indskaarne; Kapselen snoet.

Ved Gjærder og Mure, især omkring Byer: alm. paa **Øerne**, sjelden i det sydl. **Jyll**, f. Ex. Store Velling, Mørkholt (12), Kolding! Ribe (d'Origny). β, paa lignende Steder som Hovedarten, men sjeldnere: **Sj.** Hørsholm, Holte, Virum (7), Dronninggaard (Petersen), Vangede (Hoff), Ørdrup, Grøfterne udenfor Østerport ved Kbhvn! Rosenborg Have (Schum.), Sorø! **F.** Middelfart, Viby, Harndrup, Odense (7); **Samsø** (Jacobsen); **J.** Skive, Viborg, Mariager, Randers, Aarhus (7); **SL.** Haderslev, Rødning (7), Nyvæk ved Slesvig (16).

4. Actæa. Druemunke.

722. **A. spicata** L. (Bær-D.) H. 587; Drej. n. 544; F. D. 498; Rchb. ic. fl. g. IV, 4739.

Bladene dobbelt trekoblede, *Smaabladene* dybt tredeelte eller trefligede med grovt saugtakkede Flige; *Blomsterne* i ægformede Klaser; *Bægerbladene* concave, længere end *Støv-*

dragerne; *Kronbladene* omvendt-ægformede, af Længde med eller kortere end Støvdragerne.

1—2' høi. Bæger og Kronblade hvide, Bær sorte. 5—6. 4.

I Skove, ikke sjelden i Danmark.

5. *Tilia*. Lind.

723. *T. grandifolia* [Ehrh. Beitr. 5, 158] (Storbladet L.) H. N. XIV, 33, *T. platyphyllos* Scop., Rehb. ic. fl. g. VI, fig. 5139; *T. pauciflora* Hayne.

Aarsskuddene og Bladstilkene haarede; *Bladene* bredt og skjævt hjerteformede, næsten kredsrunder, kort tilspidsede, saugtakke, paa Underfladen grønne og idetmindste langs Nerverne og i Nervevinklerne haarede; *Dækbladet* forneden skjævt afrundet; *Qvasten* 3—4-blomstret; *Arrets* Flige oprette; *Kapselen* kantet-ribbet, filtet, med haardt Frøjemme.

Blomsterne bleggule og vellugtende, ligesom hos de følg. Arter. 6—7. *h.*

I Skove. Vildvoxende har jeg fundet den paa Øen Flatø i Guldborgsund, andre Voxesteder ere mig ikke bekendte. Planter i Alleer, men sjældnere end følg., f. Ex. Frederiksberg Allee, Søndermarken o. fl. St. omkring Kjøbenhavn! ^W

† 724. *T. intermedia* [DC. Prodr. 1, 513] Almindelig L.) Rehb. l. c. fig. 5138; *T. europæa* Sm., H. 596; *T. vulgaris* Hayne, Fr. S. Veg. Sc. 162; H. N. IX, 31.

Aarsskuddene og Bladstilkene glatte; *Bladene* skjævt hjerteformede, tilspidsede, saugtakke, paa Underfladen lysere, i Nervevinklerne skjægshaarede, forøvrigt glatte; *Dækbladet* forneden smalt nedløbende paa Blomsterstilken; *Qvasten* mange- (7—11)-blomstret; *Arrets* Flige tiltrykte; *Kapselen* jævn, omvendt-ægformet-kugleformet, filtet, med haardt Frøjemme.

7. *h.*

Alm. plantet i Alleer og Lystskove. Vildvoxende findes den neppe i Danmark.

725. *T. parvifolia* [Ehrh. l. c. 159] (Smaabladet L.) Drej. n. 546; Rehb. l. c. fig. 5137; H. N. IX, 32; *T. microphylla* Willd., H. 598; *T. europæa* F. D. 553.

Bladene mindre, paa Underfladen blaagraae, i Nervevinklerne tæt bruunt-skjæghaarede; *Dækbladet* forneden skjævt-afrundet; *Qvasten* 5—7-blomstret; *Arrets* Flige udstaaende; *Frugten* pæreformet, vortet-ru, med tyndt Frøgjemme; forøvrigt som foreg. 7. *h*.

I Skove, paa *Bornh.*, *Moen*, *Loll.* og i *Sydsjæll.* alm., i de andre Egne sjældnere og sporadisk: *Sj.* Gyrstinge (12), Hornsherred, Jonstrup Vang (H.); *F.* Fænø ved Middelfart, V. Skjerninge; *Thorseng* (12); *J.* Rindsholm ved Viborg (Strandg.), Kidholm i Kolding Fjord (H.), Seem, Roager og Kloby Skove ved Ribe (16); *Sl.* Rødding (16), Dravit Skov (Branth), Harrislev Enge, Flensborg, Husum (16). (Plantes sjældnere end foreg.)

6. *Helianthemum*. Soløie.

726. *H. vulgare* [Gärtn. fruct. l. t. 76] (Almindelig S.) Drej. n. 545; Rehb. l. c. III, fig. 4547; *Cistus Helianthemum* L., H. 599; F. D. 101.

Halvbusk med opstigende *Grene*; *Bladene* modsatte, linieformet-ovale; heelrandede; *Åxelbladene* lancetformede; *Blomsterne* i ensidig Klase med efter Afblomstringen tilbagebøiede Blomsterstilke.

Kronbladene citrongule, undertiden med en brandgul Plet ved Grunden, aabne sig kun i Solskin. 6—7. *h*.

Paa tørre, især lerede Bakker: paa *Bornh.*, *Moen* og i *Sjæll.*, især den nordlige og vestlige Deel, alm.; *J.* Aalborg (H.), Bjørns-holm (A. Lange), Hobro Skov og Bakkerne ved Hodalen (16). I de sydligere Egne af Halvøen, i Fyen og paa de øvrige Øer er det mig ikke bekjendt at den er funden.

7. *Nymphæa*. Nøkkerose.

727. *N. alba* L. (Hvid N.) H. 596; Drej. n. 547; F. D. 602; Rehb. l. c. VII, 117.

Bladene flydende, ovalt-nyreformede eller kredsrunde, med dybt indskaarne Lapper ved Grunden, heelrandede; *Kronbladene* i flere Rækker, efterhaanden overgaaende i *Støvdragerne*, som ere tilvoxne til Frugtknuden næsten op til det 12—20-straa-lede *Ar*.

Kronbladene hvide, store. 7—8. *u*.

I Aær og Søer, alm., men ikke i alle Egne, f. Ex ikke bemærket paa Bornholm, hvor den dog tidligere skal have voxet i Borresø i Almindingen (efter Meddelelse af Cand. pharm. Baagøe, som atter har indplantet den paa Øen).

Anm. Proprietair Cordes til Pandum pr. Nibe har i 1861 meddeelt mig, at han i en Dam, »Sløien« ved Nørre Bjerregaard i V. Hanherred, 1½ Miil fra Aggersund, har for flere Aar siden fundet en Nymphæa, forskjellig fra *N. alba* ved mindre Blade (c. 4" brede), tyndere Bladstilke, himmelblaa Kronblade i færre Rækker, smalere og under Blomstringen mindre udstaaende end hos hiin. Da Finderen kun har iagttaget denne Plante blomstrende een Gang og ikke opbevaret noget tørret Exemplar af Blomsten, er der endnu ikke tilstrækkeligt Materiale forhaanden til Afgjørelse af det Spørgsmaal, om den paagjældende Plante er en tilfældig Form eller en constant Varietet af *N. alba* eller mulig endog en fra denne forskjellig Art. (Exemplarer, meddeelte af Dyrhøge Hansen, ere nu indplantede i botanisk Have, og saavel disse, som tørrede Expl. fra det angivne Voxested, meddeelte af Adj. Grønlund, udmærke sig ved flere Gange mindre Blade end *N. alba*).

8. Nuphar. Aakande.

728. *N. luteum* [Sm. i Sibth. Prodr. fl. graec. 1, 361] (Guul A.) Drej. n. 548; Rchb. 113; Nymphæa L., H. 594; F. D. 603.

Bladene som foreg., *Kronbladene* i 1—2 Rækker, *Støvtraadene* flade, *Støvknapperne* aflag-linieformede; *Arret* skjoldformet, heelrandet eller svagt rundtakket, med 10—20 Straaler, som ikke naae til Randen.

Kronbladene gule, have en eiendommelig og ikke ubehagelig Lugt. 6—8. 4.

Forekommer paa samme Steder som foreg. og oftest i Selskab med denne. I enkelte Egne findes de adskilte. Mangler, ligesom hiin, paa Bornholm.

Anm. *N. pumilum* Sm., Rchb. l. c. fig. 115; H. N. V, 21) som adskilles ved mindre Blade og Blomster, næsten firekantede Støvknapper, tistraalet og dybt titandet, tilsidst halvkugleformet Ar, er funden i de tyske Hertugdømmer og maa søges paa lignende Localiteter som foreg. — Blade, fundne i Huul Sø V. for Veile (10) synes at høre herhid, efter Beskrivelsen skal den ogsaa voxe ved Kjærgaard i Vendsyssel, men da jeg ikke har seet Expl. derfra, tør jeg ikke med Bestemthed anføre den som dansk.

II. Di-Pentagynia.

9. Delphinium. Ridderspore.

729. **D. Consolida** L. (Korn-R.) H. 600; Drej. n. 549; F. D. 683; Rchb. ic. fl. g. IV, fig. 4669.

Stængelen opret, med udspærrede Grene; *Bladene* haandsnitdeelte, dobbelt tredeelte, med linieformede Afsnit; *Klaserne* korte, faablomstrede; *Dækbladene* 3—4 Gange kortere end Blomsterstilkene; 1 glat *Frugtknude*.

Kronen blaa, sjeldnere hvid. 6—7. ☉.

Ukrud i Vintersæden, især paa høitliggende, tørre Marker: hyppigst paa *Bornh.*, *Lolland*, *Falster* og i *Sydsjælland*; i enkelte Egne sjelden, f. Ex. Jyll. S. for Aalborg og i det østl. Sjæll.

† *D. orientale* J. Gay [Desmoul. Cat. Dord. p. 12], *D. Ajacis* Lge. Hdb. 1 Udg. S. 326. *Stængel* og Grene oprette; *Bladene* 2—3-dobbelt haandsnitdeelte med smalt linieformede, rendede Afsnit; *Klaserne* tæt- og mangeblomstrede; *Dækbladene* længere end Blomsterstilkene; *Frugtknuderne* duunhaarede.

Kronen violet, rød ell. hvid. 7. ☉.

Dyrkes alm. i Haver som Siirplante, og forekommer derfra forvildet, f. E. *F.* i en Ærtemark ved Skaarup, Strandmarker ved Skaarupør (19).

10. Aconitum. Stormhat.

730. **A. Napellus** L. (Blaa S.) Drej. n. 550; Rchb. l. c. fig. 4700; H. N. VI, 23; *A. neomontanum* H. 601; F. D. 1698.

Bladene haandsnitdeelte med spidse, fligede Afsnit; *Blomsterne* i Klase; *Hjelmene* halvkredsformet med en udstaaende Spids; *Kronbladene* Negl bueformigt opstigende; *Støvdragerne* haarede; *Frugtbladene* i yngre Tilstand udstaaende; *Frøene* skarpt trekantede, rynket-foldede.

1½—3' høi. Kronen blaaagtigt-violet. 7—8. ♀.

Paa fugtige Steder i Skove, sjelden: *J.* Vuust i V. Hanherred (Grønlund)! *Sj.* Hesttangs Mølle (Kyll., Nolt!), Herlufsholm, Øerne i Sorø Sø (H.). Paa det sidste Sted har jeg i de senere Aar søgt den forgjæves. *

11. Aquilegia. Akeleie.

731. *A. vulgaris* L. (Almindelig A.) H. 602; Drej. p. 191; F. D. 695; Rehb. l. c. fig. 4729—30.

Bladene paa Underfladen blaagraae, dobbelt trekoblede; *Bismaabladene* haandlappede, med budte, rundtakkede Lapper; *Blomsterstilkene* og *Frugtknuderne* kirtlet-duunhaarede; *Bægerbladene* ægformet-elliptiske, længere end Kronbladene.

2—3' høi. Bladene næsten glatte, Bæger og Kronblade alm. blaae, var i Henseende til Farve, Antal og Form. Monstrositeter med talrige Bægerblade, Kronen 0, (1, *stellata*) og talrige Kronblade uden Bæger (2, *corniculata*) dyrkes i Haver. 6—7. 4.

Funden vildvoxende paa Klipperne ved Randkløveskaar (20) og ved Vestermarie (Baagøe) paa *Bornh.*! Paa de andre Steder, hvor den er funden, er den maaskee i ældre Tid udkommen fra Haver, hvor den dyrkes som Siirplante: *Sj.* Dragerup Skov ved Holbek (15), Søskoven ved Sorø! Jonstrup Vang, Hesttangs Mølle (14); *Møens* Klint (19); *Falst.* Lundeskoie (14); *F.* Svendborg! *J.* Haraldslund! *Sl.* Slotsvolden ved Gelting (16).

III. Polygynia.

12. Anemone. Simmer.

a. *Hepatica*. Rodstokken lodret eller skjæv, Svøbets Blade udeelte, bægerlignende, tæt omgivende Blomsten.

732. *A. Hepatica* L. (Blaa S.) F. D. 610; *Hepatica triloba* Chaix, H. 602; Drej. n. 572; H. nobilis Rehb. l. c. fig. 4642.

Bladene langstilkede, trelappede, med budte, heelrandede Lapper; *Bladstilkene* og *Bladene* i Randen og paa Underfladen silkehaarede; *Svøbbladene* ægformede.

Kronbladene blaa, sjeldnere røde eller hvide, Støvdragerne hvide; Bladene udvikles efter Blomsterne; men de ældre Blade hensidde uvisnede Vinteren over. $\frac{3}{2}$ — $\frac{5}{4}$. 4.

I Skove, funden i alle Provindser, men ikke i alle Egne lige alm. 1*

b. *Anemone*. Rodstokken vandret, Svøbets Blade haandsnitdeelte med fligede Afsnit, fjernede fra Blomsterne.

733. *A. nemorosa* L. (Hvid S.) H. 605; Drej. n. 571; F. D. 549; Rchb. l. c. fig. 4644.

Rodbladene langstilkede, ligedannede med Svøbbladene, ofte 0; *Svøbbladene* af Længde med eller kortere end den tiltrykt-duunhaarede *Blomsterstilk*, deres Stilk halvt saa lang som Pladen; *Bægerbladene* 6—8, glatte.

Skaftet stedse enblomstret. Blomsterne hvide eller rosenrøde. $\frac{4}{1} - \frac{5}{1}$. 4.

I skyggefulde Skove, paa Enge mellem Krat, meget alm.

734. *A. ranunculoides* L. (Gul S.) H. 606; Drej. n. 570; F. D. 140; Rchb. l. c. fig. 4643.

Rodbladene som foreg.; *Svøbbladene* meget kortstilkede (Stilken mange Gange kortere end Pladen), *Blomsterstilken* duunhaaret af udstaaende Haar, af Længde med eller kortere end Svøbbladene; *Bægerbladene* alm. 5, udvendig duunhaarede.

Blomsterne gule, paa frodig Jord ofte 2—3 paa Skaftet. $\frac{4}{2} - \frac{5}{2}$. 4.

I Løvskove, især paa fugtig Grund, ikke sjelden og funden i alle danske Provindser, men sporadisk og sparsommere end foreg. !*

(*—*) *A. ranunculoidi-nemorosa* [Kze. i Rchb. D. Fl. p. 108] (*A. nemorosa* γ , *sulfurea* Pritz.), forskjellig fra *A. nemorosa* ved Blomsterstilken, som er kortere end Svøbbladene og ved de svovlgule, paa Underfladen rødligt anløbne Bægerblade, fra *A. ranunculoides* ved Svøbbladenes Plade (kun lidet over dobbelt saa lang som den mørkrøde Bladstilk) med dybere og skarpere fligede Afsnit, samt ved større og blegere Blomst, med næsten glatte Bægerblade, og (altid?) enblomstret Skaft.

Funden i Mængde paa Ellestubbe i Aaskoven ved Veistrup i Fyen (Rostrup)! Synes at være en Bastardform af de 2 andre Arter.

13. Pulsatilla. Kobjelde.

735. *P. vulgaris* [Lob. ic. 281] (Opret K.) H. 604; Drej. n. 573; Rchb. l. c. fig. 4657; *Anemone Pulsatilla* L., F. D. 153.

Rodbladene tredobbelt-fjersnitdeelte med linieformede Af-snit; *Svøbladene* stilkløse, ved Grunden sammenvoxne, haandformigt mangedeelte; *Blomsterstilken* opret; *Bægerbladene* oprette, dobbelt saa lange som *Støvdragerne*.

Hele Planten silkehaaret, Haarene udstaaende. Blomsterne lys-violette. 4—5. 7.

I Kratskove, paa solaabne Græsmarker og Bakker: hist og her paa *Halvøen*, sjelden paa Øerne: *Samsø* (2); *F.* mellem Middelfart og Assens (Krabbe), Bederslev (H.); *Sj.* Helsingør (Drej.), Fredensborg (14), Charlottenlund!

736. **P. nigricans** [Störk. Lib. Pulsat. 1771] (Nikkende K.) *P. pratensis* Mill.; H. 605; Drej. n. 574; Rchb. l. c. fig. 4655; H. N. 1, 34; *Anemone* L., F. D. 611.

Rod- og *Svøblade* som foreg.; *Blomsterstilken* under Blomstringen buetformigt nikkende; *Bægerbladene* lidet længere end *Støvdragerne*, i Spidsen tilbagebøiede.

Beklædningen som hos foreg., Blomsten mørk-violet. 4—5. 7.

β, *schizocalyx*! *Bægerbladene* fligede.

Paa sandige Bakker: alm. i *Nordsjælland* og de magrere Egne af *Fyen*, sparsom i *Sydvest-Sjæll.* og ikke bemærket paa *Loll.-Falst.* eller *Bornholm*; paa *Halvøen* sjældnere end foreg. (efter de Oplysninger jeg har kunnet erholde): Kokkedal, Fjerritslev og Nørbjerg i Hanherred, Fruerlund paa Øland (16), ved Aalborg og N. Sundby i Mængde (Juel), Skandsen ved Aarhus (2), Horsens (Jørg.). **β**, Lappesteen ved Helsingør! 13

Anm. Disse 2 Arter kunne kun med Sikkerhed adskilles under Blomstringen, og deres Fordeling i Landet, om hvilken nøiere Oplysninger kunde ønskes, maa derfor iagttages om Foraaret.

14. *Thalictrum*. Frøstjerne.

a. Blomsterne oprette.

737. **T. flavum** L. (Gul F.) H. 608; Drej. n. 567; F. D. 939; Rchb. l. c. III, 4639; H. N. IX, 25.

Stængelen buet, furet; *Bladene* dobbelt finned, *Smaabladene* kileformede eller omvendt-ægformede, i Spidsen 2—3-lappede eller hele, det nedre Par ofte med Smaaaxelblade ved Grunden; *Bladskedernes* Ører spidst ægformede, bredere end selve Skeden; *Blomsterne* tæt samlede i en Halvskjærm eller Top; *Støvdragerne*

oprette, med linieformede, budte Knapper; *Frugterne* elliptiske, tiribbede.

Bladene paa Underfladen blegere, Blomsterne hvidgule, Støvdragerne gule. 7. 4.

I fugtige Skove, paa Enge mellem Krat, ved Aabredder o. s. v., hist og her i alle danske Provindser, dog ikke overalt alm.

Ann. Den af Hornem. (p. 609) fra Bognæs Skov angivne *T. elatum*, der beskrives med en jævn Stængel, høiere end hos foreg. og blaagraae Blade, er mig ubekjendt og maaskee har her en Feiltagelse fundet Sted, idetmindste have de af mig paa det nævnte Voxested fundne Expl. en furet Stængel og høre aabenbart til *T. flavum*. (*T. elatum* Jacq. har desuden ogsaa en furet Stængel).

b. Blomsterne nikkende (Ingen Smaaaxelblade).

738. **T. simplex** L. (Udeelt F.) H. 607; Drej. n. 568; Rehb. l. c. fig. 4631; H. N. III, 26; *T. minus* F. D. 244; *T. dubium* Schum. n. 483.

Rodstokken krybende; *Stængelen* rank, udeelt, furet; *Bladene* dobbelt finned, *Smaablade* lancet-kileformede, hele eller 2—3-lappede (paa de nedre Blade omvendt-ægformede, 3—5-lappede); de øvre *Bladskeders* Ører ægformet-aflange, tilspidsede, tiltrykte til Stængelen; *Blomsterstanden* klaseformigt sammenkneben (aflang eller pyramideformet), med faablomstrede Grene; *Støvnapperne* linieformet-ovale med en kort Braad; *Frugterne* elliptisk-ægformede, otteribbede.

Blomsterne af samme Farve, men, ligesom Frugterne, meget mindre end hos foreg. 7. 4.

Paa tørre, udyrkede Marker, ved Gjærder, sporadisk og temmelig sjelden: *Bornh.* ved Olsker, Bodilsker (20), Aakirkeby (11), Knudsker, Nyker (Hjorth); *Sj.* i en Grøft mellem Christiansholm og Flaskekroen! bag Flaskekroen (Schum.), Svogerslev Mose (19), Alindelille! Sævedø (17); *Thorseng* ved Stioul (9); *F.* Bjørnemose, Kogtved (12); Kejenæs paa *Als* (20); *J.* Nørbjerg, Aagaards Kalkbakker (16); Dybdal (!) og Blegkilde ved Aalborg (12), Aarupgaard ved Horsens (16). [*

739. **T. minus** L. (Liden F.) H. 607; Drej. n. 569; Fr. S. Veg. Sc. 135; F. D. 732; Rehb. l. c. fig. 4627; H. N. VII, 23.

Rodstokken kort, lodret eller skjæv, beklædt med bladløse Skeder; *Stængelen* ikke huul, grenet, stribet, med bugtede Led-

stykker; *Bladene* tredobbelt finnede, det nedre Par Smaablade større end de øvrige; *Smaabladstilkene* kantede, *Smaablade*ne rundagtigt-kileformede, 3—5-lappede, paa Underfladen blaa-graae; *Bladskedernes Ører* udstaaende, afrundede; *Blomsterstanden* udspærret, fjernblomstret; *Støvknapperne* linieformede, tilspidsede; *Smaafrugterne* »teenformede«, fladtrykt-tvæggede, otte-ribbede.

Planten af blaa-graa Farve. Var. i Henseende til Høiden ($\frac{1}{2}$ —3'), Smaabladenes Form o. s. v. Blomsterne graae med violette Striber. 7—8. 4.

Paa sandige Bakker og ved Strandbredder paa Havstokken, sporadisk og ikke alm.: *Sj.* mellem Flaskekroen og Kjøge! Lappsteen ved Helsingør! Tibirke Bakker og Adserbo Overdrev! Adelsborg (Rafn), Nykjøbing (9), Saltbæk og Vrøi N. for Kalundborg (Baagøe)! *Moen* ved Ulfshale og Budsemærk (Dr.); *Falst.* ved Grønsund! Bøtø (5)! Tromnæs (H.); *F.* Holkenhavn (H.); Issehoved paa *Samsø* (2); *J.* Frederikshavn (H.), Horne i Vendsyssel (Drej. herb.), Nørhjern, Bulbjerg (16), Aalborg (H.), Boeslum Strand ved Ebeltoft (Ørting).

Anm. Store Expl. svare aldeles til *T. maius* Rechb. l. c. fig. 4629. Skjøndt Yderformerne ere saa afvigende, høre disse dog utvivlsomt til een Art, hvilket Overgange vise, som man seer dem f. Ex. ved Helsingør, hvor den lave blaa-graa Form findes paa den nye Havstok, medens Expl. tæt ovenfor paa den ældre Havstok mellem Krat efterhaanden antage en mere grøn Farve og naae en Mands halve Høide.

? 740. *T. flexuosum* [Rechb. Ic. fl. germ. III, fig. 4628] (Bugtet F.) Fr. mant. 3, p. 47; S. Veg. Sc. 136; H. N. VII, 24.

»*Rodstokken* krybende; *Stængelen* ved Grunden bladet; *Bladskedernes Ører* korte, tiltrykte, de øvre i Spidsen udstaaende, Smaabladenes Flige spidsere; *Blomsterstanden* forlænget, med udspærrede, fjernblomstrede Grene; *Smaafrugterne* elliptiske, fladtrykt-tvæggede, tiribbede, forøvrigt som foreg.

Frugterne mindre, mere regelmæssige end hos foreg. 7. 4.

Paa Bakker, sjældnere end foreg.: *J.* Jungbjerg N. O. for Aalborg (9); *F.* ved Fyenshoved (27)! Østerøen ved Nyborg (Lund); *Sj.* Hyldemarkshusene ved Storebælt (Lund). (Maaskee høre nogle af Voxestederne fra foreg. herhid). ☞

Anm. Flere af de angivne Kjendetegn, f. Ex. Smaabladenes Form, Ribbernes Antal o. s. v., forekomme mig foranderlige, og jeg har ikke været istand til at adskille denne med Bestemthed fra foreg., hvorfor disse Arter anbefales til nærmere Undersøgelse og Dyrkningsforsøg.

15. Batrachium. Frøpeber.

a. Alle Bladene haanddeelte.

741. **B. sceleratum** [L. Sp., under Ranunc.] (Tigger-F.)
Ranunculus L., H. 613; Drej. n. 563; Lge. Haandb. 1 Udg.
n. 735; F. D. 571; Rehb. l. c. fig. 4598.

Stængelen opret, huul, grenet; *Bladene* dybt 3—5-deelte med rundtakket-lappede Afsnit, de øvre haandsnitdeelte med linieformede Afsnit; *Bladskederne* hindeagtigt ørede; *Blomsterstilkene* furede; *Bægerbladene* tilsidst tilbagebøiede, længere end de omvendt-ægformede eller ovale *Kronblade*; *Frugtbunden* kegleformigt forlænget, haaret; *Frugtsamlingen* kugleformet-oval; *Frugterne* talrige, smaae, uden ophøiet Rand, i Midten fint rynkede, med utydelig *Griffel*.

Bladene glindsende, tilligemed Stængelen glatte eller noget duunhaarede, Kronbladene bleggule. 6—8. ☉.

Paa fugtige Steder, f. Ex. ved Grøfter, Søbredder og i Tørvmoser, alm. overalt i Danmark.

742. **B. hederaceum** [Fr. Mant. 3 p. 54] (Vedbendbladet F.) Ranunculus L., H. 622; Drej. n. 552; Gren. & Godr. fl. Fr. p. 19; F. D. 321; Rehb. l. c. fig. 4573; H. N. II, 43.

Stængelen trind, ved Leddene rodslaaende, krybende; *Bladene* nyreformede, budt femlappede; *Frugtbunden* glat; *Kronbladene* smalt kileformede, lidet længere end Bægerbladene; *Støvdragerne* faae (omtr. 10); *Frugterne* glatte, overalt indtil den ophøiede Rand tværrynkede; *Griffelen* hurtigt affaldende.

Kronbladene hvide. 6—8. ♀.

I Kilder, Grøfter og Bække: paa *Halvøen* hist og her, paa Øerne meget sjelden: F. Allesø (13), Lumby (18), Lunden ved St. Jørgensgaard (H.); Thorø ved Svendborg (12). (I Sjæll. og paa de øvrige Øer Ø. for Fyen findes den neppe).

b. Alle Bladene, eller idetmindste de nedre, haarformigt mangedeelte, de øvre ofte lappede. Frugtbunden haaret.

aa. *De svømmende (lappede) Blade typisk tilstede.*

743. **B. peltatum** [Fr. S. Veg. Sc. p. 141] (Skjoldbladet F.) H. N. XII, 48; Ranunculus Schrank; R. aquatilis L. (tildeels).

Stængelen budtkantet; *de nedsænkede Blade* langstilkede, børsteformigt-mangedeelte, Fligene uden Haar i Spidsen; *Bladskederne* uden Ører; *de svømmende Blade* altid tilstede, langstilkede, 3—5-lappede med rundtakkede Lapper, nyreformet-kredsrunde; *Kronbladene* bredt omvendt-ægformede, dobbelt saa lange som Bægerbladene; *Støvdragerne* talrige, længere end Frugtsamlingen; *Frugtbunden* ægformet; *Frugterne* haarede eller glatte, budte, med en Braad af den vedblivende Griffel.

6—8. 4.

I stillestaaende og flydende Vand. J. Hanherred (16). Fra andre Steder i Danmark har jeg hidtil ikke seet Expl., som kunde henføres til denne Art.

744. **B. heterophyllum** [Fr. l. c. p. 140] (Forskjelligbladet F.) H. N. XI, 32; R. aquatilis L. (tildeels), H. 623; Drej. n. 553 (undt. Var.); Rehb. l. c. fig. 4576.

De nedsænkede Blade børsteformigt-mangedeelte med eet eller flere Haar i Spidsen af Fligene, kortstilkede eller stikkløse, omskedende, med *ørede Bladskeder*, som i $\frac{2}{3}$ af deres Længde ere sammenhængende med Bladstilken; *de øvre, svømmende Blade* langstilkede, nyreformede, 3—5-lappede med rundtakkede Lapper, ofte 0; *Blomsterstilkene* af Længde med eller lidet længere end Bladene; *Frugtbunden* kugleformet, forøvrigt som foreg.

5—7. 4. Blomsterstilkene udgaar alm. saavel fra Hjørnerne af de lappede som af de haardeelte Blade (hos foreg. kun fra de første). Var.

β , *crassicaule* Fr. (R. aquatilis F. D. 2416). Stængelen tyk, opblæst; Kronbladene store; Frugterne glatte.

γ, *succulentum* (Koch). H. N. XI, 33. Ingen lappede Blade, de haardeelte Blades Flige tykke, safrige.

Alm. i Damme, Søer og Grøfter (*α* og *β*); *γ*, ved Randen af ud-tørrede Damme og Vandhuller.

745. **B. confusum** [Gren. & Godr. Fl. Fr. I, 22 under Ranunc.] (Trefliget F.) H. N. XV, 28; Ranunc. Petiveri Koch Syn. II, 13; H. N. X, 18; R. tripartitus Nolte nov. p. 51; H. II, 201 (ikke DC); F. D. 1993; R. aquat. *γ*, Drej. p. 192.

De øvre Blade dybt trefligede, med kileformede eller omvendt-ægformede Flige; *Blomsterstilkene* meget længere end Bladene; *Kronbladene* smalt omvendt-ægformet-kileformede, neppe dobbelt saa lange som Bægerbladene; *Griffelen* længere; *Frugtbunden* ægformet-kegleformet, forøvrigt som foreg. 6—8. 4.

Paa lignende Steder som foreg., mindre hyppig, men bemærket hist og her i alle Provindserne.

? 746. **B. hololeucon** [Ranunc. ololeucos Lloyd Fl. Loir. inf. p. 3] (Sneehvid F.) R. Petiveri Coss. & Germ. fl. Par. Atlas tab. 1 fig. 5—6; R. tripartitus *β*, obtusiflorus DC.

Bladskedernes Ører store og brede, næsten til Grunden adskilte, tilligemed Bladene og Stængelens øvre Deel haarede; *Kronbladene* (Neglen indbefattet) heelt hvide, mere end dobbelt saa lange som de alm. tilbagebøiede *Bægerblade*; *Griffelen* kortere og tykkere, forøvrigt som foreg.

Bladene dybere deelte end hos foreg., næsten skjoldformede. 6—7. 4.

Christiansø (Didr.)? Udenfor Floraen funden ved Neumünster. (16). Nærmere at eftersøge. ☞

bb. Alle Bladene børsteformigt mangedeelte.

747. **B. trichophyllum** [Chaix i Vill. Delph. I, p. 335 under Ranunc.] (Haarfliget F.) Gren. & Godr. fl. Fr. I, 23; Ranunc. pantothrix Bertol., Rechb. l. c. fig. 4576; H. N. IX, 27; R. paucistamineus Tausch, Koch Syn. II, 433; R. aquat. phellandrifolius Schum. n. 502 *β*; Drej. p. 192; F. D. 2357.

Alle *Bladenes* Flige haarfine, forlængede, udspærrede; *de nedre Blade* stikede; *Bladskederne* ørede; *Blomsterstilkene* af Længde med eller lidet længere end *Bladene*; *Kronbladene* smalt omvendt-ægformede, neppe dobbelt saa lange som *Bægerbladene*, hurtigt affaldende; *Støvdragerne* 12—15, længere end *Frugtsamlingen*; *Frugterne* skarpkjølede, oftest haarede.

Ved de korte, efter Afblostringen (endnu mere end hos de øvrige Arter) buetformigt nedbøiede *Blomsterstilke*, smaae *Kronblade* og faae *Støvdragere* let kjendelig fra de andre Arter. Var. tilfældigviis, men sjældent, med lappede svømmende *Blade*. 6—8. 4.

I Grøfter og Bække hist og her, f. Ex. *Sj.* Flakkebjerg (Nielsen), Alindemagle (Lund), et Kjær mellem Bernstorf og Lundehuset! Valby (11), Bæk mellem Rudersdal og Fuursøen! Ledreborg (8), Bidstrupgaard, Korporalskroen (19); Billesborg ved Kjøge, Feddet ved Lindersvold (9); *Bornh.* ved Rønne (20), Stangebæk (Baagøe); *Moen* paa Havstokken (9); *Falst.* Skjoltrup (14), N. Vedby, Gaabense, N. Grimmelstrup (Koch); *Loll.* ved Cypressegaarden (Panum), Slotø i Nakskov Fjord (19), Faursted Skov (5); *F.* Hofmanskave (27); i det sydl. alm.; *J.* Vendsyssel (alm. (12), Ranum ved Løgstør (8); *Sl.* Marskgrøfter ved Høier og Husum (16).

748. **B. circinnatum** [Fr. Mant. 3, p. 52] (*Kredsbladet F.*) H. N. IX, 29; *Ranunculus* Sibth., Drej. n. 554; F. D. 2236; *Rechb.* l. c. fig. 4575; *R. divaricatus* Schrank; Gren. & Godr. fl. Fr. I, 25; *R. pantothrix capillaceus* H. 623; *R. aquatilis* β , L. sp.

Stængelen budt trekantet, hvid, gjennemsigtig, de nederste *Blade* kortstilkede, de øvre stilkløse, med korte, til alle Sider kredsformigt udspærrede *Flige*; *Bladskederne* alm. haarede, uden Ører; *Blomsterstilkene* meget længere end *Bladene*; *Kronbladene* 5, bredt omvendt-ægformede, 2—3 Gange længere end *Bægerbladene*, seent affaldende; *Støvdragerne* talrige, længere end *Frugtsamlingen*; *Frugterne* haarede, uden Kjøl. 6—8. 4.

I flydende og stillestaaende Vand, hyppigere end foreg. og bemærket i alle Provindser.

749. **B. marinum** [Fr. l. c. p. 51] (*Flydende F.*) H. N. IX, 28; *R. fluitans* H. 623; Drej. n. 555 (efter de danske *Voxesteder*; ikke Lam.).

Stængelen tyk, trind, hvid, gjennemsigtig, langstrakt-flydende;

Bladene stilkløse eller meget kortstilkede, med langstrakte, parallelle Flige; *Bladskederne* ørede; *Blomsterstilkene* længere end *Bladene*; *Blomsterknopperne* lindseformigt fladtrykte; *Kronbladene* 5, omvendt-ægformede, omtrent dobbelt saa lange som *Bægerbladene*; *Støvdragerne* talrige, kortere end *Frugtsamlingen*; *Frugterne* glatte, skarpkjølede.

Den største og anseeligste af de danske Arter. 6—7. 4.

I stærkt flydende Vand eller ved Havkysterne i Brakvand, sjældnere end de foreg.: *Sj.* Halleby Aa ved Udløbet i Tiissø! *J.* Rye Aa i Hanherred (16), Flade Sø ved Agger! Ove Sø i Thy (Drej. herb.), Limfjorden ved Aalborg (Strandgaard), Viborg Sø (Drej. herb.), Gudenaa alm., Thorsted og Muldborg pr. Ringkjøbing (2), Nibs Aaen ved Ribe (16); *Sl.* Haderslev Fjord (8) og Dam (Grønlund)! Slien, Wittensee (20). ☞

Anm. F. D. 376 er forskjellig fra denne ved de korte Blomsterstilke, og er maaskee kun en Form af *B. trichophyllum*; men da nøiagtigere Analyser mangle, er dens Plads vanskelig at bestemme. — *B. fluitans* (Lam.) Fr., *R. fluviatilis* Web., adskilt fra foreg. ved tydeligt stilkede Blade, 9—12 aflang-kileformede Kronblade, glat Frugtbund og Frugter uden Kjøl, er neppe funden indenfor vor Flora.

16. *Ranunculus*. Ranunkel.

a. *Bladene* hele.

750. *R. Lingua* L. (Langbladet R.) H. 611; Drej. n. 557; F. D. 755; Rehb. l. c. fig. 4597.

Stængelen trind, huul, stivt opret, *Bladene* ved Grunden omskedende, linie-lancetformede, tilspidsede, fjernt og utydeligt tandede; *Blomsterstilkene* jævne; *Frugterne* ende i et bredt, sværdformet Næb (den vedblivende Griffel).

2—3' høi. Fra de nedre Led af *Stængelen* udgaae krandsformigt stillede Rodtrævler og Udløbere med langstilkede, ægformet-ovale eller æg-hjerteformede Blade. *Stängel* og *Blade* alm. tiltrykt-haarede. *Kronbladene* store. 7—8. 4.

I Moser, Aaer og ved Søbredder, ikke sjelden i de danske Provindser (Paa Bornholm ikke bemærket, Hoff.).

751. *R. Flammula* L. (Nedbøiet R.) H. 610; Drej. n. 556; F. D. 575; Rehb. l. c. fig. 4595.

Stængelen kantet, opstigende eller udstrakt, ved Grunden rodslaaende; *Bladene* lancetformede, de nedre ofte æg-lancet-

formede, fjernttandede, de nedre langt-, de øvre kortstilkede med omskedende Basis; *Blomsterstilkene* furede; *Frugterne* ende i en meget kort Griffel.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Ingen Udløbere. Forekommer undertiden i Vand med flydende Stængel. Bladene glatte eller svagt og tiltrykt-haarede. 6—8. 4.

β , *radicans* Nolt. (intermedius Hartm.) Stængelen krybende, Bladene linie-lancetformede; Blomsterne mindre.

I fugtige Enge og Moser alm. β , paa fugtig Leergrund, f. Ex. *Sj.* Gurre Sø; *Falst.* Nyby; *Loll.* Søholt (14); *F.* Hofmansgave (18), Østerøen ved Nyborg (Lund); *Sl.* Gram (1).

752. **R. reptans** L. (Krybende R.) H. 611; F. D. 108; H. N. X, 27; R. *Flammula* β , Drej. p. 193; Rchb. l. c. fig. 4595.

Stængelen trind, traadformet, grenet, nedliggende, med buetkrummede Ledstykker; fra Leddene udgaar knippeformede Rodtrævler og enblomstrede Blomsterstilke; *Bladene* linieformede eller linie-lancetformede, heelrandede; *Frugterne* ende med en i Spidsen krumboiet Griffel.

Hele Planten spædere, Blomsterne mindre end hos foreg., hvis Form β , den ligner, men fra hvilken den ved Griffelens Form o. s. v. er vel adskilt. 6—9. 4.

Ved sandige og grusede Søbredder, sporadisk: *Sj.* Tiissø! Gurre Sø! Fuursøen ved Frederiksdals Mølle! Emdrup (H.), Kattinge Sø ved Roeskilde (15), Korporalskroen (F. D.), Gisselfeldt (H.); *Falst.* Bøtø (Benzon); *Loll.* Søholt ved Maribo Sø! *J.* Skagen (Drej. herb.), V. Vandet Sø i Thy (Carst.), Flade Sø ved Agger, Haraldslund! Fiilsø! Rolfs Sø ved Varde (30), *Sl.* Seemühle ved Rendsborg!

b. Bladene haanddeelte.

aa. *Frugterne* jævne.

aa, Blomsterstilken trind; Frugtbunden glat.

753. **R. auricomus** L. (Nyrebladet R.) H. 613; Drej. n. 558; F. D. 665; Rchb. l. c. fig. 4599.

Bladene nyreformede, glatte eller randhaarede; *Rodbladene* stilkede, haandformigt deelte (lappede, fligede eller snitdeelte) med i Spidsen saugtakke Flige, alle langstilkede, med Blad-

skeder; *Stængelbladene* siddende, haandsnitdeelte, med linieformede, heelrandede eller saugtakke, til alle Sider udstaaende Afsnit; *Frugterne* duunhaarede, kortstilkede, med hagekrummet *Griffel*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Stængelen forneden violet. Planten glat, Blomsterstilke og Bæger duunhaarede. Var. med hele, tandede Rodblade. Ofte mangle nogle eller alle Kronbladene. 4—5. 4.

I Skove og Krat, paa Enge o. s. v. alm.

754. **R. acris** L. (Bidende R.) H. 620; Drej. n. 559; F. D. 2415; Rchb. l. c. fig. 4606.

Rod- og *Stængelbladene* stilkede, tiltrykt-silkehaarede, haandsnitdeelte eller haandfligede med dybt saugtakke eller fligede Afsnit; *Frugterne* glatte, siddende, flere Gange længere end den hagekrummede *Griffel*.

1—3' høi. Stængel og Bladstilke med tiltrykte, Bladskederne med udstaaende Haar. Var. i Henseende til Bladenes Indskjæring. 5—7. 4.

β , *Steveni* Andr. (Rchb. l. c. fig. 4605). Planten lavere, Bladfligene bredere, tæt silkehaarede.

γ , *multifidus* DC. (R. Boræanus Jord.) Planten høiere, Alle Bladenes Afsnit dybt fligede eller snitdeelte, med smale, linieformede Flige.

Paa Marker, høie Enge og ved Veigrøfter meget alm. β , paa Strandenge, f. Ex. Bognæs Odde ved Roeskilde! Amager ved Kastrup! γ , hist og her med Hovedarten.

755. **R. lanuginosus** L. (Uldhaaret R.) H. 621; F. D. 397; Rchb. l. c. fig. 4609; H. N. X, 26.

Rod- og *Stængelblade* stilkede, tilligemed hele Planten uldhaarede af udstaaende eller nedadvendte Haar, dobbelt haandlappede med tandet-saugtakke Lapper eller haandfligede med tandet-lappede Flige; *Frugterne* glatte, siddende, med en tilbagerullet, ved Grunden fladtrykt *Griffel* næsten halvt saa lang som Frugten.

1—2' høi. Haarbeklædningen mere guulagtig, Kronbladene mørkere gule end hos de øvrige Arter. 6. 4.

I høitliggende Skove paa Leergrund; kun funden i de vestlige Egne af Landet: *J.* Riis Skov og Marselisborg Skov ved Aarhus! Eltang, Kolding (28); *Sl.* Aarøsund (14), Christiansfeld, Hammelev, Haderslev (16), Langbjerg Skov (Rafn), Flensborg (12), Steenhjergshav Skov, Huusbyriis i Angel, Pulverholz (16), Klosterholz ved Slesvig (F. D.), Ellenberg og Løitmark i Svansø (Lund), Sehested (20), Syderhöft ved Frederiksstad (F. Müll.); *F.* Hindsgavls Skov mellem Middelfart og Kongebroen! (I *Sjælland* og paa de øvrige Øer mangler den). [3]

β, Blomsterstilken furet; Frugtbunden haaret.

756. *R. repens* L. (Vandgrenet R.) H. 619; Drej. n. 562; F. D. 795; Rchb. l. c. fig. 4610.

Krybende Grene (Ranker) fra de nedre Bladhjørner; *Bladene* enkelt eller dobbelt haandsnitdeelte, Afsnittene fligede med saugtakkede Flige (de primære Afsnit stilkede); *Bægerbladene* tiltrykte eller udstaaende; *Frugterne* svagt indtrykt-punkterede, med lang, svagt bøiet *Griffel*.

Var. i Henseende til Beklædningen, Bladenes Indskjæring o. s. v. 5—7. 4.

Paa Enge, ved Grøfter o. s. v., meget alm.

757. *R. polyanthemus* L. (Mangeblomstret R.) H. 619; Drej. n. 561; F. D. 1700; Rchb. l. c. fig. 4607; H. N. X, 25.

Rodstokken sammentrængt, uden krybende Grene; *Bladene* enkelt eller dobbelt haandsnitdeelte med fligede Afsnit; *Bægerbladene* tiltrykte eller udstaaende; *Frugtbunden* stivt børstehaaret; *Frugterne* under Lupen svagt indtrykt-punkterede, med kort, bred, krumbøiet *Griffel*.

1—2' høi. 6—8. 4. Var. i Henseende til Bladenes Indskjæring:

α, *angustifolius*. Bladene dobbelt snitdeelte, Afsnittene fligede med linieformede Flige; Stængelen forneden og Bladstilkene tæt- og stivhaarede.

β, *latifolius*. Bladene haandfligede, med brede, tandelappede Flige; hele Plantens Haarbeklædning svagere.

Paa høie Enge saavel ved Stranden som inde i Landet, i Krat-skove; sporadisk og ikke alm. (*β*, især paa fugtige og skyggefulde, *α*, paa høiere og solaabne Steder): *Sj.* mellem Christiansholm og Flaskekrøen! Kjøge (9); *Thorseng* ved Stioul (12), *F.* Ulriksholm,

Odense (H.), Knudshoved (19); *J. Krat* ved Donneruplund! *Sl. Königs-*
mark ved Husum (16), Slesvig (Esmarch); *Loll. Lidsø* i Rødbyfjord!
Falst. Nøisomhed, Klodskov (14), Grønsunds Færge! *

758. **R. bulbosus** L. (Løgrodet R.) H. 617; Drej. n. 560; F. D. 551; Rehb. l. c. fig. 4611.

Rodstokken løgformigt opsvulmet, uden Udløbere; *Bladene* haandsnitdeelte, med enkelt eller dobbelt fligede Afsnit; *Bægerbladene* under Blomstringen tilbagebøiede; *Frugterne* med kort, hagekrummet *Griffel*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. 5—6. 4.

Paa tørre, især sandige Marker, ved Randen af Skove o. s. v. alm.

bb. Frugterne knudret-vortede eller piggede.

759. **R. Philonotis** [Ehrh. Beitr. 2, 145] (Stivhaaret R.) H. 618; Drej. n. 565; F. D. 1459; H. N. VII, 26; R. hirsutus Curt., Rehb. l. c. fig. 4617.

Stængelen, især forneden, og *Bladstilkene* stivhaarede; *Bladene* dybt tredeelte, med enkelt eller dobbelt trelappede eller fligede Afsnit; *Blomsterstilkene* furede; *Bægerbladene* under Blomstringen tilbagebøiede, af Kronbladenes halve Længde; *Frugtbunden* haaret; *Frugterne* fladtrykte med en Kreds af vorteformede Punkter indenfor den ophøiede Rand; *Griffelen* kort, næsten ret.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. 5—8. ☉.

β , *parvulus* (L.) 1—3'' høi, mindre haaret, *Stængelen* 1—2 blomstret.

Eng og Marker paa Leer- og Kalkgrund, især i Nærheden af Havet: paa *Bornh.* og de øvrige Øer fra Møen til Ærø samt i Syd-sjæll. alm, sparsommere i *Nordsjæll.* og *Fyen*; paa Halvøen sjelden: *J. Aarhus, Ødstedgaard! Sl. Haderslev, Tønder* (16), Oeche i Angel (Lund), Pulverholz ved Slesvig (16), Eidersted (F. Müll.), Føhr (Grønlund). β , paa Strandfælleder, f. Ex. paa Amager!

760. **R. parviflorus** L. (Smaablomstret R.) H. 622; Drej. n. 564; F. D. 1218; Rehb. l. c. fig. 4616.

Bladene haandfligede med rundtacket-lappede Flige; *Blomsterstilkene* furede, modsatte *Bladene*; *Kronbladene* linieformet-omvendt-

ægformede, omtrent af Længde med de tilbagebøiede Bægerblade; *Frugtbunden* glat; *Frugterne* fladtrykte, paa hele Fladen indenfor den ophøiede Rand kortpiggede, med bred, krumbøiet Griffel.

Hele Planten haaret. 7. ☉.

Mellem Sæden, meget sjelden: *Sj.* Dorothealyst (4); *F.* Odense (H.), Lyø (M. Vahl). (Ikke iagttaget i de senere Aar). ☼

761. *R. arvensis* L. (Ager-R.) H. 621; Drej. n. 566; F. D. 219; Rchb. l. c. fig. 4614; H. N. VIII, 27.

Bladene enkelt eller dobbelt haandsnitdeelte, med linie-lancetformede Afsnit; *Blomsterstilkene* jævne; *Bægerbladene* tiltrykte til Kronen og lidet kortere end denne; *Frugtbunden* haaret, meget kort; *Frugterne* kredsstillede, fladtrykte med opbøiet Rand, paa begge Flader langtornede, med lang, i Spidsen svagt bøiet Griffel.

Stængel og Blade svagt haarede. Kronbladene bleggule. 5—7. ☉.

Ukrud mellem Kornet, især paa Kalk- og Leergrund: paa *Bornh.*, *Moen*, *Falst.* og *Loll.* alm., paa *Langel.* og *Thorseng* hist og her (19); i de andre Provindser sporadisk: *Sj.* Vordingborg (H.), Præstø (Dr.), Vindbyholt (9), 3 Milepælen mellem København og Kjøge (Dr.), Flakkebjerg (Nielsen) og Snedinge ved Skjelskør (22); *F.* Svendborg (H.), Nakkebølle (12); *Sl.* Haderslev (16), Tønning (F. Müll.). *

17. Ficaria. Vorterod.

762. *F. ranunculoides* [Roth Fl. germ. 1, p. 622] (Smørblomst). Drej. n. 551; Rchb. l. c. fig. 4572; Ranunculus *Ficaria* L., H. 612; F. D. 499.

Roden trævlet, med kølleformede eller pæreformede *Knoller* mellem Trævlerne; *Bladene* stilkede, hjerteformet-nyreformede; *Rodbladene* rundtakkede, *Stængelbladene* haandlappede.

Bladene glatte, glindsende, alm. med Løgknopper i Bladhjørnerne. Kronbladene glindsende gule. $\frac{3}{2}$ — $\frac{5}{4}$. 4.

I Haver og Skove meget alm.

18. Myosurus. Musehale.

763. *M. minimus* L. (Liden M.) H. 355; Drej. n. 354; F. D. 406; Rchb. l. c. fig. 4569.

Talrige linieformede *Blade* og enblomstrede bladløse *Skafter* ndgaae rosetteformigt fra en meget forkortet Rodstok; *Støvdragerne* $5-\infty$; *Frugtsamlingen* mod Modenheden valseformet, tilspidset; *Frugterne* talrige, tæt taglagte, trekantede med en kort Spids.

1—4" høi. 4—6. ☉.

Paa dyrkede, tørre, især lerede Marker alm.

19. *Caltha*. Kabeleie.

764. *C. palustris* L. (Eng-K.) H. 626; Drej. n. 577; F. D. 668; Rchb. l. c. IV, fig. 4712.

Stænglerne opstigende; *Bladene* hjerteformet-nyreformede, rundtakkede; *Bægerbladene* alm. 5, mørkgule, ovale, udstaaende; *Bællekapslerne* krandsstillede i alm. 1 Kreds.

4—5. 4.

Paa fugtige Enge, i Skovmoser, Grøfter o. s. v., meget alm.

20. *Trollius*. Engblomme.

765. *T. europæus* L. (Almindelig E.) H. 624; Drej. n. 575; F. D. 133; Rchb. l. c. fig. 4713.

Stængelen opret; *Bladene* haandsnitdeelte med fligede Af-snit; *Bægerbladene* talrige, kredsrunde, lysgule, lukkede omkring de linieformet-kileformede, safrangule Kronblade; *Bællekapslerne* i flere Kredse.

1—1½' høi. En af vore smukkeste Markblomster. $\frac{5}{2}$ —6. 4.

Paa Enge og fugtige Steder i Kratskove: i de fleste Egne af Landet almindelig, i nogle Egne sjelden, f. Ex. Stevns (Balslev) og det nordl. Jyll. (12), mangler paa Bornholm (Hjorth) og i Lolland-Falst. (19)!

21. *Eranthis*. Vinterblomme.

† 766. *E. hiemalis* [Salisb. Trans. Linn. soc. 8, 503] (Guul V.) H. 625; Drej. n. 576; F. D. 1391; Rchb. l. c. fig. 4714; *Helleborus* L.

Rodstokken knolleformet, frembringer 1 kreds rundt, stjerne-snitdeelt *Blad* og enblomstrede *Skafter*; *Bægerbladene* elliptiske

eller ovale, citrongule; *Kronbladene* grøngule; *Bællekapslerne* fladtrykte, rynkede. 2—3. 4.

I Skove, sandsynligviis oprindeligt forvildet fra Haver, sjelden: *Sj.* Gl. Lellingegaard (9), Fiurendal (Jacobsen), Antvorskov (H.), Orsløv ved Skjelskør (Nielsen)! *Falst.* ved Kraghave (14); *F.* Hofmangave (18).

† *Helleborus. Nyserod.*

† *H. viridis* L. (Grøn N.) *Rehb.* l. c. fig. 4718.

Stængelen foroven grenet; *Rodbladene* langstilkede, fodsnitdeelte, med lancetformede, saugtakke Afsnit; *Stængelbladene* siddende, *Bøgerbladene* udstaaende, grønne, *Kronbladene* halvt saa lange som *Støvdragerne*. 3—5. 4.

Forvildet, f. Ex. *Loll.* ved Skjelstoft; *Falst.* Riserup (Koch); *Sj.* Steensbøg Møller ved Vordingborg (19).

14^{de} Klasse. Didynamia (Tomægtige).

1. Orden. Gymnospermia (Spaltefrugtede).

De i denne Orden indeholdte Slægter høre alle, med Undtagelse af Nr. 21, til *N. F. Labiatæ*. De have modsatte Blade, Blomsterne i Qvaster eller Nøgler (tilsyneladende krandsstillede) i Bladhjørnerne, tilsammen dannende Top eller Ax, tolæbet Krone med heel eller tvedeelt Overlæbe, tredeelt Underlæbe; *Stængelen* oftest frekantet; *Bladene* have en stærk og alm. behageligt krydret Lugt. Hos mange Arter af denne Familie fremtræde Blomsterne under en dobbelt Form (en Tilnærmelse til Tveboforholdet, ligesom det er Tilfældet med mange *Asperifoliæ* (S. 142), *Primulaceæ* (S. 146), *Alsineæ* (S. 311) o. fl.), nemlig den ene (♂) med større Krone, længere *Støvtraade* og mere udviklede *Støvknapper*, den anden (♀) med mindre Krone, kortere *Støvtraade* og mindre udviklede eller ganske feilslaede *Støvknapper* *).

A. Smaafrugterne 4 før Modenheden indbyrdes adskilte Nødder; Blomsterne tilsyneladende krandsstillede.

AA. Bægeret titandet.

1. *Marrubium* L. Kronens Overlæbe linieformet, tokløvet;

*) Uagtet begge disse Former forekomme omtrent lige hyppigt, er her i Regelen, saavel ved Slægts- som Artsbeskrivelser, taget

Støvdragerne og Griffelen indsluttede i Kronen; Nødderne afstumpede med en trekantet Flade foroven.

BB. Bægeret regelm. femtandet.

a. Støvtraadene parallele.

aa. Kronens Overløbe forover hvælvet.

α. Støvknappernes Rum opspringe paatværs ved Klapper.

2. **Galeópsis** L. Midtfligen af Kronens Underløbe budt eller udrandet, adskilt fra Sidefligene ved 2 opsvulmede Tænder; Nødderne oventil afrundede.

β. Støvknappernes Rum opspringe ved Længderidser.

αα. Nødderne oventil afrundede.

* Kronens Rør indvendig (ved Støvtraadenes Iudføining) med en Haarkrands; Støvknappummene i en næsten ret Linie udstaaende fra hinanden.

3. **Stachys** L. Underlæbens Flige budte; de 2 nedre Støvdragere efter Bestøvningen snoede, udadbøiede.

4. **Ballóta** L. Underlæbens Flige budte, Støvdragerne efter Bestøvningen rette.

** Kronens Rør uden Haarkrands; Støvknappummene i Begyndelsen næsten parallelle, senere dannende en Vinkel indbyrdes.

5. **Betónica** L. Underlæbens Flige budte, Støvdragerne efter Bestøvningen rette.

ββ. Nødderne afstumpede med en trekantet Flade foroven.

* Sidefligene af Kronens Underløbe spidse (eller 0); Nødderne i Spidsen glatte.

6. **Lámium** L. Underlæbens Sideflige smaae, tandformede eller 0; Støvknapperne haarede. (Kronen hvid eller rød).

7. **Galeóbdolon** Huds. Underlæbens Flige alle spidse; Støvknapperne glatte. (Kronen gul).

Hensyn til den første. Hertil bedes Begyndere at lægge Mærke for ikke at vildledes, idet Beskrivelsen at flere Slægter kun passer paa den første, men ikke paa den sidste Form.

* Underlæbens Sideflige budte, Nødderne i Spidsen baarede.

8. **Leonurus** L. Blomsterkrandsene mangeblomstrede, danne et mellembrudt Ax; Bægerfligene tornede; Støvknappernes Rum divergerende.

bb. Kronens Overlæbe plan, tilbagebøiet eller 0.

α. Nødderne jævne.

9. **Népeta** L. Midtfligen af Kronens Underlæbe hvælvet, kredsround; Støvknappernes Rum i en næsten ret Linie udstaaende fra hinanden.

10. **Gléchoma** L. Underlæben omvendt-hjerteformet, plan; Støvknappernes Rum danne en Vinkel indbyrdes, og ved deres Tilnærmelse til Gjenbøstøvdragerne et Kors.

β. Nødderne grubet-punkterede.

11. **Ajúga** L. Kronens Rør indvendig med en Haar krands ved Støvdragernes Indføiningslinie, Overlæben kort utydeligt tokløvet; en Kirtel ved Grunden af Frugtknuderne.

12. **Téucrium** L. Kronens Rør indvendig nøgent; Overlæben synes at mangle, idet dens 2 Tænder ere bøiede henimod Underlæben, som derved synes femtandet.

b. Støvtraadene (efter Bestøvningen) bøiede fra hinanden foroven.

aa. Støvknappernes Rum parallele (Knapbaandet lige bredt).

13. **Mentha** L. Kronen tragtformet, firefliget, næsten regelret; Støvdragerne næsten ligelange. (Blomsterne i alsidige, endestillede Ax eller fjerntsiddende Krands i Bladhjørnerne.

bb. Støvknappernes Rum divergerende (Knapbaandet bredere nedentil).

† 14. **Elshóltzia** Willd. Kronen firelappet, de 3 nedre Lapper indbyrdes ligestore og næsten lige med den udelte Overlæbe, Støvknappummene udspilede og tilsidst indbyrdes

sammenflydende. (Blomsterne i ensidige Ax med toradede Dækblade).

15. **Origanum** L. Kronen tolæbet, Underlæbens Lapper ligestore; Støvknappummene adskilte, danne en Vinkel forneden. (Blomsterne i alsidige Ax med fireradede, taglagte Dækblade.

Stachys (s. Nr. 3).

CC. Bægeret tolæbet*).

a. Støvtraadene divergerende,

aa. opadtil udadbøiede.

16. **Thymus** L. Bægerets Svælg lukket ved en Haarkrands, dets Overlæbe tretandet, Underlæben toffiget, med opstigende, sylformede Flige; Støvknappummene forneden divergerende.

(*Mentha Pulegium*).

bb. Støvtraadene opadtil indadbøiede og sammenstødende under Overlæben.

17. **Ācinus** Moench. Blomsterne i 2—5-blomstrede Knipper, omgivne af faae og korte Dækblade; Bægeret ved Grunden puklet, dets Svælg lukket ved en Haarkrands, dets Overlæbe treffiget, Underlæben toffiget, alle Bægerfligene sylformede; Kronens Rør ret, dens Overlæbe plan; Støvknappummene foroven adskilte, forneden divergerende.

18. **Clinopodium** L. Blomsterne i mangeblomstrede Knipper, omgivne af et fælles mangebladet Svøb, dannet af børste-

*) Det tolæbede Bæger forholder sig omvendt mod Kronen, idet Overlæben er tredeelt, Underlæben todeelt. Flere af de med regelm. Bæger beskrevne Slægter vise en Tilnærmelse til det tolæbede Bæger, idet Bægertænderne ere uligelange, men af samme Form og med ligestore Mellemrum, (f. Ex. *Glechoma*, *Nepeta*, *Leonurus Cardiaca*).

formede Dækblade; Bægerets Rør krumt, valseformet, Kronens Overlæbe næsten plan, forøvrigt som foreg.

† *Melissa* L. Blomsterne i 3—6-blomstrede Knipper, omgivne af faae Dækblade; Bægeret ved Grunden ret, dets Rør klokkeformet, Overlæben tretandet med korte triangelformede Tænder, Underlæben tofliget; Kronens Rør opstigende, dens Overlæbe lidet hvælvet og med tilbagebøiede Spidser; Støvknapprummene efter Bestøvningen foroven sammenflydende, forneden udspilede.

b. Støvtraadene parallelle.

19. *Brunella* Tourn. Bægeret ved Frugtmodenheden til-lukt, dets Overlæbe tretandet, Underlæben todeelt, omfattet af Overlæbens indbøiede Rande; Kronens Rør med en Haarkrands, dens Underlæbe med budte Lapper; Nødderne jævne.

20. *Scutellaria* L. Bægeret ved Modenheden tillukt, dets Læber udeelte, Overlæben med et skjoldformet Tilhængsel; Kronrøret uden Haarkrands; Nødderne smaa grubede eller punkterede, befæstede til en Frugtholder.

Leonurus Cardiacæ (s. Nr. 8).

B. Frugten før Modenheden udeelt, firerummet, tilsidst deelt i 4 Nødder. Blomsterne spredte.

21. *Verbena* L. Bægeret femtandet; Kronen tolæbet; Blomsterne danne Ax. (N. F. *Verbenaceæ*).

2. Orden. *Angiospermia* (Kapselfrugtede).

A. Blomsten oversædig.

22. *Linnæa* Gron. Bægerets Krave femdeelt; Kronen klokkeformet, næsten regelmæssig femdeelt; Frugtknuden tre-rummet, Frugten enrummet, enfrøet, uopspringende. (Krybende Halvbusk med modsatte Blade og toblomstrede Blomsterstilke. N. F. *Caprifoliaceæ*).

B. Blomsten undersædig.

a. Kronen regelret femdeelt.

23. **Limosella** L. Bæger og Krone regelm. femfligede; Frugten enrummet, toklappet, mangefrøet. (Lav enaarig Dyndplante uden overjordisk Stængel. N. F. Scrophularineæ, b).

b. Kronen uregelret, (tolæbet eller maskeret).

aa. *Kapselen torummet, med Frøstolen tilvokset til Skillevæggen.*

α. Støvknappernes Rum ved Grunden budte.

αα. *Kronen maskeret*); Kapselen opspringende i Spidsen eller paa Siden.*

24. **Linaria** Tournef. Kronen med en Spore ved Grunden; Kapselen opspringer ved Tænder i Spidsen eller paa Siden ved Laag. (N. F. Scrophularineæ, b).

25. **Antirrhinum** L. (*part.*). Kronen ved Grunden puklet; Kapselen skjæv, opspringer ved Huller i Spidsen. (N. F. Scrophularineæ, b).

ββ. *Kronen tolæbet, gabende; Kapselen opspringende fra Spidsen til Grunden.*

26. **Scrophularia** L. Bægeret femdeelt; Kronen uregelm. krukke- eller kugleformet; Støvtraadene befæstede til Kronrørets Basis; Støvknapperne enrummede, opspringende ved en Tværspalte. (N. F. Scrophularineæ, a).

27. **Digitalis** L. Bægeret femdeelt; Kronen uregelm. klokkeformet; Støvtraadene befæstede til Kronrøret ovenfor Basis; Støvknapperne torummede, opspringende paalangs. (N. F. Scrophularineæ, b).

† **Mimulus** L. Bægeret rørformet, femkantet og femtandet; Kronen tolæbet, med opret Overlæbe og udstaaende

*) Kronen kaldes maskeret, naar dens Underlæbe er forsynet med en opadrettet, alm. budt tolappet Fold (Ganen), som tillukker Svælget.

Underlæbe; Støvknapperne torummede, med tilsidst sammenflydende Rum. (N. F. Scrophularineæ, b).

β. Støvknappernes Rum ved Grunden tilspidsede.

αα. Bægeret femtandet (eller tolæbet).

28. **Pedicularis** L. Bægeret opblæst; Frøene nætformigt grubede. (N. F. Scrophularineæ, c).

ββ. Bægeret firetandet.

* Kapselens Rum 1—2-frøede.

29. **Melampyrum** L. Bægeret rør- eller tragtformet, ikke opblæst; Frøene jævne, uvingede. (N. F. Scrophularineæ, c).

** Kapselens Rum mangelfrøede.

30. **Rhinanthus** L. Bægeret efter Afblomstringen blæreformig-opblæst; Kronens Underlæbe trelappet, med udeelte Lapper; Kapselen fladtrykt-vinget; Frøene jævne.

31. **Euphrasia** L. (part.) Bægeret ikke opblæst; Kronens Underlæbe trelappet, med tokløvede eller udrandede Lapper; Støvknappernes Rum med uligelange Tilhængsler ved Grunden; Griffelen indsluttet i Overlæben; Kapselen fladtrykt-hvælvet; Frøene riflede.

32. **Odontites** Pers. Bægeret ikke opblæst; Kronens Underlæbe trelappet, med udeelte Lapper; Støvknappernes Rum med ligelange Tilhængsler ved Grunden; Griffelen rager udenfor Overlæben; Kapselen hvælvet, næsten trind; Frøene riflede. (30—32. N. F. Scrophularineæ, c).

bb. Kapselen enrummet, med Frøstolene befastede til Rygsømmen. (Snylteplanter med farvede, skjælformede Blade: N. F. *Orobancheæ*).

23. **Lathraea** L. Bægeret firefiget; den afblomstrede Krone heelt affaldende; Støvknapperne i Randen haarede, en fri Kirtel ved Grunden af Frugtknuden. (Blomsterne i ensidige Klaser med afrundede Dækblade).

34. **Orobanche** L. Bægeret til nedenfor Midten eller til Grunden todeelt (eller tobladet), med hele eller tokløvede

Flige; den afblomstrede Krone omkringskaaren ved Grunden, den øvre Deel affaldende, den nedre vedblivende. (Blomsterne i Ax med tilspidsede Dækblade).

I. Gymnospermia.

1. Marrubium. Marube.

767. **M. vulgare** L. (Almindelig M.) H. 655; Drej. n. 600; F. D. 1036; Rehb. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1224, fig. 1.

Bladene ægformet-kredsrunde, rundtakkede, nætformigt aarede og rynkede; *Blomsterkrandsene* adskilte, mange- og tæt-blomstrede, næsten kugleformede; *Bægeret* med en Haarkrands i Svælget, dets Tænder sylformede, i Spidsen glatte, hagekrummede.

Hele Planten (især Stængelen og Bladenes Underflade) hvidfiltet; Kronen hvid. 7—9. ♀.

Paa grusede Steder, især ved Gjærder omkring Landsbyer, sporadisk: hyppigere paa *Bornh.* end i de andre Provindser.

2. Galeopsis. Hanekro.

a. Ledstykkerne ikke opsvulmede under Ledene.

768. **G. ochroleuca** [Lam. Enc. 2, p. 600] (Gul H.) H. 650; F. D. 1650; Rehb. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1228, fig. 1; H. N. XII, 33; *G. dubia* Leers.

Stængelen blødt duunhaaret af nedad tiltrykte Haar; *Bladene* æg-lancetformede, saugtakkede; *alle Krandsene* adskilte; *Dækbladene* linieformede, kortere end Bægeret, opret-tiltrykte, kort tornspidsede; *Kronrøret* 3 Gange længere end Bægeret, *Overlæben* 2—3-tandet, *Underlæbens* Flige rundtakkede.

Stængelen oventil og Bægeret kirtelhaarede. Kronen svovlgul med en citrongul Plet ved Grunden af Underlæben. 7—8. ☉.

Dyrkede, især sandige Marker, kun funden i *Halvøens* sydlige Deel: mellem Skudstrup og Vandrup ved Kongeaaen! Løgumkloster, Marker N. for Rendsborg (16). (Mangler paa Øerne). ☞

769. **G. Ladanum** L. (Sand-H.) H. 649; Drej. n. 585; F. D. 1757; *G. latifolia* Hffm.; Rehb. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1228, fig. 3; *G. Ladanum* α , *latifolia* Wimm.; Lge. Haandb. 1 Udg. p. 345; *G. intermedia* Vill., Gren. & Godr. fl. Fr. II, p. 684.

Stængelen blødt duunhaaret af nedad tiltrykte Haar, *Bladene* elliptiske eller lancetformede, saugtakke; alle *Blomsterkrandsene* adskilte; *Dækbladene* kortere end Bægeret, opret-tiltrykte; *Bægeret* kirtelhaaret, dets Flige ligelange, kort tornspidsede, oprette; *Kronrøret* dobbelt saa langt som Bægeret, *Overlæben* svagt udrandet, *Underlæbens* midterste Flig udrandet, *Sidefigene* budte, heelrandede.

Stængelen, især foroven, kirtelhaaret. Kronen roseurød med en gul, rødtribet Plet ved Grunden af Underlæben. 7—8. ☉. Var. med smalere eller bredere Blade.

Ukrud mellem Sæden, især alm. i sandige Egne.

770. **G. angustifolia** [Ehrh. Herb. 137] (Smalbladet H.) Rehb. l. c. tab. 1229, fig. 1; *G. Ladanum* β , *angustifolia* Wimm.; Lge. l. c.; *G. Ladanum* E. Bot. 884.

Stængelen blødt duunhaaret af nedad tiltrykte Haar; *Bladene* linie-lancetformede, ved Grunden og i Spidsen forlænget-tilspidsede og heelrandede, i Midten fjernttandede eller næsten heelrandede; de øvre *Blomsterkrandse* sammenhobede; *Dækbladene* udadbøiede, længere end Bægeret, langt tornspidsede; *Bægeret* blødhhaaret, ved Frugtmodningen opblæst, dets Flige uligelange, langt tornspidsede, tilsidst udstaaende; *Kronen* som foreg., men større, dens Overlæbe stærkere hvælvet.

Ved dens Udseende og ved talrige Kjendetegn synes den at være en fra foreg. vel adskilt Art. 7—8. ☉.

Mellem Sæden ved Koster paa Møen (28)! (I Sydeuropa er den hyppigere end foreg.) *

b. Ledstykkerne oventil opsvulmede, de øvre
Krandse sammenhobede.

771. **G. Tetrahit** L. (Almindelig H.) H. 649; Drej. n. 583; F. D. 1271; Rehb. l. c. tab. 1231, fig. 1.

Stængelen stivhaaret af nedbøiede eller udstaaende Haar, under de stærkt opsvulmede Led tæt beklædt med Børster; *Bladene* ægformede eller elliptiske, tilspidsede, saugtaktede; *Kronrøret* omtrent af Længde med Bægeret, indtrykt paa Ryggen nedenfor Overlæben; *Underlæbens Midtflig* plan, budt, næsten firekantet, fiint rundtakket.

Stængelen oventil og Bægeret kirtelhaarede med oftest mørkrøde Kirtler, Kronen større, rød (α , *rosea*!) eller mindre, hvidgul, ved Grunden af Underlæben rødplettet (β , *pallida*!).

Paa dyrkede Steder, f. Ex. mellem Sæden, ved Gjærder o. s. v. alm.

Ann. Den i forrige Udg. optagne *G. pubescens* er kun en Afart af *G. Tetrahit* (*G. Reichenbachii* Reut?) med mindre opsvulmede Led, større og mørkere Kroner, hvis Rør er længere end Bægeret; den ægte *G. pubescens* Bess., som findes i Syd- og Mellemtyskland, forekommer neppe hos os.

* 772. *G. bifida* [Boenn. Fl. monast. p. 178] (Tvedeelt H.) Drej. p. 201; F. D. 2654; H. N. VII, 8; Reh. l. c. tab. 1230, fig. 1.

Kronrøret kortere end eller af Længde med Bægeret, ikke indtrykt paa Ryggen; *Underlæbens Midtflig* linieformet, i Spidsen tokløvet, med tilsidst tilbagerullet Rand, *Bladene* smalle (elliptiske), forøvrigt som foreg.

Kirtlerne paa Bægeret og Stængelens øverste Deel alm. gule. Kronen alm. mindre end hos Formen α af foreg., lysrød eller hvid med røde Aarer og en gul Plet ved Grunden af Underlæben. 7—8. ☉.

Forekomst som foreg. og ligesaa hyppig som hiin, af hvilken flere Forff. ansee den for en Afart.

773. *G. versicolor* [Curt. Fl. lond. f. 6 t. 38] (Hampagtig H.) Drej. n. 584; Reh. l. c. tab. 1231, fig. 3—4; *G. canabina* Roth, H. 650; F. D. 929; *G. Tetrahit* β , L.

Kronrøret dobbelt saa langt som Bægeret, *Underlæbens Midtflig* afrundet, fiint rundtakket, violet, den øvrige Krone svovlgul, over dobbelt saa stor som hos de 2 foreg., forøvrigt som disse.

Kirtlerne alm. røde. 7—8. ☉.

Mellem Sæden alm. udbredt.

3. Stachys. Galtetand.

a. Udløbere fra Rodstokken. 4.

774. *S. silvatica* L. (Stor G.) H. 652; Drej. n. 590; F. D. 1102; Rehb. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1222, fig. 1.

Alle *Bladene* langstilkede, hjerteformede, grovt saugtakke; *Krandsene* sexblomstrede; *Udløberne* ikke tykkere imod Spidsen.

1½—2' høi. Hele Planten laaden af udstaaende Haar. Kronen mørk-bruunrød (sjeldnere skident violet) med hvide Aarer paa Underløben; Bageret og Kronens Overløbe kirtelhaarede. Den har en ubehagelig, stinkende Lugt. 7—8.

I Skove og Krat meget alm.

775. *S. palustris* L. (Smalbladet G.) H. 653; Drej. n. 588; F. D. 1103; Rehb. l. c. tab. 1211, fig. 1.

Bladene lancetformede med afrundet eller svagt hjerteformet Basis, fint saugtakke, de nedre kortstilkede, de øvre siddende; *Krandsene* 6—12-blomstrede; *Udløberne* i Spidsen kolleformigt fortykkede.

1—1½' høi. Stængelen stivhaaret-ru af nedbøjede Haar, *Bladene* blødharede, paa Overfladen grønne, paa Underfladen graaagtige; Kronen lys-rosenrød, med hvide Aarer paa Underløben; Overløben og Bageret duunharede med faae Kirtelhaar. Planten mindre stinkende end den foreg. 7—8.

β, *canescens*! (*S. segetum* Hagen). *Bladene* smalere, paa begge Flader graafiltede.

I Tørvmoser, ved Grøfter og paa dyrkede, især fugtige Marker alm. β, paa mere tør Grund.

⋈ *S. palustri-silvatica* [Schiede Pl. hybr. 43] (Tvivlsom G.) *S. ambigua* Sm., H. II, 206; Drej. n. 589; Lge. Haandb. 1 Udg. n. 749; F. D. 1877; Rehb. l. c. tab. 1215.

Alle *Bladene* kortstilkede, æg-lancetformede med hjerteformet Basis, saugtakke; *Krandsene* 6—8-blomstrede; *Udløberne* som hos foreg.

1—1½ høi. Hele Planten haaret, med nedbøiede Haar paa Stængelen; Kronen mørk rosenrød med hvide Aarer paa Underlæben. Den stærke, men ubehagelige Lugt har den tilfælles med *S. silvatica*. 7—8.

I Skove og paa dyrkede Steder meget sjelden: *Sj.* Hellebæks Vang! en Grøft ved Strandveien forbi Agershvile (Blytt); *Loll.* Nøbbølle (19); *J.* Eskjær Skov i Salling (Dr.); Haven i Vendsyssel (12)!

Ann. De fleste nyere Forfattere ansee denne Plante for en Bastardform af de 2 foregaaende Arter.

b. Udløbere 0. ☉.

776. *S. arvensis* L. (Ager-G.) H. 654; Drej. n. 587; F. D. 587; Rchb. l. c. tab. 1212, fig. 1; H. N. IV, 12.

Alle *Bladene* stilkede, æg-hjerteformede, budte, rundtakkede; *Krandsene* 4—6-blomstrede; *Bægertænderne* af Længde med eller længere end Kronrøret.

½—¾ høi. Hele Planten stivhaaret, Haarene paa Stængelen udstaaende. Kronen blegrød eller hvidagtig. 7—9.

Paa dyrkede Marker mellem Vaarsæden, i Haver o. s. v. et i flere Egne alm. Ukrud, især paa *Bornh.*, i *Sydsjæll.*, paa *Loll.*, *Falst.* og i *Fyen*, sjeldnere i det nordl. og vestl. Jyll. og Nordsjælland.

777. *S. annua* L. (Enaarig G.) F. D. 2541; Rchb. l. c. tab. 1212, fig. 2.

Bladene lancetformet-ovale, rundtakkethaugtakkede, de nedre kortstilkede, de øvre næsten stilkløse; *Krandsene* 4—6-blomstrede; *Bægertænderne* kortere end Kronrøret.

½—¾ høi. Stængelen duunhaaret, Bægeret stivhaaret, *Bladene* næsten glatte. Kronen hvid med blegguul Underlæbe. 7—9.

Mellem Sæden, paa sandige Marker, sjelden: *Bornh.* Ruthsker (Hjorth), Hasle (11)! *Falst.* i en Havremark mellem Brarup og Rise-rup (Koch)!

4. Ballota. Tandbæger.

778. *B. ruderalis* [Swartz i Sv. bot. 489] (Almindelig T.) Fr. nov. p. 194; H. 655; Drej. n. 602; F. D. 1702; *B. nigra* L. fl. Suec., Fr. H. N. VII, 7; *B. nigra* var. *ruderalis* Rchb. l. c. tab. 1218, fig. 3.

Bladene æg-hjerteformede, grovt og uregelm. saugtakkethaugtakkede, rynkede af de stærkt forgrenede, paa Underfladen

ophøjede, paa Overfladen indtrykte Nerver; *Bægeret* tragtformet eller næsten fladkravet, dets *Tænder* jævnt udløbende i en lang, sylformet Spids.

Hele Planten haaret. Kronen rosenrød-lila med hvide Aarer, sjældnere hvid (*B. alba* L. fl. Suec.). 7—9. 4. Overlæben alm. heel, var.

β , *nepetoides*! Kronens Overlæbe tolappet, næsten plan.

γ , *urticæfolia* (*B. urticæfolia* Ortm.) Rchb. l. c. fig. 4. Bladene dybt saugtakkede, næsten lappede; Bægertændernes Spids længere end hos Hovedarten, stakformet.

Ved Gjærder, især omkring Byer, meget alm. — β , med Hovedarten; γ , sjældnere: Vedbæk!

* 779. **B. foetida** [Lam. Fl. Fr. II, p. 381] (Stinkende T.) Fr. nov. p. 195; Drej. n. 601 (undt. Voxest.); Rchb. ic. crit. VIII, 1041; H. N. XI, 18; *B. nigra* α , *foetida* Koch og β , *borealis* (Schweigg.) Rchb. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1218, fig. 1—2.

Bladene mindre og alm. mindre dybt tandede; *Bægeret* fladkravet, med nætformig aarede, bredt ægformede, afrundede *Tænder*, som pludselig ende i en kort Braad; forøvrigt som foreg.

Har, ligesom foreg., men maaskee i noget høiere Grad, en stinkende Lugt, omtr. som *Stachys silvatica*. 7—9. 4. Kronen alm. af Farve som foreg., var.

β , *alba* (*B. alba* L. sp.) Kronen hvid, Bægertændernes Braad længere end hos Hovedarten.

Sjelden i Danmark, og kun bemærket i Nærheden af Søhavne (α , paa Ballastpladser ved Nakskov (19); β har jeg fundet paa Lange Linie ved Kbh. tæt ved Indgangen fra Citadellet). Sandsynligviis er den her (ligesom i Sverige) oprindelig indslæbt med Ballast. At *Hornem.* (*B. nigra* — efter Beskr.) og *Drej.* angive denne som den i Danm. hyppigste Art, hidrører i hvert Fald fra en Feiltagelse. F. D. 673 (*Mentha aquatica*), som alm. henføres til *B. foetida*, er for slet til med Sikkerhed at kunne bestemmes. *

Anm. Flere Forff. forene disse 2 Arter, og det kan ikke nægtes, at *B. foetida* β , *alba* i Bægerets Form synes at danne en Overgang. Dr. Sonder (som har sendt mig en lignende hvidblomstret Form fra Hamburg) bemærker (Fl. hamburg. p. 335), at han endog paa samme Plante har fundet begge Bægerformer. Imidlertid vil man, ved at sammenligne den nordiske *B. ruderalis* med den i Sydeuropa ene forekommende *B. foetida*, finde disse væsenlig forskellige. Navnet *B.*

nigra L., som bør beholdes naar man forener Arterne, kan ikke anvendes naar de adskilles, fordi det dels er lidet betegnende, dels af Forff. anvendt paa begge Arterne, og sandsynligviis af Linné selv brugt collectivt.

5. *Betonica*. *Betonie*.

780. *B. officinalis* L. (Læge-B.) H. 652; Drej. n. 586; F. D. 726; H. N. II, 23; *B. stricta* Ait., Rehb. ic. crit. VIII, 954; *Stachys Betonica* Benth., Rehb. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1217.

Bladene aflang-ægformede med hjerteformet Basis, grovt saugtakkeede eller rundtakkeede, de nedre langstilkede, de øvre næsten stilkløse; *Blomsterkrandsene* danne et tæt Ax (de nedre Krands stundom fjernede fra de øvrige); *Bæger-tænderne* braadspidsede, med ægformet Basis; *Kronens Overløbe* budt, i Spidsen tilsidst tilbagebøiet.

1—2' høi. Hele Planten haaret (især Bægeret, Bladstilkene og Stængelen under Ledene). Kronen rosenrød, udvendig hviduldet. 7—8. 4.

I Kratskove og paa høie Enge sjelden: *Sj.* Sophienberg (H.), Rygaard (Kyll.); *Loll.* Krat mellem Darket og Ottelund! Bjerremark, Rubjerggaard (5)! Løitofte (14), Svingelen ved Nakskov (9); *F.* Skovgarde (7); *Sl.* Flensborg (25). ³

6. *Lamium*. *Tvetand*.

a. *Bladene* tilspidsede. 4.

aa. *Kronrøret* krummet, med en *Haarkrands* indvendig i Røret.

781. *L. album* L. (Døvnælde-T.) H. 646; Drej. n. 593; F. D. 594; Rehb. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1205, fig. 1.

Stængelen udeelt; *Bladene* æg-hjerteformede, grovt og uregelm. saugtakkeede; *Krandsene* 10—20-blomstrede; *Bæger-tænderne* børsteformede; *Haarkrandsen* i Kronrøret skraa.

1—1½' høi. Kronen hvid, Underløbens Midtflig blegguul med en braun Plet ved Grunden, tolappet, Sidefligene ende i en spids Tand. 5—8.

β, *integrifolium* Nolt. (Hans. Herb. 1028). *L. parietariæ-folium* Benth. *Bladene* heelrandede, ægformede, de øvre smalere.

γ, roseum Lge. Kronen rosenrød.

Ved Gjærder, omkring Byer o. s. v. meget alm. i de fleste Egne af Landet; sjelden paa *Falst.* (Stubbekjøbing, 14, Kippinge, Koch), i det østl. *Loll.* (19), i det sydl. *Fyen* og paa Øerne deromkring (Vindeby paa Thorseng, 12). *β*, Deetzboel i *Slesv.* (F. Müll.); *γ*, mellem Nykro og Veseby Ø. for Flensborg!

782. *L. maculatum* L. (Plettet T.) H. 646; F. D. 1649; Rchb. l. c. tab. 1205, fig. 3; H. N. XV, 18.

Stængelen grenet; *Bladene* hjerteformede, uregelm. saug-takkede, med hvidgule Pletter paa Overfladen; *Bægertænderne* smalt sylformede, lidet kortere end *Kronrøret*, som har en horizontal Haarkrands indvendig.

1—1½' høi. Stængelen rødlig. Kronen rosenrød, med hvid- og rødtribet Underlæbe. 5—8.

Ved Gjærder meget sjelden: *Sl. Vogelsang Skov* (16). (I Holsteen paa flere Steder). *

bb. Kronrøret ret, med nøgent Rør.

† *L. garganicum* L. (Rchb. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1207, fig. 2). *Bladene* hjerteformede, dybt og uregelm. dobbelt saugtakkede, rynkede og duunhaarede; *Bægertænderne* bredt sylformede, meget kortere end *Kronrøret*; Kronen skidenrød med sækformigt udvidet Svælg.

Forvildet ved Risingsminde pr. Odense (Lefolii)!

b. *Bladene* budte eller afrundede, sjeldnere spidse (ikke tilspidsede). ☉.

aa. Kronrøret oftest krummet, med en Haarkrands indvendig (ovenfor Basis).

783. *L. purpureum* L. (Rød T.) H. 647; Drej. n. 595; F. D. 523; Rchb. l. c. tab. 1204, fig. 3.

Bladene hjerteformede, uregelm. rundtakkede, alle stilkede; *Bægertænderne* omtrent af Længde med Bægerrøret.

½—1' høi. Kronen rosenrød, sjeldnere hvid. 4—9.

Paa dyrkede Steder overalt meget alm.

bb. Kronrøret ret, indvendig nøgent.

784. **L. incisum** [Willd. Sp. 3, p. 89] (Fliget T.) H. 647; Drej. n. 594; F. D. 2358; Rchb. l. c. tab. 1204, fig. 4; H. N. X, 16; L. confertum Fr. S. Veg. Sc. p. 15 og 198.

Bladene uregelm. rundtakket-lappede eller indskaarne, de nedre hjerteformet-nyreformede, langstilkede, de øvre rudeformet-ægformede, kortstilkede med forneden udvidet *Bladstilk*; de øvre *Blomsterkrandse* tæt samlede; *Bægertænderne* af Længde med eller længere end Bægerrøret, sylformede, udstaaende, stivhaarede.

$\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ høi. Kronen rosenrød. Planten mørkfarvet, alm. rødligt anløben. Flere af de angivne Kjendetegn variere, men ved sit hele Udseende er den noksom forskjellig fra og kan ikke forvexles med foreg. (12). Fra følg. er den aldeles forskjellig.

Paa lignende Steder som foreg., hist og her i alle Provindser. *

785. **L. intermedium** [Fr. Nov. p. 192] (Nyrebladet T.) H. 649; Drej. n. 596; F. D. 1701 (ikke god); Rchb. l. c. tab. 1204, fig. 1; N. N. I, 51.

Alle *Bladene* nyreformede, rundtakket-haandlappede, de nedre stilkede, de øvre næsten siddende eller omfattende med en kort, opblæst *Bladstilk*; *Blomsterkrandsene* adskilte; *Bægertænderne* som hos foreg., længere end Røret.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronen rosenrød, Overlæben smukt og mørkt purpur-rød. 4—5 og 8—9.

Paa lignende Steder som de foreg., men sjeldnere og sporadisk (paa enkelte Steder periodisk i Mængde): *Sj. Fortunen!* Vibenshuus (Dr.) o. fl. St. i Kjøbenhavns Omegn! Ballerup (1), Roeskilde, Holbæk (15); *Falster!* Loll. ved Rødby (H.); *J.* i det nordl. og nordvestl. alm.! Viborg (Feddersen), Hobro (16), Randers! Haraldslund! Hjortlund (12).

786. **L. amplexicaule** L. (Liden T.) H. 648; Drej. n. 597; F. D. 752; Rchb. l. c. tab. 1204, fig. 2.

Alle *Bladene* nyreformede, de nedre stilkede, rundtakkede, de øvre siddende og omfattende, haandlappede; *Blomsterkrandsene* adskilte; *Bægeret* blødt og graaagtig-duunhaaret; *Tænderne*

kortere end Røret, før og efter Blomstringen sammenstødende i Spidsen.

$\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ ' høi. Kronen som foreg., med meget langt Rør. 5—8.

β, clandestinum (Rehb. ic. crit. VIII, 950). Kronen liden, affaldende uudsprungen, blomstrer tidligere end Hovedarten (4).

Ved Gjærder og mellem Sæden ikke sjelden.

7. Galeobdolon. Barsvælg.

787. *G. luteum* [Huds. Fl. angl. 258] (Gual B.) H. 651; Drej. n. 598; H. N. II, 24; Galeopsis Galeobdolon L., F. D. 1272; Lamium Galeobdolon Crantz, Rehb. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1206, fig. 3.

Stængelen opstigende, duunhaaret af nedad tiltrykte Haar paa Kanterne, med *Vandgrene* fra Rodstokken; *Bladene* ægformede, saugtakkede; *Bægeret* tragtformet, med bladagtigt-grønne, spidst triangelformede *Tænder*.

De ældre Blade hvidplettede. Kronen lysgul med mørkere Underlæbe. 5—6. 4.

I Løvskovene, alm. i de sydlige Egne af Landet omkring Østersøen (f. E. *Bornh.*, *Loll.-Falst.*, *Sydsjæll.*, sydl. *F.* og *Halvøens* sydøstlige Skove). Sjelden mod N.: *Sj.* Hornbæk (20), Hellebæk! Egebæksvang! Frederiksborg, Fredensborg (Jørg.); Hørsholm (19). Holbæk (15), (mangler ved Kbhvn); *F.* Holkenhavn, Ubberød, Vissenberg (H.); *J.* Lundbykrat (H.).

8. Leonurus. Hjertespan.

788. *L. Cardiaca* L. (Almindelig H.) H. 656; Drej. n. 599; F. D. 727 og 1756; Rehb. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1233, fig. 2.

Bladene alle stilkede, nætformigt aarede, haandfligede, de øvre tre-, de nedre femfligede; *Blomsterkrandsene* siddende, tætblomstrede, adskilte; *Bægeret* glat, næsten tolæbet, med braadspidset-stikkende, uligelange *Tænder*; *Kronens Underlæbe* med aflang Midtflig, dens Rør indvendig forsynet med en Haarkrands.

2—3' høi. Kronen rosenrød, udvendig hvidfiltet, Underlæben hvidgul med røde Prikker. 7—8. 4.

Ved Gjærder, især omkring Landsbyer, alm. udbredt.

789. **L. Marrubiastrum** L. (Stortandet H.) H. 656; F. D. 2653; H. N. XV, 19; Chaiturus Marrubiastrum Rehb. fl. exc. p. 317, ic. fl. germ. XVIII, tab. 1233, fig. 1.

Bladene stilkede, aflange, saugtakke, de øvre Blade (ved Blomsterne) lancetformede, heelrandede eller ovenfor Midten fjernst saugtakke; *Bægeret* tiltrykt-duunhaaret, med braadspidset-stikkende *Tænder*; *Kronens Midtflig* rundagtig; *Kronrøret* indvendig nøgent.

1½—2½' høi. Kronen lysrød, udvendig flettet. 7—8. ☉.

Ved Landsbyer, kun fundet paa *Loll.*: Dannemarre (9), Harpe-lunde, Rolykke (19), Skovsbølle, Gloshunde, Alminde (14), Østofte, Errindlev (Rasmussen) og fl. St. (ialt noteret fra 14 forskellige Voxe-steder). [✱]

9. **Nepeta. Katteurt.**

790. **N. Cataria** L. (Almindelig K.) H. 637; Drej. n. 591; F. D. 580; Rehb. l. c. tab. 1242.

Bladene stilkede, æg-hjerteformede, dybt saugtakke; *Blomsterkrandsene* stilkede; *Bægertænderne* sylformede; *Nødderne* jævne, glatte.

1½—2' høi. Hele Planten tæt graaflettet. Kronen hvid med rød-punkteret Underlæbe. 6—8. ♀.

Ved Gjærder, især omkring Byer paa Gruus, men sporadisk, og i enkelte Egne ikke bemærket, f. Ex. Bornholm (Hoff).

† *N. nuda* L. *Bladene* aflang-hjerteformede, rundtakke; *Nødderne* knudret-rue, i Spidsen duunhaarede.

Forvildet paa en Høi ved Bidstrupgaard (tilligemed flere andre fremmede Planter).

10. **Glechoma. Korsknop.**

791. **G. hederaceum** L. (Vedbende-K.) H. 645; Drej. n. 592; F. D. 789; Rehb. l. c. tab. 1241, fig. 1—2; H. N. XI, 19 (var.).

De golde *Stængler* krybende, de blomsterbærende Grene oprette eller opstigende; *Bladene* stilkede, med en Haarkrands ved Grunden af Bladstilken, nyreformede, rundtakke; *Krandsene*

dannede af kortstilkede, 3—5-blomstrede Nøgler; *Bæbertænderne* ægformede, sylspidsede, 3 Gange kortere end Røret.

Kronen blaaagtig, sjældnere rød-violet med mørkrødprikket og hvidstribet Svælg. (♀ Formen har indsluttede, ikke korsstillede Støvdragere). $\frac{4}{2} - \frac{6}{1}$. 4.

Ved Gjærder, i Randen af Skove o. s. v., meget almindelig.

11. *Ajuga*. Læbeløs.

792. *A. reptans* L. (Krybende L.) H. 635; Drej. n. 608; F. D. 925; Rehb. l. c. tab. 1234, fig. 3; H. N. IX, 15.

Vandgrene fra Rodstokken; *Bladene* omvendt-ægformede eller ovale, rundbugtede; *Rodbladene* stilkede; *de øvre Dækblade* af Længde med eller kortere end Blomsterne.

Var. svagthaaret eller næsten glat. Kronen blaa, sjældent rød eller hvid. 5—6. 4.

I Løvskove (sjældnere paa høie Enge), oftest i Selskab med Galeobdolon, med hvilken den ogsaa i Henseende til Fordeling i Landet stemmer overeens: *Nordsjæll.* sporadisk: Ledreborg, Rygaard (15), Fredensborg (Jørg.), Frederiksborg, Hørsholm! Søllerød (Petersen), Store Hareskov (14), Frederiksdal (H.), Lyngby (17), Frederiksberg Have (H.), mellem Valby og Flaskekroen, Voldgravene mellem Øster og Nørre Port (Krabbe), Charlottenlund ved Forsthaven (14)! Ordrups Mose ved Fuxveien! i *Syd-* og *Vestsjæll.* alm., ligesaa paa de sydligere Øer og i *Fyen*; *Samso* (2); *J.* i det nordl. sjelden: Viborg (Feddersen), Skyum Krat, Randers (H.), Haraldslund! i det sydøstl. alm. (Ikke bemærket paa Bornholm. Hoff).

793. *A. pyramidalis* L. (Pyramideformet L.) H. 633; Drej. n. 609; F. D. 185; Rehb. l. c. tab. 1234, fig. 2; H. N. XII, 34.

Rodstokken uden Vandgrene; *Bladene* som foreg., med korte Stilke; *Blomsterkrandsene* danne et pyramideformet Ax med fireradet stillede *Dækblade*, som alle ere meget længere end Blomsterne.

Stængel og Blade tæthaarede. Kronen lysblaa, mindre end hos foreg., sjældnere hvid. 5—6. 4 eller ☉.

I høitliggende Skove, paa Bakker mellem Krat, Lyngheder, sporadisk og temmelig sjelden: *Sj.* Asnæs Skov ved Kalundborg (Smith), Helsingørs Ladegaard (21), mellem Ørsholt og Gurre, Hjørlande Mark ved Slangerup, Jonstrup (H.), Greve (14); *J.* Hjørring (H.), Torslev

Lgby), Overklitgaard og Agersted i Vendsyssel (16), Morsø (Schade), Skovsgaard Krat (Feddersen) og Margretelund ved Viborg (Morville)! Lyne Kro ved Varde, Hjerting (16); paa *Bornh.* flere Steder (H., 20).

12. *Teucrium*. Kortlæbe.

794. **T. Scordium** L. (Løglugtende K.) H. 656; Drej. n. 610; F. D. 593; Rehb. l. c. tab. 1239, fig. 2; H. N. I, 17.

Stængelen opstigende, med *Udløbere* fra Rodstokken; *Bladene* stilkløse, linieformet-ovale, tandet-saugtakkede, de øvre nedenfor Midten heelrandede; *Krandsene* omtrent fireblomstrede.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Planten haaret, har en løgagtig Lugt. Kronen lys-rosenrød. 7—9. 4.

Paa fugtige Steder, især paa Leergrund, f. Ex. ved Randen af Grøfter og Mergelgrave: *Sj.* en Grøft bag Flaskekroen! Magleby paa Amager (15), Svenstrup ved Kjøge (Burs. herb.), i *Sydsjæll.*, paa *Falst.*, *Loll.* og *Langel.* hist og her; *Sl.* Fobislet ved Haderslev (H.). I *Jyll.* og de andre nordlige Egne af Landet mangler den. *

† *T. Chamædrys* L. Rehb. l. c. tab. 1238.

Rodstokken udsender traadformede, gule *Udløbere*; *Stængelne* opstigende; *Bladene* kortstilkede, æg-lancetformede, rundtakkede, paa Overfladen glindsende, paa Underfladen blaagraa-duunhaarede; *Krandsene* 4—6-blomstrede, samlede til ensidige, endestillede Klaser.

Kronen rosenrød. h. 7—9.

Forvildet i Vemmetofte Dyrehave (Sünckenberg, Visby)! *

13. *Mentha*. Mynte.

a. *M. genuinæ*. Bægeret regelm. femtandet, med aabent Svælg; Kronens Overlæbe udrandet.

aa. *Bladene* stilkløse, *Stængelbladene* forskellige fra *Bladene* ved *Blomsterne*; *Blomsterkrandsene* samlede til *Ax.*

795. **M. rotundifolia** L. (Rundbladet M.) F. D. 2542; Rehb. l. c. tab. 1282; H. N. IX, 12.

Bladene hjerteformet-ovale, i Spidsen afrundede, rynkede, tiltrykt-saugtakkede; *Axene* korte, tætblomstrede; *Bægeret* ved

Frugtmodenheden kugleformigt opblæst med lancet-sylformede, tilsidst sammenstødende *Tænder*.

1—1½' høi. Bladene hvidfildede af kruset Uld. Kronen hvid, meget liden. 8—9. 4.

Paa fugtige Steder, sjelden: *Bornh.* Ormebækken ved Pythuset, ¼ Miil S. O. for Rønne (21)! *Sj.* Storehedinge (Visby)! *

796. *M. silvestris* L. (Graa M.) H. 638; Drej. n. 581; F. D. 484 (slet) og 1932; Rehb. l. c. tab. 1283; H. N. I, 18.

Bladene ægformet-elliptiske, spidse, skarpt saugtaktede, ved Grunden afsmalnede (de nedre kortstilkede); *Axene* langstrakte, tætblomstrede (de nedre Krandsse ofte adskilte); *Bægeret* ved Frugtmodenheden opblæst med indsnøret Svælg og linie-sylformede, tilsidst sammenstødende *Tænder*.

1½—2' høi. Bægeret og Bladene paa Underfladen graafildede, Kronen rød-lila, duunhaaret, større end hos foreg. 8—9. 4. Bladene var. i Brede, Beklædning o. s. v.

Ved Aa- og Søbredder, i fugtige Skove, sporadisk og sjelden: *Sj.* ved Nordbredden af Esrom Sø (21), Nøddebo (12), Fredensborg (Freuchen), Hørsholm (H.), Hesttangs Mølle (Schlichtkrull), Søndermarken (19), Svends Mølle ved Valø (21), Bredebæks Mølle ved Sparresholm (Lund); *Loll.* Søholt Skov (5), Hamborgerskoven (Benzon); *F.* Bjørnemose (H.); *J.* Tange Brohuus (16), Williamsborg N. for Veile Fjord (H.), Lundeskov mellem Kolding og Vamdrup (16), *Sl.* Vedel-spang (16), ved Eideren mellem Carlshütte og Bargstedt! *

797. *M. viridis* L. (Grøn M.) H. II, 204; F. D. 1876; H. N. VII, 9.

Bladene lancetformede, tilspidsede, fjernt, men skarpt saugtaktede; *Blomsterkrandsene* adskilte, danne et mellembrudt Ax; *Bægeret* furet, dets *Tænder* sylformede, rette, tilligemed de linieformede *Dækblade* randhaarede.

Bladene grønne. Hele Planten glat eller Stængel og Blade paa Underfladen svagt haarede; Kronen lila, af Størrelse som foreg. 8—9. 4.

Ved Gjerder og Landsbyer, især paa fugtige Steder, sjelden: *Sj.* en Bæk ved Skotterup pr. Helsingør (9), Ørholm (Drej. herb.), Broxø (Visby); *Falst.* Nykjøbing; *Loll.* Vesterborg, Hillested (19), *F.* Ollerup! V. Skjerninge Mølle! Assens (Kyll.); *Sl.* Dammen ved Haderslev (N.)! Gram, Hoptrup (Grønlund); *J.* Lundeskov og Eistrup V. for Kolding, ved Skanderborg Sø (16); Ristrup (H.), Ranum ved Løgstør (8), Ørlev i V. Hanherred (16); Christiansø (Hamann)! *

Ann. En var. *canescens* med graafiltede Blade, som efter Fr. findes i Sverige, har jeg ikke fundet hos os. Alle Arterne i denne Slægt variere i Henseende til Beklædningen, men denne Art er, foruden dens typiske Mangel paa Haar, saa betydeligt forskjellig fra foreg., at de umuligt kunne forenes. Den af Koch (Syn. p. 633) for *M. viridis* L. antagne Var. (*glabra*) af foreg., er (efter Beskr.) meget forskjellig fra den her forekommende *M. viridis*. (Sm. Fr. mant. 3 p. 56).

bb. Stængelbladene stilkede, ensformede med Bladene ved Blomsterne.

798. **M. aquatica** L. (Vand-M.) Fr. Nov. p. 182; F. W. Areschoug, Botan. Observ., cf. Bot. not. 1855 p. 20.

Stængelen opret, med opstigende eller opret-aabne Grene; *Bladene* ægformede, elliptiske eller ovale, saugtakke; *Blomsterstilkene* haarede; *Bægeret* rør- eller tragtformet, furet, med tilspidset-triangelformede eller sylformede *Tænder*; *Kronen* udvendig duunhaaret.

1—2' høi. Kronen lila. Var. betydeligt i Henseende til Bladenes Form, Beklædning, Blomsterstanden samt Støvdragernes og Griffelens indbyrdes Længde. 7—9. 4.

Følgende Former kunne adskilles:

A. capitata Fr. Nov. p. 182; *M. aquatica* Drej. n. 580; Lge. Haandb. ed. 2, n. 790; Rehb. l. c. tab. 1286; H. N. II, 25; *M. hirsuta aquatica* H. 640; *Origanum vulgare* F. D. 63. Bladene ægformede eller ovale, med kortere og mere tiltrykte Takker; Blomsterkrandsene faae, tæt samlede til et Hoved uden Bladdusk i Spidsen; Støvdragerne oftest fremragende (♂).

B. subspicata Aresch. l. c. p. 21 (cf. Fr. nov. p. 183), *M. pyramidalis* Lloyd fl. d'Ouest 344. Blomsterkrandsene flere, de nedre adskilte og ofte langstilkede, Bladene ved Blomsterne alm. siddende, de øvre danne ofte en Bladdusk; Støvdragerne alm. indsluttede (♀).

C. verticillata Fr. Nov. p. 183, Aresch. l. c. p. 21; *M. sativa* Fr. mant. 3, p. 57; Drej. l. c. n. 579; Lge l. c. n. 791; Rehb. l. c. tab. 1285, 3 og tab. 1287; H. N. II, 26; *M. hirsuta sativa* H. 640; *M. palustris* Rehb. ic. crit. X, 1307. Bladene æg-

lancetformede eller elliptiske, med skarpere Takker, Blomsterkrandsene adskilte, med en Bladdusk i Spidsen; Støvdragerne alm. indsluttede (♀).

Af denne Form forekomme følgende Afændringer:

α, *vulgaris*. Hele Planten haaret og alm. stærkt grenet; Haarene paa Stængelen nedadvendte; Bladene æg-lancetformede eller elliptiske.

β, *glabrata*. Stængel og Blade meget svagt haarede eller næsten glatte.

γ, *brevifolia*! Bladene korte og brede; Kronen meget svagt haaret; Stængelen, Bladene ved Blomsterne og Bægerne mørkviolet anløbne.

δ, *acutifolia* (M. *acutifolia* Sm.). Rehb. l. c. tab. 1287, fig. 1. Bladene elliptiske eller lancetformede; Kronen meget stærkt haaret. Hele Planten alm. grøn.

ε, *latifolia* Nolte (F. D. 2057; H. 640). Bladene bredt ægformede, dybt saugtakke; Blomsterkrandsene fjerne.

I Grøfter, Moser o. a. fugtige Steder (B. sjældnere end A og C). A forekommer især ved Bredderne af selve Vandet, C i fugtige Enger eller endog paa mere tør Grund, begge udbredte over hele Landet. Formen *β*, Skjærhoved i *Jyll!* *γ*, *Sj.* Tryggerød Mose! *J.* Faurholt i Vendsyssel! *Sl.* Pobøl mellem Flensborg og Husum! *δ*, *Sj.* Hjulebækshuset ved Helsingør! *J.* (Kph. Herb.); *ε*, *Sl.* Aabenraa!

Anm. De hos os almindeligt forekommende Former (A og C) af denne Art ere, saavel ved flere Characterer, som især ved Habitus saa forskellige fra hinanden, at den almindeligt vedtagne Adskillelse i 2 Arter, *M. aquatica* og *sativa*, kunde synes tilstrækkelig berettiget, dersom ikke Formen B dannede et tydeligt Overgangsled imellem dem, hvortil fremdeles kommer, at et af de væsentligste Skjælmærker, Mangel eller Tilstedeværelse af tomme Blade (Bladdusk) i Spidsen af Blomsterstanden, er funden at være ikke constant. I Overensstemmelse med Areschoug (l. c.) og efter at have seet Expl. af *M. pyramidata* Lloyd, der er en øiensynlig Mellemform imellem dem, er jeg nu tilbøjelig til at forene de forhen adskilte Arter. — Linnés *M. sativa* synes at maatte henføres til de tvivlsomme Arter; til den i Norden og hele Nordeuropa almindelige Art kan den i hvert Fald neppe henføres, da L. kun angiver den at voxer »in Europa australi».

799. *M. gentilis* L. (Eng-M.) H. 642; F. D. 736 (?) og 2655; H. N. VI, 13; *M. pratensis* Sole, Menth. britt. t. 17.

Stængelen opret med opret-aabne Grene; *Bladene* elliptiske eller æg-lancetformede, tilspidsede, skarpt saugtakke; *Bladene ved Blomsterne* siddende; *Dækbladene* nedhængende, længere end de unge Krandsene; i Randen og paa Underfladen stivhaarede; *Krandsene* fjerne, smaae, tæt blomstrede; *Bægeret* lidet kortere end Kronen, rørformet-klokkeformet, med sylformede, randhaarede *Tænder*; *Blomsterstilkene* glatte.

Stængelen mørkrød, med faae, nedadvendte Haar; Blomsterne neppe halvt saa store som hos foreg.; Kronen glat, blegrød-lila. 8—9. 7.

β , *Agardhiana* Fr. S. Veg. p. 13. *M. sativa* (Agardhiana) Fr. nov. p. 184; mindre haaret, Bladene større, bredt ægformede.

Paa fugtig Grund meget sjelden: *J. Viborg* (Drej. herb.); *SL. Lyrskov* (Jessen). β , Hjulebækshuset mellem Helsingør og Hellebæk! *

800. *M. arvensis* L. (Ager-M.) H. 643; Drej. n. 578; F. D. 512; Rehb. l. c. tab. 1289, fig. 1.

Stængelen fremliggende eller opstigende, med vandret udspilede eller opstigende Grene og underjordiske *Udløbere*, ved hvilke den overvintrer; *Bladene* ægformede eller elliptiske, spidse, tiltrykt-saugtakke; *Krandsene* tæt- og mangeblomstrede; *Bladene ved Blomsterne* stilkede, *Dækbladene* kortere end Krandsene, bredere end hos foreg.; *Bægeret* klokkeformet, med ægformet-triangelformede, korte (ligesaa brede som lange) *Tænder*.

Kronen haaret, lila (lidet større end hos foreg., mindre end hos næstforeg.). 7—9. 7. Forekommer i talrige Former, hvoraf følgende ere de eiendommeligste:

α , *vulgaris* (Rehb. l. c. fig. 1). Bladene ægformede, Bladstilkene omtrent af Længde med Blomsterkrandsene; Blomsterstilkene haarede.

β , *parietariæfolia* Beck (Rehb. l. c. fig. 2). Svagthaaret; Bladene store, elliptiske, forneden heelrandede og afsmalnede i en Bladstilk, som er meget længere end Krandsene; Blomsterstilkene glatte.

γ , *glabriuscula* Koch (*M. gracilis* Sole Menth. britt. t. 16; *M. arvensis acuta* Rehb. l. c. tab. 1286, fig. 5). Bladene elliptisk-

lancetformede, tilspidsede, tilligemed Stængelen svagthaarede, Bladstilkene kortere end Krandsene, Blomsterstilkene glatte.

♂, *riparia* Fr. nov. 189; H. N. II, 27. Stængelen lav, næsten opret, ugrenet; Bladene ægformede, tilligemed de tætsiddende Blomsterkrandsse svagthaarede; Blomsterstilkene glatte. Hele Planten af en mørkrød Farve.

Paa Agre, høie Euge, ved Grøfter o. s. v. meget alm. Afarterne sjeldnere: β, Bognæs Skov (Horn. Herb.); γ, *Loll.* ved Søllested (19); δ, i Holsteen ved Einfelder-Søen! (ikke funden i det egenlige Danmark, men anført fordi den formodenlig ogsaa forekommer her).

b. *Pulegium* Mill. Bægeret tolæbet, dets Svælg tilsidst lukket ved en Haarkrands; Kronens Overlæbe udeelt.

× 801. *M. Pulegium* L. (Polei-M.) H. 644; F. D. 1755; Rehb. l. c. tab. 1290, fig. 2; *Pulegium vulgare* Mill., Koch Syn. II, 636.

Grenene talrige, fremliggende; *Bladene* ægformet-elliptiske, budte, utydeligt tandet-saugtakkede; *Blomsterkrandsene* alle adskilte; *Bægerets* Overlæbe med tilbagebøjede *Tænder*.

Kronerne lila. 7—9. 4.

Paa fugtige, oversvømmede Steder: *Falst.* ved Korselitze (II.). Ikke senere gjenfunden. [✱]

14. *Elsholtzia*. Krydermynte.

† 802. *E. cristata* [Willd. Sp. pl. 3, 59] (Ensidig K.) H. II, 207; Drej. p. 201; F. D. 2652; Rehb. l. c. tab. 1281; H. N. V, 8.

Grenene og *Bladstilkene* ensidigt haarede; *Bladene* stilkede, elliptiske, rundtakket-saugtakkede; *Dækbladene* kreds rundt-ægformede, pludseligt tilspidsede, randhaarede.

Kronerne smaae, blegt-lila. Planten har en eiendommelig og gjennemtrængende Lugt. 7—8. ☉.

Oprindelig indført som Haveplante fra Siberien, forekommer nu forvildet paa mange Steder omkring Byer og Haver.

15. Origanum. Merian.

803. **O. vulgare** L. (Almindelig M.) H. 657; Drej. n. 582; F. D. 1581; Rchb. l. c. tab. 1262, fig. 1.

Bladene kortstilkede, elliptisk-ægformede, heelrandede eller utydeligt tandede; *Bægeret* regelm. femtandet, dets Svælg lukket ved en Haarkrands; *Blomsterne* fleerbo.

Bladene grønne, næsten glatte, Kronerne røde, sjeldnere hvide (f. Ex. Riserup o. fl. St. paa Falst., Koch, 14, Præstø i Maribo Sø, 19); Bæger og Dækblade alm. mørkviolette. 7—9. 4.

Ved Gjærder og i Kratskove: hyppig i *Sydsjæll.*, paa *Moen*, *Falst.*, *Loll.* og i det sydl. *Fyen*, sjeldnere i *Nordsjæll.* (mangler f. Ex. ved Helsingør (21); paa *Halvøen* sporadisk, men ikke alm., paa Østkysten, mod V. sjeldnere, f. Ex. Hanstholm o. fl. St. i det nordvestlige Thy!

† *O. Majorana* L. (Have-M.) Rchb. l. c. tab. 1263, fig. 3; *Majorana hortensis* Moench. Bladene elliptisk-ovale, paa begge Sider graafiltede; Axene ovale med tæt taglagte Dækblade; Bægeret paa den ene Side til Grunden kløvet, forøvrigt heelt; Kronerne hvide. 7—8. ☉.

Dyrkes som Kryderurt i Kjøkkenhaver.

16. Thymus. Timiau.

804. **T. Serpyllum** L. [Fr. nov. 195] (Smalbladet T.) H. 659 (undt. var. 2 og 4); Drej. n. 603; F. D. 1165; Rchb. l. c. tab. 1266; H. N. V, 7; *T. angustifolius* Pers.

Stænglerne alsidigt haarede, regelmæssigt firekantede eller næsten trinde, *de blomsterløse* krybende og forlængede, *de blomstrende* opstigende; *Bladene* linieformet-kileformede eller omvendt-ægformede, ved Grunden randhaarede, paa begge Flader ophøiet-nervede; *Blomsterkrandsene* samlede til et Ax eller Hoved.

Kronen rød, sjeldnere hvid. 7—8. 4. (Lav, ofte tueformigt sammentrængt Halvbusk). Var. i Henseende til Bladenes Form, Beklædning o. s. v.

Paa sandige Bakker og Lyngheder: alm. paa *Bornh.*, *Møens* Klint, i det nordlige og nordøstlige *Sjæll.* samt i den vestlige og mellemste Deel af *Halvøen*. Paa *Loll.*, *Falst.*, i det sydl. og

sydvestl. *Sjæll.* ikke bemærket. (I *Fyen* forekommer den kun paa de høiere Sandbakker (12, 24). [*

805. **T. Chamædrys** [Fr. Nov. 197] (Bredbladet T.) Drej. n. 604; F. D. 2237; H. N. V, 6; T. Serpyllum vulgaris Rchb. l. c. tab. 1267, fig. 1—2.

Stænglerne alle opstigende, firekantede med 2 smalere og 2 bredere Flader, langs Kanterne haarede (og derved tilsyneladende toradet-haarede); *Bladene* ovale eller elliptiske, stilkede, paa Overfladen utydeligt nervede.

Kronen rød, sjeldnere hvid. Høiere, med større Blade end foreg. 7—8. **h.** *Var.*

α, *capitatus*! Blomsterkrandsene samlede til et Hoved eller de nedre fjerne.

β, *verticillatus*! Blomsterkrandsene adskilte, danne et langstrakt, mellembudt Ax.

Paa tørre Marker og Bakker, ved Gjærder o s. v.: hyppig i *Syd-* og *Vest-Sjæll.*, paa *Falster*, *Langeland*, i *Fyen* og paa *Halvøens* Østkyst. Paa *Loll.* sparsom (f. Ex. Grønnegade, 5); forekommer sjeldent blandet med foreg. f. Ex. *J. V. Velling* (Dr.), Kalbygaard! Ø. Nykirke! Store Andst! *Sj.* Københavns Omegn! Paa Bornh. og i de vestlige Dele af Halvøen mangler den.

† *T. vulgaris* L. (Have-T.) Rchb. l. c. tab. 1264. Stænglerne alsidigt duunhaarede; Bladene i Randen tilbagerullede, ægformede, de øvre lancetformede; Kronen hvid eller lila. 7—8. **h.**

Dyrkes alm. i Køkkenhaver som Kryderurt; vildvoxende i Syd-Europa.

17. **Acinos. Voldtimian.**

806. **A. thymoides** [Moench Meth. 407]. Thymus Acinos L., H. 660; F. D. 814 og 1822 (var.); Calamintha Acinos Benth., Rchb. l. c. tab. 1274, fig. 2; Drej. n. 605.

Stængelen fra Grunden af grenet, med opstigende *Grene*; *Bladene* ægformet-elliptiske, saugtakke; *Krandsene* adskilte; *Blomsterstilkene* enblomstrede; *Bægeret* mod Frugtmodningen foroven sammensnøret, med opadbøiede *Tænder* i Underlæben.

4—8" høi. Kronerne violette. 6—8. ☉.

Tørre Marker, Bakker og Grøftevolde, især paa Leer- og Kalkgrund, funden i alle Provindser, men sporadisk og i de fleste Egne af Landet sparsom; hyppig i Omegnen af Aalborg (Branth), i *Sj.* omkring Frederiksværk og Roeskilde! samt paa *Møens* Klint!

18. Clinopodium. Krandsbørste.

807. *C. vulgare* L. (Almindelig K.) H. 657; Drej. n. 606; F. D. 930; Calamintha Clinopodium Benth., Rechb. l. c. tab. 1274, fig. 1.

Rodstokken udsender Udløbere; *Stængelen* opret; *Bladene* ægformede, budte, fjernt og svagt saugtakkede; *Krandsene* 1—3, adskilte, den øvre endestillet; *Svøbbladene* stivhaarede, omtr. af Længde med Bægerne; *Bægerrøret* tistribet, kirtelhaaret, ved Grunden løst tilleddet til de korte Blomsterstilke og hurtigt affaldende.

1—1½' høi, haaret. Kronen mørk-rosenrød, sjeldnere hvid, udv. duunhaaret, indv. med 2 haarede Længdestriber i Røret. 7—8. 4.

I Randen af Skove og Krat, ved Gjærder, ikke sjelden; forekommer ofte i Selskab med *Origanum vulgare*, og er, ligesom denne, hyppigst i de sydlige Egne af Landet.

† *Melissa. Hjertensfryd.*

† *M. officinalis* L. (Læge-H.) Rechb. l. c. tab. 1261.

Stængelen opret; *Bladene* ægformede, afsmalnede i en Bladstilk der er kortere end Pladen, grovt saugtakkede; *Blomsterstilkene* nikkende.

1½—2' høi, mere eller mindre haaret. Kronerne hvide eller blegrøde. Planten har en behagelig, citronlignende Lugt. 7—8. 4.

Dyrkes som Kryderplante i Haver, og forekommer hist og her forvildet, f. Ex. *Loll.* Branderslev, Støkkemarke o. fl. St. (19). *

19. Brunella. Prunel.

808. *B. vulgaris* [Moench Meth. 414] (Almindelig P.) *Prunella* L., H. 663; Drej. n. 607; F. D. 910; Rechb. l. c. tab. 1223, fig. 2.

Stængelne opstigende; *Bladene* ægformede, budte, heelrandede eller tandede; *Dækbladene* nyreformede, kort tilspidsede; *Bægerets Overlæbe* svagt tretandet, *Tænderne* kort af-

stumpede, braadspidsede; *Underlæben* dybt totandet, med lancetformede Tænder; alle *Støvdragerne* med en ret, tornformet Tand i Spidsen.

Kronen blaaagtig-violet, sjeldnere rød eller hvid. 7—8. 4.

Paa Enge, i Skove o. s. v. alm.

809. **B. grandiflora** [Jacq. Fl. austr. 4, p. 40, t. 377] (Storblomstret P.) H. II, 209; F. D. 1933; Rehb. l. c. tab. 1223, fig. 4; H. N. IV, 14.

Stænglerne opstigende eller næsten oprette, *Bladene* aflang-ægformede, heelrandede eller ved Grunden tandede; *Dækbladene* nyreformede, tilspidsede; *Bægerets Overlæbe* tretandet, med triangelformede, sylformigt tilspidsede, *Underlæben* dybt totandet med lancetformede Tænder; *Støvdragerne* med en kort, puklet Udvæxt i Spidsen.

Kronen violet, dobbelt saa stor som hos foreg. 7—8. 4.

Paa Kalkbakker, sjelden: Dybdals Bakker ved Aalborg! ☞

20. *Scutellaria*. Skjolddrager.

810. **S. galericulata** L. (Blaa S.) H. 661; Drej. n. 611; F. D. 637; Rehb. l. c. tab. 1256, fig. 3.

Bladene æg-lancetformede, med hjerteformet Basis, fjernt og budt rundtakkede; *Dækbladene* omtrent af Størrelse med Stængelbladene; *Blomsterne* parvise i Bladhjørnerne, alle fjerne fra hinanden; *Bægeret* svagt og kort duunhaaret.

Kronen blaa. 7—8. 4. *Var.*

β , *hastæformis*! *Bladene* med afstumpet Basis, den nedre Tand større end de øvrige.

Paa Enge, i fugtige Skove og ved Aabredder alm.

? 811. **S. hastifolia** L. (Spydbladet S.) H. 662; F. D. 1822; Rehb. l. c. tab. 1256, fig. 1; H. N. IV, 13.

Bladene spydformede, heelrandede; *Dækbladene* mindre end Stængelbladene; *Blomsterne* parvise i de øvre Bladhjørner, dannende en ensidig Klase; *Bægeret* kirtlet-duunhaaret.

Kronen blaa eller violet. 7—8. 4.

Paa Enge og ved Grøfter. Angives fra *Sj.* Omegnen af Kjøbenhavn (Schum.), Kirkehyllinge i Hornsherred (Albrecht). Fra intet af disse Steder har jeg seet Expl.; muligviis kunde Var. af foreg., hvis Blade nærme sig Spydformen, være antaget for denne Art. ¹⁸

† *S. altissima* L. (*S. commutata* Rehb. l. c. tab. 1257, fig. 2); *Bladene* hjerteformede, dybt rundtakkede; *Blomster* i ensidige Klaser med ægformet-elliptiske *Dækblade* omtr. af det kirtelhaarede Bægers Længde; *Kronen* lysblaa med hvid Underløbe.

I Mængde paa en Høi ved Bidstrupgaard, tidligere plantet.

21. Verbena. Jernurt.

812. *V. officinalis* L. (Læge-J.) H. 638; Drej. n. 612; F. D. 528; Rehb. l. c. tab. 1292, fig. 2; H. N. 1, 19.

Bladene fjerfligede eller fjersnitdeelte (de nedre Flige størst), afsmalnede til en bred Bladstilk; *Åxene* traadformede, samlede til en Top.

1—2' høi. Blomsteraxen og Bægeret kirtelhaarede. Kronen bleg-rød eller lila. 6—9. 4.

Ved Gjærder, især i og omkring Landsbyer, sporadisk og ikke alm., men funden i alle Provindser, hyppigst paa *Loll.*, *Falst.* og *Bornh.* ²⁴

II. Angiospermia.

22. Linnæa.

813. *L. borealis* L. (Nordisk L.) F. D. 3; Rehb. ic. fl. germ. XVII, tab. 1170.

Stængelen langstrakt krybende og rodslaaende, halvbuskagtig; *Bladene* modsatte, ovale eller omvendt-ægformede, svagt saugtakkede; *Blomsterstilkene* spredte, oprette, oventil klæbrigt duunhaarede, med to sylformede *Dækblade* nedenfor de 2 hængende Blomster.

Kronerne hvide, i Svælget rødlige, vellugtende. 7—8. 12.

I Norges og Sveriges Naaleskove hyppig; i Danmark kun funden mellem Lyng i Vinding Skov ved Landeveien mellem Vedelsbo og

Salten Bro i *Jyll.* (29)! Tidligere har den sandsynligviis været funden ved Aarhus, ifølge haandskreven Angivelse ved et Expl. opbevaret i Brix's Herb. (!)

23. *Limosella*. Dyndurt.

814. *L. aquatica* L. (Liden D.) H. 684; Drej. n. 634; F. D. 69; H. N. XV, 23; Rehb. l. c. XX, tab. 1722, fig. 1.

Rodstokken med krybende *Udløbere*; *Bladene* langstilkede, lancet-spadeformede, tilligemed de enblomstrede *Blomsterstilke* knippeviis udgaaende fra *Rodstokken* og *Udløbernes* Led.

Planten glat. Kronen hvidagtigt-kjødfarvet. 7—8. ☉.

β , *minor* (L. *borealis* Læst.; L. *aquatica* β , *tenuifolia* Rehb. l. c. fig. 2—3). Ingen *Udløbere*; *Bladene* smalt linieformede; *Blomsterne* meget smaae.

Paa lerede og dyndfulde, fugtige Steder, forekommer i alle danske Provindser, men ikke alm. β , ved Bredden af en Dam S. for Hørsholms Slotshave!

24. *Linaria*. Torskemund.

a. Blomsterne i Klasse.

815. *L. vulgaris* [Mill. Dict. n. 1] (Hørbladet T.) Drej. n. 628; Rehb. l. c. XX, tab. 1685, fig. 2; Antirrhimum *Linaria* L., H. 679; F. D. 982.

Stængelen opret, med *Udløbere* fra *Rodstokken*; *Bladene* talrige, spredte, linieformede eller smalt lancetformede, heelerandede, glatte; *Klasen* tætblomstret; *Blomsterstilkene* af Bægerets Længde; *Kapselen* oval, mere end dobbelt saa lang som Bægeret, opspringende ved 4—6 Tænder i Spidsen; *Frøene* kredsrunde, fladtrykt-vingede, i Midten knudret-rue.

1—2' høi, glat; Blomsteraxen og Blomsterstilkene var. kirtelhaarede eller glatte, Kronen citronguul med orangefarvet Gane, fløielshaaret Svælg, sjeldnere heelt blegguul. 7—9. ♀.

◁ *Peloria*. Kronen regelret, med 5 Sporer, 5 Støvdragere, feilslaaende Frugtknude.

Paa tørre Marker, ved Gjærder o. s. v., alm. ◁ (en Monstrositet) Sj. ved Brøndshøj (H.); F. Holkenhavn (Lund), Skjoldemose! J. Aalborg (12), Haraldslund!

† *L. genistæfolia* Mill. l. c. n. 14; Rchb. l. c. tab. 1686, fig. 1.

Stængelen opret; *Bladene* spredte, lancetformede, heelrandede, tilspidsede, stive, blaa-graae; *Blomsterstanden* en af fjernblomstrede Klaser sammensat Top; *Blomsterstilkene* kortere end Bægerfligene; *Frøene* trekantede med ujævne Sider.

Høiere end foreg., men med mindre Kroner (gule). 4.

Forvildet paa Gurre Slots Ruiner (Kjærskou!).

b. Blomsterne spredte i Bladhjørnerne.

816. **L. minor** [Desf. Fl. atl. 2, 46] (Liden T.) Drej. n. 627; Rchb. l. c. tab. 1682, fig. 1; H. N. XI, 21; Antirrhinum minus L., H. 680; F. D. 502.

Stængelen opret med opret-aabne Grene; *Bladene* lancetformede, bredest foroven, budte, heelrandede, de nedre modsatte, de øvre spredte; *Blomsterstilkene* 2—3 Gange længere end Bægeret; *Sporen* kortere end de uligelange, budt-liniefornede Bægerflige; *Kronens* Svælg ufuldstændigt lukket af Ganen; *Kapselen* oval, lidet kortere end Bægeret, opspringende ved 2 Tænder i Spidsen; *Frøene* aflange, furede paalangs.

4—8" høi. Hele Planten kirtelhaaret. Kronen violet med bleggul Underlæbe. 7—8. ☉.

Paa tørre Marker mellem Sæden, især paa Leer- og Kalkgrund: Sj. hist og her; paa *Moen*, *Falst.* og *Loll.* alm.; i de andre Provindser sjældnere; *J.* Drastrup, Horup Mølle (H.), Aalborg (12); *Sl.* Nordskov ved Gelting, Nyværk ved Slesvig (16); *Ærø* (10).

817. **L. spuria** [Mill. Dict. n. 15] (Rundbladet T.) Rchb. l. c. tab. 1680, fig. 2; Antirrhinum spurium L., H. 678; F. D. 913.

Stængelen fra Grunden af grenet, med nedliggende Grene, Sidegrenene fine, meget længere end Hovedstængelen; de nedre Blade modsatte, de øvre spredte, alle kreds rundt-ovale eller æg-hjerteformede, budte med en meget kort Spids, heelrandede eller svagt rundbugtet-bølgede; *Blomsterstilkene* haarede, 1—3 Gange længere end Bægeret; *Sporen* opadbøiet, spids, længere end de ægformede Bægerflige; *Kapsel* og *Frøe* som foreg.

Stængel og Blade tæthaarede, med ofte klæbrige Haar. Kronen guul, med violet Overlæbe. 7—9. ☉.

Ukrudsplante mellem Sæden, sjelden og hidtil kun bemærket paa *Lolland*: Holmegaard ved Nakskov (19)! Dannemarre (14).

818. *L. Elatine* [Mill. l. c. n. 16] (Spydbladet T.) Drej. n. 626; Rehb. l. c. tab. 1680, fig. 4; H. N. 1, 20; Antirrhinum L., H. 678; F. D. 426.

Stængelen fra Grunden af grenet, med nedliggende Grene; *Bladene* spredte, spydformede, spidse, heelrandede (paa den yngre Plante tandede); *Blomsterstilkene* glatte, traadfine, 3—4 Gange længere end Bægeret; *Sporen* tilspidset, næsten ret, længere end de lancetformede, tilspidsede *Bægerflige*; *Kapselen* kugleformet, opspringende paa Siden ved Laag; *Frøene* næsten kugleformede, nætformigt grubede.

Stængel og Blade haarede. Kronen guul, ved Grunden af Overlæben violet. 7—9. ☉.

Ukrud i Haver og paa Marker mellem Sæden, sporadisk og ikke alm.: *Bornh.* Marker ved Blykobbegaarden! Hasle, Rø (Hjorth); *Sj.* Tiisvilde (H.), Brøndshøj, Flaskekroen (Dr.), Amager ved Kastrup! mellem Valø og Billesborg, Gjorsløv i Stevns (9), Bjerre, Ørsløv, Tjæreby (Nielsen) og Rude ved Skjelskør (17), Disagergaard ved Slagelse (16), Bjernede, Gyrestinge (12); *Falst.* og *Loll.* alm.; *Ærø* (10); *Thorseng* (12); *F.* Hersnap og Dalby paa Hindsholm! Kjerteminde (Heiberg), Lunde ved Odense (18), Fraugde (16), Rødekro ved Faaborg (Riise), Horne (H.); *J.* Ødstedgaard! *Sl.* Falkenberg ved Slesvig (16). *

† 819. *L. Cymbalaria* [Mill. l. c. n. 17] (Lappet T.) Rehb. l. c. tab. 1680, fig. 1; Antirrhinum L., H. 677; F. D. 1220.

Stængelen krybende; *Bladene* nyreformede, femlappede, glatte; *Blomsterstilkene* mange Gange længere end Bægeret; *Frøene* som hos foreg.

Kronen violet med guul Gane. 6—9. 4.

Paa Mure og Steendiger omkring Haver, sjelden: *Sj.* Tømmerpladserne ved Kjøbenhavn (Møller), Havegjærder ved Roeskilde (Thomsen), Kjøge Kirkemur (12), Dronninggaard, Bagsværd (14); *Sl.* Murene af Slotshaven ved Gottorp (H.). Ikke oprindeligt indenlandsk. *

25. Antirrhinum. Løvemule.

820. **A. Orontium** L. (Langbægret L.) H. 680; Drej. n. 629; F. D. 941; Rchb. l. c. XX, tab. 1678, fig. 2.

Bladene lancetformede, heelrandede, de nedre modsatte; *Bægerfligene* linieformede, længere end Kronen og mange Gange længere end Blomsterstilkene; *Frugtknuden* kirtelhaaret.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronen rosenrød, sjeldnere hvid. 7—9. ☉.

Paa tørre Marker mellem Sæden, saavel paa Leer- som Sandgrund, bemærket i alle Provindser, men ikke alm. overalt, hyppigst paa *Bornh.*, *Loll.*, *Falst.* og de øvrige sydlige Øer. *

26. Scrophularia. Bruunrod.

a. *Venilia* Don. Blomsterne i Knipper fra Bladhjørnerne. Ingen Bistøvdragere. (Planten haaret).

821. **S. vernalis** L. (Vaar-B.) H. 682; Drej. n. 633; F. D. 411; Ceramanthe vernalis Rchb. l. c. XX, tab. 1676.

Bladene modsatte, hjerteformede, dobbelt-tandede, tilligemed Stængelen og Bladstilkene klæbrigt-kirtelhaarede; *Knipperne* 3—7-blomstrede; *Bægerfligene* omvendt-ægformet-lancetformede, budte, uden hindeagtig Rand, i Spidsen tilbagebøiede.

1—2' høi. Kronen grøngul. 5—6. ☉.

Ved Gjærder, især omkring Byer, ikke alm. *Sj.* Classens Have, Frederiksberg Have tilvenstre fra Indgangen (H.)! Roeskilde alm.! Sorø! Kongsdal (16), Frydendal! Knapstrup (15), Holsteinborg (Nielsen); *F.* Maalø paa Hindsholm (12), Hverringe (Rafn), Odense (H.); *Sl.* Nyværk og Værtshuset Berlin ved Slesvig (16). *

b. *Scorodonia* Don. Blomsterne i endestillet Klase eller Top, dannet af Qvaster fra de øvre Bladhjørner. En gold Støvdrager befæstet til Overlæben. (Planten glat.)

822. **S. aquatica** L. (Vand-B.) H. 682; Drej. n. 632; F. D. 507; H. N. XIV, 19; S. Ehrharti Steven., Koch Syn. II, 593; E. Bot. Suppl. t. 2875; S. alata Gil., Rchb. l. c. tab. 1672, fig. 1.

Rodstokken krybende; *Stængelen* firekantet, tilligemed *Blad-*

stilkene bredvinget; *Bladene* modsatte, ægformet-elliptiske, de nedre æg-hjerteformede, saugtakkede, de nedre Takker mindst; *Qvasterne* 7—9-blomstrede; *Bægerfligene* budte med en bred hindeagtig Rand; *Bistøvdrageren* omvendt-nyreformet, svagt ud-randet; *Kapselen* budt, med vedblivende *Griffel*.

2—4' høi. Kronen mørk rødbrun. 6—9. 7.

Ved Kildevæld, Aaer og Bække, hist og her: i *Sjæll.* ikke alm., hyppigere i *Fyen* og paa de *sydlige Øer*. 7

Anm. *S. Balbisii* Horn. (*S. aquatica* Bab. Man. p. 233), som adskilles ved bredere, mere rundtakkede Blade, *Bistøvdrageren* rundagtig-nyreformet, ikke udrandet, *Kapselen* spids-ægformet, kunde muligviis ved nøiere Undersøgelse ogsaa findes i vor Flora. (Den maa søges paa lignende Steder som foreg.).

823. *S. nodosa* L. (Knollet B.) H. 681; Drej. n. 631; F. D. 1167; Rehb. l. c. tab. 1674.

Rodstokken knolleformigt opsvulmet, beklædt med tandformede Skjæl; *Stængelen* firekantet, uvinget (hos større Expl. smalvinget); *Bladene* modsatte, ægformede eller æg-hjerteformede, dobbelt tandet-saugtakkede, de nedre Tænder størst; *Qvasterne* som hos foreg., *Bægerfligene* ægformede, budte, med en smal hindeagtig Rand; *Bistøvdrageren* omvendt-hjerteformet-spadeformet, udrandet; *Kapselen* ægformet, spids.

1½—3' høi. Blomsterstilkene violet kirtelhaarede. Kronen mørk olivengrøn, Overlæben mørkbrun. 6—8. 7.

I Skove og Krat, ved Gjærder o. s. v. ikke sjelden.

27. Digitalis. Fingerbølle.

824. *D. purpurea* L. (Rød F.) H. 683; Drej. n. 630; F. D. 74; Rehb. l. c. XX, tab. 1688; H. N. X, 18.

Stængelen opret; *Bladene* spredte, æg-lancetformede, tandet-rundtakkede, paa Underfladen nætformigt aarede og tilligemed Stængel og Bladstilke fiint graafilte, *Blomsterne* i ensidig Klase; *Bægerfligene* ægformede.

2—3' høi. Kronen rosenrød, sjældnere hvid, indvendig mørkrødpunkteret. 6—8. ☉.

I Skove: *Sj.* paa Øerne i Gurre Sø (11), Krogerup Skov (9), Søllerød (Petersen); *J.* Thorstedlund Skov (Branth), Bjørnsholm (8),

Steenalt Skov (3), Serritslevgaard (Jørg.), Donneruplund! Kjærgaard Skov ved Ribe (H.); *Sl.* Gram (1), Sønderbrarup (Esmarch). (Paa flere af disse Steder og andetsteds forvildet, især omkring Haver, hvor den dyrkes som Siirplante).

† *Mimulus. Abeblomst.*

† 825. *M. luteus* L. (Guul A.) Bot. Mag. tab. 1501.

Stængelen opret eller ved Grunden opstigende, *Bladene* modsatte, kredsrunder-ovale, bugtet-tandede, de nedre stilkede, de øvre siddende og halvt omfattende; *Blomsterne* modsatte i de øvre Bladbjørner; danne en kort Klase; *Kronen* dobbelt saa lang som Bægeret, guul med større eller mindre Pletter i Svælget.

1—1½' høi. Forneden glat, foroven ofte duunhaaret. 6—7. 4.

Oprindelig fra det vestlige Amerika, dyrkes i forskjellige Former paa fugtig Grund i Haver. Forekommer forvildet i stor Mængde langs Nordbredden af Viborg Sø, N. Vosborg! Bæk ved Vestervig i Thy (Andresen)! *F.* Skaarup; *Loll.* Nakskov (19).

28. Pedicularis. Troidurt.

a. *Kronen* gabende; *Kapselen* skjævt ægformet, fladtrykt.

826. *P. palustris* L. (Eng-T.) H. 671; Drej. n. 525; F. D. 2055; Rehb. l. c. XX, tab. 1749, fig. 2.

Stængelen opret, fra Grunden af grenet; *Bladene* fjersnit-deelte med halvfinnet-lappede Afsnit, *Lapperne* rundtakkede; *Bægeret* tolæbet, med lappede, kruset-tandede Læber; *Kronens* Over- og Underlæbe ligelange, *Overlæben* seglformigt krummet, med et kort Næb og paa hver Side af dette en sylformet Tand.

1—1½' høi. *Kronen* rosenrød eller kjødfarvet. 5—7. ☉ eller ☺.

I fugtige Enge, Tørvmoser og Kjær alm. udbredt.

827. *P. silvatica* L. (Skov-T.) H. 672; Drej. n. 624; F. D. 225; Rehb. l. c. tab. 1749, fig. 1 og 1826, fig. 3—5.

Stænglerne flere, de sidestillede opstigende eller nedliggende, den midterste kort, opret, med faa Blomster næsten fra

Grunden af; *Bladene* som hos foreg.; *Bægeret* femtandet, *Tænderne* oventil bladagtige, tandede; *Kronen* som hos foreg., men med længere Rør, Underlæben kortere end Overlæben.

Stænglerne 3—6" høje; Rodbladene rosettestillede, lappede eller næsten hele, tidligt henvisnende. Kronen rosenrød. 5—7. 4. (☉?)

I Hedemoser, fugtige Kratskove o. s. v., ikke saa alm. som foreg., hyppigst i Nordsjælland og paa Halvøen, mangler i enkelte Egne af Landet, f. Ex. paa Lolland-Falster.

b. Kronen lukket af de sammensluttende Læber, Kapselen næsten kugleformet.

828. **P. Sceptrum carolinum** L. (Storblomstret T.) H. 673; F. D. 26; Rchb. l. c. tab. 1763; *Sceptrum carolinum* Rudb., Hartm. Skand. Fl. 5 Udg. p. 64.

Stængelen opret, rank, ugrenet, faabladet; *Bladene* fjerlappede eller halvfinnede med rundtakket-lappede Flige; *Blomsterne* krandsstillede, danne et idetmindste forneden mellembrydt Ax; *Bægeret* femtandet med budte, rundtakkede Tænder; *Kronens* Overlæbe uden Næb, hætteformig bøiet, udeelt, Underlæben trelappet.

1—2' høi. Kronen stor, blegguul med Underlæbens Lapper i Spidsen røde. 7—8. 4.

I et hedeagtigt Pilekrat ved Kartoft Aa nær Skjærlund i Brande Sogn (Veile Amt) Th. Schiøtz 1861!

29. *Melampyrum*. Koføde.

(Alle Arterne i denne Slægt blive sorte ved Tørring).

a. Blomsterne alsidigt vendte.

829. **M. cristatum** L. (Firekantet K.) H. 667; Drej. n. 613; F. D. 1104; Rchb. l. c. XX, tab. 1737.

Bladene linieformede eller linie-lancetformede, heelrandede; *Dækbladene* tilspidsede, ved Grunden hjerteformede, fliget-tandede, i 4 Rader, hvorved Axet bliver firekantet.

Kronen lysrød med hvidguul Underlæbe; Dækbladene ved Grunden rødviolette. (En Form med bleggule Kroner, guul Underlæbe og grønne eller grøngule Dækblade forekommer sjældnere). 6—8. ☉.

I Skove og Krat, paa høie Enge, sporadisk, men funden i alle danske Provindser, hyppigst paa *Bornh.*, i *Fyen* og paa *Halvøens* Østkyst, i de andre Egne ikke alm.

830. *M. arvense* L. (Ager-K.) H. 668; Drej. n. 614; F. D. 911; Rchb. l. c. tab. 1736, fig. 1.

Bladene lancetformede, i Randen tilbagerullede, ved Grunden bredere, spydformigt-tandet-fligede; *Dækbladene* æg-lancetformede, spidse, halvfinnede, med sylformede *Flige*; *Åxet* kegleformigt forlænget.

Stængel og Blade korthaarede. Kronen rød med en guul Plet paa Underlæben ved Svælget, Dækbladene rosenrøde. 7—8. ☉.

Paa Agre mellem Sæden, sjeldnere i Kratskove: paa *Bornh.*, *Falst.*, *Loll.* og i *Sydsjæll.* alm., forøvrigt sjelden: *J.* Elsegaards Strand ved Ebeltoft (Ørting), Fredericia! *Sl.* Haderslev (16); *Langel.* ved Tranekjær (11); *F.* Lundsgaard mellem Nyborg og Svendborg (*F.* Lange) o. fl. St. i det sydlige (12); *Sj.* Basnæs (Nielsen), de østlige Skrænter ved Tiissø (Lund), Reersø (Dr.), Refsnæs (15), Nexelø (Baagø), Odsherred (21), Gyrstinge Skov! Amager (1). ☞

b. Blomsterne ensidige.

831. *M. nemorosum* L. (Blaatoppet K.) H. 669; Drej. n. 615; F. D. 305; Rchb. l. c. tab. 1735.

Bladene æg-lancetformede, heelrandede; *Dækbladene* ved Grunden pilformede, fliget-tandede; *Blomsterne* tætsiddende; *Bægeret* haaret med lancet-sylformede, udstaaende *Flige* af Længde med Røret, naaende Halvdelen af Kronen.

Korthaaret. Kronen guul med brandguul Underlæbe; Dækbladene blaae, sjeldnere hvide. ☉.

I Skove og Krat: paa *Halvøen* sjelden: *J.* Lundbykrat, Andruplund, Palsgaard (H.); *Sl.* Vonsbæk (7); *F.* Juelsberg Skov ved Nyborg (Heiberg); *Falst.* Vennerslund (Boye); i *Sjæll.* hist og her alm.; paa de andre Øer ikke bemærket. ☞

832. *M. pratense* L. (Almindelig K.) H. 669; Drej. n. 616; F. D. 2238; Rchb. l. c. tab. 1738.

Bladene lancetformede med bredere Basis, de øvre tilligemed *Dækbladene* ved Grunden 1—3-fliget-tandede eller heelrandede; *Blomsterne* fjernede fra hverandre, vandret udstaaende; *Bægeret* svagt duunhaaret eller glat, dets Tænder længere end

Røret, der er 2—3 Gange kortere end Kronen; *Kronens Underlæbe* lige udstaaende.

Planten næsten glat eller lidet ru. Kronen hvid med gul Underlæbe eller gul med blegguult eller hvidt Rør; Dækbladene grønne. 6—7. ☉.

I Skove og Krat, paa Lyngheder: alm. udbredt.

833. *M. silvaticum* L. (Skov-K.) H. 670; F. D. 145; Rehb. l. c. XX, tab. 1734, fig. 2.

Bladene smalt lancetformede, kortstilkede, alle heelrandede; *Dækbladene* eensdannede med *Bladene*, de øvre stundom med en enkelt Tand ved Grunden; *Blomsterne* fjerne, oprette; *Bægeret* glat, med Tænder længere end Røret og næsten af Længde med *Kronen*, hvis *Underlæbe* er nedadbøiet.

Stængelen ensidigt haaret, *Bladene* paa Overfladen rue. Kronerne gule. Dækbladene grønne. 7—8. ☉.

I Skove og Krat: paa *Halvøen* (især Østkysten) hist og her; *F.* Kratskov ved Lunde N. for Odense (4, 18)! Langeskovs Kro (16); *Sj.* Bøgholm i Bromme Skov (Lund)! *Bornh.* ved Almegaard (19), Rønne, Knudsker, Pedersker (Hjorth), mellem Rø og Gudhjem (Baagø). Paa de andre Øer ikke bemærket.

30. *Rhinanthus*. Skjaller.

834. *R. major* [Ehrh. Beitr. 6, 144] (Stor S.) *R. Crista galli* β , L. fl. Suec., H. 665; F. D. 981.

Bladene modsatte, linie-lancetformede med ægformet Basis, rundtakket-saugtaktede; de øvre *Dækblade* hjerteformet-rudeformede, saugtakket-fligede; *Axet* mangeblomstret; *Kronrøret* bøiet; *Overlæben* i Spidsen totandet, med forlængede Tænder; *Griffelen* rager udenfor *Overlæben*.

Dækblade og Bæger gulgrønne; Kronen lysgul med violette Tænder paa *Overlæben*. 5—7. ☉. Var. glat og haaret, *Bladenes* Brede forskellig. I Henseende til Frøene forekommer den hos os under 2 Former:

α , *platypterus* Fr. Mant. 3, p. 60; H. N. VII, 11; *Alectorolophus major* β , glaber Rehb. l. c. XX, tab. 1739, fig. 2; Drej. n. 618. Frøene omgivne af en bred, bindeagtig Vinge.

β , *apterus* Fr. l. c., H. N. X, 19; *A. major* α , *hirsutus*

Rchb. l. c. fig. 1; A. Reichenbachii Drej. n. 619. Frøene uvingede.

Paa Enge og Marker alm. udbredt; α , den hyppigste Form; β , især mellem Sæden, f. Ex. J. i Vendsyssel hyppig (12), Eveldrup (Drej. Herb.); Rø paa Bornh.!

835. **R. minor** [Ehrh. l. c.] (Liden S.) H. 666; F. D. 2656; H. N. VII, 12; R. Crista galli α , L. fl. Suec.; Alectorolophus minor Rchb. l. c. XX, tab. 1738; Drej. n. 617.

Bladene som foreg.; *de øvre Dækblade* hjerteformede, saugtakked-fligede; *Åxet* kort, faablomstret; *Kronrøret* ret; *Overlæbens* Tænder korte; *Griffelen* indsluttet i Overlæben; *Frøene* omgivne af en bred hindeagtig Vinge.

Dækblade og Bæger skidengrønne, violet anløbne; Kronen brungul, med hvide eller violette Tænder paa Overlæben. 5—7. ☉.

Paa lignende Steder som foreg. og ligesaa alm. udbredt.

31. Euphrasia. Øientrøst.

836. **E. officinalis** L. (Læge-Ø.) H. 667; Drej. n. 621; F. D. 1037; Rchb. l. c. XX, tab. 1731—32; Fr. S. Veg. Sc. 195; H. IX, 17.

Stængelen budtkantet; *Bladene* ægformede, paa begge Sider 4—5-tandet-fligede; *Dækbladene* hjerteformet-triangelformede, sylformigt tandede; *Kronens Svælg* haaret; *Underlæben* længere end Røret; *Overlæben* tilsidst tilbagebøiet; *Kapselen* omvendt-hjerteformet, udrandet.

Var. glat eller haaret. Kronen hvid eller lila med mørkere Striber og en gul Plet ved Grunden af Underlæben. 6—8. ☉.

Paa Enge, aabne Pladser i Skove o. s. v., alm. udbredt, forekommer paa de forskellige Voxesteder under forskellige Former uden bestemt Grændse.

* 837. **E. parviflora** [Fr. S. Veg. Sc. 195] (Smaakronet Ø.) H. N. IX, 18.

Bladene ægformede, saugtakkede, med 3—5 Takker paa hver Side; *Dækbladene* æg-hjerteformede, tilspidset-tandede; *Kronens Svælg* næsten glat; *Underlæben* af Rørets Længde, *Overlæben* tilsidst tilbagebøiet; *Kapselen* oventil afrundet, neppe udrandet.

6—8. ☉. Kronen mindre og lysere end hos foreg., var. ligesom hiin; hyppigst forekommer den graaagtig-tæthaaret. De meest udmærkede Former ere:

β , *imbricata* Lge., F. D. 2657 (*campestris* Fr.?) Axene tætblomstrede, forlængede.

γ , *curta* Fr. H. N. II, 26; Rechb. l. c. XX, tab. 1733, fig. 6. Axene korte, faablomstrede.

Paa tørre Marker og høie Enge o. s. v. ikke sjelden: β , paa Strandfællede, f. Ex. Amager Fællede! Flaskekroen! *Falst.* Bøtø Fang (Koch). γ , paa tørre Bakker.

Ann. Denne Art fortjener yderligere Opmærksomhed. Maaskee bør den ikke adskilles fra foreg., skjøndt den synes at have en analog Udviklingsrække. Formen β , forekommer mig især udmærket.

838. **E. gracilis** [Fr. Fl. hall. p. 104; mant. 3, 62] (Spæd Ø.) Drej. n. 620; H. N. II, 30.

Stængelen trind, stivt opret med tiltrykte Grene; *Bladene* ægformet-elliptiske, paa begge Sider tretakkede; *Dækbladene* ved Grunden kileformede, tilspidset-tandede; *Kronens Svælg* glat; *Underlæben* kortere end Røret, *Overlæben* opret; *Kapselen* linieformet-aflang, afstumpet.

Spæd og tyndstænglet; Kronen oftest violet, sjeldnere hvid med mørkere Striber, mindre end hos foreg. 7—9. ☉.

Lyngheder og tørre Bakker, alm. i Halvøens Hedeegne og paa *Bornh.*; paa de andre Øer sporadisk.

32. Odontites. Rødtop.

839. **O. littoralis** [Fr. S. Veg. Sc. p. 196] (Strand-R.) H. N. XII, 37; O. verna Drej. n. 622; Bartsia *Odontites* β , *littoralis* Rechb. l. c. XX, tab. 1727, fig. 2.

Stængelen udeelt eller faagrenet; *Bladene* æg-lancetformede, budte, rundtakkede; *de nedre Dækblade* længere end Kronen; *Kapselen* længere end Bægeret.

Bladene kjødfulde; Kronen smukt rød, udvendig dunet, større og mørkere end hos følg. 6—7. ☉.

Paa Strandenge: i enkelte Egne ikke sjelden, f. Ex. langs Fjordene paa *Halvøens* Østkyst (7, 28!); Agger (Drej. Herb.), Staby ved Nissum Fjord! Nordby paa Fano (1), Amrom (20)! St. Peter i Eidersted (F. Müll.); *Sj.* alm. omkring Lammefjorden! Flaskekroen!

Vordingborg (29)! Reersø (21); *Falst.* p. fl. St. 14); *Langeland* ved Spodsbjerg (19); *F.* Hofmansgave (18)! ☞

840. **O. rubra** [Pers. Syn. 2, 150] (Mark-R.) H. N. XI, 22; *O. serotina* Drej. n. 623 (ikke Koch); *Euphrasia Odontites* L., F. D. 625; *Bartsia Odontites* Sm., H 664; *Rchb.* l. c. XX, tab. 1727, fig. 1.

Stængelen fra Grunden af grenet; *Bladene* lancetformede, med smalere Basis, spidse, fjernt saugtakkede; *Klasen* før Udspringningen i Spidsen nikkende; *Dækbladene* kortere end Kronen; *Kapselen* af Længde med eller kortere end Bægeret.

Kronen skidenrød, udv. dunet. 7—9. ☉.

β, *pallida*. Kronen hvid, ved Tørring blegrød.

Paa Kornagre mellem Sæden, i Landsbyer ved Gadekjær o. s. v. alm. udbredt; *β*, meget hyppig i Egnen mellem Kolding og Aabenraa (hvor jeg ikke har bemærket den rød blomstrede Form)! Angel (16).

33. *Lathraea*. Skjælrod.

841. **L. Squamaria** L. (Bruun S.) H. 670; Drej. n. 635; F. D. 136; *Rchb.* l. c. XX, tab. 1764.

Rodstokken beklædt med tykke, tandformede, taglagte *Skjæl*, (underjordiske Blade); *Skafte* bladløst eller med faae, ligesom *Dækbladene*, hindeagtig-skjælformede Blade; *Blomsterne* i ensidig Klase; *Kronens* Overlæbe udeelt.

Hele Planten rødlig, ved Tørring sort. Overlæben rosenrød, Underlæben hvid. 4—5. ♀.

I Skove (Snylteplante paa Trærødder), funden i alle danske Provindser, men sporadisk og ikke alm.

34. *Orobancha*. Gyvelqvæler.

842. **O. major** L. (Stor G.) Fr. Mant. 3, 57; H. N. XII, 35; *O. elatior* Sutton, H. 685; Drej. n. 636; F. D. 1338; *Rchb.* l. c. XX, tab. 1794; *O. stigmatodes* Wimm., Koch Syn. II, 616. (?)

Bægeret indtil nedenfor Midten tokløvet, med omtrent regelm. tvedeelte Flige, af Længde med det svagt bøiede *Kronrør*; *Kronens* Læber parallelle, *Overlæben* tolappet, rund-

takket-kruset, *Underlæben* tretandet; *Støvtraadene* befæstede lidet nedenfor Midten af Kronrøret, i den nedre Halvdeel kirtelhaarede indadtil; *Griffelen* opstigende, svagt haaret; *Arret* tolappet, med kugleformede, glatte Lapper.

1—4' høi, med tæt skjældækt, forneden meget tykt Skaft. Kronen rødviollet, udvendig kirtelhaaret, *Arret* violet. ☉.

Snyltende paa Rødderne af *Centaurea Jacea* og *Scabiosa*, sjelden: *Sj.* mellem Brøndshøj og Søborghuus (Dr.)! Høie ved Bidstrupgaard (4)! Alindelille (27), Skjelskør (Nielsen), Borreby (Ehrenr.); *Samsø* (28); *J.* Gudumlund (16).

843. **O. Cirsii** [Fr. Mant. 3, 58] (Tidsel-G.) H. N. XI, 24; Rchb. l. c. tab. 1832.

Dækbladene lidet længere end Kronen, de øvre danne en Dusk i Spidsen af Axet; *Bægeret* indtil Grunden deelt i 2, til nedenfor Midten tokløvede Flige med uligelange, tilspidsede Tænder, neppe saa lange som det bueformigt bøiede Kronrør; *Kronen* duunhaaret, gabende, med rundtakket eller svagt udrandet *Overlæbe*, *Underlæben* tilbagebøiet, trelappet med rundtakke Lapper; *Støvtraadene* glatte, befæstede nær Grunden af Kronrøret; *Griffelen* i Spidsen bøiet, kun under det tolappede *Ar* svagt kirtelhaaret, forøvrigt glat.

1—2' høi. Axet mindre tætblomstret end hos foreg. Kronen brunagtig med skidenguul *Underlæbe*, *Arret* violet. 8. ☉.

Snylteplante paa *Cirsium oleraceum* ved Hobro (Landinsp. J. Mørch).

Anm. Den her i Landet fundne Plante afviger fra Beskrivelsen hos Fries (l. c.) ved rundtakket (ikke todeelt) *Overlæbe*, men er forøvrigt neppe forskjellig fra den svenske Art. Den citerede Fig. hos Reichenbach ligner ikke meget vor Plante.

844. **O. minor** [Sutton Trans. linn. soc. 4, p. 179] (Liden G.) H. 686; Fr. Mant. 3, 59; F. D. 1219; Rchb. l. c. tab. 1804.

Bægeret indtil Grunden deelt i 2, fra en ægformet Basis pludseligt sylspidsede og omtrent til Midten uregelm. tokløvede Flige, omtrent af Længde med det svagt bøiede *Kronrør*; *Kronens Overlæbe* utydeligt tolappet, fremstaaende, *Underlæben* nedbøiet, med afrundede, ligedannede Lapper, begge Læberne aarede, bølget-rundtakke; *Støvtraadene* befæstede nedenfor Midten af Kronrøret, foroven glatte, forneden haarede indadtil;

Støvknapperne glatte; *Griffelen* bøiet, svagt haaret; *Arret* to-lappet, med frastaaende Lapper.

4—10" høi. Spædere og med mere faablomstret Ax end de to foreg. Kronen skidenguul, Arret rødt.

Snylteplante, sjelden: *F.* Juelsberg Skov (4), Moderplanten ikke angivet.

845. *O. Picridis* [Vauch. Monogr. 60, 6. 12] (Bittermælks-G.) *Rchb.* l. c. XX, tab. 1796.

Bægeret dybt tvedeelt, med lancetformede, hele eller uregelm. tokløvede Flige, af Længde med eller længere end det svagt bøiede *Kronrør*; Kronens Overlæbe udeelt, med foroven tilbage-rullet Rand, *Støvknapperne* i Spidsen haarede, forøvrigt som foreg. men alm. høiere af Væxt.

Snylteplante paa *Picris hieracioides*; her i Landet kun fundet paa Faxø Kalkbakker (23)!

Ann. De her fundne Expl. ere meget mindre end den i Syd-europa forekommende Form, saaledes som den er afbildet hos *Rchb.* Jeg har tidligere henført den til *O. minor*, men er dog dels paa Grund af enkelte Characterer, dels paa Grund af Voxestedet, tilbøielig til at antage dem for henhørende til *O. Picridis*. Undersøgelsen af disse Arter efter tørrede Exemplarer er forøvrigt meget vanskelig.

15^{de} Klasse. *Tetradynamia* (Firemægtige).

Hele denne Klasse hører til *N. F. Cruciferae*: Bæger og Krone (oftest regelm.) firebladede, Frugten en Skulpe, som alm. springer op ved 2 Klapper, der løsne sig franeden og efterlade en hindeagtig Skille-væg (de vægstillede og indbyrdes sammenvoxne Frøstole), til hvilken Frøene ere befæstede i 2 Rækker paa hver Side. Vægsømmene staae ligefor Axen, Rygsømmene tilhøire og venstre for samme. (De fleste udmærke sig ved skarp Smag).

1. Orden. *Siliculosa* (Kortskulpede).

A. Skulpen uopspringende,

a. smalt vægget (Skillevæggene ∴ Afstanden mellem Vægsømmene, smalere end Afstanden mellem Rygsømmene).

1. *Senebiéra* Pers. Skulpen nyreformet eller udrandet,

med større Brede end Længde, torummet, Rummene uvingede, enfrøede. (Kronbladene hvide). °0*)

† 2. **Isatis** L. Skulpen flad, omvendt-ægformet, vinget, enrummet, 1—2-frøet. (Kronbladene gule). °0

b. Skulpen bredvægget eller trind (Skillevæggen bredere end eller af samme Brede som Afstanden mellem Rygsømmene),

aa. *bestaaende af 1 Led (Blomsterne gule).*

3. **Neslia** Desv. Skulpen kugleformet, enrummet, enfrøet. °0

4. **Bunias** L. Skulpen ægformet-aflang, torummet med en skjæv Skillevæg, Rummene enfrøede. °∞

bb. *Skulpen deelt paatværs i 2 Led (Blomsterne røde eller hvide).*

5. **Cakile** Tournef. Skulpen aflang; Rummene enfrøede, det øvre fladtrykt-firekantet, pilformet. °∞

6. **Crambe** L. Skulpens øvre Led kugleformet, enfrøet, det nedre lidet, tomt; Støvtraadene af de længere Støvdragere i Spidsen 2—3-tandede (3: 1—2 Tænder foruden det forlængede Knapbaand). ∞»

B. Skulpen opspringende,

a. *smalvægget.*

aa. *Rummene 1—2-frøede.*

7. **Teesdalia** R. Br. Støvtraadene med Tilhængsler ved Grunden; Skulpen vinget; Rummene tofrøede. °∞

8. **Lepidium** L. (part.) Støvtraadene uden Tilhængsler; Skulpen alm. vinget; Rummene enfrøede. °0

*) De efter Slægtsbeskrivelserne vedføjede Tegn, som angive Forskjelligheder i Henseende til Frøbladene og Rodspidsens gjen-sidige Stilling, ere forklarede i den foran i Bogen meddeelte Oversigt over de naturlige Familier (Fam. Cruciferæ), hvortil her henvises.

bb. Rummene fleerfrøede.

9. **Thlaspi** L. (part.) Skulpen kredsround-oval, dybt udrandet, vinget. $\circ\ominus$

10. **Capsella** Medic. Skulpen omvendt-hjerteformet-triangelformet, uvinget. $\circ 0$

*b. Skulpen bredvægget eller trind,**aa. dens Klapper forsynede med Rygnerve.*

11. **Camelina** Crantz. Skulpen pæreformet med hvælvede Klapper; Griffelen ved Frugtmodningen todelelig, affaldende med Klapperne. (Kronbladene gule). $\circ 0$

12. **Cochlearia** L. Skulpen elliptisk eller ægformet-kugleformet med hvælvede Klapper og fremstaaende Midtnerve; Griffelen ved Frugtmodningen udeelt, tilvoxet til Skillevæggen. (Kronbladene hvide). $\circ\ominus$

13. **Draba** L. Skulpen elliptisk eller omvendt-ægformet, fladtrykt med svagt hvælvede Klapper og ikke fremstaaende Midtnerve; Griffelen 0. (Kronbladene hvide). $\circ\ominus$

bb. Klapperne uden Rygnerve.

α. Støvdragerne med tand- eller vingeformede Tilhængsler ved Grunden.

14. **Alýssum** L. (part.) Kronbladene hele; Skulpen rundagtig, med 1—4-frøede Rum. (De kortere Støvdragere med børsteformede Tænder ved Grunden). $\circ\ominus$

15. **Bertéroa** DC. Kronbladene tokløvede; Skulpen oval, med 6-fleerfrøede Rum. (De længere Støvdragere ved Grunden vingede). $\circ\ominus$

β. Støvdragerne uden Tilhængsler.

16. **Subulária** L. Bægerbladene ved Grunden lige (ikke puklede); Skulpen oval, hvælvet, Klapperne budt kjølformede; Frøstrængene frie. \gg

17. **Lunária** L. De 2 Bægerblade ved Grunden sækformigt udvidede; Skulpen oval-kredsround eller elliptisk, fladtrykt; Frøstrængene tilvoxne til Skillevæggen. $\circ\ominus$

18. *Nastúrtium* R. Br. (Fr.) Bægerbladene ved Grunden lige; Skulpen linieformet, elliptisk eller kugleformet, Klapperne hvælvede; Frøstrængene frie. ◐

2. Orden. *Siliquosa* (Langskulpede).

A. Skulpen uopspringende eller deelt paatværs.

19. *Ráphanus* L. Skulpen ved Tværskillevægge afdeelt til en mangenervet Ledskulpe, dannet af en forlænget Griffel; Skulpens Klapper meget smaae (eller 0), ved Frugtmodningen alm. utydelige*); Frøbladene omvendt-nyreformede, dybt udrandede. ☞

B. Skulpen opspringende paalangs.

a. Arret tofliget, med oprette, i Spidsen sammenstødende Flige.

20. *Hesperis* L. Skulpens Klapper ennervede; Frøene i een lige Linie; Frøbladene hele. ◐

b. Arret udeelt eller tolappet, med budte, frastaaende Lapper.

aa. *Skulpens Klapper nerveløse.*

21. *Dentária* L. Skulpen fladtrykt med elastisk tilbagerullede Klapper; Frøstrængene brede; Frøene i een lige Linie; Frøbladene hele, foldede. ◐

22. *Cardamine* L. Skulpen fladtrykt, med elastisk tilbagerullede Klapper; Frøstrængene traadformede; Frøene i een lige Linie; Frøbladene hele, flade. ◐

Nasturtium. Skulpen hvælvet (15, 1).

*) Den her meddeelte Berigtigelse til Slægtsmærkerne for *Raphanus* (ifølge hvilken Skulpens frøbærende Deel hidrører fra Griffelen, hvorimod dens Klapper, skjøndt de ikke indslutte Frøe, men ere meget smaae under Blomstringen og oftest ukjendelige under Frugtmodningen, dog ere byggede aldeles som Klapperne hos de øvrige Korsblomstrede) skylder jeg Hr. Docent Didrichsens skarpe Blik og velvillige Meddelelse. Dette Exempel er ikke enestaaende i Familien, hvorfor Slægterne med uopspringende Skulper maa nærmere iagttages.

*bb. Skulpens Klapper ennervede.**a. Griffelen kort.*

aa. De 2 Rækker af Frøe paa hver Side af Skillevæggen ordnede i een lige Linie.

23. **Erysimum** L. (part.) Skulpen firekantet; Frøene aflange, jævne, Frøbladene hele. (Kronbladene gule). 00

24. **Barbaréa** R. Br. Skulpen tveægget eller firekantet; Frøene fladtrykte, nætformigt-punkterede; Frøbladene hele. (Kronbladene gule). 00

25. **Arabis** L. Skulpen fladtrykt-hvælvet; Frøene aflange eller ovale; Frøbladene hele. (Kronbladene hvide eller rød-lige). 00 *)

ββ. Frøene paa hver Side af Skillevæggen i 2 Rader.

26. **Turritis** L. Skulpen tveægget-fladtrykt; Frøene smaae, fladtrykte, Frøbladene hele. (Kronbladene hvide). 00

† **Diplotaxis** DC. Skulpen fladtrykt, med convexe Klapper; Frøene større, aflange, jævne; Frøbladene rundagtige, svagt udrandede. (Kronbladene gule). 00

β. Griffelen forlænget.

27. **Brassica** L. Skulpen trind; Frøene kuglerunde, jævne eller fint punkterede, ordnede i een lige Linie; Frøbladene omvendt-hjerteformede, dybt udrandede. (Kronbladene gule). 00

cc. Skulpens Klapper 3—5-nervede.

28. **Sinapis** L. Skulpen trind, med forlænget Griffel; Frøene kuglerunde, i een lige Linie; Frøbladene omvendt-hjerteformede, dybt udrandede. (Kronbladene gule). 00

29. **Sisymbrium** L. (part.) Skulpen trind eller fladtrykt-tveægget, med kort eller ingen Griffel; Frøene i een lige Linie, aflange, fint punkterede; Frøbladene hele. (Kronbladene gule). 00

30. **Alliaria** Andr. Skulpen firekantet med kort Griffel; Frøene i een lige Linie, aflange, stribede paalangs; Frøbladene hele. (Kronbladene hvide). 00

*) Hos *Arabis Thaliana*, som ifølge ennervede Klapper og øvrige Kjendetegn hører til denne Slægt, er Kimen oftest 00.

I. Siliculosa.

1. Senebiera. Ravnefod.

846. **S. Coronopus** [Poir. Enc. 7, 76] (Liggende R.) Drej. n. 641; Rehb. ic. fl. germ. II, fig. 4210; Cochlearia L., F. D. 202; Coronopus Ruellii Gärtn., H. 707.

Mangestænglet, med nedliggende, til Jorden tiltrykte *Stængler*; *Bladene* enkelt eller dobbelt fjersnitdeelte med linieformede Afsnit; *Blomsterstanden* klaseformet, kortere end *Bladene*; *Skulperne* nyreformede, tilspidsede af den vedblivende *Griffel*, nætformigt rynkede, i Randen straaleformigt stribede og takkede.

Stænglerne 2—6" lange. Kronbladene hvide. 7—8. ☉.

Ved Strandbredder, paa Byggepladser, Gader og lignende Steder: ikke sjelden i Marskegnene paa Slesvigs Vestkyst (16); fra *Jyll.* og *F.* ere ingen Voxesteder mig bekendte, i de øvrige Provindser sporadisk: *Sj.* Finderup Præstegaard! Sorø Gader! Nørrefælle v. Kbhvn! Tømmerpladserne paa Christianshavn (Dr.), Amager Fælle, Kastrup! *Nyord* (9); *Falst.* p. fl. St. (14); *Loll.* v. Keirup og Taars pr. Sækkjøbing, Holmegaard, Aunede (19); *Bornh.* alm.! Christiansø; *Femern* (H.).

† 2. Isatis. Vaid.

† 847. **I. tinctoria** L. (Farve-V.) Rehb. l. c. fig. 4177.

Stængelen opret, foroven halvskjærmformigt grenet; de nedre *Blade* lancetformede, fjernt tandede, Stængelbladene lancetformede, heelrandede, ved Grunden piilformigt omfattende; *Blomsterstilkene* traadfine, tykkere foroven, tilsidst nikkende; *Kronbladene* dobbelt saa lange som Bægerbladene; *Skulperne* jævne, 4—5 Gange saa lange som brede, med i Spidsen sammenflydende Vinger.

1½—3' høi; blaa grøn. Kronbladene gule. 6—7. ☉.

Bornh. N. for Bobbeaens Udløb (Hoff)! formodenlig indvandret.

3. Neslia. Rundskulpe.

848. **N. paniculata** [Desv. Journ. bot. 3, 162] (Topblomstret R.) Drej. n. 656; Rehb. l. c. fig. 4291; H. N. XV, 36; Myagrum L., F. D. 204; Rapistrum Gärtn., H. 692.

Stængelen opret, mangebladet; *Bladene* lancetformede med piilformet, halvt-omfattende Basis, heelrandede eller utydeligt tandede, korthaaret-rue; *Blomsterne* i enkelte eller til en Top samlede Klaser*); *Blomsterstilkene* fine, udstaaende; *Skulpen* nætformigt rynket.

$1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}'$ høi. Kronbladene gule. 6—7. ☉.

Ukrud mellem Kornet: paa *Bornh.*, *Møen*, *Falst.*, *Loll.* og *Sydsjæll.* alm., i de andre Egne sporadisk (Fra Jyll. har jeg ikke seet Expl.). ¹³

4. *Bunias*. Takkeklap.

† 849. *B. orientalis* L. (Orientalsk T.) H. 710; Drej. p. 216; F. D. 1651; L. Herb. IV, 79; Lælia Desv., Rchb. l. c. fig. 4162.

De nedre Blade lyreformet-høvlformede, *de øvre* lancetformede, tandede; *Blomsterne* i en enkelt eller flere til en Top samlede Klaser, med opret-aabne *Blomsterstilke*; *Skulperne* skjævt ægformede, knudret-tandede, med vedblivende *Griffel*.

2—4' høi. Bladene var i Indskjæring. Kronbladene gule. 6—8. 4.

Paa Græsmarker omkring beboede Steder, oprindelig indført fra Rusland, men nu paa enkelte Steder alm., da den udbreder sig meget stærkt, f. Ex. *Sj.* Humlebæk (1), Fredensborg (Weilbach), Bastionerne mellem Ø. og N. Port ved København! *F.* Rødkilde! Svendborg (H.)! Gudme (19); *J.* Horsens (13), Kolding (28); *Sl.* Haderslev (Grønlund), Flensborg (Stisgaard). ¹⁴

5. *Cakile*. Strandsennep.

850. *C. maritima* [Scop. Fl. carn. 2, 35] (Tykbladet S.) H. 709; Drej. n. 637; F. D. 1168; Rchb. l. c. fig. 4158; H. N. III, 19; *Bunias Cakile* L.

Bladene fjersnitdeelte, med linieformede, budte, rendede, tandede Afsnit; *Blomsterstilkene* korte, tykke, udspærrede.

Bladene kødfulde, glatte. Kronbladene lysrøde, sjeldnere hvide, i Spidsen afrundede. 7—9. ☉.

*) Klasen er, ligesom hos de fleste Arter i denne Klasse, før Blomstringen halvskjærmformigt sammentrængt.

β, *integrifolia* Hornem. F. D. 1583. Bladene omvendt-ægformede, uregelret-budttandede eller rundtakket-lappede.

Ved Strandbredder paa den sandige Havstok, alm. udbredt. *β*, J. Lemvig, Staby ved Nissum Fjord! mellem Ribe og Kjærgaard (H.), Sønderho paa Fanø (14); Sl. Høier (Kph.), St. Peter og Ording i Eidersted (F. Müll.).

Ann. Formen *β* er maaskee en egen Art, og maa derfor nærmere undersøges. Muligviis hører den til *C. monosperma* Lge. (descr. ic. ill. tab. 7) som udmærker sig ved fjerlappede Blade, Skulpens øvre Led ved Grunden afrundet (ikke pilformet), det nedre Led goldt, udrandede (oftest hvide) Kronblade.

6. Crambe. Kløftnaal.

851. *C. maritima* L. (Strandkaal) H. 710; Drej. n. 638; F. D. 316; Rehb. l. c. fig. 4164.

Bladene bugtet-fjerlappede med uregelret bølget-tandede Lapper; *Blomsterstilkene* opret-aabne, forlængede; *Arret* siddende.

2' høi. Hele Planten blaadugget, kødfuld, glat. Kronbladene hvide. 6—7. 4.

Paa den sandige Havstok, bemærket i alle Provindser (undt. Bornh.), hyppigst ved Kysterne af Østersøen og paa enkelte Steder i Mængde, f. Ex. Veirø ved Samsø (H.), Seierø (21), Sprogø! Ærø (H.).

7. Teesdalia. Flipkrave.

852. *T. nudicaulis* [R. Br. H. Kew. ed. 2, 83] (Nøgenstænglet F.) Drej. n. 639; Rehb. l. c. fig. 4189; H. N. 1, 31; Iberis L., H. 707; F. D. 323.

Bladene rosetteformigt samlede ved Grunden, lyreformet-fjersnitdeelte; *Stænglerne* (alm.) flere, den midterste opret, bladløs, *Sidestænglerne* opstigende, med smaae, lancetformede Blade; *Kronbladene* uligestore, *Skulpen* oval-kredsformet, udrandet.

1—4" høi. Kronbladene hvide. 4—6. ☉.

Paa høie og tørre, især sandige Marker alm., sjeldnere paa Lolland-Falster end i de øvrige Egne.

8. Lepidium. Karse.

a. Skulpen vinget, udrandet.

aa. *Blomsterstilkene* ved Frugtmodningen tiltrykte. *Frøbladene* trelappede.

853. *L. sativum* L. (Have-K.) H. 699; Drej. p. 217; F. D. 1761; Rehb. l. c. fig. 4212.

Bladene enkelt eller dobbelt fjersnitdeelte, de nedre med tandet-lappede, de øvre med udeelte, linieformede Afsnit; *Skulperne* ovale, overalt vingede; *Griffelen* meget kort.

Planten glat. Stængelen ofte overtrukken med en blaa Dug. Blomsterne smaae, Kronbladene hvide. Bladene have en behagelig skarp Smag. 6—7. ☉.

Ukrud mellem Sæden, især Hørsæd, f. Ex. ved Kolding (28), Rantrum og Ostenfeld ved Husum (F. Müll.), Eidersted, Sandklitterne paa Romø (16)! *Bornh.* Fævagten ved Rønne (Baagøe). Forekommer desuden som forvildet omkring Haver, hvor den dyrkes som Salat-plante. ☼

bb. Blomsterstilkene ved Frugtmodningen udstaaende. Frøbladene hele.

854. *L. ruderales* L. (Stinkende K.) H. 700; Drej. n. 643; F. D. 184; Rchb. l. c. fig. 4215.

Rodbladene fjerlappede, tidligt affaldende, de nedre Stængelblade fjersnitdeelte, de øvre udeelte, linieformede; *Kronblade* oftest 0; *Støvdragere* 2; *Skulperne* kreds rundt-ovale, i Spidsen smalvingede; *Griffelen* utydelig.

Planten glat, meget grenet, ubehageligt og stærkt lugtende. 6—8. ☉.

Omkring Byer, især Kjøbstæder, paa Byggepladser, ved Mure, funden i alle Provindser sporadisk, i enkelte Egne hyppig, f. Ex. *Sl.* paa Digerne i Marsken, i det sydl. *Loll.*, *Sj.* omkring Kbhvn.

855. *L. campestre* [R. Br. H. Kew. ed. 2, IV, 465] (Salomons Lysestage) Drej. n. 642; Rchb. l. c. fig. 4214; *Thlaspi* L., H. 701; F. D. 1221.

Rodbladene snart henvisnende, heelrandede eller bugtet-fjerlappede, omvendt-ægformede eller ovale, stilkede, *Stængelbladene* tandede, pilformede, omfattende; *Blomsterstilkene* stive, vandret udspærrede eller nedbøiede; *Skulperne* ægformede, i Spidsen bredvingede, vablet-punkterede; *Griffelen* kort.

Hele Planten graaagtig-duunhaaret, stivt opret, $\frac{1}{2}$ —1' høj, enkelt eller alm. i Spidsen grenet; Blomsterne smaae, Kronbladene hvide. 6—7. ☉.

Paa dyrkede Marker og ved Gjærder, paa Leer- eller Kalkgrund; paa *Øerne* i de fleste Egne alm., sjeldnere paa *Halvøen*, især mod S. og V.

b. Skulpen uvinget, ikke udrandet.

856. **L. latifolium** L. (Bredbladet K.) H. 699; Drej. n. 644; F. D. 557; Rehb. l. c. fig. 4219; H. N. IX, 24.

Bladene saugtakkede, glatte, de nedre ægformede eller elliptiske, langstilkede, de øvre æg-lancetformede, kortstilkede; *Blomsterne* i Top med tætblomstrede Grene og haarfine *Blomsterstilke*; *Skulperne* ovale, duunhaarede, *Arret* siddende.

Omtrent 2' høi. Blomsterne meget smaae, Kronbladene hvide. 7—8. 4.

Ved Strandbredder i leret Marskbund: paa Øerne fra *Moen* til *Æro* ikke sjelden, i de andre Egne sparsom: *Sj.* Elhorn i Roeskilde Fjord (Kyll., Schlichtkr.), Stadsgravene ved Nørreport (Nielsen) og Tømmerpladserne ved Kbhvn. (Dr.), Kastrup paa Amager! Tappernøie (H.) og Evenbro ved Præstø! *Langelands* Østkyst (19); *F.* Hofmansgave (H.), Bjørnemose (12); *J.* Varde Aaes Udløb ved Hjerting (16); *Sl.* Hoptrup (28). *

9. **Thlaspi. Pengeurt.**

857. **T. arvense** L. (Almindelig P.) H. 701; Drej. n. 640; F. D. 793; Rehb. l. c. fig. 4181.

Rodbladene omvendt-ægformede, stilkede, *Stængelbladene* elliptiske, med den piilformede Basis halvt-omfattende, tandede; *Blomsterstilkene* udspærrede eller opstigende; *Frøene* stribet-rynkede.

Hele Planten glat, $1\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronbladene hvide. 5—7. ☉.

Paa Brakmarker og mellem Sæden et alm. Ukrud.

10. **Capsella. Hyrdetaske.**

858. **C. Bursa pastoris** [Moench Meth. 271] (Almindelig H.) Drej. n. 645; Rehb. l. c. fig. 4229; Thlaspi L., H. 702; F. D. 729.

Rodbladene lyreformet-tandede, halvfinnede eller fjersnitdeelte; *Stængelbladene* lancetformede, heelrandede eller tandede, med piilformet Basis; *Blomsterstilkene* mod Frugtmodningen udspærrede.

²¹ $1\frac{1}{2}$ —1' høi, mere eller mindre duunhaaret af stjerneformede Haar.

Kronbladene hvide. 4—9. ☉. (Var. betydeligt i Henseende til Høiden, Bladenes Indskjæring o. s. v.).

Paa Marker, i Haver o. a. dyrkede Steder meget alm.

11. *Camelina*. Dodder.

859. *C. foetida* [Fr. Mant. 3, p. 70] (Hundehør) *Myagrum sativum* F. D. 1038.

Bladene lancetformede, heelrandede eller tandede, ved Grunden smalere, piilformede, duunhaarede; *Blomsterstilkene* mod Frugtmodningen slapt nedhængende; *Skulperne* omvendt-hjerteformede eller næsten kugleformede, punkterede, i Spidsen indtrykte, med kort *Griffel*.

Kronbladene bleggule. 6—8. ☉

Alm. Ukrud mellem Hør. ☞

860. *C. dentata* [Pers. Syn. 2, p. 191] (Tandbladet D.) Fr. S. veg. Sc. p. 152; H. N. VII, 21; *C. sativa dentata* H. 691.

Bladene halvfinnede eller tandede, næsten glatte; *Blomsterstilkene* mod Frugtmodningen aabent udstaaende; *Skulperne* omvendt-ægformede med en smal Rand, jævne, i Spidsen ikke udrandede; *Griffelen* længere; forøvrigt som foreg.

Kronbladene gule. Skulpens Klapper haardere end hos foreg. 6—7. ☉.

α , *pinnatifida* (*C. pinnatifida* Horn. Hort. hafn. 2, p. 598; *C. dentata* F. D. 1824; Rehb. l. c. fig. 4294). Bladene dybt halvfinnede.

β , *integrifolia* (*C. sativa* Fr. Mant. 3, p. 72; H. N. VII, 20; *C. macrocarpa* Heuff., Rehb. l. c. fig. 4294 b). Bladene heelrandede eller svagt tandede.

Forekommer som Ukrud mellem Hør og anden Vaarsæd, men sjældnere end foreg., f. Ex. α , F. Faaborg (15), Ringe; *Stryno* (12); J. Fjerritslev i V. Hanherred (Drej. Herb.), Gjeding (16), Leerbæk ved Veile (1), Fredericia (12), Kolding (28!); *Sl. Rødding* (16), Hør (Branth). β , *Sj. Tikjøb!* Marker ved Lyngby Sø! *Falst. N. Grimmestrup* (Koch), Stubbekjøbing (14); alm. paa *Bornholm!*

861. *C. silvestris* [Wallr. Sched. crit. p. 347] (Smaaskulptet D.) Fr. Mant. 3 p. 68; *C. sativa* α *silvestris* Fr. i v.

ed. 2, p. 199; *C. sativa* Rehb. l. c. fig. 4292; *Brassica campestris* F. D. 550 (tildeels, slet Fig.).

Stængelen udeelt eller faagrenet, med oprette Grene, tæt- og mangebladet; *Bladene* elliptiske eller lancetformede, ved Grunden piilformigt omfattende, fjernt og utydeligt tandede, korthaaret-rue; *Klasen* tætblomstret, *Blomsterstilkene* mod Frugtmodningen oprette; *Skulperne* pæreformede, haarede, fint punkterede, med en bred, fladtrykt Rand og længere Griffel end hos foreg.

Kronbladene gule. Høiere end de 2 foreg. Arter, men med mindre Skulper og Frøe. Formen *microcarpa* DC. (*C. microcarpa* Andr., Rehb. l. c. fig. 4293, er den hos os forekommende). 6—7. ☉.

Paa Græsmarker, hidtil kun funden paa faa Steder i Danmark: *Sj.* Marker ved Landbohøiskolen! *Falst.* S. Kirkeby, Ourupgaard (Koch)! *F.* Seden ved Odense (12).

12. Cochlearia. Kokleare.

862. *C. danica* L. (Dansk K.) H. 704; Drej. n. 648; F. D. 100; Rehb. l. c. fig. 4257; H. N. IV, 35.

Stænglerne nedliggende eller opstigende; *Rodbladene* langstilkede, hjerteformet-spydformede, *Stængelbladene* kortstilkede, æg-triangelformede eller rudeformede, 3—5-lappede; *Kronbladene* omtrent af Bægerbladernes dobbelte Længde; *Skulperne* ægformede eller ovale, med kort Griffel.

Kronbladene hvide. 5—6. ☉ (Bladene hos denne og de følg. Arter glatte, kjødfulde, af en behagelig, skarp Smag).

β, integrifolia Drej. Bladene rundagtige, heelrandede.

Ved Strandbredder i Sandet og mellem raaden Tang, ikke sjelden. *β*, med Hovedarten, f. Ex. Aalholm i Isefjorden (Nolt.).

863. *C. anglica* L. (Engelsk K.) H. 704; Drej. n. 649; F. D. 329; Rehb. l. c. fig. 4258; H. N. XIV, 31 og X, 35 (var.).

Stængelen opstigende eller opret; *Rodbladene* langstilkede, ægformet-ovale, ved Grunden afrundede; *Stængelbladene* stilk-løse, halvt-omfattende, elliptiske eller rudeformede, bugtet-tandede; *Kronbladene* omtrent af Bægerbladernes tredobbelte Længde; *Skulperne* elliptiske med middelstor Griffel.

Kronbladene hvide. Frøene omtr. dobbelt saa store som hos de andre Arter. 5—6. ☹.

Ved Strandbredder, sjeldnere end foreg. og følg., f. Ex. *Sj.* Bisserrup ved Skjelskør (Nielsen), Ourø (15), Oxholm i Isefjorden (9), Dragør (H.), Saltholm! *Moen* ved Noret (27); *Falst.* ved Grønsund, Kalvø i Guldborgsund (14), Nykjøbing (29), Tjæreby Fang (14); *Loll.* Bjerremark (5)! Saltvig (19); *Frø* ved Ourehoved (12); *F.* Svendborg (H.), Hofmansgave (18)! *J.* Estruplund (H.), Holmene i Randers Fjord (7), Horsens Fjord (Jørgens.); Kolding Fjord (28); *Sl.* Lyksborg (Hansen), Husum o. fl. St. i Marsken og paa Halligerne (N.). *

Ann. Denne Art beskrives alm. med forlænget Griffel, men hos de af mig undersøgte Expl. er Griffelen kun lidet længere end hos foreg. og følg. (omtr. $\frac{1}{6}$ af den fuldvoxne Skulpes Længde). Mellem Arterne i denne Slægt er det vanskeligt paa Papiret at drage nogen fast Grændse, og stundom synes de ogsaa i Naturen at sammenflyde, da næsten alle de angivne Kjendetegn ere Forandring underkastede (f. Ex. dyrket i bot. Have af Frø fra Saltholm viser *C. anglica* sig kun forskjellig fra *C. officinalis* ved noget større Kronblade og Frøe), men de have dog i vild Tilstand hver sit eiendommelige Udseende, og i deres typiske Former ere de meget forskellige.

864. *C. officinalis* L. (Læge-K.) H. 703; Drej. n. 650; F. D. 135; Rehb. l. c. fig. 4260; H. N. XIII, 50.

Stænglerne oprette eller opstigende; *Rodbladene* langstilkede, spydformet-nyreformede; *Stængelbladene* stilkløse, halvtomfattende (de nedre ofte kortstilkede), ægformet-elliptiske eller rudeformede, bugtet-tandede eller lappede; *Kronbladene* omtr. dobbelt saa lange som Bægerbladene; *Skulperne* oval-kugleformede, med kort *Griffel*.

Alm. høiere, men spædere, med mindre Kroner, Skulper og Frø end foreg. Kronbladene hvide. 5—6. ☹.

Ved Strandbredder, funden i alle danske Provindser, men ikke overalt alm. Meget udbredt og hyppig omkring Isefjorden!

13. *Draba*. Gjæslingblomst.

865. *D. verna* L. (Vaar-G.) H. 693; Drej. n. 646; F. D. 983; Rehb. l. c. fig. 4234; *Erophila vulgaris* DC.

Bladene rosetteformigt samlede ved Grunden, elliptiske eller lancetformede, i Spidsen tandede; *Skafterne* bladløse; *Blomsterstilkene* længere end de elliptiske *Skulper*; *Kronbladene* omtr. til Midten tokløvede.

1—6" høi. Kronbladene hvide. 3—5. ☉

β, *præcox* Stev. (Rchb. l. c. fig. 4233; H. N. IV, 34).
Skulperne ovale.

Paa tørre Marker, Grøftevolde o. s. v., meget alm.

866. **D. incana** L. (Hvidgraa G.) H. 696; F. D. 130;
Rchb. l. c. fig. 4249; H. N. V, 14.

Bladene ved Roden og paa de blomsterløse Bladknipper rosettestillede, *Stængelbladene* talrige, spredte ($\frac{2}{5}$), saugtaktede, lancetformede eller de øvre ægformede; *Blomsterstilkene* kortere end de lancetformede, tilsidst snoede Skulper; *Kronbladene* ud-randede.

4—10" høi, graaagtig af stjerneformede Haar. Kronbladene hvide. 5—6. ♀.

Paa tørre Steder, især paa Kalkgrund, kun funden i den nordlige Deel af *Jyll.*: Lerup i Ø. Hanherred (Dr.), Korsø og Blis Kalkbakker i Thy (23)! Dybdals Bakker og Sohngaardsholm ved Aalborg (Beck). *

14. *Alyssum*. Krognaal.

867. **A. calycinum** L. (Stivbægret K.) H. 697; Drej. n. 647; F. D. 1704; Rchb. l. c. fig. 4269; H. N. 1, 29.

Stængelen fra Grunden af grenet, med opstigende *Grene*; *Bladene* tætsiddende, heelrandede, de nedre omvendt-ægformede, de øvre lancet-spadeformede; *Blomsterne* i valseformede, mangeblomstrede Klaser fra Spidsen af Grenene; *Bægerbladene* vedblivende, i Spidsen skjægghaarede, omtrent halvt saa lange som den kredsrunde, hvælvede, i Spidsen indtrykte, i Randen smalt vingede *Skulpe*.

3—8" høi. Hele Planten hvidgraa af stjerneformede Haar. Kronbladene bleggule (i visnet Tilstand hvide). $\frac{5}{2}$ — $\frac{5}{1}$. ☉.

Paa tørre Marker og Bakker, ved sandige Søbredder og mellem Sæden, sporadisk, men funden i alle Provindser og er i de senere Aar bleven temmelig almindelig udbredt.

15. *Berteroa*. Kløvplade.

868. **B. incana** [DC. Syst. 2, p. 191] (Graa K.) Rchb. l. c. fig. 4284; *Alyssum* L., H. 697; F. D. 1461; H. N. I, 30; *Farsetia* R. Br., Lge. Haandb. 1 Udg. Nr. 832.

Stængelen opret eller opstigende, foroven grenet, med oprette *Grene*; *Bladene* lancetformede; *Skulpen* fladtrykt-hvælvet, ikke udrandet, med lang *Griffel*.

1—1½' høi. Hele Planten graa af stjerneformede Haar. Kronbladene hvide. 5—8. 2.

Paa tørre Steder, især ved Veie og Byer, sjelden: *J. Randers* ved Kirkegaarden og Veiene Ø. for Byen! *Sl. Haderslev* (Grønlund), Sundeved (16); *F. Faaborg* (H.); *Bornh.* Klemensker (Hjorth), N. for Rønne! [3]

16. *Subularia*. Sylblad.

869. *S. aquatica* L. (Vand-S.) H. 692; F. D. 35; Rehb. l. c. fig. 4232; H. N. VI, 20.

Bladene sylformede, heelrandede, tæt samlede ved Grunden; *Blomsterskafterne* bladløse, udstrakte eller opstigende; *Kronbladene* smaae, heelrandede.

½—2" høi. Roden trævlet, med hvide Trævler. Kronbladene hvide, paa Blomsterne under Vandet Ø. 7—8. ☉.

Ved Aa- og Søbredder (over og under Vandet) sjelden: *J. Skjern* Aa ved Lønborg! Ørnsø ved Ribe (6)!

17. *Lunaria*. Sækbæger.

870. *L. rediviva* L. (Vedvarende S.) H. 708; F. D. 2241; Rehb. l. c. fig. 4290.

Bladene hjerteformede, tilspidsede, fint og skarpt tandede; *Skulperne* lancetformet-elliptiske, spidse; *Frøene* nyreformede, dobbelt saa brede som lange.

½—2' høi. Kronbladene hvide eller blegt lila. 6—7. 2.

Paa fugtige Steder i Skove, sjelden: *J. Aaen* ved Greis Mølle! Veile (4); *Bornh.* Store Fos i Rø Sogn (Baagøe)! [3]

† 871. *L. biennis* [Moench Meth. 126] (Toaarig S.); F. D. 1880; Rehb. l. c. fig. 4289; *L. annua* L., H. 708; Drej. p. 218.

Bladene hjerteformede, spidse, grovt tandede; *Skulperne* ovale, budte; *Frøene* hjerteformet kredsrunde, ligesaa lange som brede.

1—1½' høi. Kronbladene violette eller hvide. 5—6. ☉.

Forvildet omkring Haver, hvor den dyrkes som Siirplante.

18. Nasturtium. Brøndkarse.

a. Kronbladene hvide.

872. *N. Armoracia* [Fr. Mant. 3, 65] (Peberrod.) H. N. VIII, 21; *Cochlearia* L., Rehb. l. c. fig. 4262; *Armoracia rusticana* Fl. wett., H. 705; Drej. n. 651.

Rodbladene langstilkede, ægformet-ovale, rundtakkede; *Stængelbladene* siddende, lancetformede, de øvre heelrandede, de mellemste saugtakkede, de nedre halvfinnede; *Skulperne* ovale eller elliptiske*), meget kortere end de oprette *Blomsterstilke*.

Roden lang, tapformet, Rodbladene meget store. 2—3' høi. Kronbladene hvide. Frøene modnes sjældent eller aldrig hos os. 6—7. 4.

Paa *Strynø* (som det synes, vildvoxende: 12); *Sl. Tønning* (F. Müll.). Dyrkes i Haver og paa fugtige Marker, og forekommer derfra forvildet. ♣

873. *N. officinale* [R. Br. H. Kew. ed. 2, IV, 110] (Almindelig B.) Drej. n. 668; Rehb. l. c. fig. 4359; H. N. XV, 33; *Sisymbrium Nasturtium* L.; H. 716; F. D. 690.

Stængelen fra en nedliggende Rodstok opstigende; *Bladene* lyreformet-fjersnitdeelte, med 2—4 Par rundagtigt-ægformede, rundbugtede eller heelrandede Afsnit; *Skulperne* linieformede, trinde, opstigende, af Længde med eller længere end de nedbøiede *Blomsterstilke*.

Fra Stængelens nedre Bladhjørner udgaae knippestilte Trævlerødder. Kronbladene hvide. 6—7. 4. Var. meget i Henseende til Høiden, Smaabladenes Størrelse og Form o. s. v.

*) Skulpens Form hos Arterne i denne Slægt danner en Overgang fra denne til følg. Orden, og nogle af Arterne høre derfor strængt taget til *Siliquosa*. At adskille de kortskulpede i en egen Slægt (*Roripa* Bess., cf. Gren. & Godr. fl. Fr.) fra de langskulpede, er unaturligt, da idetmindste alle Arterne med gule Kronblade ere saa nær beslægtede, at de nødvendigviis maa forenes i een Slægt.

β, *siifolium* (Rchb. l. c. fig. 4361). Stængelen tyk og meget høi, Afsnittene store, æg-lancetformede.

γ, *microphyllum* (Rchb. l. c. fig. 4360). Stængelen tyndere og lavere, Afsnittene kortstilkede, meget smaae.

Ved Bredderne af Bække, Kilder og Grøfter, hist og her, men ikke overalt lige alm. **β**, i selve Vandet; **γ**, paa mere tør Grund, f. Ex. *Sj. Svinninge!* *J. Kolding* (28). [⚥]

b. Kronbladene gule (*Brachyolobus* DC.),

aa. længere end Bægerbladene.

874. **N. amphibium** [R. Br. l. c.] (Vand-Peberrod). Rchb. l. c. fig. 4363; *Sisymbrium* L., H. 717; F. D. 984 (ikke god); *Brachyolobus* Drej. n. 652.

Bladene lancetformede, de nedsænkede fjersnitdeelte, de nedre ovenfor Vandet stilkede, halvfinnede, de øvre siddende, med halvt-omfattende Basis, saugtakke; *Skulperne* elliptiske, lidet længere end Griffelne, 2—3 Gange kortere end de udspilede eller nedbøjede *Blomsterstilke*.

Bladene var. i Indskjæring. 6—7. 4.

I Bække, Grøfter og Kjær alm.

875. **N. silvestre** [R. Br. l. c.] (Langskulpet B.) F. D. 1881; Rchb. l. c. fig. 4368; H. N. XI, 35; *Sisymbrium* L., H. 716; *Brachyolobus* Drej. n. 654.

Alle *Bladene* stilkede, fjersnitdeelte, med elliptisk-lancetformede, paa de øvre Blade linieformede, saugtakke; Afsnit; *Skulperne* linieformede, fladtrykt-tveæggede, af Længde med eller længere end de udstaaende *Blomsterstilke*; *Griffelen* meget kort.

7—8. 4.

β, *rivulare* (Rchb. l. c. fig. 4365). Bladenes Afsnit smale, linieformede, Griffelen længere.

Ved Randen af Bække og Grøfter, sjelden og kun funden i de sydligere Egne af Landet: *Bornh.* Læsaaen ved Limensgade! Grødby Aa ved Boderne! Nexø (20); *Loll.* Nakskov (19); *F.* Ølstedgaard (24)! *Sl.* Süderholz og Rødemis ved Husum (F. Müll.), Süderstapel (16). — **β**, Høireby og Raahave paa *Loll.* (5)!

876. **N. anceps** [Wahlenb. mscr. sec. Fries; Rchb. Bot. Zeit. V, 1, 295] (Tveægget B.) Rchb. l. c. fig. 4364; H. N. VI, 18; *Sisymbrium* Wahlenb., H. 718; *Brachyolobus* Drej. n. 653.

De nedre Blade lyreformet-fjersnitdeelte; *Skulperne* tveægget-fladtrykte, linie-lancetformede, af Blomsterstilkenes halve Længde, 2—3 Gange længere end *Griffelen*, forøvrigt som foreg. og var., ligesom denne, i Henseende til Bladenes Indskjæring.

7—8. 2.

Paa fugtige Steder, sjelden: **J. Ribe** (d'Origny)! **Sl. Aabeuraa** (Hempel), Skovlund Aa mellem Flensborg og Læk, Husum (20), Hollingsted (Didrichsen)! Trejholm ved Trenesholm (Jessen), Rendsborg (28); Hummelmai paa **Als** (20)! (Saavel denne som foreg. angives af Horn. som ikke sjeldne, hvilket maa beroe paa en Feiltagelse). [5]

bb. Kronbladene af Længde med Bægerbladene.

877. **N. palustre** [DC. Syst. II, 191] (Kjær-B.) Rchb. l. c. fig. 4362; H. N. VI, 19; *Sisymbrium* Leyss., H. 717; F. D. 409 (*S. islandicum*) og 931; *Brachyolobus* Drej. n. 655.

Bladene lyreformet-fjersnitdeelte med elliptiske, tandede Afsnit, *de øvre* ved Grunden øreformet-halvtomfattende; *Skulperne* opblæste, linieformet-ovale, opstigende, af Længde med de udspilede eller nedbøiede *Blomsterstilke*; *Griffelen* meget kort.

Hele Planten mørkgrøn, ofte brunnagtigt anløben. Kronbladene skidengule. 6—8. ☉.

Paa fugtige Steder, f. Ex. ved Randen af Gadekjær og Grøfter, meget alm.

II. Siliquosa.

19. *Raphanus*. Reddike.

878. **R. Raphanistrum** L. (Kiddike). H. 731; *Raphanistrum* segetum Baumg., Drej. n. 658; Rchb. l. c. fig. 4172; *Sinapis arvensis* F. D. 678.

Bladene lyreformet-halvfinnede eller -snitdeelte; *Bægerbladene* tiltrykte, *Skulpen* halsbaandformigt indsnøret paatværs

og tilsidst furet paalangs, flere Gange længere end Blomsterstilken, dens Klapper altid tilstede, men meget smaae og mod Frugtmodningen utydelige.

Planten blaagrøn, mere eller mindre stivhaaret af ved Grunden kirtelformigt opsvulmede Haar; Kronbladene bleggule. 6—7. ☉.

Alm. Ukrud i dyrket Jord, især mellem Vaarsæden.

Anm. Ved de angivne Kjendetegn skjælnes den let fra *Sinapis arvensis*, med hvilken den har nogen Lighed og stundom bliver forvexlet.

† *R. sativus* L. (Have-R.) Rchb. l. c. fig. 4175. De nedre Blade lyreformede, de øvre ægformet-elliptiske, tandede; Skulpen trind, kegleformigt tilspidset, svagt eller ikke indsnøret, lidet længere end Blomsterstilken, dens Klapper snart (endog paa samme Plante) 0, snart tydelige og mod Frugtmodningen tilvoxende.

Kronbladene violette eller hvide. 6. ☉.

Dyrkes i Kjøkkenhaver formedelst den spiselige Rod, og forekommer forvildet.

20. Hesperis. Aftenstjerne.

879. *H. matronalis* L. (Vellugtende A.) Drej. n. 669; Rchb. l. c. fig. 4377—78; *H. inodora* L., H. 724; F. D. 921 og 924.

Rodbladene lancetformede; *Stængelbladene* ægformet-elliptiske, tilspidsede, tandede; *Kronbladene* omvendt-ægformede, budte eller svagt udrandede; *Blomsterstilkene* udstaaende, flere Gange kortere end den opstigende, valseformet-knudrede *Skulpe*.

Bladene rue. Kronbladene violette eller hvide, vellugtende. 6—7. ♀.

I Kratskove og ved Gærder, sjelden: *Sj.* Helsingør, Taarbæk, Springforbi (H.); *F.* Fjellebro (Kyll.), Ulriksholm, Vissenberg, Hinds-gavl (H.); *J.* Blegkilde ved Aalborg (Branth), Viborg (16), Frysensborg (2), Jensgaard (Kyll.), Gærder ved Kolding! Forekommer desuden hist og her forvildet ved Haver, hvor den dyrkes som Siirplante. ☞

Anm. Den dyrkede Form (*H. matronalis* L.) er (efter Koch) ikke væsenligt forskjellig fra den vilde (*H. inodora* L.) undtagen deri, at den sidste kun lugter om Natten.

21. Dentaria. Tandrod.

880. *D. bulbifera* L. (Løgbærende T.) H. 711; Drej. n. 665; F. D. 361; Rchb. l. c. fig. 4318.

Rodstokken vandret, tandet af hvidagtige, kjødfulde Skjæl; *de nedre Stængelblade* fjersnitdeelte med lancetformede, saugtakke *Afsnit*, *de øvre* hele, lancetformede, saugtakke; sorte *Løgknopper* i Bladhjørnerne.

Kronbladene lys-rosenrøde, kun faa Blomster frembringe Frugt. 5—6. 4.

I høitliggende Skove, sporadisk og temmelig sjelden: *Sj.* Bjørnstrup paa Refsnæs (15), Benzonslund (H.), Jægerspris (Kyll.), Egelund ved Hillerød (A. Rafn), Sorø (7), Vintersbølle (29); *Møens* Klinteskov! *Falst.* ved Hesnæs (14), Kraghave, Flatø i Guldborgsund (29); *Loll.* paa Borgø og Lindø i Maribo Sø (5); *F.* Trolleborg (Oppermann); *J.* Øland i Limfjorden (Drej. Herb.), Østed (Brix), Clausholm (7), Kalø (13), Palsgaard (H.), Veile! Refstrup (30), Kolding (28); *Sl.* paa flere Steder i Skovene, især paa Østkysten.

22. Cardamine. Springklap.

a. Bladstilken med piilformede Ører ved Grunden.

881. *C. impatiens* L. (Kronløs S.) H. 713; Drej. n. 662; F. D. 1339; Rehb. l. c. fig. 4302.

Bladene mangeparret-fjersnitdeelte; *Afsnittene* paa de nedre Blade ægformet-elliptiske, halvfinnede, paa de øvre lancetformede, tandet-fligede eller paa den opadvendte Rand heelrandede; *Blomsterstilken* opret-aabne; *Skulperne* opstigende.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ høi. Kronbladene hvide, omtrent af Bægerbladenes Længde, oftest 0. 5—6. ☹.

Paa fugtige Steder i Skove, sjelden: *J.* Øland i Limfjorden (Aaby), Anlægget ved Veile (30)! Greisdalen (16), Kidholm i Kolding Fjord (28); *F.* Ølstedgaard (24)! *Falst.* (Heerforths Herb.); *Møens* Klinteskov (Freuchen).

b. Bladstilken uden Ører.

aa. *Kronbladene* dobbelt saa lange som Bægerbladene, med smal, opret Plade.

882. *C. parviflora* L. (Smaablomstret S.) H. II, 218; Rehb. l. c. fig. 4301; H. N. III, 21.

Bladene mangeparret-fjersnitdeelte, alle *Afsnittene* ligestore, heelrandede, paa de nedre Blade ovale, paa de øvre linieformede; *Rodbladene* faae, *Stængelbladene* talrige; *Skulperne* opstigende, paa næsten retvinklet udstaaende *Blomsterstilke*.

Planten finere og spædere end de følg., Blomsterne meget smaae, hvide. 6—7. ☉.

Paa fugtige, oversvømmede Steder, meget sjelden: *Sl. Aabenraa* (N.). ☼

883. *C. intermedia* [Horn. Oec. Pl. p. 714] (Rosettebladet S.) F. D. 1762 (ikke god); *C. hirsuta* L., Drej. p. 322; Rehb. l. c. fig. 4304; *C. hirsuta* a, campestris Fr. nov. p. 201; H. N. III, 20.

Alle Bladene faaparret-fjersnitdeelte; *Rodbladene* talrige, rosetteformigt samlede, med kreds rundt-ægformede, rundbugtede *Sideafsnit* og større, kreds rundt-nyreformet *Endeafsnit*; *Stængelbladene* faae, mindre end *Rodbladene*, med ligestore, linie-lancetformede *Afsnit*; *Stænglerne* opstigende, ofte udstrakte, med rette *Ledstykker*; *Blomsterstilkene* opret-aabne, 3—4 Gange kortere end de oprette *Skulper*, de øverste *Skulper* meget længere end den blomstrende *Deel* af *Klasen*; *Støvdragerne* oftest 4.

Forekommer hos os oftere glat end haaret, hvorfor Navnet *hirsuta* synes mindre passende og Linné har muligviis derunder tillige indbefattet følg. Art. 2—6" høi. *Kronbladene* hvide. 4—5. ☉.

I Tørvmoser og ved Gjærder, især i løs Tørv- eller Sandjord, sporadisk: *J. Tandrup* i Thy (Drej. Herb.), Hald og Hjarbæk ved Viborg (Morville), Fusing Vasehuus (3), Fiskergaarden ved Randers (Selmer)! Skanderborg (16), Kolding (28); *Sl. Christiansfeld*, Aabenraa (N.), Flensborg (Hansen), Husum (F. Müll.); *Als* ved Sønderborg (20); i *Fyen* alm.! *Langel.* ved Tranekjær; *Falst.* ved Seminariet (H.), S. Kirkeby (Koch), Bregninge (14); *Møen* ved Ulfssund (9); *Sj.* Haverup og Steenstrup ved Sorø! Mose mellem Nærum og Søllerød!

884. *C. silvatica* [Link i Hoffm. phytogr. Blätt. 1, 50] (Skov-S.) Koch Syn. II, 46; Rehb. l. c. fig. 4303; *C. impatiens* F. D. 735; *C. hirsuta* H. 713 (undt. Var.).

Stængelen opstigende eller opret, med zigzagbøiede *Ledstykker*; *Rodbladene* faae og tidligt henvisnende; *Stængelbladene* talrige, alm. større end *Rodbladene*, forøvrigt som foreg., men med flere Par større og bredere *Afsnit*; *Blomsterstilkene* udstaaende, 2—3 Gange kortere end de opstigende *Skulper*, af hvilke de øvre neppe naae højere end *Blomsterne*.

Væksten kraftigere (4—8" høi), oftest haaret, med blegere grønne Blade og forholdsviis mindre Blomster end foreg. Kronbladene hvide. 5—6. ☉ eller 4.

β , *clandestina* Fr. Nov. p. 203; H. N. VII, 18. Kronbladene meget smaae eller 0, med senere Blomstringstid.

Paa fugtige Steder i Skove, sporadisk og ikke alm.: J. Børghlum Klosterskov (Grønlund)! Rold Skov (8), Randrup (Feddersen)! V. Velling, Lindum (Drej. Herb.), Linaa Storskov (16), Østbirk (2), Veile, Høien, Trelde Skov (12)! mellem Kolding og Vandrup (16)! *St. Jels* (12), Gram (Reimers), Rødding (16), Haderslev (Grønlund), Aabenraa, Hoist, Slesvig (N.), Flensborg (12), Süderholz og Ostenfeld ved Husum (F. Müll.); *Als* i Sønderborg Skov (20); *Sj.* Nyrupgaard ved Sorø! Teglstруп Hegn! Hammermølleskoven, Skovsborg (12), Hareskoven (26)! Græsholmen ved Christiansø (Didrichsen)! — β , ved Kolding (28)!.

Ann. C. *hirsuta* β , *silvestris* Fr. nov. 202 hører efter Bekrivelsen («caulis 1—2-pedalis, vix flexuosus, fol. in cæspitem densum collecta») neppe herhid, men er muligviis en usædvanlig høi Form af foreg. Art. Links Beskrivelse af C. *silvatica* passer aldeles til den her forekommende Plante, men Cit. af F. D. ere urigtige (tab. 148 føres til C. *silvatica*, t. 735 til C. *hirsuta*). Imidlertid er Navnet baade passende og tilstrækkeligt forklaret ved Kochs Beskrivelse og Afbildningen hos Rchb. At den er en fra foreg. vel adskilt Art forekommer mig utvivlsomt.

bb. Kronbladene 3 Gange længere end Bægeret, med bred, udstaaende Plade.

885. C. *amara* L. (Vandkarse). H. 715; Drej. n. 663; Rchb. l. c. fig. 4305.

Stængelen opstigende eller opret, med Udløbere fra Grunden, kantet-furet, bladet indtil Spidsen; *Bladene* faaparret-fjersnit-deelte, med bugtet-tandede, paa de nedre Blade ovale, paa de øvre elliptiske eller lancetformede *Sideafsnit* og større *Endeafsnit*; *Støvdragerne* af Kronbladenes Længde, med violette *Støvknapper*; *Griffelen* forlænget, sylformet.

1—1½' høi. Kronbladene hvide, paa aabne Steder svagt lila-stribede. 5—6. 4.

β , *hirta* W. Gr.; C. *hirsuta* F. D. 148; C. h. *silvatica* H. 714. Stængel og Blade haarede, Blomsterstilkene glatte.

γ , *minor* Lge. Spædere og lavere end Hovedarten (4—6" høi) med tæthaarede Blade og meget smaae Bladafsnit, Kronbladene violette.

I Moser, ved Kilder og Bække, ikke sjelden. β , paa skyggefulde Steder; γ , Viborg (Feddersen)!

886. **C. pratensis** L. (Engkarse). H. 714; Drej. n. 664; F. D. 1039; Rchb. l. c. fig. 4308.

Stængelen opret, trind, foroven svagt stribet, det øvre Ledstykke forlænget og Klasen derved fjernet fra Bladene; alle *Bladene* fjersnitdeelte, med heelerandede eller rundbugtede, paa de nedre Blade rundagtig-ovale, paa de øvre lancetformede *Sideafsnit* og større *Endeafsnit*; *Støvdragerne* af Kronbladenes halve Længde, med gule *Støvknapper*; *Griffelen* kort, (neppe saa lang som Skulpens Brede).

1—1½' høi. Kronbladene lila, sjældnere hvide. 5—6. 7. Forekommer undtagelsesviis med Udløbere, og var. desuden i Henseende til Afsnittenes Form o. s. v.

β , *dentata* Schult. (Rchb. l. c. β). Bladafsnittene bugtet-tandede.

γ , *parviflora* Bot. Foren. Catal. 1845 (= γ , *angustifolia* Mortens. Mscr.?) Bladafsnittene smalt linieformede, Blomsterne mindre.

δ . *gynocrates* Didr. Støvveien langt fremragende, stilket, dens Stilk mindst af Kronbladneglens Længde (hos den typiske Form er Støvveien ustilket).

Paa Enge o. a. fugtige Steder meget alm. β , ved Bredden af Søllerød Sø! Gram (Reimers); γ , *Nordsjælland* (24)! *Bornh.* ved Rønne (Hjorth); δ , hyppig paa alle Engene langs Ladegaardsaaens Løb, funden 1863 af Doc. Didrichsen!

23. **Erysimum. Hjørneklap.**

887. **E. cheiranthoides** L. (Gyldenlak-H.) H. 722; Drej. n. 670; F. D. 731 (slet) og 923; Rchb. l. c. fig. 4383.

Bladene lancetformede, fjernt rundbugtet-tandede eller næsten heelerandede, alle kortstilkede; *Blomsterstilkene* 2—3 Gange længere end Bægeret, mod Frugtmodningen vandret udspærrede, halvt saa lange som den fuldvoxne, opstigende *Skulpe*.

Skulpen (ligesom den øvrige Plante) med faae, tregrenede Haar. 6—8. ☉.

I dyrket Jord, især mellem Sæden, funden i alle danske Provindser og ikke sjelden: hyppigst paa de sydlige Øer.

888. **E. hieraciifolium** L. (Rankskulpet H.) H. 722; Drej. n. 671; F. D. 229; Rchb. l. c. fig. 4388; H. N. VIII, 19; *E. strictum* Fl. Wett., Koch Syn. II, 55.

Bladene lancetformede, saugtakket-tandede, de nedre stilkede, de øvre siddende; *Blomsterstilkene* af Længde med Bægeret, mod Frugtmødningen oprette, 3—4 Gange kortere end den fuldvoxne, opret-tiltrykte *Skulpe*.

Skulpen og Bladene tæt beklædte med tregrenede Haar. Kronbladene større end hos foreg. 6—7. ☹.

Paa Bakker o. a. tørre Steder: kun funden paa *Møen*, hvor den forekommer flere Steder paa Storeklint! !*

24. *Barbarea*. Vinterkarse.

889. **B. stricta** [Fr. mscr. 1819, S. Veg. I, 146] (Rankskulpet V.) H. N. VI, 16; Rchb. l. c. fig. 4355; *B. parviflora* Fr. nov. p. 207.

De nedre Blade langstilkede, udeelte, rundbugtede, ovale eller øreformede med ovalt Endeafsnit, *de mellemste* kortstilkede, ovale, rundtakkede, *Bladstilkene* ved Grunden piilformigt udvidet, *de øvre* siddende med piilformet Basis, elliptiske eller omvendt-ægformede, bugtet-tandede eller øreformede; *Kronbladene* $\frac{1}{2}$ Gang længere end Bægeret; *Skulperne* tiltrykte, tveægget-firekantede.

Kronbladene kortere, smalere og blegere gule end hos følg. Art. 5. ☹.

Paa fugtige Steder, sjelden: *Sj.* mellem Kalundborg og Lerchenborg (Baagøe)! *Kj.* og Barrit Moser ved Vordingborg (28); *J.* Hænsted Mose (2), alm. ved Ribe (d'Origny)! Enge ved Kolding Aa (28)! *St.* Oxenvad (Grønlund), Heilsminde, Broager (28), Haderslev Dam (8), Gram (1), Almdorf N. for Husum (F. Müll.).

890. **B. vulgaris** [R. Br. H. Kew. ed. 2, IV, p. 109] (Almindelig V.) Fr. nov. p. 205; Drej. n. 666; Rchb. l. c. fig. 4356; *Erysimum Barbarea* L., H. 720; F. D. 985.

De nedre Blade lyreformet-fjersnitdeelte med rundagtigt-hjerteformet Endeafsnit; *de øvre Stængelblade* bugtet-halvfinnede med øreformigt omfattende Basis; *Kronbladene* dobbelt saa lange som Bægeret; *Skulperne* oprette, tveægget-firekantede.

Bladene have en skarp, men ikke behagelig Smag. 6. 4.

β, *arcuata* (Rchb. l. c. fig. 4357; H. N. XII, 49). *Blomsterstilkene* udstaaende, *Skulperne* bueformigt opstigende.

Paa Græsmarker og ved Gjærder, ikke sjelden, men sporadisk. *β*, med Hovedarten, f. Ex. *Sj.* Kirke-Værløse (14), Bregentved (12); *Moen* ved Borre! *Falst.* Øverup (14); *J.* Kolding (28).

891. **B. præcox** [R. Br. l. c.] (Tidlig V.) Fr. nov. p. 206; Mant. 3, 75; H. N. I, 28; Rehb. l. c. fig. 4358; Drej. n. 667; Erysimum Sm., H. 721; F. D. 1759; B. vulg. acidula Hartm.

De nedre Blade lyreformet-fjersnitdeelte, med oval-nyreformet eller ægformet Endeafsnit og talrige Sideafsnit; *de øvre Stængelblade* lyreformet-halvfinnede eller -snitdeelte med linieformede Sideafsnit; *Kronbladene* dobbelt saa lange som Bægeret; *Skulperne* opret-aabne, budt-firekantede.

»Bladene have en behagelig, skarp, karseagtig Smag«. (Fr.). 5—6. ☉.

Paa lignende Steder som foreg., men sjeldnere: *Sj.* paa Vesterfælle! Nysø, mellem Præstø og Kallehave (H.), Ørsløv ved Skjelskør (Nielsen); *Loll.* Hellinge (19); *J.* ved Viborg Sø (Morville), Kolding (28); *Sl.* Gram (1), Bukhavn ved Kappel o. fl. St. (N.). (Om alle de angivne Voxesteder høre til denne, tør jeg ikke med Bestemthed paastaae, da den ofte er vanskelig at kjende fra foreg.). ☞

25. Arabis. Gaasemad.

a. *Stængelbladene* talrige, med halvt omfattende Basis; *Kronbladene* med opret, omvendt-ægformet-linieformet Plade.

892. **A. hirsuta** [Scop. Fl. carn. 2, 30] (Stivhaaret G.) Drej. n. 660; Rehb. l. c. fig. 4342; H. N. XII, 50; Turritis L., H. 726; F. D. 1040.

Stængelen opret; *Rodbladene* kortstilkede, omvendt-ægformet-lancetformede, fjernt og svagt saugtakkede; *Stængelbladene* siddende, med hjerteformet Basis, saugtakkede; *Skulperne* tiltrykte til Stængelen, fladtrykte, mange Gange længere end $\frac{1}{2}$ de oprette *Blomsterstilke*; *Klapperne* med en tydelig Midtnerve, knudrede af de fremstaaende, tydeligt vingede Frøe.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Stængelen ved Grunden stivhaaret, alle Bladene haarede af grenede Haar. *Kronbladene* hvide. 5—6. ♀.

Paa Bakker, især paa Leer- eller Kalkgrund, ved Gjærder, sjeldnere paa tørvholdige Enge: bemærket i alle Provindser, men sporadisk og ikke alm.

b. Stængelbladene faae, ikke omfattende; Kronbladenes Plade omvendt-ægformet, udstaaende.

893. **A. arenosa** [Scop. l. c. 2, 32] (Sand-G.) Drej. n. 659; F. D. 1760; Rehb. l. c. fig. 4522; H. N. VII, 15 (og X, 34 *A. suecica* — *biennis*); *Sisymbrium arenosum* L., H, 718.

Stængelen grenet; *Rodbladene* rosetteformigt samlede, lyreformet-fjersnitdeelte eller halvfinnede; *Stængelbladene* kortstilkede, lancetformede, saugtakket-fligede, de øvre næsten heelrandede; de 2 *Bægerblade* ved Grunden puklede; *Blomsterstilkene* opret-aabne; *Skulperne* opstigende; *Klapperne* med svag Midtnerve, knudrede af de fremstaaende, svagt vingede *Frøe*.

4—10" høi. Stængelen stivhaaret; Bladene tæt beklædte med grenede Haar. Kronbladene hvide eller lila. 5—7. ☉.

Paa sandige eller kalkholdige Bakker, sjelden: *Sj.* Stevns Klint (9), Tappernøie (17); *Møens* Klint alm.! ☼

Ann. Mellem den Plante, som under Navn af *A. suecica* — *biennis* er fremstillet i H. N. (l. c.) og vore Expl. fra Møen formaaer jeg ikke at see nogensomhelst Forskjel. Stængelen har hos vor ligesaa mange Blade og Skulperne findes snart opret-aabne, snart udstaaende.

894. **A. Thaliana** L. (Almindelig G.) H. 725; F. D. 1106; *Sisymbrium Thalianum* Gay, Drej. n. 674; *Conringia* Rehb. l. c. fig. 4380.

Stængelen grenet; *Bladene* lancetformede, fjernt-tandede; *Rodbladene* rosetteformigt samlede, kortstilkede; *Stængelbladene* siddende, ofte heelrandede; *Bægerbladene* ikke puklede ved Grunden; *Blomsterstilkene* udstaaende; *Skulperne* opstigende, linieformede, med jævne, svagt ennervede *Klapper*; *Frøene* uvingede.

2—8" høi. Stængelen forneden stivhaaret; Bladene mere eller mindre haarede af grenede Haar. Kronbladene hvide, mindre end hos foreg. 4—5. ☉.

Paa dyrkede, tørre Marker alm. udbredt.

26. Turritis. Taarnurt.

895. **T. glabra** L. (Glat T.) H. 726; Drej. n. 661; F. D. 809; Rehb. l. c. fig. 4346; *Arabis perfoliata* Lam.

Stængelen stivt opret, *de nedre Blade* stilkede, lancetformede, tandede eller halvfinnede, rue af tregrenede Haar, *de øvre* piilformigt omfattende, heelerandede, glatte; *Skulperne* tiltrykte til *Stængelen*, mange Gange længere end de oprette *Blomsterstilke*.

1½—3' høi. Hele Planten blaadugget. Kronbladene gulhvide. 6—7. ☉.

Paa Marker, ved Grøftevolde o. a. tørre Steder alm.

† *Diplotaxis*.

† *D. tenuifolia* [DC. Syst. II, p. 632] Rehb. l. c. fig. 4420; *Sisymbrium* L.

Bladene glatte, fjersnitdeelte eller dybt halvfinnede, med fjerne, linie-lancetformede, bukte Flige; *Klasen* fjernblomstret, efter Afblostringen meget forlænget; *Bægerbladene* under Blomstringen vandret udstaaende, halvt saa lange som *Kronbladene*; *Skulperne* opstigende, omtrent af Længde med de opret-aabne *Blomsterstilke*.

Stængelen ved Grunden halvbuskagtig. Kronbladene bleggule. 7—9. 4.

Paa Gruusdynger ved Vordingborg (A. Lange)! formodenlig hidført med Ballast. *

27. Brassica. Kaal.

a. Blomsterstanden under Blomstringen en forlænget Klase, Støvdragerne næsten ligelange.

896. **B. oleracea** L. (Almindelig K.) F. D. 2056; Rehb. l. c. fig. 4438.

Bladene blaagrønne, glatte; *de nedre* lyreformet-snitdeelte, stilkede, *de øvre* æg-lancetformede med omfattende Basis; *Bægerbladene* opret-tiltrykte; *Støvdragerne* alle oprette; *Frøene* jævne.

Kronbladene bleggule. 6—7. ☉

I vild Tilstand forekommer den ved Strandbredder og er fundet ved Kramnitze paa *Loll.* (9). (Fig. i F. D. er tegnet efter Expl. fra den ikke under vor Flora hørende Ø Helgoland). I Haver dyrkes den under en Mængde Afændringer og forekommer undertiden tilfældigt forvildet i Nærheden af Dyrkningsstedet. ☞

b. Blomsterstanden under Blomstringen halvskjærmformet; de 2 Støvdragere meget kortere end de øvrige.

897. **B. Napus** L. (Raps). H. 728; Drej. p. 226; Rchb. l. c. fig. 4435 γ ; H. N. XIV, 29.

Bladene blaagraae, glatte, de nedre stilkede, lyreformet-halvfinnede, de øvre lancetformede med piilformigt omfattende Basis; Bægerbladene oprette eller tilsidst noget udstaaende; de 2 kortere Støvdragere opstigende, de længere oprette; Skulperne udstaaende; Frøene svagt punkterede.

Kronbladene smukt gule. 5—6. ☉ eller ☉.

α , *oleifera biennis*. Toaarig, med stærk Rod (Vinterraps).

β , *oleifera annua* (H. N. X, 32). Enaarig, med tynd Rod (Sommerraps).

γ , *rapifera* Metzg. Toaarig, med tyk og kjødfuld Rod (Kaalrabi).

Findes som vild i *Slesvigs* Marskegne (efter H.). Formerne α og β , især den første, dyrkes som Olieplanter, dog i større Maalestok før end nu; γ , dyrkes som Foderplante. I de Egne, hvor den dyrkes, forekommer den hyppigt forvildet.

898. **B. campestris** L. (Ager-K.) H. 727; Drej. n. 678; F. D. 550 (slet); Rchb. l. c. fig. 4434; H. N. IX, 21.

De nedre Blade fjernt-stivhaarede, de øvre glatte, tilspidset-ægformede, med hjerteformigt omfattende Basis; Bægeret tilsidst vandret udstaaende; Blomsterstilkene vandret udspilede; Skulperne opstigende, forøvrigt som foreg.

Kronbladene smukt gule. 6—7. ☉ eller ☉.

β , *esculenta* Gren. & Godr. B. Rapa L., Rchb. l. c. fig. 4437 (β); H. N. IX, 22. Roden tyk, kjødfuld (Hvidroe).

Alm. Ukrud i Vaarsæden, dog ikke lige hyppig overalt, mangler f. Ex. i flere Egne af Fyen. Roen, som efter de nyere Forfattere

Mening kun er en ved Dyrkning frembragt Form af Agerkaalen, dyrkes alm. i Have og Mark og forekommer derfra tilfældigt forvildet.

† 899. **B. lanceolata** [Lge. Haandb. 2 Udg., p. 447, F. D. 2658] (Smalbladet K.)

Alle *Bladene* stilkede, *de nedre* elliptiske, bugtet-halvfinnede eller tandede, *de øvre* lancetformede, heelrandede eller tandede; *Bægerbladene* oprette, tilsidst udstaaende; *Skulperne* noget fladtrykte, med Kjøll paa Ryggen, tilligemed *Blomsterstilkene* opret-aabne; *Frøene* grubet-punkterede.

Bladene paa Overfladen grønne, paa Underfladen blaagraae. Kronbladene gule. ☉ eller ☺.

Denne Plante, som er aldeles forskjellig fra de andre mig kjendte Arter af denne Slægt, og i flere Henseender lig *B. Richeri* Vill. (hvilken dog bl. a. er forskjellig ved dens Varighed) har jeg i flere Aar fundet forvildet paa Gjødningspladser udenfor Kjøbenhavn. (I den senere Tid har jeg ikke bemærket den).

900. **B. nigra** [Koch D. Fl. 4, 713] (Senep-K., Sort Senep). Drej. n. 679; Sinapis L., H. 730; F. D. 1582; Rchb. l. c. fig. 4427; L. Herb. IV, 80.

Alle *Bladene* stilkede, *de nedre* lyreformet-snitdeelte med lappet Endeafsnit, *de øvre* lancetformede, heelrandede eller med en enkelt Tand ved Grunden; *Bægerbladene* udstaaende; *Blomsterstilkene* oprette; *Skulperne* tiltrykte til Blomsteraxen, fladtrykt-frekantede; *Frøene* grubet-punkterede.

Frøene mindre end hos de foreg., af skarp Smag. 6—7. ☉.

Paa dyrket Jord, f. Ex. ved Veie, mellem Vaarsæden, ikke sjelden, især hyppig paa Øerne. Dyrkes desuden alm. i Have og Mark for Frøenes Skyld.

28. Sinapis. Senep.

901. **S. arvensis** L. (Ager-S.) H. 729; Drej. n. 676; F. D. 753; Rchb. l. c. fig. 4425.

Bladene ægformede eller elliptiske, grovt og uregelm. tandede, *de nedre* ørede eller lyreformede; *Bægerbladene* under Blomstringen tilbagebøiede; *Skulperne* valseformede, knudrede, med trenervede *Klapper*, meget længere end de opret-aabne Blomsterstilke; *Griffelen* af Længde med eller kortere end

Skulpen, kegleformigt-firekantet, treribbet med lige Afstand mellem Ribberne indbyrdes og Randen.

Stængelen stivhaaret, Bladene, især de nedre, haarede, var. glat. Frøene sorte. 5—7. ☉.

α, vulgaris. Skulperne glatte.

β, hispida Sond. (*S. arvens. b. Schkuhriana* l. c. fig. 4426 b; *S. orientalis* Schk.?) Skulperne stivhaarede af korte, nedbøiede Haar.

Meget alm. Ukrud paa Brakmarker og mellem Vaarsæden overalt i Danmark. *β*, hist og her paa samme Steder som Hovedarten.

902. *S. alba* L. (Guul S.) H. 730; Drej. n. 677; F. D. 1393; Rchb. l. c. fig. 4424; H. N. VII, 13.

Blanene fjersnitdeelte (de nedre lyreformede), med rundtakket-lappede Afsnit; *Bægerbladene* under Blomstringen udspærrede; *Blomsterstilkene* efter Afblostringen vandret udstaaende, ligelange med Skulperne (Griffelen fraregnet); *Skulperne* opstigende, valseformede, stivhaarede, knudrede, med femnervede *Klapper*; *Griffelen* længere end Skulpen, fladtrykt-sværdformet med 3 imod Midten tæt samlede og fra Randen fjernede Ribber.

Planten stivhaaret. Frøene lysgule, skarpe af Smag. 6—8. ☉.

Mellem Sæden og ved Gjærder sporadisk og ikke alm., men funden i alle Provindser. Dyrkes paa Grund af de skarpe Frøe.

29. *Sisymbrium. Gabeklap.*

903. *S. officinale* [Scop. Fl. carn. 2, p. 26] (Rank G.) Rchb. l. c. fig. 4401; *Erysimum* L., H. 720; F. D. 560; *Chamaepium* Wallr., Drej. n. 675.

Bladene høvlformet-fjersnitdeelte med spydformet Ende-afsnit; *de øvre* spydformede; *Grenene* stivt udspærrede; *Skulperne* fra en bredere Basis sylformigt tilspidsede, tæt tiltrykte til Blomsteraxen, flere Gange længere end de tykke *Blomsterstilke*; *Skillevæggen* uden Nerver.

Planten rank og stiv, mere eller mindre haaret og noget ru. Kronbladene smaae, men længere end Bægerbladene. 6—7. ☉.

Ved Veie, Mure og Ryddepladser, især i Nærheden af Byer; ikke sjelden, i størst Mængde paa *Bornholm*!

† *S. Irio* L. (Glatbladet G.) H. 719; Rehb. l. c. fig. 4408.

Bladene som hos foreg.; *Skulperne* knudrede, bueformigt opstigende, 3—4 Gange længere og kun lidet tykkere end de udstaaende, meget tynde Blomsterstilke; *Skillevæggen* uden Nerve; de øvre Skulper naae op over den blomstrende Deel af Klasen.

Bladene glatte. Stængelen var. glat eller haaret. Kronbladene smaae, bleggule. 7—8. ☉.

Fæstningsmure paa Christiansø (18)! sandsynligviis indført.

† *S. Loeselii* L. (Stivhaaret G.) Rehb. l. c. fig. 4409.

Bladene lyreformet-halvfinnede eller -fjersnitdeelte med vandret udstaaende, lancetformet-elliptiske eller linie-lancetformede, heelrandede eller bugtet-tandede Flige; Endeffigen spydformet; *Skulperne* opstigende, dobbelt saa lange som de næsten vandret udstaaende Blomsterstilke, i yngre Tilstand ikke naaende den blomstrende Deel af Klasen.

Stængelen 1—1½' høi, opret, tilligemed de nedre Blade stivhaaret. Kronbladene gule, større end hos foreg. og følgende. 6—7. ☉.

Christiansø (Baagøe)! formodenlig indvandret.

904. *S. Sophia* L. (Fiinbladet G.) H. 719; Drej. n. 672; F. D. 528; Rehb. l. c. fig. 4405.

Bladene dobbelt fjersnitdeelte med linie-lancetformede Af-snit; *Grenene* opret-aabne; *Blomsterstilkene* udspærrede; *Skulperne* opstigende, traadformet-valseformede, noget knudrede; lidet længere og tykkere end Blomsterstilkene; *Skillevæggen* med 1 eller flere Nerver.

Var. duunhaaret eller næsten glat. Kronbladene gule, kortere end Bægerbladene. 6—7. ☉.

Alm. i hele Landet ved Byer, i Haver o. a. dyrkede Steder.

30. Alliaria. Løgurt.

905. *A. officinalis* [Andrz. i DC. Syst. 2, 489] (Skov-L.) Rehb. l. c. fig. 4379; Erysimum Alliaria L., H. 722; F. D. 935; Sisymbrium Alliaria Scop., Drej. n. 673.

De nedre Blade langstilkede, nyreformede, rundtakkede, *de øvre* kortstilkede, hjerteformede, tandede; *Skulperne* opret-aabne eller opstigende, mange Gange længere end de tykke, udstaaende *Blomsterstilke*.

Planten ved Grunden duunhaaret, foroven glat. Bladene have, naar de gnides, en løgagtig Lugt. Kronbladene hvide. 5. ☉.

I Skove og Krat, ved levende Hegn, alm. udbredt.

16^{de} Klasse. Monadelphia (Enknippede).

1. Orden. Pentandria (Femhannede).

1. *Linum* L. Bæger og Krone fembladede; 5 Griffler; Frugten en femrummet, ved en Skillevæg fra Rygsømmen ufuldstændigt tirummet, tifrøet Kapsel. (N. F. Lineæ).

Lysimachia. 1 Griffel med udeelt Ar (5, 1).

Erodium. 1 Griffel med 5 Ar; femdelelig Spaltefrugt (10, 1).

Geranium pusillum (10, 1).

2. Orden. Decandria (Tihannede).

2. *Œxalis* L. Bæger og Krone regelm. fembladede; 5 lange og 5 korte Støvdragere; 5 Griffler; Frugten en femklappet, mangefrøet Kapsel, opspringende elastisk ved Ridser; Frøene omgivne af en Frøhud. (N. F. Oxalideæ).

Geranium. 1 Griffel med 5 Ar; femdelelig Spaltefrugt. (10, 1).

Ononis

Ulex

Sarothamnus

Genista

Cytisus

Anthyllis

$\left. \begin{array}{l} \text{Ærteblomst, 1} \\ \text{Griffel, Frugten} \\ \text{en Bælle.} \end{array} \right\} (17, 3).$

3. Orden. Polyandria (Mangehannede).

3. *Althæa* L. Yderbægeret 6—9-fliget; Bægeret femdeelt; Kronblade 5; Frugten mangedelelig Spaltefrugt med nødagtige

Smaafrugter, ordnede krandsformigt omkring den midtstillede Griffel.

4. **Malva** L. Yderbægeret trebladet, forøvrigt som foreg.
(3—4. N. F. *Malvaceæ*).

I. Pentandria.

1. *Linum*. Hør.

906. **L. catharticum** L. (Vild H.) H. 353; Drej. n. 351; F. D. 851; *Cathartolinum pratense* Rchb. ic. fl. germ. VI, fig. 5153.

Bladene modsatte, elliptiske, de nedre ovale eller omvendt-ægformede; *Blomsterne* i Qvast; *Bægerbladene* elliptiske, tilspidsede, kirtlet-randhaarede, halvt saa lange som Kronbladene, omtrent af Længde med Kapselen; *Frøene* oval-halvmaaneformede, blege.

$\frac{1}{4}$ —1' høi. Kronbladene smaae, hvide med gul Negl. 6—8. ☉.

β , *condensatum* M. Lange, Ledstykkerne af Længde med eller kortere end Bladene.

Paa Enge, især med tørvholdig Bund, i Kratskove o. s. v.; alm. udbredt. β , F. Midskov paa Hindsholm (12).

† **L. usitatissimum** L. (Sæd-H.) Rchb. l. c. fig. 5155.

Bladene spredte, lancetformede; *Bægerbladene* ægformede, svagt randhaarede uden Kirtler; *Frøene* omvendt-ægformede, brune, glindsende.

1—1 $\frac{1}{2}$ ' høi. Kronbladene blaae. 7—8. ☉.

Alm. dyrket.

II. Decandria.

2. Oxalis. Gjøgemed.

a. Ingen overjordisk Stængel. Kronbladene (hvide eller rødlige) 3—4 Gange længere end Bægeret; Frøene stærkt furede paalangs, med svagere Tværstriber.

907. **O. Acetosella** L. (Suurkløver). H. 509; Drej. n. 695; F. D. 980; Rehb. ic. fl. germ. V, fig. 4898.

Rodstokken vandret, med tandformede Skjæl af de vedblivende Bladpuder; *Bladene* trekoblede; *Smaabladene* omvendthjerteformede, duunhaarede, især paa Underfladen; *Blomsterstilkene* længere end *Bladene*, med 2 skjælagtige, forneden sammenvoxne *Dækblade* ovenfor Midten; *Kronbladene* omvendtægformede, svagt udrandede.

Kronbladene hvide med røde Aarer. De senere Blomster kronbladløse, de tidligst udsprungne ofte ufrugtbare. 4—5. 4.

β, lilacina! Kronbladene lila med violette Aarer.

I Løvskove, paa Muldjord, meget alm. **β, Sj.** Ledreborg! Ravns-
holt Skov, Store Hareskov (14), Søllerød (Kyll.); **Bornh.** Rønne,
Almindingen (Hjorth); **Møens** Klint (5); **Falst.** paa fl. St. (14);
Langel. ved Lindelse (12); **F.** Grøftebjerg (A. Lange), Skaarup (19)!

b. Den overjordiske Stængel grenet; Kronbladene gule, af Bægerets dobbelte Længde; Frøene riflede paatværs.

908. **O. stricta** L. (Rank G.) H. 510; Drej. n. 696; Rehb. l. c. fig. 4895; O. corniculata F. D. 873.

Rodstokken kort, buformigt opstigende, med kjødfulde *Udløbere*, som overvintre, medens Hovedaxen bortdør; *Stængelen* opret, de *nedre Grene* korte; *Bladene* som hos foreg., men med mindre, glatte eller i Randen svagt duunhaarede *Smaa-
blade*; *Axelblade* 0; *Blomsterstilkene* 2—3-blomstrede, med smaae, sylformede *Dækblade* ved Grunden af de mod Modningen opret-
aabne *Smaablomsterstilke*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Blomsterne meget mindre end hos foreg. 7—8. 4.

Ved Gjærder, især omkring Byer, Ukrud i Haver og mellem Sæden, ikke alm. og sandsynligviis oprindelig forvildet: *Sj.* Refsnæs (15), Frederiksværk! Ramløse (Rafn), Gurre (9), Tikjøb! Hellebæk! Helsingør, Fredensborg (Dr.), Nøddebo, Frederiksborg (H.), Ruder-gaard (Thomsen), Aldershvile (14)! Ørholm! Lyngby! Classens Have (19), Nysø (H.), Sorø alm.! Munkebjergby (Lund), Høve, Flakkebjerg (Nielsen); *Møen* ved Liselund (12) og Marienborg; *Loll.* Aalholm (H.); *F. V.* Skjerninge! *Sl.* Nyværk ved Slesvig (16), Owschlag (20). ☞

909. *O. corniculata* L. (Nedliggende G.) H. 510; F. D. 1753; Rchb. l. c. fig. 4896.

Ingen Udlobere; Stængelen kort, *de nedre Grene* forlængede, nedliggende og rodslaaende; *Bladstilkene* og *Bladenes Underflade* duunhaarede; *Åxelbladene* tilvoxne til *Bladstilk*en; *Blomsterstilkene* 1—5-blomstrede, med imod *Modningen* tilbagebøiede *Smaa blomsterstilke*, forøvrigt som foreg. 6—9. ☉.

Forekommer sjeldent som Ukrud, oprindeligt indført med Sæd fra Syd-Europa: *Sl.* Gelting, Slotsvolden ved Husum, alm. i Haver og ved Gjærder omkring Garding i Eidersted (16); *Bornh.* i Haver (Rafn). ☞

III. Polyandria.

3. Althæa. Stokrose.

910. *A. officinalis* L. (Læge-S.) H. 741; Drej. n. 701; F. D. 530; Rchb. ic. fl. germ. V, fig. 4849.

Stængelen opret; *Bladene* æg-hjerteformede, *de nedre* fem-, *de øvre* trelappede, med grovt-tandede Lapper; *Blomsterstilkene* mangeblomstrede, i *Bladhjørnerne*, flere Gange kortere end *Bladene*; *Yderbægerets Flige* linie-lancetformede, kortere end *Bægeret*.

Hele Planten blødt hvidfiltet, 2—3' høj. Kronen rosenrød. 7—9. 4.

Ved Strandbredder ikke alm. og kun funden i de sydlige Egne af Landet: *J.* Strandkliner ved Fredericia (12)! *Sl.* Bæverør ved Gelting (16); Baagø ved Assens (Kyll.); *F.* Gyldensteen (18), *Thorseng* mellem Bregninge og Vemmenæs (H.); *Langel.* ved Rudkjøbing og Magleby (H.); *Loll.* Færgelandet ved Nakskov! Dueholm (9), Aalholm (H.), Blangs (19); *Falst.* ved Vennerslund (H.), Ourehoved, Lindeskoven (Koch), Vaalse, Tjæreby Fang (14)! *Møen* (H.); *Sj.* mellem Christiansholm og Flaskekroen (forvildet)! ☞

4. Malva. Katost.

- a. Stængelbladene dybt fligede eller snitdeelte, Blomsterne enlige i Bladhjørnerne.

911. **M. moschata** L. (Moskus-K.) H. 743; Drej. p. 231; F. D. 905; Rchb. l. c. fig. 4841; H. N. X, 37.

Stængelen opret, haaret af udstaaende og oftest enkelte Haar; *Bladene* kreds rundt-nyreformede, *de nedre* haandlappede, *de øvre* haandsnitdeelte med enkelt eller dobbelt fjerfligede Afsnit; *Blomsterstilke* og *Bæger* stivhaarede; *Yderbægerets* Blade linie-lancetformede; *Smaafrugterne* jævne, tæt duunhaarede.

1—1½' høi. Bladene have, naar de gnides, en svag Moskuslugt, dog forekomme de ogsaa ulugtende. Kronen rosenrød eller hvid. 7—9. 4.

I Krat og ved Gjærder, funden i alle Provindser, men ikke alm. og især ved beboede Steder, sandsynligviis oprindelig indført. *

912. **M. Alcea** L. (Rosen-K.) H. 742; Drej. n. 697; F. D. 1882; H. N. XIV, 34; *M. excisa* Rchb. l. c. fig. 4842 b.

Stængelen opret, haaret af tiltrykte, knippestilte Haar; *Bladene* hjerteformede, *Rodbladene* haandlappede, *Stængelbladene* dybt haandfligede eller -snitdeelte med tandede eller halv-finnede Flige; *Blomsterstilke* og *Bæger* graafiltede; *Yderbægerets* Blade ægformede; *Smaafrugterne* glatte, svagt rynkede paatværs.

1½—2' høi. Kronerne rosenrøde, større end hos foreg. 7—8. 4.

β, fastigiata (M. fastigiata Cavan.). H. N. XIII, 51; M. *Alcea* Rchb. l. c. fig. 4842 a. Graaagtig af tiltrykte Stjernehaar; *de mellemste* Stængelblade femfligede, *de øvre* treffligede, med faatandede eller næsten hele Flige.

Ved Gjærder og i Kratskove, forekommer i alle danske Provindser, men sporadisk og ikke alm. *β, Sj.* ved Classens Havel Skjelskør (Nielsen); *Falst.* ved Vaalse (14); *Loll.* Juellinge (19); *Thorseng* ved Lundby med Hovedarten (12); *Sl.* ved Egernefærde i Krat paa Veien til Louisenlund (16). □

b. Bladene lappede, Blomsterne knippestillende
i Bladhjørnerne.

aa. Blomsterstilkene efter Afblomstringen oprette.

913. **M. silvestris** L. (Almindelig K.) H. 741; Drej. n. 698; F. D. 1223; Rchb. l. c. fig. 4840.

Stængelen opret eller opstigende, tilligemed *Blad- og Blomsterstilke* samt Bægeret stivhaaret af udstaaende Haar; *Bladene* nyre-hjerteformede, de nedre (budt-) 5—7-, de øvre (spidst-) 3—5-lappede, *Lapperne* tandet-rundtakkede; *Yderbægerets* Blade lancetformede; *Kronbladene* omvendt-hjerteformede, dybt ud-randede, 3 Gange længere end Bægeret; *Smaafrugterne* glatte, rynkede paatværs, skarpkantede.

2—3' høi. Kronen rødviolet, sjeldnere hvid (Bringe i Sjæll., 14). 7—9. ☉.

Ved Gjærder og Veie, omkring Byer, alm. i de fleste Egne af Danmark.

Ann. **M. mauritiana** L. Alle Bladene budt femlappede, Bladstilke og Blomsterstilke glatte, Kronbladene mørk carmoisinrøde, er funden forvildet paa Glaciere mellem Østerport og Kastellet (19).

M. nicæensis All. Bladene nyreformede, budt 5—7-lappede; Blomsterstilkene efter Afblomstringen oprette eller udstaaende, stivhaarede; Smaafrugterne haarede, nætformigt rynkede, med ophøiet Rand; Kronbladene knap dobbelt saa lange som Bægeret, blegblaa eller lila. Forvildet ved Kastrup Mølle paa Amager (19). (Tidligere paa Pladsen ved Thorvaldsens Museum)!

bb. Blomsterstilkene efter Afblomstringen nedadboiede.

914. **M. vulgaris** [Trag., Fr. nov. p. 219] (Rundbladet K.) Drej. n. 699; Rchb. l. c. fig. 4836; H. N. VIH, 34; **M. rotundifolia** L. (tildeels), H. 742; F. D. 721.

Stængelen opstigende eller fremliggende; *Bladene* langstilkede, nyreformede, haandlappede, med 5—7, tandet-rundtakkede, *Lapper*; *Yderbægerets* Blade linie-lancetformede, kortere end det med Stjernehaar og længere Randhaar beklædte Bæger; *Kronbladene* kileformede, ud-randede, 2—3 Gange længere end Bægeret; *Smaafrugterne* jævne, i Randen afrandede.

Kronbladene lila eller hvide med røde Aarer. 6—9. ☉ eller ☉.

Ved Gjærder, Veie, Rendestene o. s. v. meget alm.

915. **M. borealis** [Wallm. i Liljebl. Sv. Fl. ed. 3, 374] (Smaablomstret K.) Drej. n. 700; *M. rotundifolia* L. fl. Suec., Fr. nov. p. 218; Rehb. l. c. fig. 4835; H. N. VIII, 33; *M. pusilla* With., H. 742; F. D. 1825.

Stængelen fremliggende eller opstigende; *Bladene* bredt nyreformede, haandlappede med 5—7 korte, saugtakket-rundtakkede *Lapper*; *Yderbægerets* Blade linie-lancetformede, af Længde med det randhaarede *Bæger*; *Kronbladene* svagt ud-randede, af Længde med Bægeret; *Smaafrugterne* nætformigt rynkede, skarpkantede.

Kronbladene hvide med svagt Anstrøg af lila, meget mindre end hos foreg. 6—8. ☉.

Ved Strandbredder, paa Diger omkring Byer, ikke sjelden og iagttaget i alle danske Provindser, men forekommer især i Strandegnene.

17^{de} Klasse. Diadelphia (Toknippede).

1. Orden. Hexandria (Sexhannede).

1. **Fumária** L. (part.). Bægeret tobladet, affaldende; Kronen uregelm. firebladet, 2 ydre Kronblade, hvoraf det ene med Spore, og 2 indre, sammenstødende; Frugten enfrøet, uop springende.

2. **Corýdalis** DC. Bæger- og Kronblade som foreg., (Bægerbladene ofte 0). Frugten en fleerfrøet, i 2 Klapper opspringende Kapsel. (1—2. N. F. Fumariaceæ).

2. Orden. Octandria (Ottehannede).

3. **Polýgala** L. Bægeret fembladet, med 2 indre, større og 3 ydre, mindre Blade; Kronen uregelret; Støvdragerne forneden sammenvoxne med Kronbladene; Frugten en torummet Kapsel med enfrøede Rum; Frøene hængende, haarede, med en trelappet Frøhud ved Grunden. (N. F. Polygalæ).

3. Orden. *Decandria* (*Tihannede*).

(Bægeret femtandet eller femfliget, alm. tolæbet; Kronen uregelm. fembladet (Ærteblomst): det øvre Blad (Fanen) større, de 2 mellemste indbyrdes ligestore (Vingerne), de to nedre sammenvoxne (Kjølén); Frugten en Bælle; Bladene for det meste sammensatte, med Axelblade ved Grunden. (4—21. N. F. Leguminosæ α, Papilionaceæ).

A. Alle Støvtraadene sammenvoxne i eet Bundt. (16, 2).

a. Bægeret tolæbet.

4. *Ulex* L. Bægeret til Grunden todeelt, Overlæben utydeligt to-, Underlæben tretandet; 2 Dækblade i Form af et Yderbæger ved Grunden; Griffelen traadformet, opstigende; Bællen opblæst, af Længde med Bægeret. (Bladene enkelte, tornformede, Grene og Smaagrene tornspidsede).

5. *Genista* L. Bægerets Overlæbe til Grunden tvedeelt, Underlæben tretandet; Griffelen sylformet, opstigende; Bællen længere end Bægeret. (Bladene enkelte, ikke tornformede).

† 6. *Cytisus* L. Bægerets Overlæbe totandet, Underlæben tretandet; Griffelen sylformet, i Spidsen bøiet, med skjævt Ar; Bællen længere end Bægeret. (Bladene trekoblede).

7. *Sarothamnus* Wimm. Griffelen sneglehuusformigt indrullet, i Spidsen udvidet, med hovedformet Ar, forøvrigt som foreg.

b. Bægeret femdeelt.

8. *Ononis* L. Bægeret femfliget, vedblivende, ved Frugtmodningen aabent; Bællen siddende eller kortstillet, fremragende udenfor Bægeret. (Bladene enkelte eller trekoblede).

9. *Anthyllis* L. Bægeret uregelm. femtandet, vedblivende, opblæst, ved Frugtmodningen lukket; Bællen stillet, indsluttet af Bægeret (Bladene uligefinnede).

B. De 9 Støvtraade sammenvoxne, den tiende fri.

a. Bællen tværdelelig (Ledbælle).

10. *Ornithopus* L. Blomsterne i Skjærm; Bællen halsbaandformet, indsnøret ved Leddene, Tværrummene enfrøede (Bladene uligefinnede).

b. Bællen opspringende paalangs eller uop-
springende.

aa. *Bladene uligefinnede.*

11. **Onobrychis** Tournef. Bællen enrummet, enfrøet, uop-springende, nætformigt-rynknet (Blomsterne i Klase; Bladene mangeparrede).

12. **Astragalus** L. Bællen ved den indbøiede Rygsøm ufuldstændigt torummet, fleerfrøet (Blomsterne i Ax eller Hoved; Bladene mangeparrede).

† **Phaseolus** L. Bællen opspringende, fleerfrøet, enrummet eller indsnøret ved ufuldstændige Skillevægge mellem Frøene; Griffelen sneglehuusformigt snoet (Blomsterne i Klase; Bladene sammensatte af et Par Sidesmaablade og et Endeblad, med Smaaaxelblade ved Grunden).

bb. *Bladene ligefinnede.*

13. **Vicia** L. Griffelen traadformet, noget fladtrykt, mod Spidsen overalt haaret eller paa Yderfladen under Arret skjæg-haaret, forøvrigt glat; Bællen med et kortere eller længere Næb paa Grund af den buformigt opstigende Rygsøm (Bladene oftest mangeparrede, Endebladet omdannet til en Sling-traad eller Braad).

14. **Ervum** L. Griffelen trind, traadformet, mod Spidsen overalt haaret; Bællen faafrøet, i Spidsen afrundet, uden Næb (Endebladet omdannet til en Slingtraad).

15. **Pisum** L. Griffelen ved Grunden knæbøiet, paa Yderfladen udhulet, paa Inderfladen trekantet-kjølet; Arret fladtrykt fra Siden, paa Inderfladen haaret; Navlen langagtig-oval (Endebladet omdannet til en Slingtraad; Axelbladene større end Smaabladene).

16. **Lathyrus** L. (part.). Griffelen buformigt opstigende eller snoet, oventil fladtrykt fra Ryggen og i Spidsen paa Inderfladen haaret, paa Yderfladen glat; Navlen langagtig-oval (Endebladet omdannet til en Slingtraad).

17. **Orobis** L. Bladene ende med en kort Braad; Bællen opspringende i snoede Klapper; Navlen linieformet, forøvrigt som foreg.

cc. Bladene trekoblede.

a. Kronen fribladet, affaldende efter Afbloomstringen; Bællen længere end Bægeret.

** Bællen mangefrøet.*

18. **Lotus** L. (part.). Kjølen tilspidset i et Næb; Griffelen knæbøiet-opstigende, overalt traadformet og tyndere end Arret; Bællen trind, linieformet, ret, opspringende i snoede Klapper. (Blomsterne i Hoved eller Skjærm).

19. **Tetragonolobus** Scop. Griffelen bueformigt opstigende, i Spidsen under Arret udvidet; Bællen firekantet, paa Kanterne vinget, forøvrigt som foreg. (Blomsterne enlige eller parviis).

20. **Medicago** L. Kjølen budt; Griffelen tyndere end Arret; Bællen seglformet eller sneglehuusformigt snoet, kun opspringende i den ene Søm eller uoppringende. (Blomsterne i Hoved eller kort Klase).

21. **Trigonella** L. Kjølen budt; Griffelen traadformet; Bællen fladtrykt, mere eller mindre bøiet. (Blomsterne enlige eller 2—3 samlede; hos udenlandske Arter ofte i Skjærm eller Hoved).

*** Bællen faafrøet.*

22. **Melilotus** Tournef. Kjølen budt; Bællen rundagtig-ægformet, 1—2-frøet. (Blomsterne i Klase).

(*Medicago lupulina* L. — Bællerne alm. enfrøede).

β. Kronen sambladet, vedblivende i visnet Tilstand efter Afbloomstringen; Bællen kortere end Bægeret.

23. **Trifolium** L. Kronens nedre Deel sambladet og sammenvoxet med Støvtraadernes Bundt; Bællen faafrøet. (Blomsterne i Hoved eller Skjærm).

I. Hexandria.

1. Fumaria. Jordrøg.

916. *F. capreolata* L. (Klattice J.) H. 750; Drej. n. 702; Hammar Monogr. Fum. p. 24 tab. V; F. D. 2359; Rchb. ic. fl. germ. III, tab. 4, fig. 4456; H. N. XIII, 47.

Stængelen klattice ved Hjælp af de snoede Bladstilke; *Bladene* finnedede med trekoblede Smaablade; *Bismaablade* dybt tredeelte, med kileformede, 2—3-lappede *Afsnit*, Lapperne ovale; *Smaablomsterstilkene* efter Afblomstringen bueformigt tilbagebøiede; *Bægerbladene* brede, ægformede, tandede, halvt saa lange som Kronen; *Frugterne* kuglerunde, jævne.

Planten blaagraa. Var. med opret-aabne Blomsterstilke, Kronbladene hvide eller hvidgule, i Spidsen mørkrøde. 6—9. ☉.

Paa dyrkede Marker og ved Gjærder, sjelden: *J.* i Mængde ved Horsens i Korn- og Kartoffelmarker (Dr.?) nu forsvunden (2); *Sl.* Havekrud ved Gram (20), Steengjærder ved Aschau pr. Egerndorfe, Wyk paa Føhr (16); *Moen* (H.). ☞

917. *F. officinalis* L. (Læge-J.) H. 749; Drej. n. 703; Hamm. l. c. p. 1, tab. I; F. D. 940; Rchb. l. c. tab. 3, fig. 4454.

Stængelen opret (sjældnere svag, med snoede Bladstilke); *Bladene* som foreg., men med bredere eller smalere lancetformede, spidse *Lapper*; *Blomsterstilkene* efter Afblomstringen opret-aabne; *Bægerbladene* ægformede, tilspidsede, $\frac{1}{3}$ af Kronens Længde, bredere end Blomsterstilkene; *Frugten* kugleformet, i Spidsen indtrykt, næsten omvendt-nyreformet, knudret-rynket.

Planten lidet blaagraa. Kronbladene mindre end hos foreg., rosenrøde, i Spidsen mørkrøde, de ydre med grøn Midtnerve. 5—8. ☉. Var. i Henseende til Blomstens Størrelse og Farve, Bægerbladene (hele eller tandede), Lapperne Form o. s. v., og desuden:

β, *minor* Hamm. l. c. p. 3 (F. offic. *β*, *tenuiflora* 1 Udg., ikke Fr.). Lapperne budte, Klaserne faablomstrede, med mindre Blomster; Planten mere blaagraa.

γ, *floribunda* Hamm. (F. officinalis *β*, *densiflora* Parl.). Bladfligene smalere, Klaserne tætblomstrede; Blomsterne mørkere.

Paa dyrket Jord i Have og Mark alm. — β , især ved Gjærder og paa skyggefulde Steder. γ , som ved Dyrkningsforsøg i bot. Have er gaaet tilbage til Hovedarten, er funden i *Fyen* ved Veistrup (19).

918. **F. Vaillantii** [Lois. Not. p. 102] (Smalfiget J.) Hamm. l. c. p. 8, tab. II; Rchb. l. c. tab. 1, fig. 4452; H. N. III, 25.

Stængelen svag, meget grenet, med oprette eller klattrende Grene; *Bladene* som foreg., men *Afsnittene* 2—3-fligede, med linieformede, spidse *Flige*; *Bægerbladene* meget smaae, mange Gange kortere end Kronen, smalere end de efter Afblomstringen oprette eller udspærrede *Smaablomsterstilke*; *Frugten* kugleformet, i yngre Tilstand med en svag Spids, knudret-rynket.

Hele Planten blaagraa; Kronbladene hvide eller blegrøde, i Spidsen mørkrøde, mindre end hos foreg. 6—8. ☉.

Paa dyrkede Marker, meget sjelden: J. mellem Sæden paa Aagaards Kalkbakker (16). *

2. *Corydalis*. Lærkespore.

a. *Capnoides* DC. Rodstok 0; *Stængelen* mangebladet; *Klaserne* modsatte *Bladene*; 2 *Frøblade*.

919. **C. claviculata** [DC. Fl. fr. 4, 638] (Klattrende L.) Rchb. l. c. tab. 5, fig. 4457; H. N. XIII, 46; *Fumaria* L., H. 751; F. D. 340.

Stængelen svag, klattrende; *Bladene* finnede; *Smaabladene* alm. 2—3-koblede med elliptiske eller ovale, heelrandede *Bismaablade*, de yderste omdannede til *Slyngtraade*; *Dækbladene* æg-lancetformede, lidet længere end de meget korte *Smaablomsterstilke*; *Griffelen* affaldende.

Bladene meget tynde, paa Underfladen blaagraae. *Kronerne* smaae, hvide eller bleggule. 6—7. ☉.

Mellem Buske, især paa fugtig, tørvholdig Grund: Sj. Skamstrup (Drej. Herb.), V. for Helsingør mellem *Rubus* (21)! Klosterriis ved Hornbæk! Horserød Hegn (15), Skovhusene i Gribs Skov nærvæd Esrom! *Møen* ved Askeby (Olufsen); i *Fyen* ikke sjelden; paa *Halvøens* Østkyst sporadisk: Steenalt Skov (H.), Nebbegaard ved Veile Fjord! Christiansfeld (H.), mellem Drey og Lyksborg (16). *

b. *Bulbocapnos* Bernh. Rodstokken knollet; Stængelen faabladet; Klasen endestillet; 1 Frøblad.

aa. Knollen heel, skjældækt, med knippestilte Rodtrævler; ingen Rodblade, men et skedeformet Blad uden Plade ovenfor
Stængelens Basis.

920. *C. fabacea* [Pers. Syn. 2, p. 269] (Liden L.) H. 748; Drej. n. 705; T. Fries bot. not. 1854 p. 40; F. D. 1394; Rehb. l. c. tab. 7, fig. 4460; H. N. 30; *Fumaria bulbosa* β, L.

Bladene dobbelt-trekoblede; *Bismaabladene* 2—3-fligede eller -snitdeelte, med kort braadspidsede eller næsten spidse Flige; *Klasen* kort, faa-, men tæt blomstret, før og efter Blomstringen nikkende; *Dækbladene* ægformet-elliptiske, hele, kortere end Blomsterne; *Sporen* næsten ret; *Griffelen* under Blomstringen opstigende; *Kapselen* æg-lancetformet, 3 Gange længere end de oprette *Smaablomsterstilke*.

2—6" høi. Var. (men sjeldent) med indskaarne Dækblade; Kronbladene violetrøde. 4. 4.

I Løvskove, alm. udbredt. !*

921. *C. pumila* [Host, Fl. austr. 2, p. 304] (Kortstillet L.) T. Fr. l. c. p. 40; Rehb. l. c. fig. 4461; H. N. VIII, 26; C. Halleri H. 749; Drej. n. 706; F. D. 1224; C. *Lobellii* Tausch.

Bladene som hos foreg., men med bredere og mere budte Flige; *Klasen* tæt, mangeblomstret, opret eller tilsidst nikkende; *Dækbladene* bredt-kileformede, fingerdeelte, af Længde med eller længere end Blomsterne; *Bægerbladene* 0; *Sporen* i Spidsen lidet bøiet; det sporeløse ydre Kronblad uden Pukkel ved Grunden; *Griffelen* opstigende; *Kapselen* æg-lancetformet, 3 Gange længere end de tilsidst udadbøiede *Smaablomsterstilke*.

3—8" høi. De ydre Kronblade rødviolette, de indre hvide eller bleggule. 4—5 (idetmindste 8 Dage senere end foreg.). 4.

β, *latiloba*! (*C. grandifolia* Mortens. mscr.) Smaabladene og Dækbladenes Flige meget brede, Dækbladene længere end Blomsterne; det sporeløse ydre Kronblad puklet ved Grunden.

I Krat og Løvskove med foreg., men sjeldnere: *Sj.* Egebæksvang (21)! Charlottenlund, Fortunen, Sorgenfri! Bidstrupgaard (20), Dragerup Skov ved Holbæk (15), Asnæs (Smith!); *F.* Hofmangsgave (H.); *J.* Haraldslund (1), Ulsund ved Ringkjøbing (16); *Sl.* Haderslev, Nyvæk (16); *Loll.* ved Nakskov (Kisky); *Bornh.* Almindingen (20), Almegaard (Hoff), Seiersgaard ved Rønne (Zahrtmann), Ypernestad Fiskerleie, Lindholmsklipperne (Baagøe). *β*, *Falst.* ved Abelvig og Grønsund (14). ¹*

Anm. I Egebæksvang ved Helsingør har jeg fundet en Form forskjellig fra foreg. ved Blomsterstilkene over halvt saa lange som Kapselen. Om denne hører til *C. laxa* Fr. (mant. 3, 86, T. Fr. l. c. p. 39, H. N. VIII, 25), som beskrives med tæt blomstret, nikkende Klase, Dækblade af Blomsternes Længde, Blomsterstilkene næsten saa lange som Kapselen, Sporen ret, Griffelen ikke knæbøiet), kan jeg formedelst Mangel af Blomster-Expl. ikke afgjøre.

922. *C. solida* [Sm. Engl. Fl. 3, p. 353] (Langstilket L.) Fr. mant. 3, 85; S. veg. Sc. 145; T. Fr. l. c. p. 39; H. N. XI, 34; *C. digitata* Pers., Rchb. l. c. fig. 4462; *Fumaria bulbosa* γ, L. sp. (α, Fl. Suec.); *Bulbocapnos Halleri* Drej. Bot. not. 1842 p. 34.

Bladene som hos foreg., men med smalere *Flige*; *Klasen* opret, forlænget, mangeblomstret; *Dækbladene* dybt fingerdeelte, kortere end Blomsterne; *Bægerbladene* 0 eller tidligt affaldende; *Sporen* i Spidsen bøiet; det sporeløse ydre *Kronblad* i Spidsen udrandet, med en skarp Kjøl paa Ryggen, som naaer heelt ud til Indskjæringen, ved Grunden puklet; *Griffelen* fra en knæbøiet Basis opstigende; *Smaablomsterstilkene* fine, tilsidst ud-bøiede, af Længde med den lancetformede *Kapsel*.

3—8" høi. Kronbladene violet-røde, de indre hvide med røde Striber. 4 (tidligere end foreg.). 4.

I Kratskove meget sjelden: *Sl.* Gram forvildet (A. Rafn)! Husum, Tønning (F. Müll.). ²*

bb. *Knollen* tilsidst huul, med spredte Rodtrævler, uden Skjel; intet skedeformet Blad, men 2—flere fuldt udviklede Blade fra Rodstokken.

923. *C. cava* [Schweigg. & Kört. Fl. erlang. 2, p. 44] (Huulrodet L.) Drej. n. 704; H. N. I, 33; *C. bulbosa* Pers. H. 747; Rchb. l. c. tab. 8, fig. 4463; *Fumaria bulbosa* α, L. Sp. (γ, Fl. Suec.), F. D. 605.

Stængelbladene som hos de foregaaende; *Rodbladene* langstilkede; *Klasen* forlænget, under og efter Afblomstringen opret; *Dækbladene* elliptiske eller ægformede, hele, kortere end Blomsterne; *Bægerbladene* meget smaae, tidligt affaldende; *Sporen* i Spidsen tyk, buetrummet, det sporeløse *ydre Kronblad* i Spidsen udrandet, med en skarp Kjel paa Ryggen, som ikke naaer til Indskjæringen; *Griffelen* opstigende; *Smaablomsterstilkene* 2—3 Gange kortere end den modne *Kapsel*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronbladene røde, rødviolette eller hvide. 5. 4.

I Løvskove paa løs Muldjord, funden i alle Provindser, men i mange Egne ikke alm., hyppigst i Sydsjælland, Fyen og paa de sydlige Øer. [3]

II. Octandria.

3. Polygala. Mælkurt.

924. *P. vulgaris* L. (Almindelig M.) H. 751; Drej. n. 707; F. D. 516; Rchb. ic. crit. I, 52—53; ic. fl. germ. VIII, tab. 1344 fig. 1; H. N. XIV, 32 b.

De nedre Blade elliptiske, *de øvre* længere, lancetformede; *Klaserne* endestillede, mangeblomstrede; *Dækbladene* 3 (det ene større), affaldende ved Afblomstringen; de 2 større *Bægerblade* elliptiske, trenervede, med i Spidsen sammenstødende Nerver, Sidenervene udadtil forgrenede, med sammenløbende Grene; *Kapselen* omvendt-hjerteformet; kortere og oftest smalere end de større *Bægerblade*.

6—7. 4. Var. i Henseende til Blomsternes Størrelse og Farve (blaa, røde og hvide), *Bægerbladenes* Længde og Brede i Forhold til *Kapselen* o. s. v. Den meest afvigende Form er:

* *oxyptera* (Rchb. ic. crit. I, 47—49; ic. fl. germ. I. c. fig. 1. *Stænglerne* talrige, nedliggende; *Klasen* ensidig; *de større Bægerblade* smalere end *Kapselen*.

Hovedarten forekommer meget alm. paa udyrkede Græsmarker, Bakker og solaabne Steder i Skove; * paa Lyngheder og Overdrev ikke sjelden, især paa Halvøen.

925. **P. depressa** [Wenderoth Schrift. d. Ges. z. Marb. p. 1, t. 1] (Spæd M.) Drej. i Krø. Tidsskr. I, p. 226: Rchb. ic. fl. germ. XVIII, tab. 1347, fig. 1; P. serpyllacea Whe.; P. vulgaris * depressa Fr. Mant. 2; Lge. Haandb. 1 Udg. p. 405.

Stænglerne talrige, fine, nedliggende, med oftest modsatte Grene; *de nedre Blade* modsatte, bredt elliptiske eller omvendt-ægformede; *Klaserne* faa-(4—6-) blomstrede; fra de øvre Bladhjørner udgaae Blomstergrene, der naae meget høiere end den endestillede Klase (som derved bliver tilsyneladende side-stillet), forøvrigt som foreg.

Ved de lavere og finere Stængler, frisk grønne, noget kødfulde Blade og faae, men store, smukt blaae Blomster let kjendelig fra foreg. 7—9. 4.

I Lyngmoser mellem Sphagnum, sjældnere end foreg. og kun bemærket paa *Halvøen*: J. Vuust i V. Hanherred (Grønlund)! Møgelkjær ved Viborg (Feddersen)! ved Eveldrup (Dr.)! Thorsted pr. Ringkjøbing! Sl. Gram (8)! Marieskoven ved Flensborg!

926. **P. amara** L. (Bitter M.) H. 752; Gren. & Godr. fl. Fr. I, p. 196; F. D. 1169; H. N. III, 14; P. uliginosa Rchb. ic. crit. I, 40—41; ic. fl. germ. XVIII, tab. 1348, fig. 2—3.

Rodbladene rosetteformigt samlede, omvendt-ægformede, afrundede, *Stængelbladene* elliptisk-omvendt-ægformede; *Klaserne* endestillede; *Dækbladene* som hos foreg.; de 2 større *Bægerblade* elliptiske eller omvendt-ægformede, trenervede, med neppe sammenstødende Nerver, Sidenerverne udadtil forgrenede, med ikke sammenløbende Grene; *Kapselen* omvendt-hjerteformet, bredere, men lidet kortere end eller af Længde med de større Bægerblade.

Planten lavere, Kronen mindre end hos de foreg., mørkeblaa, sjældnere blegt mælkeblaa. Bladene af bitter Smag (dette er dog kun i ringe Grad Tilfældet med den sjællandske Plante). 5—6. 4.

Paa Enge og Kalkbakker, sjelden: Sj. Engen V. for Leersøen (mellem Uttersløv Mølle og Lygten)! J. Silstrup ved Thisted (Jacobsen)! Blegkilde (M. Vahl), Dybdal og Klarupgaard ved Aalborg (Dr.). 4*

III. Decandria.

4. Ulex. Tornblad.

927. *U. europæus* L. (Opret T.) H. 756; Drej. n. 708; F. D. 608.

Grenene udspærrede, stikkende; *Bladene* naaleformede, furede, endende i en stikkende Torn; *Blomsterstilkene* kortere end Bægeret, med 1 smalere Dækblad ved Grunden og 2 bredere, ægformede Dækblade foroven; *Vingerne* længere end Kjolen, lidet kortere end *Fanen*; *Bægeret* og *Bællen* tilligemed Blomsterstilke og Grene uldhaarede.

4—7' høi Busk. Kronerne gule, langs Kjølens Rand silkehaarede, forøvrigt glatte. 10—11. *h*.

Ved Gjærder, især paa sandig Jordbund, sporadisk og ikke alm.: *Bornh.* ved Rønne Citadel! Seiersgaard ved Rønne (Hjorth); *Sj.* Fredensborg (Jørg.), Charlottenlund (Dr.); *Møen* paa Lilleklint! *Falst* ved Bøtø; *Loll.* ved Taars pr. Sækkjøbing (5); *F.* Gribsvad! Minnedal! Assens (H.), Hindsgavl (28); *J.* Thaarupgaard ved Viborg (Drej. Herb.), Steenalt Skov (H.), Randers, Mattrup (16), Rathlousdal (Jørg.), Houer! Veile (H.), Bredstrup (12), N. for Hjerting (16); *Als* ved Augustenborg (H.); *Sl.* Haderslev (16), Højbjerg ved Arrild (Fabr.-Müller), Aabenraa (Grønlund), Egernførde, Friederichsruhe ved Rendsborg (16), Mildsted ved Husum (F. Müll.), Sylt (F. D.), Føhr (H.). Paa flere af disse Steder synes den oprindelig at være plantet som Hegn. *

5. Genista. Visse.

a. Stængelen tornet af tilspidsede Grene (Blomsterne udvikles af Biknopper ved Siden af de tornede Grene).

928. *G. anglica* L. (Engelsk V.) H. 755; F. D. 619; H. N. XIII, 63.

Bladene lancetformede, tilligemed *Grenene* glatte; *Axelblade* 0; *Dækbladene* bladagtige, længere end Blomsterstilkene; *Bællerne* lancetformede, opblæst-trinde, næsten valseformede, glatte, med 6—10 Frøe.

Kronbladene gule. 5—7. *h*.

Paa Lyngbakker og i Hedemoser: paa *Halvoen**) hyppig; i *Fyen* ved Hindsgavl (12), Middelfart (18), Verringe, Vissenberg (H.). Paa de øvrige Øer ikke bemærket. ☞

929. *G. germanica* L. (Tydsk V.) H. 755; F. D. 1826; H. N. XIII, 64.

Bladene oval-lancetformede, tilligemed *Grenene* haarede af udstaaende Haar; *Axelblade* 0; *Dækbladene* sylformede, kortere end *Blomsterstilkene*; *Bællerne* rudeformet-elliptiske, fladtrykte, uldhaarede, 3—5-frøede.

Kronbladene gule. 6—7. h.

Paa Lyngheder, sjelden og kun funden paa Halvøen: J. Nørholm (H.), Tinneth og Vonge i Ø. Nykirke Sogn! *Sl.* Oxenvad (12). ☞

b. Stænglerne tornløse (*Blomsterne* eller de blomsterbærende *Grene* udvikles af Hovedknoppen i Bladhjørnerne).

930. *G. tinctoria* L. (Farve-V.) H. 754; F. D. 526; H. N. V, 46.

Stængelen opret, med opstigende *Grene*; *Bladene* lancetformede, glatte, i Randen svagt haarede; flade; *Axelbladene* smaae, sylformede; *Blomsterne* i Klaser i Spidsen af de enaarige *Grene*; *Kronbladene* og *Bællen* glatte.

Kronbladene gule. 7—8. h.

Paa Lyngheder, Bakker, Græsmarker, ved Veie: alm. paa *Halvoen*; i *Fyen* ved Hindsgavl, Vissenberg (H.)! Mangler paa de øvrige Øer. ☞

931. *G. pilosa* L. (Haaret V.) H. 754; F. D. 1225; H. N. I, 46.

Stænglerne fremliggende eller opstigende, knudrede; *Bladene* omvendt-ægformede, budte, med indrullet Rand, tilligemed *Grenene* tiltrykt-silkehaarede; *Axelbladene* smaae, tandformede; *Blomsterne* enlige eller 2—3 samlede, omgivne af et Bladknippe, spredte eller i afbrudte Klaser langs opad de toaarige *Grene*; *Fane* og *Kjøl* tilligemed *Bællen* silkehaarede.

*) Hverken denne eller de øvrige Arter af *Genista* bemærket i Vendsyssel (12).

Kronbladene gule. 5—7. \bar{h} .

Lyngheder og sandige Bakker: paa Halvøen ikke sjelden mod ∇ . og S. Mangler paa Øerne. ∇

6. Cytisus. Guldregn.

† 932. **C. Laburnum** L. (Almindelig G.) Jacq. Fl. austr. tab. 380.

Bladene langstilkede, trekoblede; *Smaabladene* elliptiske, paa Underfladen tiltrykt-silkehaarede; *Blomsterne* i mange-blomstrede, nedhængende Klaser.

Træ med glat Bark. Kronbladene gule med mørkbrune Striber paa Fanen. 5—6. \bar{h} .

Dyrkes alm. i Haver og stundom i Hegn, forekommer hist og her forvildet, f. Ex. *Sj.* Hornbæks Plantage! Frederiksdals Skov! *Falst.* Nykjøbing (Koch).

7. Sarothamnus. Gyvel.

933. **S. scoparius** [Koch Syn. I, 152] (Kost-G.) Drej. n. 709; *Spartium scoparium* L., H. 752; F. D. 313; *Sarothamnus vulgaris* Wimm.

Stængelen opret, med riisformede, stive, kantede *Grene*; *Bladene* trekoblede, (paa de yngre *Grene* enkelte), med lancetformede, paa Underfladen tiltrykt-silkehaarede *Smaablade*; *Blomsterne* 1—2 i Bladhjørnerne; *Ballerne* fladtrykte, randhaarede.

2—3' høi, storblomstret, Kronbladene mørkgule. 5—6. \bar{h} .

Paa Bakker og Lyngheder, alm. paa *Halvøen* S. for Limfjorden; paa Øerne sporadisk: *F.* Faaborg (H.); *Falst.* Bregninge (14), Korselitze, Lindeskoven, Bøtø Fang (Koch); *Sj.* omkring Helsingør alm.! Fredensborg (Jørg.), Smidstrup (15), Farum (1), Strandveien ved Charlottenlund! *Møens* Lilleklint!

8. Ononis. Krageklo.

934. **O. campestris** [Koch & Ziz Cat. pal. 22] (Strand-K.) Fr. S. Veg. Sc. 162; H. N. X, 44; *O. spinosa* β , L. (tildeels), Koch Syn. II, 173; L. Herb. IX, 166; *O. spin.* α , *glomerata* Schum. n. 605; H. 757; *O. procurrens* Drej. n. 711 (ifølge Voxest. og Beskr. for en Deel, ikke Wallr.).

Stængelen opret eller opstigende, tilligemed de tornede *Grene* ensidigt kirtlet-duunhaaret; *Bladene* enkelte eller trekoblede; *Smaabladene* linie- eller lancetformet-ovale, skarpt saugtakke, næsten glatte; *Åxelbladene* æg-lancetformede; *Blomsterne* enlige i Bladhjørnerne, de øvre samlede til en Klase; *Ballerne* af Længde med eller længere end Bægeret; *Frøene* 2—4, rupunkterede.

Kronerne rosenrøde med hvid Kjøl. 7—9. \mathfrak{h} .

Paa Strandenge og Marker (hos os kun funden i Nærheden af Havet); i Egnene omkring Østersøen ikke sjelden og især alm. paa de sydlige Øer fra *Falster* til *Ærø*! Ved Kysterne af Vesterhavet og Bælterne sporadisk: *Sl.* Husum (16); *F.* Kjerteminde (9); *Sj.* Reersø (11), Kalkbrænderiet, Amager, Flaskekroen! I de nordligere Egne (omkring Kattégattet) ikke bemærket.

Anm. Det linneiske Navn *O. spinosa* er tvivlsomt og for største Delen at henføre til følg. Art, hvorfor jeg med Fries har optaget det ældre Kochske Navn, (for vor Floras Vedkommende vilde Navnet *O. littoralis* være meest passende). Drej. har (fl. exc. p. 235) sammenblandet Charactererne for denne og følg. Art, hvorfor hans Beskrivelse ikke kan benyttes.

935. ***O. repens* L.** (Mark-K.) *O. arvensis* (L., tildeels), Sm. Engl. Fl.; Fr. S. Veg. Sc. p. 162; H. N. X, 46; *O. spinosa* L. (tildeels), H. 757; Drej. n. 710 (tildeels); F. D. 783? *O. procurrens* Wallr.

Rodstokken krybende; *Stænglerne* nedliggende eller opstigende, alsidigt haarede af klæbrige Haar; *Grenene* oftest tornede; *Bladene* enkelte eller de nedre trekoblede, *Smaabladene* bredt ovale, saugtakke, kirtelhaarede, især paa Underfladen; *Åxelbladene* bredt ægformede; *Blomsterne* enlige i Bladhjørnerne; *Ballerne* kortere end Bægeret, 2—4-frøede; *Frøene* som hos foreg.

Kronerne som foreg. 7—8. \mathfrak{h} . En meget foranderlig Plante, dens vigtigste Former ere:

β , *mitis* (*O. spinosa* α , L. Sp. II; H. N. X, 45). *Grenene* uden Torne, *Blomsterne* ofte parviis samlede.

γ , *spinosissima*! Tornene stærke, ofte grenede; *Bladene* rundagtigt-ovale, tilligemed *Blomsterne* mindre end hos α .

Ved Gjærder, paa Heder og saavel dyrkede som udyrkede Marker, alm. udbredt i Danmark. β , med Hovedarten, sjeldnere; γ , paa Sandbakker: J. Kollerup N. V. for Aarhus! Sj. Beks Kro ved Tiissø! *Bornh.* Hammershuus (Hamann), Sandvig!

936. *O. hircina* [Jacq. Hort. vind. I, 40, t. 93] (Stinkende K.) Drej. n. 712; F. D. 1584; H. N. X, 47; *O. arvensis* Retz. (Linn. herb.); H. 758.

Stængelen opret eller opstigende, tilligemed de tornløse *Grene* alsidigt klæbrig-laaden; *Bladene* trekoblede, *Smaablade*ne elliptisk-ovale, saugtakkede; *Æxlblade*ne ægformede; *Blomster*ne parviis i Bladhjørnerne, samlede til Klaser i Spidsen af *Stængelen* og de øvre *Grene*; *Bællen* kortere end *Bægeret*, 4—5-frøet, *Frøene* som hos foreg.

Større i alle Dele end de foreg. Hele Planten stærkt klæbrig-haaret, af ubehagelig Lugt. Kronerne som hos foreg. Var. med enkelte Blade. 7. *h*.

Paa høje Enge og ved Gjærder, funden i alle Provindser, men i mange Egne sporadisk og ikke alm. Hyppig paa *Bornh.* i *Lolands* vestlige Deel! og i *Jyll.* N. for Liimfjorden. !*

9. Anthyllis. Rundbælle.

937. *A. vulneraria* L. (Gul R.) H. 758; Drej. n. 713; F. D. 988; H. N. X, 48; L. Herb. III, 57.

Bladene uligefinnede, *Smaablade*ne linieformet-ovale eller elliptiske, Endebladet større end Sidebladene; *Blomster*ne i 2 tæt samlede Hoveder i Spidsen af *Stængelen*, omgivne af fingerdeelte *Dækblade*.

4—10" høi. $\frac{5}{2}$ —7. 4. *Stængler*ne og *Bladene* paa Underfladen tiltrykt-silkehaarede; *Bægeret* flettet, var. hvidt, næsten sølvglindsende og (især i Spidsen) rødviollet; Kronerne lysere eller mørkere gule, var.

β , *maritima* (A. *maritima* Schweigg.) Høiere, mere grenet og silkehaaret, med 3—4 Blade paa *Stængelen* og bleggule *Blomster*.

γ , *rubriflora* DC. H. N. XIV, 57. Kronerne mørkt hoi-røde, *Stængler*ne alm. lavere og mere udstrakte.

Paa tørre, sandige og kalkholdige Marker og Bakker, ved Veie o. s. v. alm. β , J. Klitterne ved Fjaltring! *Sl.* Klitterne ved Eider-

sted (F. Müll.); *γ*, *Bornh.* langs Østkysten fra Bobbe-Aaen til Randkløveskaar (20)!

10. Ornithopus. Fugleklo.

938. *O. perprillus* L. (Liden F.) H. 772; Drej. n. 735; F. D. 730; H. N. II, 49; L. Herb. II, 40.

Mangestænglet; *Stænglerne* udstrakte; *Bladene* 6—12-parrede med ovale Smaablade; *Blomsterstilkene* længere end Bladene, 2—4-blomstrede; *Ledballerne* seglformigt krummede, *Ledene* stribede paalangs.

3—10" høi; Stænglerne fine; Kronerne smaae, hvide med røde Striber. 6—7. ☉.

Paa tørre, sandige Marker, alm. paa *Halvøen*; i *Fyen* hist og her i Bakkepartiet fra Middelfart til Svendborg; *Thorseng* ved Bregninge! *Langel.* mellem Steengade og Tranekjær (12); længere mod Ø. sjelden: *Sj.* Munkebjergby (Lund), Præstø (H.). *

11. Onobrychis. Esparsette.

† 939. *O. sativa* [Lam. Fl. fr. 2, p. 652] (Foder-E.) Drej. p. 242; Hedysarum Onobrychis L., H. 773; F. D. 2243.

Bladene mangeparrede, med elliptisk-ovale eller lancetformede, braadspidsede *Smaablade*; *Åxelbladene* hindeagtige, sammenvoxne og modsatte Bladet, med ægformede, sylspidsede Flige; *Blomsterne* i Klaser; *Bægerrøret* kort, Bægertænderne sylformede (den nedre kortere end de øvrige), længere end Kronens Vinger; *Ballen* omvendt-ægformet, med kjølformet, tornet-tandet Rygsøm.

1—2' høi. Kronerne rosenrøde med mørkere Striber. 6—7. ♀.

Har stundom været dyrket som Fodervæxt, og er derfra forvildet, f. Ex. *Sj.* Kalundborg, Amager (H.), Stevns Klint ved Mandehoved (9); *Møens* Klint S. for Graaryg (Lütken); *Falst.* Næsgaard (Koch); *Loll.* Vesterborg (Nielsen); *Sl.* Egernførde (20). *

12. Astragalus. Astragel.

940. *A. danicus* [Retz. Obs. 2, p. 41] (Dansk A.) *A. hypoglottis* H. 777; Drej. n. 734; Lge. Haandb. 1 Udg. Nr. 903; H. N. XI, 49; L. Herb. I, 15 (ikke L.); *A. arenarius* F. D. 614.

Rodstokken grenet, med udstrakte eller opstigende *Stængler*; *Bladene* 8—12-parrede, *Smaablade* paa *de nedre* Blade ægformet-ovale, udrandede, paa *de øvre* lancetformede; *Axelbladene* forneden (omtrent til Midten) sammenvoxne og modsatte Bladet; *Blomsterstilken* længere end det støttende Blad, oventil tilligemed *Dækbladene* og *Bægeret* tiltrykt-haarede af sorte Haar; *Bællerne* æg-hjerteformede, langhaarede, rette og stilkede ved en kort *Frugtholder*, som under Blomstringen er halvt saa lang som Frugtknuden.

Stænglerne 2—6" lange. Kronen blaa eller violet. 6—7. 4.

Paa Strandenge, Marker og Bakker, især i Nærheden af Havet: i *Sj.* hist og her mod N. og hyppigst omkring Isefjorden fra Roeskilde til Odsherred! i Sydsjæll. og de andre Provindser sparsom: *F.* Hindsholm, Hals ved Hofmangave, Munkebo Bakke (H.)! *J.* Houer ved Veile (10), Fjedsted Bakker ved Ribe (H.). [4]

Anm. Den hidtil almindelige Mening, at *A. danicus* Retz. skulde være synonym med *A. hypoglottis* L. kan jeg ikke tiltræde. Den linnéiske *A. hypoglottis* beskrives nemlig »leguminibus replicatis compressis, acumine reflexo« og siges at ligne meget *A. pentaglottis*, hvilket aldeles ikke passer paa vor Plante. Den angives desuden kun fra Spanien, men *A. danicus*, som voxer i England, Danmark og enkelte Egne af Tydskland, mangler i Frankerig og er efter alle de mig bekjendte Data ikke funden i Spanien. Dersom altsaa denne Plante ikke har været ukjendt af Linné, turde den snarere af ham være indbefattet under *A. arenarius*, idet han angiver denne fra England, hvor den (efter Bab.) ikke findes, og desuden citerer som synonym *Raj. Angl. t. 12 f. 3*, der aldeles utvivlsomt fremstiller *A. danicus*.

† 941. *A. Cicer* L. (Rundbællet A.) Jacq. Fl. austr. t. 251; L. Herb. IX, 168.

Stænglerne opstigende; *Bladene* 10—16-parrede, med lancetformet-ovale, kort braadspidsede *Smaablade*; *Axelbladene* frie, lancetformet-sylspidsede eller de øvre forneden sammenvoxne og modsatte Bladet; *Blomsterstilken* (kortere end det tilsvarende Blad) tilligemed *Dækblade* og *Bæger* tiltrykt-haarede af sorte Haar; *Bællerne* rette, opblæste, æg-hjerteformede, sorthaarede, næsten stilkløse; *Frugtholderen* meget kort eller 0.

1—1½' høi. Kronerne bleggule. 6—7. 4.

Paa Kjøbenhavns Glacis mellem Nørre- og Vester-Port ved Teglgårdsbroen (26)! formodenlig forvildet. [4]

942. *A. glycyphyllos* L. (Sødbladet A.) H. 775; Drej. n. 733; F. D. 1108.

Stænglerne udstrakte eller opstigende; *Bladene* 5—6-parrede, med rundagtigt-ovale, budte *Smaablade*; *Axelbladene* frie, ægformede, tilspidsede; *Blomsterstilken* glat, kortere end det støttende Blad; *Bællerne* linieformede, i Gjennemsnit trekantede, glatte, bueformigt krummede, tilsidst sammenslyngede, befæstede til en *Frugtholder*, som under Blomstringen er $\frac{1}{6}$ af Frugtknudens Længde.

Planten næsten glat, $1\frac{1}{2}$ —3' høi. Bladene have en bittersød Smag, omtrent som Lakrits. Kronerne skidengule. 6—7. ☐.

I aabne Skove og Krat, ved Gjærder og Randen af Græsmarker, alm.

† *Phaseolus. Bonne.*

† *Ph. multiflorus* [Willd. Sp. 3, p. 1030] (Pralbønne).

Stængelen slyngende; *Smaabladene* ægformede; *Blomsterstilken* længere end Bladene; *Bællerne* nedhængende, seglformede, rue.

Var. med hørøde og hvide Kroner. Frøene violette med sortagtige Pletter. 7—8. ☉.

Dyrkes i Haver.

† *Ph. vulgaris* [Savi Mem. 3, p. 14] (Almindelig B.).

Stængelen lidet slyngende; *Smaabladene* ægformede; *Blomsterstilken* kortere end Bladene; *Bællerne* nedhængende, rette, næsten glatte.

Kronerne hvide eller lila. Frøene mindre end hos foreg., var. i forskellige Farver. 7—8. Var.

β, nanus (Ph. nanus L.). *Stængelen* lav, ikke slyngende. Dyrkes i Haver og paa Marker i flere Afarter.

† *Ph. compressus* [DC. Prodr. II, 392] (Snittebønne).

Stængelen slyngende; *Bællerne* fladtrykte; *Frøene* hvide, større og mere fladtrykte end hos foreg., forøvrigt som denne.

Kronerne hvide. 7—8. ☉.

Dyrkes alm. i Haver.

13. Vicia. Vikke.

a. *Ervilia*. Griffelen fladtrykt fra Ryggen, i Spidsen svagt men alsidigt haaret.

aa. *Axelbladene* halvt püil- eller spydformede, næsten heelrandede.

943. **V. Orobus** [DC. Fl. fr. 5, p. 577] (Lyng-V.) Drej. n. 742; H. N. VII, 41; *Orobus silvaticus* L., H. 763; *Vicia cassubica* F. D. 98.

Rodstokken kort, uden Udløbere; *Stænglerne* oprette eller opstigende; *Bladene* mangeparrede, endende med en kort Braad; *Smaabladene* æg-lancetformede, braadspidsede; *Blomsterstilken* (tilligemed Klæsen) lidet længere end det støttende Blad; *Ballerne* lancetformede, 3—6-frøede, graabrune.

Hele Planten haaret. Kronerne hvide med rødviolette Aarer. 6—7. 4.

Paa Lyngbakker og i Kratskove, især i Hedeegne: i *Jyll.* hist og her, men ikke alm.; *SL* Kolsnap (Grønlund), Frøslev Mølle, Slesvig (16); *Sj.* Roeskilde, Brede Bakker (Dr.), mellem Lyngby og Frederiksdal (Hornem. Herb.) Den har i mange Aar forgjæves været eftersøgt paa de fra Sjælland angivne Voxesteder. *

944. **V. cassubica** L. (Kassubisk V.) H. 767; Drej. n. 743; F. D. 1395; H. N. III, 40; L. Herb. II, 35.

Rodstokken med krybende Udløbere; *Stænglerne* oprette eller opstigende; *Bladene* mangeparrede, ende med en *Slyngtraad*; *Smaabladene* linieformet-ovale med bredere Basis, braadspidsede; *Blomsterstilken* lidet kortere end det støttende Blad; *Ballerne* korte, elliptiske, 1—2-frøede, graabrune.

Stænglerne og Bladene, især de nedre, duunhaarede. Kronerne violette med hvidagtig Kjøll. $\frac{6}{2}$ — $\frac{7}{1}$.

I Kratskove: hyppig i Almindingen o. fl. St. paa *Bornh.* ikke sjelden i Kbhvns Omegn! i de andre Egne sporadisk: *Sj.* Jægerspris (19), Kongsøre Skov i Odsherred (H.); *F.* Lykkesholm (H.); *J.* Agdruplund i Vendsyssel (9), Lundbykrat (H.), Skatskov ved Evelstrup (Dr.); *SL* Midsunde (16). !*

bb. *Axelbladene* halvmaaneformede, tandede.

945. **V. silvatica** L. (Skov-V.) H. 767; Drej. n. 745; F. D. 277.

Stængelen svag, klattrende; *Bladene* 6—8-parrede med en *Slyngtraad*; *Smaablade* ægformet-ovale, budte eller svagt udrandede, kort braadspidsede; *Axelbladene* Tænder langt sylspidsede; *Klaserne* efter Afblomstringen længere end det støttende Blad; *Bællerne* linie-lancetformede, sorte.

Bladene glatte, tynde, smukt grønne. Kronerne hvide med lila Aarer. 7—8. 4.

I skyggefulde Løvskove, funden i alle Provindser, men sporadisk.

b. *Cracca*. Griffelen fladtrykt fra Siden, i Spidsen alsidigt tæthaaret.

946. *V. Cracca* L. (Muse-V.) H. 768; Drej. n. 744; F. D. 804; L. Herb. VIII, 148.

Stængelen svag, klattrende; *Bladene* 8—10-parrede, med oval-lancetformede, paa begge Flader tiltrykt-silkehaarede *Smaablade*; *Axelbladene* halvt-spydformede, heelrandede; *Klaserne* mangeblomstrede, paa nikkende *Blomsterstilke* af Længde med eller lidet længere end det støttende Blad; *Bægerets* nedre Tænder kortere end Røret; *Fanens Plade* og *Negl* ligelange, *Vingerne* sammenstødende; *Bællerne* linie-lancetformede, 6—9-frøede, pludseligt sammendragne til en *Frugtholder*, som er kortere end Bægerrøret.

Kronerne blaaagtigt-violette, sjældent hvide. 6—8. 4.

β , *leptophylla* (Fr. Fl. Hall., H. 768). H. N. VII, 42; *Smaablade* linie-lancetformede, meget smale.

Ved Gjærder, paa dyrkede Marker og i Kratskove alm. β , paa Enge, især ved Stranden, f. Ex. *Sj. Tryggerød Mose!* *Vesterfælle!* *Falst. Bøtø Fang* (Koch), *Jyll. Nebbegaard!*

947. *V. tenuifolia* [Roth Fl. germ. 1, p. 309] (Tyndbladet V.) Fr. nov. p. 230; H. II, 232; F. D. 2177; H. N. XIII, 61; L. Herb. II, 36.

Stængelen stiv, bugtet mellem Ledene, lidet klattrende; *Bladene* 10—14-parrede; *Smaablade* linie-lancetformede, paa Underfladen haarede af udstaaende Haar, forøvrigt, ligesom *Stængelen*, tiltrykt-haarede eller glatte; *Axelbladene* heelrandede,

de nedre halvt-spydformede, de øvre linieformede; *Klaserne* mangeblomstrede, paa oprette *Blomsterstilke*, som ere meget længere end det støttende Blad; de nedre *Bægertænder* kortere end *Røret*; *Fanens Plade* næsten dobbelt saa lang som *Neglen*, *Vingerne* frastaaende; *Bællen* lancetformet, 6—8-frøet, efterhaanden afsmalnet i en *Frugtholder* af Længde med *Bæger-røret*.

Høiere end foreg., med større, vellugtende Blomster; Kronerne blaae, Vingerne blegere. 6—8. 4.

Ved Gjærder og i Krat, sporadisk og ikke alm.: *Æbelø* (A. Meyer)! *F.* Dalby paa Hindsholm (12), mellem Odense og Skibhuse (19); *Sj.* Kulbjerg paa Tudsenæs (15), Strandkanter ligeoverfor Reersø (14), Bognæsgaarden ved Roeskilde! Bidstrupgaard! Ermelundsskoven (Benzon)! Gjerdrup, Basnæs, Borreby (Nielsen); *Møen* ved Liselund, Sømark og paa Aborrebjerget! Stege Nor (9); *Falst.* Riserup, Blæsbjerg Mølle (Koch), mellem Gundslev og Stubbekjøbing! 1*

948. *V. villosa* [Roth l. c. 2, p. 182] (Duunhaaret V.) H. 769 (undt. Voxest.); F. D. 2599; H. N. IV, 61; L. Herb. IX, 167.

Stængelen svag, klattrende; *Bladene* omtrent otteparrede; *Smaabladene* oval-lancetformede, tilligemed *Stængelen* uldhaarede; *Æxelbladene* halvt-spydformede, større end hos de foreg.; *Klaserne* mangeblomstrede, af Længde med eller lidet kortere end det støttende Blad; de nedre *Bægertænder* sylformede, længere end *Røret*; *Fanens Plade* $\frac{1}{2}$ Gang kortere end *Neglen*; *Bællerne* rudeformet-elliptiske, fladtrykte, 3—6-frøede, pludseligt sammen-
dragne til en *Frugtholder* af Længde med *Bægerrøret*.

Kronerne store, blaaagtigt-violette, med blegere Vinger. 6—7. ☉

Paa dyrkede Marker mellem Sæden, meget sjelden. De eneste danske Expl. som jeg har seet, ere samlede paa Hasseløen mellem Lolland og Falster (Koch, Lütken)! og ved Vesselsminde N. for Kjøbenhavn (19)! samt paa Marker ved Valby (Heiberg). Den angives af Hornem. fra *Fyen* (Einsiedelsborg, Hofmansgave, Svendborg) og *Møen*, men de Expl. fra det sidstnævnte Voxested, som opbevares i Hornemans Herb., høre til *V. tenuifolia*, Expl. fra Svendborg til en Form af *V. Cracca*. 1*

c. *Vicia s. s.* Griffelen fladtrykt fra Ryggen, i Spidsen paa Yderfladen skjæghaaret, for-
øvrigt glat.

aa. *Blomsterne i en 3—10-blomstret Klase, Bællerne stilkede. 4.*

949. *V. dumetorum* L. (Krat-V.) H. 766; Drej. n. 746; F. D. 1464; L. Herb. VIII, 147.

Stængelen klattrende, kantet, næsten vinget; *Bladene* faa- (4—5) parrede; *Smaabladene* ægformede, budte med en Braad; *Åxelbladene* halvmaaneformede, med sylspidsede Tænder; *Klaserne* 6—10-blomstrede, længere end det støttende Blad; *Bægertænderne* korte, triangelformede, de nedre lidet længere end de øvre.

Glat og frisk grøn. Kronerne mørk-rosenrøde, de modne Bæller gulbrune. 7—8.

I Skove og Krat, sjelden: *Sj.* Esbønderup (H.), Boserup Skov! Ledreborg, Korsør Skov (H.), Basnæs (Nielsen)! *Falst.* mellem Buske i Korselitze Have (Koch); *F.* Maglehøj ved Lykkesholm, Einsiedelsborg (H.), Næsbyhoveds Skov ved Odense! *J.* Lundbykrat (3), Had-sund ved Hobro (9). [4]

950. *V. sepium* L. (Gjærde-V.) H. 771; Drej. n. 739; F. D. 699; L. Herb. VIII, 146.

Rodstokken med *Udløbere*; *Stænglerne* opstigende og klat-trende; *Bladene* 5—8-parrede; *Smaabladene* oval-ægformede, budte med en Braad, aftage i Størrelse mod Spidsen af Bladet; *Åxelbladene* halvt-pilformede, tandede; *Klaserne* 3—5-blomstrede, kortstilkede, meget kortere end det støttende Blad; *Bægertænderne* sylformede, de nedre meget længere end de øvre.

Planten af mat grøn Farve, mere eller mindre haaret; Kronerne skident røde eller violette, sjældnere hvide. Bællerne ved Moden-heden sorte (alm. komme kun 1—2 Bæller i hver Klase til Modenhed). $\frac{5}{2}$ — $\frac{7}{1}$.

I Skove og Krat, ved levende Hegn, alm. udbredt.

bb. *Blomsterne* 1—2, næsten siddende, i Bladhjørnerne. *Bællerne* stilkløse ♀; uden *Frugtholder*. ☉.

α. *Bladene* ende med en Slingtraad; Frøene jævne, runde.

951. *V. sativa* L. (Foder-V.) H. 769; Drej. n. 738; F. D. 522; L. Herb. V, 90.

Bladene 5—7-parrede; *Smaabladene* ovale eller omvendt-ægformede, udrandede med en Braad i Indskjæringen; *Axel-bladene* halvmaaneformede, tandet-fligede, med en sort Plet i Spidsen; *Bægertænderne* ligestore, lancet-sylformede, af Længde med *Røret*; *Bællerne* oprette, flade, duunhaarede; *Frøene* fladtrykt-kugleformede.

Fanen violet, Vingerne røde. 6—7.

Dyrkes som Sædart og forekommer som Ukrud, f. Ex. mellem Ærter.

952. **V. angustifolia** [Roth l. c. I, 310] (Smalbladet V.) H. 770; Drej. n. 737; F. D. 1340; H. N. XII, 56; L. Herb. III, 55.

Bladene 3—5-parrede; *Smaabladene* paa de nedre Blade omvendt-hjerteformede eller ovale og i Spidsen indtrykte med en Braad i Indskjæringen, paa de øvre linieformet-ovale; *Axel-bladene* halvt-piilformede, tandet-fligede, med en alm. lysere Plet mod Spidsen; *Bægertænderne* ligestore, sylformede, kortere end *Røret*; *Bællerne* udstaaende, trind-fladtrykte, i moden Tilstand sorte, næsten glatte; *Frøene* kuglerunde.

Mindre og spædere end foreg. Kronerne smukt og mørkt purpur-røde. 5—6.

β , *segetalis* (Thuill.) *Smaabladene* paa de øvre Blade linie-lancetformede.

I Krat, ved Gjærder og paa dyrket Jord alm. — β , især mellem Sæden.

β , *Bladene* ende med en Braad; *Frøene* tærningformede, røde.

953. **V. lathyroides** L. (Vaar-V.) H. 770; Drej. n. 736; F. D. 58; L. Herb. III, 56; H. N. XIV, 55.

Bladene 2—3 parrede; *Smaabladene* omvendt-hjerteformede eller omvendt-ægformede, i Spidsen udrandede og sædvanligt braadspidsede; *Axelbladene* halvt-piilformede, heelrandede; *Blomsterne* enlige; *Bægertænderne* omtrent ligestore, sylformede, kortere end *Røret*; *Bællerne* glatte.

Stænglerne 2—4' lange, oftest flere og nedliggende. Paa kraftige Expl. forlænges stundom Braaden i Bladets Spidse og antager Form af en Slynghraad. Blomsterne smaae, rødviolette. 4—5.

Paa græsklædte Marker og Bakker, især paa sandig Jordbund, ikke sjelden, men ofte overseet paa Grund af dens Lidenhed.

d. *Faba*. Griffelen i Spidsen paa Yderfladen skjæghaaret; Bællen tyk, svampagtig-puklet; Frøene aflange, fladtrykte paa Siderne.

† *V. Faba* L. (Hestebønne). Sturm D. Fl. h. 32; *Faba vulgaris* Moench.

Bladene 1—3-parrede, ende med en Braad; *Smaabladene* ovale eller elliptiske, budte; *Axelbladene* halvmaaneformede, tandede; *Blomsterne* 2—5 samlede i en kort Klase, meget kortere end Bladet; *Bæbertænderne* uligestore; *Bællen* duunhaaret.

Kronerne hvide med en sort Plet paa Vingerne, Fanen ofte rødlig anløben og med sorte Striber. Bællen ved Modenheden sort, Frøene blegbrune. 6—7. ☉.

Dyrkes i flere Afarter dels paa Marker som Fodervæxt og dels i Haver (under Navn af valsk Bønne).

14. *Ervum*. *Lindse*.

954. *E. hirsutum* L. (Laaden L.) H. 772; F. D. 639; *Vicia hirsuta* Koch Syn. 1, 191; Drej. n. 740; L. Herb. VIII, 149.

Bladene 6—8-parrede; *Smaabladene* linieformede eller oval-linieformede, afstumpede eller indtrykte med en Braad; *Axelbladene* tandet-fligede; *Blomsterstilkene* 2—6-blomstrede; *Bæbertænderne* omtrent ligestore, sylformede, af Længde med eller længere end *Roret*; *Bællerne* elliptiske, tofrøede, tilligemed *Bladene* duunhaarede.

Kronerne smaae, blaaagtigt hvide. 5—7. ☉.

Paa Grøftevolde, tørre Marker og Bakker, mellem Sæden o. s. v., alm.

955. *E. tetraspermum* L. (Tadder-L.) H. 771; F. D. 95; *Vicia* Moench, Drej. n. 741; L. Herb. IV, 73.

Bladene 3—5-parrede, *Smaabladene* oval-linieformede, budte med en Braad; *Axelbladene* halvt-piilformede, heelrandede;

Blomsterstilkene 1—2-blomstrede; *Bægtænderne* uligestore, de øvre triangelformede, de nedre sylformede, kortere end Røret; *Bællerne* linieformet-ovale, firefrøede, tilligemed Bladene glatte.

Kronerne lidet større end hos foreg., hvide med lila Fane. 6—7. ☉.

Paa dyrkede Marker mellem Sæden, ved Gjærder, paa Bakker: sporadisk og hyppigere i de sydlige end i de nordlige Egne af Landet (sjældnest i Jyll.).

15. *Pisum. Ært.*

† 956. *P. arvense* L. (Graae Ærter). H. 759; Drej. p. 247; Sturm D. Fl. h. 4.

Bladene 1—3-parrede, med omvendt-ægformet-elliptiske *Smaablade*; *Axelbladene* halvt hjerteformede, ved Grunden tandede, næsten ligesaa lange som de 1—2-blomstrede *Blomsterstilke*; *Kronens Fane* lila, grønlige stribet, *Vingerne* røde; *Frøene* kantede, graagrønne med brune Punkter. 6—7. ☉.

Dyrkes som Sædart og forekommer hyppigt som Ukrud mellem anden Sæd, især mellem de alm. Ærter.

† *P. sativum* L. (Gule Æ.) Drej. p. 247.

Kronbladene hvide; *Frøene* kugleformede, gule, forøvrigt som foreg. 6—7. ☉.

Dyrkes alm. i Mark og Have, forekommer stundom tilfældigt forvildet.

16. *Lathyrus. Fladbælle.*

a. Kronbladene gule.

957. *L. Aphaca* L. (Bladløs F.) Horn. i Krøyt. Tidsskr. 1, 461; F. D. 2245.

Stængelen kantet, uvinget; *Bladene* heelt omdannede til en Slingtraad (uden *Smaablade*); *Axelbladene* piilformede, kortere end de enblomstrede, ovenfor Midten leddede *Blomsterstilke*; *Bægtænderne* linie-lancetformede, næsten ligestore, meget længere end Røret; *Bællen* seglformigt krummet; *Frøene* jævne.

Hele Planten glat, blaagrøn. 6—7. ☉.

Paa dyrket Jord meget sjelden: *F.* Dæmningerne ved Næsbyhoveds Skov udenfor Odense! (Ikke funden i de senere Aar. Angives af Kyll. fra Falster). [¶]

958. *L. pratensis* L. (Guul F.) H. 764; Drej. n. 747; F. D. 527; L. Herb. VI, 113.

Stængelen firekantet med uligestore Sider; uvinget; *Bladene* med 1 Par elliptisk-lancetformede, grundnervede *Smaablade* og endende i en grenet Slingtraad; *Axelbladene* skjævt pølformede; *Blomsterne* i Klase paa en Blomsterstilk som er længere end *Bladene*; *Bæbertænderne* sylformede, uligestore, omtrent lige-lange med *Røret*; *Frøene* jævne.

6—7. 4. Var. i Henseende til Blomsternes Retning i Klasen (ensidige eller næsten alsidige), Beklædningen (næsten glat, tiltrykt-silkehaaret eller tæt-duunhaaret), *Smaabladenes* Størrelse o. s. v. (Sml. Drej. i Krøy. Tidsskr. II, 282).

Ved Gjærder, paa Enge og fugtige Steder i Skove alm. Den stærkt duunhaarede Form (*villosus* Dr.) sjældnere og især paa høitliggende, solaabne Steder.

b. Kronbladene røde eller violette (undtagelsesviis hvide).

aa. *Stængelen* kantet uden Vinger.

959. *L. tuberosus* L. (Knollet F.) H. 763; Drej. n. 748; F. D. 1463; H. N. 1, 50.

Rodstokkens Grene knolleformigt opsvulmede; *Stængelen* firekantet; *Bladene* enparrede, *Smaabladene* ovale, budte med en kort Braad; *Axelbladene* halvt-pølformede, tilspidsede; *Blomsterstilkene* meget længere end *Bladet*; *Klasen* 2—6-blomstret; *Bæbertænderne* uligestore: de øvre kort triangelformede, de mellemste æg lancetformede, den nedre sylformet, af Længde med *Røret*; *Bællerne* glatte, hvælvede; »*Frøene* svagt knudrede, med meget kort Navle.«

Kronerne rosenrøde, vellugtende; Rodknollerne spiselige. 7—8. 4.

Paa Marker og ved Gjærder, sjelden: *Sj.* Kastelsvolden ved Kjøbenhavn (Schum., 29)! Bidstrupgaard ved Roeskilde. (Paa det sidste Sted, hvor den endnu findes, har den voxet fra ældgammel Tid, da Expl. samlede der, allerede findes i Bursers Herbarium)! [¶]

960. **L. maritimus** [Fr. Fl. Scan. p. 106] (Strand-Ært). Drej. n. 749; H. N. II, 50; Pisum L., H. 759; F. D. 338; L. Herb. II, 37.

Stængelen trekantet, nedliggende; *Bladene* 4—5-parrede; *Smaabladene* elliptiske eller ovale, budte eller lidet spidse og med en kort Braad, *Axelbladene* spydformede, meget større end hos foreg., *Blomsterstilken* omtrent af Længde med Bladet; *Klasen* 4—8-blomstret; *Bægertænderne* uligestore: de øvre triangelformede, den nedre linie-lancetformet, længere end *Røret*; *Ballerne* fladtrykte, først duunhaarede, tilsidst glatte; *Frøene* jævne, Navlen omgiver omtrent $\frac{1}{3}$ af Frøet.

Planten blaagrøn; Bladstilkene alm. bueformigt tilbagebøiede; Krønerne violetrøde. 7—8. 4. Var. i Henseende til Smaabladenes Form, Beklædningen (alm. glat, sjældnere duunhaaret: — *velutinus* Fr.) o. s. v. En meget afvigende Form er

* *acutifolius* Bab. Stænglerne tynde; Bladstilken udstaaende (ikke bøiet); Smaabladene elliptisk-lancetformede, spidse, meget mindre end hos Hovedarten; Bægertænderne længere tilspidsede; den nedre i Spidsen alm. tilbagebøiet.

Ved sandige Strandbredder, ikke alm.: *J.* Løkken (9), Hanstholmen (Dr.), Ringkjøbing (1), Klitter ved Filsø (16); *Sl.* Sylt, Føhr (N.), Amrom (16); *Ærø* paa Halen og Dreiet ved Marstal (H.); *Falst.* mellem Tromnæs og Hesnæs! o. fl. Steder langs Kysten af Østersøen (Koch), Bøtø (Benzon); *Sj.* Skjelskør (H.), Nykjøbing, Holbæk (Bursers Herb.); *Bornh.* Hammershuus (19), Hasle (11), Rønne (8)! * *J.* i Klitterne ved Agger (Dr.)! Harboøre (H.), Klitter ved Fjaltring! *Sl.* Nieblum paa Føhr (20).

bb. Stængelen vinget.

961. **L. palustris** L. (Kjær-F.) H. 766; Drej. n. 750; F. D. 399; L. H. II, 38.

Bladene 2—3-parrede, *Smaabladene* lancetformede, spidse eller budte med en Braad; *Axelbladene* halvt-piilformede; *Bladstilken* rendet, med en smal, ophøiet Rand; *Blomsterstilken* længere end Bladet; *Bægertænderne* uligestore: de øvre kort triangelformede, den nedre lancet-sylformet, lidet kortere end *Røret*; ved et afrundet Indsnit adskilt fra de mellemste; *Griffelen* retvinklet opstigende; *Frøene* jævne, Navlen omgiver omtrent $\frac{1}{4}$ af Frøet.

Kronerne violet-blaa. 6—8. γ . Var. i Henseende til *Axelbladernes Størrelse* og *Smaabladenes Brede* (α , *latifolius*, med bredt lancetformede eller ovale, β , *ensifolius*, med smalt lancetformede, næsten linieformede Smaablade), samt *Smaabladenes Antal* (Expl. med 1 Par Smaablade fundne i Omegnen af Kbhavn. Koch).

I Moser og paa fugtige Enge, bemærket i alle danske Provindser, men sporadisk og paa flere Steder periodisk forsvindende.

962. **L. silvestris** L. (Skov-F.) H. 765; Drej. n. 751; F. D. 325.

Bladene enparrede; *Smaabladene* lancetformede, tilspidsede i en Braad; *Bladstilkens* vinger, med smalere Vinger end Stængelen; *Axelbladene* halvt-piilformede, smalere end Stængelen; *Blomsterstilkens* under Blomstringen lidet længere end Bladet; *Bægtænderne* uligestore: de øvre ægformede, sylpidsede, den nedre sylformet, lidet kortere end Røret, adskilt fra de mellemste ved et afrundet Indsnit; *Griffelen* buelformigt opstigende, snoet; *Frøene* jævne, *Navlen* omgivende det halve Frø.

Kronerne rosenrøde, sjældent hvide. 7—8. γ . Var. i Henseende til *Smaabladenes Brede*:

β , *platyphyllus* (Retz.) F. D. 785; *L. latifolius* H. 765 (ikke L.), *Smaabladene* elliptiske (3—4" lange), budte med en Braad eller spidse (ikke tilspidsede); *Stængelen* bredvinget.

γ , *stenophyllus*! *Smaabladene* lancet-linieformede, $1\frac{1}{2}$ —2" lange, *Stængelens* Vinger smalere.

I Kratskove og ved Gjærder ikke sjelden. β , *Sj.* Holbæk (27), Kjøge! *Falst.* ved Næsgaard (H); *Loll.* i Strandsandet ved Rødby (Müll. i F. D.); *F.* Krat ved Lunde pr. Odense (18), St. Jørgensgaard (12). γ , Tiisvilde (27).

963. **L. heterophyllus** L. (Bredvinget F.) H. N. IV, 62.

Bladene 1—2 parrede; *Smaabladene* lancetformet-elliptiske, spidse eller budte med en Braad; *Bladstilkens* Vinger lige saa brede som Stængelens; *Axelbladene* af Brede med eller bredere end Stængelen; *Bægtænderne* uligestore: de øvre kort triangelformede, den nedre sylformet, længere end Røret, ved et skarpt Indsnit adskilt fra de mellemste lancetformede; »*Frøene* knudret-rue, *Navlen* neppe $\frac{1}{3}$ af Frøets Omkreds«, forøvrigt som foreg.

Bladene paa Underfladen blaagrønne. Kronerne rosenrøde.
7—8. 4.

Gjærder ved Raahave paa *Loll.* (5)! andre danske Voxesteder ere mig ikke bekjendte. [§]

17. *Orob.* Glatbælle.

a. Stængelen vinget.

964. *O. tuberosus* L. (Knollet G.) H. 761; Drej. n. 752; F. D. 781; L. Herb. VIII, 151; *Lathyrus macrorrhizus* Wimm., Lge. Haandb. 2 Udg. S. 481.

Rodstokken krybende, ved Ledene knolleformigt opsvulmet; *Stængelen* opstigende; *Bladene* 2—3-parrede, med oval-lancetformede *Smaablade*; *Åxelbladene* halvt pilformede, naaende op over det nederste Bladpars Basis.

6—10" høi. Bladene glatte, paa Underfladen glandsløse, blaagraae; Kronerne rødviolette. 5—6. 4.

β, tenuifolius (Roth). H. N. V, 49. *Smaabladene* linieformede.

Paa Lyngbakker, i Krat og Skove alm.; ikke bemærket paa *Loll.*, *Fatsl.*, det sydlige *Fyen* og *Smaaøerne* (14, 12!). — *β*, meest paa solaabne Steder.

b. Stængelen kantet, uvinget.

965. *O. niger* L. (Sort G.) H. 762; Drej. n. 754; F. D. 1170; L. Herb. VIII, 150; *Lathyrus niger* Wimm., Lge. l. c. p. 482.

Stængelen opret, grenet; *Bladene* 4—7-parrede; *Smaabladene* ovalt-elliptiske, braadspidsede, paa Underfladen mat blaagraae; *Åxelbladene* sylspidsede, de øvre linie-lancetformede, de nedre halvt pilformede, naaende op til det nedre Bladpars Basis.

1—2' høi, glat, bliver sort ved Tørring. Kronerne røde, Fanen med mørkere Aarer. 6—7. 4.

I Skove og Krat, hist og her i alle Provindser, men ikke alm.

966. *O. vernus* (Vaar-G.) H. 761; Drej. n. 753; F. D. 1226; L. Herb. IV, 74; *Lathyrus vernus* Wimm.; Lge. l. c.

Stængelen opret, udeelt, forneden firekantet, foroven trekantet: *Bladene* 2—3-parrede; *Smaabladene* ægformede eller elliptiske, tilspidsede, svagt randhaarede, paa Underfladen grønne, glindsende; *Axelbladene* halvt piilformede (større end hos foreg.), ikke naaende til det nedre Bladpar.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Kronerne røde eller violette, efter Afblomstringen blaaagtig-grønne. 5. 4.

I skyggefulde Løvskove, funden i alle Provindser, men sporadisk og ikke alm. !*

18. Lotus. Kjællingtand.

967. *L. uliginosus* [Schkuhr Handb. 2, p. 412, t. 211] (Sump-K.) F. D. 1521; H. N. XV, 56; *L. corniculatus silvaticus* H. 789; *L. major* Scop., Drej. n. 729; L. Herb. VI, 115.

Stængelen opret, ved Grunden opstigende, huul; *Smaabladene* omvendt-ægformede; *Axelbladene* bredt og skjævt ægformede, budte; *Blomsterne* i et 5—12-blomstret Hoved; *Bægertænderne* sylformede, før Udspringningen tilbagebøiede; Kronens Vinger svagt buede nedadtil, bredere end den jævnt opstigende *Kjøl*.

Bladene paa Underfladen blaagraae, var. glatte og haarede (Blomsterstilkene stundom 1—2-blomstrede). Kronerne gule, blive grønne ved Tørring. 7—8. 4.

I fugtige Enge og Moser, ved Randen af Kilder og Bække, ikke sjelden paa *Halvøen*, i *Fyen*, *Loll-Falst.* og det vestlige *Sjæll.*; sparsommere i de nordlige og østlige Egne af *Sjæll.*

968. *L. corniculatus* L. (Almindelig K.) H. 788; Drej. n. 728; F. D. 991; L. Herb. VI, 114.

Stænglerne fremliggende; *Smaabladene* omvendt-ægformede; *Axelbladene* skjævt ægformet-elliptiske eller halvt-ægformede; *Blomsterhovedet* 4—6-blomstret; *Bægertænderne* fra en ægformet Basis kort tilspidsede, før Udspringningen tiltrykte; *Vingerne* stærkt buede nedadtil, bredere end den retvinklet opstigende *Kjøl*.

Bladene paa Underfladen blaagrønne, Kronerne af Farve som foreg., ofte med Anstrøg af Orange eller Høirødt, blive grønne ved Tørring. 6—7. 4. Alm. glat eller svagt haaret.

β, villosus (Thuill.) Hele Planten graaagtig af en tæt Haarbeklædning.

γ, carnosus Pers. H. N. XV, 55. Bladene safrige.

Paa Græsmarker, Bakker og ved Veie alm. — *β*, paa tørre Bakker og Lyngheder, sjældnere; *γ*, ved Strandbredder.

969. *L. tenuis* [Kit. i Willd. H. berol. 2, 797] (Smalbladet K.) *L. corniculatus angustifolius* H. II, 235; F. D. 1995; *L. tenuifolius* Rehb., H. N. XII, 58; *L. Herb.* VI, 116.

Stænglerne oprette, opstigende eller nedliggende; *Smaa-bladene* linie-lancetformede eller linieformede, bredere foroven; *Åxelbladene* linie-lancetformede; *Blomsterstilkene* fine, med 3--5 Blomster i Hovedet; *Vingerne* smalere end den retvinklet opstigende *Kjøl*, forøvrigt som foreg., men *Stænglerne* tyndere og mere grenede.

6—7. 4.

Paa Strandenge, hist og her paa Øerne. Fra Halvøen er intet Voxested mig bekendt. ☞

19. *Tetragonolobus*. Kantbælle.

970. *T. maritimus* [Roth Fl. germ. I, p. 323] (Strand-K.) Drej. n. 730; *L. Herb.* VI, 117; *Lotus marit.* L., H. 788; F. D. 800; H. N. IV, 59; *T. siliculosus β, maritimus* Ser.

Stænglerne fra en træagtig, grenet *Rodstok* opstigende; *Smaa-bladene* omvendt-ægformede eller rudeformede; *Åxelbladene* skjævt ægformede, ved Grunden tilvoxne til Bladstilk; *Blomsterstilk* 2—3 Gange længere end det støttende Blad, med 1 endestillet *Blomst* omgivet af et trekoblet *Dækblad* med linie-lancetformede *Smaablade*.

Blomsterstilke, Bæger-tænder og Bladene i Randen og paa Underfladen haarede; Bladene noget kjødfulde, paa Underfladen blaagraae. Kronerne bleggule. 6—7. 4.

Paa Strandenge: har sin største Udbredelse langs Kysterne af Store Bælt og Østersøen (i det vestlige og sydvestlige Sjæll. samt paa Smaøerne): Sj. Gniben (1), Saltbæk paa Refsnæs (15). Kalundborg (H.), Drosselbjerg, Stillinge (Lund), Øerne og Kongebroen ved Korsør, Skjelskør, Basnæs, Holsteinborg, Fiurendal (H)! *Bornh.* Hammeren (Hjorth), mellem Sandvig og Allinge (Hoff), paa en Eng ved Rise (Rafn); Rønne (Hjorth), Randklevn (8)! *Falst.* Ourehoved

(Koch); *Loll.* Bjerremark (5); *Frø* ved Marstal (H). Ved de øvrige Have sjelden: *J.* Løkken ved Vesterhavet (H.). ¹³

Anm. Den hos os udelukkende i Nærheden af Stranden forekommende Form er kun ved noget mere kjødfulde Blade forskjellig fra den i det Indre af Europas Fastland voxende Hovedart, *T. siliquosus* (L.), og er neppe engang som Afart at adskille derfra.

20. *Medicago*. Sneglebælle.

a. *Falcago* Rchb. Bællen opspringende, fladtrykt, seglformigt bøiet eller sneglehuusformigt snoet, i Midten aaben.

971. *M. sativa* L. (Foder-Lucerne). H. 789; Drej. p. 241; F. D. 2244; H. N. VII, 37; L. Herb. V, 91.

Stænglerne oprette; *Smaabladene* ovenfor Midten saugtaktede, i Spidsen udrandede med en Braad, paa de nedre Blade omvendt-ægformede, paa de øvre linieformet-kileformede; *Axelbladene* langt sylspidsede, ved Grunden æg-hjerteformede, tandede; *Blomsterstilkene* længere end det støttende Blad, *Blomsterstanden* klaseformet; *Bællen* sneglehuusformigt-snoet, tiltrykt-haaret.

1—1½' høi. Kronerne lila med violette Striber. 7—9. 4.

Dyrket hist og her som Fodervæxt og, forvildet derfra, findes den nu paa flere Steder som vildvoxende, f. Ex. *Bornh.* ved Rabekkegaard (Hoff), *Moen*, *Amager* (H.); *Sj.* Brøndbyøster (19), Glacieren mellem N. og Ø. Port ved Kjøbenhavn! mellem Charlottenlund og Skovshoved (Dr.)! Skovsborg (15), Adlersborg! Kalundborg (H.), Korsør! *Falst.* S. Kirkeby, Uggerløse (Koch), Nykjøbing (19); *F.* Hofmangave (18), Nyborg Vold (H.); *J.* Aagaards Kalkbakker (16); *SL.* Sundeved (Nolt). *

972. *M. falcata* L. (Segl-S.) H. 790; Drej. n. 732; F. D. 233; H. N. VII, 40; L. Herb. V, 92.

Stænglerne opstigende; *Smaabladene* linieformet-kileformede; *Axelbladene* æg-lancetformede, sylspidsede, de nedre hindeagtige, tandede; *Klaserne* korte, halvskjærmformede; *Bællen* seglkrummet med concav Bugsøm; forøvrigt som foreg.

½—1½' høi. Kronerne gule. 7—8. 4.

Paa sandige eller kalkholdige Marker og Bakker, ved Gjærder: paa *Bornh.* alm., i *Sj.* og paa *Moen* hist og her; sjældnere i de andre Provindser: *F.* ved Nyborg (24); *J.* Aalborg, mellem Grenaa og Scheel, ved Ebeltoft (H.).

b. *Lupulina* Gren. & Godr. Bællen uopspringende, nyreformet, i Spidsen sneglehuusformigt snoet og i Midten lukket, uden Torne.

973. *M. lupulina* L. (Humleagtig S.) H. 791; Drej. n. 731; F. D. 992; L. Herb. IV, 76.

Smaabladene omvendt-ægformede eller omvendt-hjerterformede, indtrykte med en Braad, ovenfor Midten tandede eller næsten heelrandede; *Axelbladene* ægformede, sylspidsede, tandede eller heelrandede; *Blomsterne* i ovale, tæt- og mangeblomstrede Ax; *Ballerne* nætformigt aarede, glatte eller tiltrykt-haarede, snoede i $1\frac{1}{2}$ Omgang.

$\frac{1}{4}$ —1' høi. Kronerne gule, smaae, alm. enfrøede, i moden Tilstand sorte. Ligner en Trifolium af Afdelingen a. 6—9. ☉.

β, *Willdenowiana* (Boenn.). Bællerne beklædte med udstaaende, kirtelbærende Haar.

Ved Veie, paa høie Enge og lerede eller kalkholdige Marker, meget alm. — β, hist og her, mindre almindelig end Hovedarten.

c. *Spirocarpus* DC. Bællen uopspringende, kreds-rund, sneglehuusformigt sammenrullet, beklædt med Torne, som udgaae deels fra Rygsømmen, deels fra en ophøiet Nerve indenfor Randen.

974. *M. minima* [Lam. Dict. 3, p. 636] (Liden S.) H. 791; H. N. 1, 47; *M. polymorpha* μ, *minima* L., F. D. 211.

Fleerstænglet, med oprette eller opstigende *Stængler*; *Smaa-bladene* omvendt-ægformede, mod Spidsen tandede, indtrykte med en Braad; *Axelbladene* ægformede, sylspidsede, heelrandede eller tandede; *Blomsterne* i et 2—5-blomstret Hoved; *Ballerne* kugleformede, dannede af 3—5 Vindinger uden Længdeaarer, men med 2 Rækker af i Spidsen hagekrummede *Torne*.

2—8" høi. Hele Planten mere eller mindre tæt duunhaaret. Kronerne gule, lidet større end hos foreg. Bællen fra det foreg. Aar, hvoraf Planten er fremspiret, findes alm. fasthæftet til Roden endnu under Blomstringen. 5—6. ☉.

Paa tørre, især sandige Bakker, sjelden i Danmark: *Bornh.* paa Skrænterne langs Stranden fra Boderne til Pythuset! Hammershuus

(H.); *Moen* paa Troldkonehøiene i Borre Sogn (Holst); *Sj.* Refsnæs hist og her paa Sandmarker (15), Skrænterne ved Beks Kro N. for Tiissø! Hyldemarkshusene ved Storebælt (Lund); *F.* Klintebjerg pr. Odense (N. E. Hofm. Bang)! *Samsø* ved Maarup Vig (2). ☞

† *M. maculata* Willd. Smaabladene omvendt-hjerteformede, brunplettede, Axelbladene fliget-tandede, Bællen med Længdeaarer og bøiede, ikke hagekrummede Torne.

Findes undertiden forvildet, f. Ex. i flere Aar paa Pladsen udenfor Thorvaldsens Museum! Kastrup Mølle paa Amager (Branth)!

21. Trigonella. Bukkehorn.

975. *T. ornithopodioides* [DC. Fl. fr. IV, p. 50] (Fugleklo-B.) *Trifolium* L., F. D. 368; *Melilotus* H. 779; *Medicago* Fr. Mant. 3, p. 93.

Stænglerne talrige, udstrakte; *Smaabladene* omvendt-hjerteformede, tandet-saugtakke; *Axelbladene* lancet-sylformede, hindeagtige; *Blomsterstilken* 2—3 blomstret, kortere end det støttende Blad; *Bællen* budt linieformet, svagt seglformet, med convex Bugsøm, rynket paatværs, haaret.

2—5" høi. Kronbladene rødlig-hvide. 7. ☉.

Meget sjelden: Sandmarker i den nordlige Deel af *Sylt* (F. D.); Østkanten af Christiansø (H.) Paa det sidste Sted søgt forgjæves i de senere Aar. ☞

22. Melilotus. Steenkløver.

976. *M. alba* [Lam. Dict. 4, p. 63] (Hvid S.) *M. vulgaris* Willd., H. 779; Drej. n. 725; F. D. 1105; H. N. VI, 35; L. Herb. V, 93.

Stængelen opret, grenet; *Smaabladene* omvendt-ægformede eller ovale, afskaarne eller budte, fjernt-saugtakke; *Axelbladene* børsteformede, heelrandede; *Klaserne* forlængede; *Kronens Vinger* og *Kjøl* af lige Længde, kortere end *Fanen*; *Bællerne* uden Frugtholder, omvendt-ægformede, budte med en Braad, nætformigt rynkede, glatte, 1—2-frøede; *Bugsømmen* budtkjølet.

2—4' høi. Planten har (ligesom de øvrige Arter i Slægten), en stærk og efter Tørringen vedholdende Lugt (omtr. som *Trigonella Foenum græcum* eller *Heracleum*). Kronerne hvide, "lugtløse". De modne Bæller graabrune. 7—9. ☉.

Ved Strandbredder, Veie, omkring Byer, især i Nærheden af Stranden, sporadisk og ikke alm., men funden i alle Provindser.

977. **M. officinalis** [Willd. Enum. hort. berol. 2 p. 790] (Læge-S.) H. 777; Drej. n. 726; H. N. VI, 32—33; *Trifolium Melilot. off.* L., F. D. 934; *M. macrorrhiza* Pers., Koch Syn. II, 182.

Stængelen opret, grenet; *Smaabladene* omvendt-ægformede, budte, de øvre linieformet-ovale eller kileformede, indtrykte, alle fjernt saugtakkede; *Axelbladene* børsteformede; heelrandede; *Klaserne* forlængede; *Fane*, *Vinger* og *Kjøl* af lige Længde; *Ballerne* ved en kort Frugtholder stilkede, omvendt-ægformede, spidse, med skarp kjølformet *Bugsøm*, nætformigt rynkede og duunhaarede, alm. tofrøede.

2—3' høi. Kronerne gule, »lugtende«. De modne Bæller sorte, meget større end hos de øvrige Arter. 7—9. ☉.

Ved Strandbredder, Veie og paa Marker ikke sjelden.

978. **M. arvensis** [Wallr. Sched. 391] (Mark-S.) H. N. VI, 34; *M. officinalis* Lam. dict. 4, p. 63; Koch Syn. II, 182; *M. Petitpierreana* Rehb.

De nedre Blades Smaablade omvendt-ægformede eller ovale, *de øvre* oval-lancetformede, alle tandet-saugtakkede; *Klaserne* forlængede, mindre tætblomstrede; *Vingerne* kortere end *Fanen*, længere end *Kjølen*; *Ballerne* kortstilkede, glatte, med budt-kjølet *Bugsøm*, rynkede paatværs, forøvrigt som foreg.

1—2" høi. De modne Bæller grønbrune, tilligemed Blomsterne mindre end hos foreg. Kronerne bleggule, sjeldnere hvide, »vel-lugtende«. 7—9. ☉.

Paa Marker, sjelden: *J* Ferslev og Scheelsminde ved Aalborg (Branth)! *Sj* Kalundborg (Baagøe)! Marker ved Københavns Assistenskirkegaard! *Falst.* ved Korselitze og Karleby (Rasmussen)! Riserup, Bieginge (14), S. Kirkeby, Ourupgaard, Kringelborg (Koch). Den hvidblomstrede Form ved Bagsværd (19). Sandsynligviis indført med fremmed Sæd.

979. **M. dentata** [Pers. Syn. 2, 348] (Strand-S.) H. 778; Drej. n. 727; F. D. 1883; H. N. X, 49; L. Herb. I, 16; *Trifolium dentatum* Waldst. & Kit. pl. rar. hung. I, p. 41 t. 42 (den første Kilde til Arten).

Stængelen opstigende eller opret, ofte fra Grunden af grenet; *Smaabladene* elliptisk- eller lancetformet ovale, fiint og tæt saugtakke; *Axelbladene* sylformede med børsteformede Tænder ved Grunden; *Klaserne* kortere og mere tætblomstrede end hos de foreg.; *Vingerne* kortere end *Fanen*, længere end *Kjolen*; *Ballerne* uden Frugtholder, omvendt-ægformede, svagt rynkede, glatte.

Lavere (1—1½' høi) og finere, med meget mindre Blomster end de foreg. Kronerne gule, de modne Bæller sortbrune. 7—9. ☉.

Ved lerede og dyndfulde Strandbredder, paa Strandenge, ikke alm. og fornemlig i de sydlige Egne (omkring Bælterne og Østersøen): *Sl.* Haderslev (16); *Femern*; *Ærø* (N.): *Drejø* (12); *F.* Hofmangave (1), Koholm ved Svendborg (12); *Thorseng* ved Vemmenæs (12); *Loll.* Nakskov Færgeland! Flatø i Guldborgsund! *Falst.* Vaalse, N. Vedby (Koch), Hesnæs, Nykjøbing, Bøtø (14)! *Sj.* Avedøre (26), Flaskekroen ved Kalkovnen! Kastrup paa Amager (Dr.)! *Holbæk* (15), *Reersø* (Dr.), *Korsør*! Skjelskør! ☼

23. Trifolium. Kløver.

a. *Chronosemium* DC. Smaabladenes Sideaarer udeelte; Kronbladene gule, efter Afblomstringen hindeagtigt vedblivende; Vinger og Kjøl bedækkede af den hvælvede og nedadbøiede Fane; Bællen med en Frugtholder.

aa. *Axelbladene* randhaarede; *Griffelen* 4—6 Gange kortere end Bællen.

980. **T. filiforme** [L. Sp. pl. 1088, ex descr., loc. nat. et synonym. Raj.] (Faablomstret K.) Sm. fl. brit. 1404; E. Bot. 1257; Gren. & Godr. fl. Fr. I, p. 422; T. micranthum Viv.; Lge. Haandb. 1 Udg. n. 941.

Stænglerne nedliggende; *Smaabladene* omvendt-ægformede eller kileformede, rynket-nervede, i Spidsen svagt tandede og afskaarne eller udrandede, det midterste siddende; *Axelbladene**)

*) Axelbladene hos Trifolium-Arterne ere i omtr. deres halve Længde tilvoxne til Bladstilken. Ved Beskrivelsen af disse er her taget Hensyn til de midterste paa Stængelen, da de øvre, (under Blomsterstilkene) ofte have en fra hine meget afvigende Form. Blomster-

elliptiske (bredest paa Midten); *Blomsterstilkene* traadfne, noget bøiede, af Længde med eller lidet længere end det støttende Blad, 3—6-blomstrede; *Fanen* jævn, *Vingerne* oprette.

Stænglerne 2—4" lange. Kronerne bleggule, meget smaae. 6—7. ☉.

Paa Strandenge, meget sjelden: J. Steensballe Sund ved Horsens (Mygind)! Loll. ved Gottesgabe (19), Bjerremark (5)! Fra andre Steder er den mig ikke bekendt. ☞

981. **T. minus** [Sm. Fl. brit. 1403] (Traadstænglet K.) E. Bot. 1256; T. filiforme DC., H. 787; Drej. n. 724; Lge. Haandb. 1 Udg. n. 942; F. D. 1707; H. N. II, 48 og IX, 54; L. Herb. I, 20 (ikke L.); T. procumbens L. Sp. (tildeels), Gren. & Godr. l. c. 423.

Stænglerne nedliggende eller opstigende; *Smaaablade* omvendt-ægformede eller omvendt-hjerteformede, i Spidsen svagt tandede og udrandede. det midterste stillet; *Axelblade* ægformede; *Blomsterstilkene* fine, længere end Bladene, med 8—12-blomstrede, noget fladtrykte Hoveder; *Fanen* utydeligt sribet, *Vingerne* oprette.

Stænglerne 3—10" lange; Kronerne lysgule, visnede blegbrune. 5—8. ☉.

Paa Græsmarker, tørre Enge, Bakker o. s. v. alm. udbredt.

982. **T. procumbens** [L. Fl. Suec. (excl. syn. Raj.); Sm. Fl. brit. 792] (Udstrakt K.) H. 787; Drej. n. 723; F. D. 796; H. N. IX, 53; L. Herb. IV, 78; T. agrarium Poll., Gren. & Godr. l. c. 423 (ikke L.).

Stænglerne opstigende eller udstrakte, med udstaaende Grene, *Smaaablade* omvendt-ægformede eller omvendt-hjerteformede, ophøiet-nervede, fra Spidsen til Midten tandede, udrandede, det midterste stillet; *Axelblade* halvt-ægformede; *Blomsterstilkene* rette, udstaaende, alm. længere end Bladene,

standen er hos alle Arterne for Enheds Skyld og fordi en skarp Grændse er vanskelig at drage, benævnt et Hoved, skjøndt den hos nogle Arter ved Axens Forlængelse strængt taget er et Ax (f. Ex. Nr. 988), hos andre (f. Ex. Nr. 984—86) en Skjærm.

med halvkugleformede, tilsidst ovale, tæt- og mangeblomstrede Hoveder; *Fanen* med ophøiede Striber, dobbelt saa lang som Bællen; *Vingerne* udstaaende.

Hovederne meget større end hos foreg., mindre end hos følg. Kronerne smukt gule, i visnet Tilstand blegbrune. 6—8. ☉. Var. i Henseende til Stænglernes Længde, Beklædning (glat eller duunhaaret), og

β, *campestre* Schreb. (*α*, majus Koch Syn.) Stænglerne næsten oprette, Blomsterstilkene af Længde med Bladene. Kronen mørkere gul.

Ved Veie, paa Marker o. s. v. alm. *β*, med Hovedarten sjældnere.

bb. *Axelbladene* glatte; *Griffelen* omtrent af Længde med Bællen.

983. *T. agrarium* L. (Humble-K.) H. 786; Drej. n. 722; F. D. 558; H. N. IX, 52; L. Herb. I, 19; *T. aureum* Poll., Gren. & Godr. l. c.

Stængler og *Grene* oprette; *Smaabladene* rudeformet-omvendt-ægformede, ophøiet-nervede, fra Midten til Spidsen tandede, afskaarne eller svagt-udrandede, alle siddende; *Axelbladene* lancetformede, sylspidsede, af Længde med Bladstilk; *Blomsterhovederne* først halvkugleformede, tilsidst ovale; *Fanen* med ophøiede Striber, dobbelt saa lang som Bællen; *Vingerne* udstaaende.

$\frac{1}{2}$ —1' høi, bleggrøn. Kronerne smukt guldgule, tilsidst blegbrune. 7—9. ☉.

β, *brevipes* Drej. Grenene opret aabne, Smaabladene oval-lancetformede, Blomsterstilkene kortere end det støttende Blad.

Ved Veie og paa Græsmarker: i det nordøstlige *Sjæll.* hist og her, sjældnere i de andre Egne af Landet: *Sj.* Holbæk (15), Gyrstinge! Borød ved Sorø! Magleby paa Stevns (5); *Falst.* Halskov Vænge (Lütken); *Loll.* Mageltving (Rasm.); *F.* Skovlyst ved Svendborg (19), Kirkeby (12), Trolleborg! *J.* Ugilt i Vendsyssel (Grønlund); *Sl.* Rødding, Husum (16). — *β*, ved Teglbærderiet mellem Farum og Slangstrup (16). *js*

Anm. 1. *T. spadiceum* L. (H. 786; H. N. III, 37) adskilt fra foreg ved de øvre Blade modsatte, Bægertænderne langhaarede, Blomsterne tilsidst sodfarvede, er ikke hidtil funden i vor Flora, men derimod i Holsteen.

Anm. 2. Da de Linneiske Skjelnemærker ikke ere de samme som nu benyttes til Adskillelsen af de 4 foreg. Arter, og efterat de

flæste Forff. ere enige i at ansee den under Nr. 980 opførte som en egen Art, er der yttret Tvivl om Anvendelsen af de linneiske Navne *T. agrarium*, *procumbens* og *filiforme*. *Trifol. agrarium* L. synes baade ifølge Linnés Beskrivelse, de anførte Synonymer og ifølge Expl. i Linnés Herbarium (cf. C. Hartm. i Vet. Ac. handl. 1851, p. 287) utvivlsomt at være den med dette Navn hidtil almindelig benævnte Art, og til den foreslaaede Forandring i Navnet for denne Art forekommer der mig ikke at være nogensombelst Grund. Linnés *T. filiforme* synes ganske at stemme overens med *T. micranthum* Viv., saavel naar der tages Hensyn til Beskr. («*planta vix spithamæa profert pedunculos vix capillo aut seta equina crassiores et in capitulis tantum 3 v. 5 flosculos distinctos, magis manifeste pedicellatos*» etc.) som til Synonymer (Raj. Angl. t. 14 f. 4); den angives desuden kun fra England, men *T. minus* Sm., som førend Adskillelsen af *T. micranthum* almindelig antoges for *T. filiforme* L. er ikke sjelden i Norden og kunde neppe være ubekjendt for Linné. Grunden til den indtraadte Usikkerhed i Nomenclaturen synes at være den, at Linné har indbefattet under Navnet *T. procumbens* baade *T. minus* Sm. og den Art, som almindelig tillægges Navnet *procumbens*. Men da det er vanskeligt, om ikke umuligt, at udfinde hvilken af de 2 Arter Linné oprindeligt har tænkt paa ved det formeentlig collective Navn, har jeg beholdt dette for den som Traditionen har tillagt det, og derimod anvendt Smiths Navn *T. minus*, som ikke er Tvivl underkastet, for den anden Art.

b. Smaabladenes Sideaarer grenede; Bællen uden Frugtholder; Kronbladene hvide eller røde.

aa. Blomsterne forsynede med Dækblade; Bægerets Svælg nøgent; Griffelen jævnt bøiet, opstigende.

* *Trifolium DC.* Blomsterne stilkede; Bægerets Rør ikke opblæst.

984. **T. montanum** L. (Bjerg-K.) H. 785; Drej. n. 714; F. D. 1172.

Stængelen opret eller opstigende; Smaabladene lancetformede, spidse, med talrige og fremspringende Aarer mod Randen, kærpt og hvast saugtakke; Axelbladene lancet-sylformede, jævnt og langt tilspidsede; Blomsterhovedet tæt, før Udspringningen indtrykt, under Blomstringen kugleformet, tilsidst ovalt, paa Blomsterstilke fra de øvre Bladhjørner; Smaablomsterstilkene $\frac{1}{3}$ af Bægerrørets Længde, efter Afbloomstringen tilbagebøiede; Bægertænderne sylformede, de to øvre kortere end den nedre; »Bællen enfrøet«.

Rodstokken tyk, træagtig. Stængelen, de yngre Blades Underflade og Bægeret haarede. Kronen hvid. 7. 4.

Paa Græsmarker og Bakker, sjelden: *Bornh.* mellem Aakirkeby og Limensgade! Arnager (H.), Ringeby (Hamann); *Sj.* Nymølle (26), en Høi bag Flaskekroen (Dr.), Ø. for Flaskekroen 1863 (14), mellem Skillingskroen og Kjøge Kro (M. Vahl i F. D.). †

985. **T. hybridum** L. (Fladhoved-K.) H. 779; F. D. 1706; H. N. VII, 36; L. Herb. VIII, 152.

Stængelen opstigende eller opret; *Smaablade*ne ovale eller rudeformet-omvendt-ægformede, budte, med ophøiede Aarer i Randen, fint og mere eller mindre tæt saugtakke; *Åxelblade*ne æg-lancetformede, jævnt sylspidsede, stribede; *Blomsterhovedet* rundagtigt, efter Afblomstringen fladtrykt, paa Blomsterstilke fra de øvre Bladhjørner; *Smaablomsterstilkene* efter Afblomstringen tilbagebøiede, de indre 2—3 Gange længere end Bægerrøret; *Bægeret* randhaaret; *Tænderne* sylformede, de 2 øvre lidet længere end den nedre; »*Ballen* tofrøet«.

Hele Planten glat. Kronen først hvid, senere smukt rosenrød. 7—8. 4.

Paa Græsmarker, ikke almindelig og maaskee fra først af indført med fremmed Sæd: *Sj.* Marianelund ved Gurre, Tikjøb! Bringe, Herløv (14), Strandbredder ved Kalkbrænderiet! Marker bag Flaskekroen! Roholte i Sydsjælland! Bredderne af Sorø Sø! *Falst.* Riserup, Næsgaard (14), Korselitze (Koch); *F.* Midskov paa Hindsholm! Ollerup, Sørup (12); *J.* Ørnsø ved Silkeborg (12), Horsens (16); *Sl.* Flensborg (16), Huusby i Angel! Kappel (Lund), Slesvig (Esmarch). †

986. **T. repens** L. (Hvid K.) H. 780; Drej. n. 715; F. D. 990; L. Herb. V, 96.

Stængelen krybende; *Smaablade*ne kredsround-ovale eller omvendt-ægformede, skarpt og tæt saugtakke, budte eller udrandede; *Åxelblade*ne hindeagtige, æg-lancetformede, pludseligt tilspidsede; *Blomsterhovedet* først fladtrykt, siden rundagtigt, paa meget lange Blomsterstilke fra Bladhjørnerne, de indre *Smaablomsterstilke* af Længde med Bægerrøret; *Bægertænderne* glatte, lancetformede, de 2 øvre længere, tilsidst tilbagebøiede; *Ballen* 3—4-frøet; *Kronblade*ne hvide, tilsidst ofte kjødfarvede, forøvrigt som foreg.

Blad- og Blomsterstilke undertiden duunhaarede, Planten forøvrigt glat; Bladene have ofte en bleg eller bruun, halvmaaneformet Plet paa Midten. 6—8. 4. En Misdannelse (◁ *phyllanthum*!) med Bæger-

blade og Frugtknuder omdannede til Blade, de øvrige Blomsterdele mere eller mindre forvandlede, forekommer ikke sjældent, og især i fugtige Sommer.

Paa Enge og Græsmarker, overalt alm.

** *Fragarioides*. Blomsterne siddende (i Hoved); Bægerrørets Rygside med de 2 øvre Tænder efter Blomstringen hindeagtigt-opblæst.

987. *T. fragiferum* L. (Jordbær-K.) H. 785; Drej. n. 716; F. D. 1042; H. N. XI, 50; L. Herb. V, 97.

Stængelen krybende; *Smaablade* omvendt-ægformede eller ovale, budte eller udrandede, mod Randen ophøiet-nervede, tæt og skarpt saugtakke; *Axelblade* hindeagtige, forneden rørformigt sammenvoxne, fra en lancetformet Basis langt sylspidsede; *Blomsterhovedet* paa en meget lang Blomsterstilk fra Bladhjørnerne, under og efter Blomstringen kugleformet, omgivet af et mangebladet *Svøb* af Bægerets Længde; *Bægerets* øvre, opblæste Deel nætformigt-rynknet, haaret; *Ballen* 1—2-frøet.

Glat eller svagt haaret. Kronen kjødfarvet. 7—8. 7.

Paa Strandenge alm., sjældnere ved Bredden af Færskvandssøer og ved Veie inde i Landet, f. Ex. Sj. Leersøen! alm. mellem Glostrup og Herstedøster (12), Tjustrup Sø, Sorø, Tiis Sø! Slagelse, Flakkebjerg (Nielsen).

† *T. resupinatum* L. (Omvendt K.) (Sturm D. Fl. h. 16).

Stænglerne grenede, med nedliggende eller opstigende *Grene*; *Smaablade* rudeformet-elliptiske eller omvendt-ægformede, saugtakke; *Blomsterhovedet* fladtrykt, efter Afblostringen kugleformet, med 10—12-deelt, meget kort *Svøb*; opadvendte *Blomster*; Kronen rosenrød, vellugtende, forøvrigt som foreg. 7—9. ☉.

Er oprindelig indført fra Italien med Hø, der havde tjent til Indpakning af Thorvaldsens Arbejder; har siden den Tid i flere Aar voxet i Mængde paa Pladserne omkring Thorvaldsens Museum og er senere funden ved Kastrup Mølle paa Amager (Branth). [3]

bb. Blomsterne uden Dækblade, siddende (i Hoved); Griffelen i Spidsen hagekrummet.

* *Lagopus*. Hovederne dels endestillede, dels sidestillede (fra Bladhjørnerne); Kronen omtr. af Bægerets Længde, bleg rød eller hvid. ☉.

988. **T. arvense** L. (Hare-K.) H. 783; Drej. n. 717; F. D. 724; L. Herb. I, 18.

Stængelen opret, med oprette eller udspilede *Grene*; *Smaa-bladene* linieformet-kileformede, i *Spidsen* udrandede, utydeligt tandede; *Axelbladene* hindeagtige, sribede, den frie Deel børsteformet; *Blomsterhovederne* ovale, tilsidst valseformede, ved en *Blomsterstilk* fjernede fra det støttende *Blad*; *Bægeret* tæt laadent, uden ophøiet *Ring* i *Svælget*, *Tænderne* børsteformede, næsten ligestore, længere end *Røret* og *Kronen*.

Hele *Planten* blødhåret, *Axet* graaagtigt af de tæthaarede *Bægere*; *Kronen* meget liden, hvidagtigt-kjødfarvet. 7—8.

Paa tørre, især sandige *Marker* og *Bakker* alm. udbredt.

989. **T. striatum** L. (Stribet K.) H. 784; Drej. n. 721; F. D. 1171; H. N. XV, 54; L. Herb. VI, 118.

Stængelen opstigende eller opret; *Smaa-bladene* paa de nedre *Blade* omvendt-hjerteformede, paa de øvre omvendt-ægformede eller kileformede, ovenfor *Midten* svagt saugtakke; *Axelbladene* sribede, ægformede, den frie Deel triangelformet, pludseligt syldspidset; *Blomsterhovederne* ægformede eller ovale, stilkløse (∴ tæt omgivne af det støttende *Blad*); *Bægerrøret* tæt uldhåret; *Svælget* indsnøret af en bruskagtig *Ring*; *Tænderne* braadspidsede, mod *Spidsen* næsten glatte, tilsidst udstaaende, (den nedre længere end de øvrige), kortere end *Røret* og af *Længde* med eller lidet kortere end *Kronen*.

Planten håret. *Kronen* bleg rød. 6—7.

β, strictum Drej. *Stængelen* rank, *Smaa-bladene* rudeformet-elliptiske.

Paa dyrkede og udyrkede *Marker*, saavel paa *Leer-* som *Sandgrund*, ikke sjelden: hyppigst paa *Halvøens Østkyst*, i *Fyen* og *sydl. og vestl. Sjæll.* — **β**, paa *Marken* mellem *Charlottenlund* og *Øresundet* (Dr.), *Mannehøjene* paa *Møen* (17). ☼

**** *Eutriphyllum* DC.** Alle Blomsterhovederne endestillede, (i Spidsen af Hovedstængelen og Grenene); Kronen meget længere end Bægeret, purpurrød (undtagelsesviis hvid). 4.

990. **T. pratense** L. (Rød K.) H. 781; Drej. n. 719; F. D. 989; L. Herb. V, 94.

Stængelen opstigende, udeelt eller grenet, med rette *Ledstykker*; *Smaabladene* ovale eller omvendt-ægformede, heelrandede eller svagt tandede, i Spidsen indtrykte eller budte med en Braad; *Axelbladene*s frie Deel ægformet, pludseligt tilspidset i en hørsteformet Spids; *Blomsterhovederne* enlige eller 2 samlede, tæt omgivne af det støttende Blad; *Bægerrøret* tinervet, duunhaaret, *Svælget* indsnøret af en bruskagtig, haaret Ring, *Tænderne* randhaarede, de 4 øvre omtrent ligestore, lidet kortere end Røret, den nedre lidet længere end Røret, ikke naaende op til Vingerne; *Bællen* opspringende paatværs.

Bladene have alm. en halvmaaneformet Plet paa Midten. Kronen rosenrød, sjeldnere hvid. 5—9.

β, *sativum* Schreb. Større i alle Dele og mere grenet; Blomsterhovedet stundom ved en Stilk fjernet fra det støttende Blad.

γ, *parviflorum* Bab. Blomsterhovederne aflange, ved en Stilk fjernede fra det støttende Blad, Blomsterne stilkede, mindre end hos Hovedarten; Bægertænderne af Længde med eller længere end Kronen.

Paa Enge og Græsmarker, alm. vildvoxende og dyrket som Fodervæxt (β) over hele Landet. γ, (en meget afvigende Form) sjeldnere: Sj. Hellebæks Teglværk! Grøndal og Lundehuusmosen ved Kbhavn! Hjortenæs ved Sorø! F. Nielstrup (12).

991. **T. medium** L. (Bugtet K.) H. 782; Drej. n. 718; F. D. 662 (T. alpestre) og 1273; L. Herb. V, 95; T. flexuosum Jacq.

Stængelen grenet, med zigzagbøiede *Ledstykker*; *Smaabladene* elliptiske eller lancetformede, mod Randen mangegrenet-nervede og heelrandede eller utydeligt saugtakke; *Axelbladene*s frie Deel lancetformet, jævnt sylspidset; *Blomsterhovederne* enlige, mod Blomstringen ved en Stilk fjernede fra det støttende Blad;

Bægerrøret næsten glat; *Svalget* med en Haarkrands; *Bællen* opspringende paalangs, forøvrigt som foreg.

Kronen mørk rosenrød eller violetrød. Hovederne alm. større, men mindre tætblomstrede end hos foreg. og følg. 6—7.

β, *strictum* Hartm. Stængelen mere rank, Bladene mere duunhaarede.

Paa Græsmarker, Bakker, ved Veie og i Randen af Skove alm. udbredt. — *β*, i Skygge.

992. **T. alpestre** L. (Skov-K.) H. 783; Drej. n. 720; H. N. XIII, 62, L. Herb. I, 17.

Stængelen rank-opret, alm. udeelt, med rette *Ledstykker*; *Smaablade*ne smalt lancetformede, mod Randen flint- og mangel-grenet-nervede, Nerverne udløbende i hvasse, men meget korte Takker; *Axelbladene*s frie Deel sylformet, jævnt tilspidset i en lang, børsteformet Spids; *Blomsterhovederne* ofte 2 samlede, tæt omgivne af det beskyttende Blad; *Bægerrøret* tyvenervet, uldhaaret, de 4 øvre *Tænder* omtrent ligestore, lidet kortere end Røret, den nedre næsten dobbelt saa lang som Røret; forøvrigt som foreg.

Kronen rosenrød, sjældnere hvid med rød Kjøl. 6—7.

I høitliggende Skove temmelig sjelden: *Sj.* Ledreborg! Boserup! Bidstrupgaard! Hvedstrup (8), Slangerup (H.), mellem Søsum og Knardrup, Ballerup, Jonstrup (14), Hareskoven, Fredriksdal (H.), Nymølle! Kjøge Aas (9)! *J.* i Aalborg-Egnen (12), Aarslev (H.). ¹²

18^{de} Klasse. Polyadelphia (Fleerknippede).

1. Orden. Polyandria (Mangehannede).

1. **Hypericum** L. Bæger og Krone fembladede; Støvtraadene ved Grunden sammenvoxne i 3 Bundter; 3 Grifler; Frugten en treklappet Kapsel. (N. F. Hypericineæ. *)

*) Alle vore Arter af denne Slægt have modsatte, mere eller mindre gennemsigtigt punkterede Blade og gule Kronblade, som ofte

I. Polyandria.

1. Hypericum. Perikon.

a. Stængelen fladtrykt-tveægget.

993. **H. humifusum** L. (Liggende P.) H. 795; Drej. n. 755; F. D. 141; Rehb. ic. fl. germ. VI, fig. 5176; H. N. I, 35.

Stænglerne talrige, nedliggende; *Bladene* ovale, med gjen-nemsigtige Punkter i Midten og spredte sorte Kirtler mod Randen; *Blomsterne* i en faablomstret Qvast; *Bægerbladene* heelrandede eller fjernt-tandede, med sorte Punkter mod Randen paa Underfladen, de tre oval-linieformede, budte med en Braad, de to kortere, lancetformede; *Støvdragerne* 15—20; *Griflerne* kortere end Kapselen.

Stænglerne fine, 2—6" lange (den mindste danske Art). Blomsterne aabne sig kun i Solskin. 6—8. 4.

Paa Bakker og tørre Marker, ikke sjelden i de fleste Egne af Landet. *

994. **H. perforatum** L. (Prikbladet P.) H. 794; Drej. n. 756; F. D. 1043; Rehb. l. c. fig. 5177.

Stængelen opret; *Bladene* elliptiske eller ovale, med talrige gjennemsigtige Punkter og faae sorte Kirtler; *Blomsterne* i rigt-blomstrede Qvaster fra Spidsen af Stængelen og Grenene; *Bægerbladene* ligestore, lancetformede, spidse, heelrandede eller i Spidsen svagt tandede, med sorte Punkter paa Underfladen; *Støvdragerne* ∞ ; *Griflerne* længere end Kapselen.

1—2' høi. Kronbladene med sorte Punkter og Streger i Randen. 7—8. 4.

β , angustifolium Gaud. Bladene linieformede, med færre sorte Punkter.

tilligemed Blade og Bægerblade ere forsynede med sorte Kirtler. Den alm. Adskillelse i Arter med eller uden Kirtler i Randen af Bægerbladene er ikke heldig, da idetmindste *H. humifusum* alm. har sorte Kirtler i Randen, uagtet den angives uden disse, og Forskjellen saaledes ikke er skarp.

Ved Randen af Veie, paa Diger, Græsmarker o. s. v. meget alm., ogsaa i Hedeegne. — *β*, sjeldnere, f. Ex. *Sj.* Brede Bakker! *Falst.* Korselitze Skov (Koch); *Loll.* ved Steensgaard (19); *Bornh.* Hammershuus (Baagøe).

b. Stængelen firekantet.

995. *H. quadrangulum* L. [Fr. Nov. p. 237] (Firekantet P.) *H. N.* XI, 37; *Rehb.* l. c. fig. 5178; *H. dubium* Leers, *H.* 794; *H. tetragonum* (Fr.) *Drej.* n. 758.

Stængelen opret, skarpt firekantet, uvinget; *Bladene* ovale, budte, med faae (eller ingen) gjennemsgtige Punkter og sorte Kirtler: *Blomsterstanden* en Top, dannet af faablomstrede Qvaster fra Spidsen af Stængelen og de øvre Grene; *Bægerbladene* ægformet-ovale, budte, heelrandede, under Blomstringen udstaaende; *Kronbladene* elliptisk-ovale, budte, med talrige sorte Punkter.

1—2' høi. 7—8. 4.

Ved Veie, paa Græsmarker og tørre Enge alm.

996. *H. tetrapterum* [Fr. Nov. p. 236] (Firevinget P.) *Drej.* n. 757; *Rehb.* l. c. fig. 5179; *H. N.* VII, 29; *H. quadrangulum* *H.* 793; *F. D.* 640.

Stængelen opret, firekantet-vinget; *Bladene* ovale, budte, med talrige gjennemsgtige Punkter og en Række af sorte Kirtler mod Randen; *Blomsterstanden* en tæt Halvskjærm, dannet af mangeblomstrede Qvaster fra Spidsen af Stængelen og de øverste Grene; *Bægerbladene* lancetformede, tilspidsede, heelrandede, under Blomstringen oprette, efter samme i Spidsen tilbagebøiede; *Kronbladene* lancetformede, med faae (eller ingen) røde Punkter.

Stængelen 1—2' høi, ofte rødlig. *Kronbladene* blegere gule og mindre end hos foreg. 7—8. 4.

Ved Bredderne af Aaer, Kilder og Grøfter: ikke sjelden paa *Halvøens* Østkyst, *Fyen* og *de sydlige Øer* (*Bornh.* indbefattet), i *Sjæll.* og det nordlige og vestlige *Jyll.* *

c. Stængelen trind.

997. *H. montanum* L. (Bjerg-P.) *H.* 795; *Drej.* n. 760; *F. D.* 173; *Rehb.* l. c. fig. 5187.

Stængelen opret; *Bladene* siddende, ægformede eller ovale, de øvre med, de nedre uden gjennemsigtige Punkter; *Blomsterne* i Halvskjærm eller kort Klase, dannet af tæt-, men faablomstrede *Qvaster*; *Bægerbladene* lancetformede, spidse, med stilkede, sorte Kirtler i Randen; *Frøene* valseformede, under Lupen fint punkterede.

1—2' høi. Bladene glatte, ofte paa Underfladen rue, var. bredere og smalere, spidse og budte. 7—8. 4.

I høitliggende Skove og paa Bakker mellem Krat, funden i alle Provindser (med Undtagelse af Lolland og Falster), men sparsom og sporadisk.

998. **H. pulchrum** L. (Smuk P.) H. 796; Drej. n. 759; F. D. 75; Rchb. l. c. fig. 5185; H. N. VII, 30.

Stængelen opret; *Bladene* budte, i Randen tilbagerullede, gjennemsigtigt-punkterede; *Stængelbladene* æg-hjerteformede, siddende og omfattende; Bladene paa Grenene ovale, meget kortstilkede; *Blomsterne* i en forlænget Klase, dannet af faablomstrede *Qvaster*; *Bægerbladene* omvendt-ægformede, budte, med sorte, utydeligt stilkede Kirtler i Randen; *Frøene* valseformede, svagt halvmaaneformigt bøiede, under Lupen fint punkterede.

Stængelen 1—1½' høi, ofte rødtligt anløben; Bladene glatte, paa Underfladen blaaagraae. Kronbladene smukt gule med sorte Kirtler i Randen og alm. brandgule Striber i Spidsen. 7—8. 4.

I høie Skove og paa Lyngbakker: alm. paa *Halvøen*; paa Øerne sjelden: *F.* Hindsgavl (12), Svanninge Bakker, Hvidkilde (H.); *Møens* Klint (H.); *Sj.* Helsingør (!), alm. ved Hellebæk, Tikjøb! Krogenberg Hegn (Weilbach), Frederiksberg (Dr.)! *Bornh.* i Almindingen!

999. **H. hirsutum** L. (Laaden P.) H. 795; Drej. n. 761; F. D. 802; Rchb. l. c. fig. 5189; H. N. XI, 48.

Stængelen opret, tilligemed de ægformet-ovale, kortstilkede, gjennemsigtigt-punkterede Blade haaret; *Blomsterstanden* en forlænget Klase eller Top, dannet af mangeblomstrede *Qvaster*; *Bægerbladene* lancetformede, spidse, randhaarede af kortstilkede, sorte Kirtler; *Frøene* valseformede, under Lupen vortet-punkterede.

1 $\frac{1}{2}$ —3' høi. Kronbladene bleggule med faae sorte Kirtler i Randen. (Ved Beklædningen let kjendelig fra alle de øvrige Arter). 7—8. 4.

I Skove og Krat, funden i alle Provindser; hyppig paa Østkysten af *Halvøen*, i *Fyen* og paa de *mindre Øer*; i *Sjæll.* sparsom.

19^{de} Klasse. Syngenesia (Rörhannede). *)

1. Orden. *S. æqualis* (*Lige Sambo*).

Blomsterkurvene eenskjønnede (alle Blomsterne ♂).

I. *Semiflosculosæ*. Alle Blomsterne i Kurven med tungeformede Kroner; Kurvbladene bladagtige; Planten indeholder Mælkesaft. (N. F. Synanthereæ, a, Cichoraceæ).

A. Fnokken 0 eller hindeagtig.

1. *Låmpsana* L. Blomsterleiet nøgent; Kurvdækket toradet, den indre Kreds 8—10-bladet, med under Frugtmodningen oprette Kurvblade, den ydre Kreds meget kort; Skalfrugterne svagt tyvestribede, med ingen eller utydelig Fnok (Kronerne gule).

*) Alle de i denne Klasse indeholdte Planter høre til N. F. Synanthereæ. Blomsterne ere tæt samlede i en hovedformet Blomsterstand (Blomsterkurv), paa en kort, ofte skiveformet Axe (Blomsterleiet) og omgivne af krands- eller spiralstillede Dækblade (Kurvdækket, dets enkelte Blade Kurvbladene). Bægeret sammenvokset med Frugtknuden, dets Krave fjer- eller haarformet (Fnok), sjældnere hindeagtig eller 0; Kronen regelm. femtandet eller tungeformet, enten eens hos alle Blomsterne i Kurven eller de ydre (Randblomsterne) forskellige fra de indre (Skiveblomsterne). Støvdragerne 5 med sammenvoxne Støvknapper; Frugten en Skalfrugt beklædt med den vedblivende Fnok.

2. **Arnóseris** Gärt. Blomsterleiet afdeelt i Rum med hindeagtigt tandet Rand; Kurvdækket enradet, mangebladet (med faae, korte Skjæl ved Grunden), under Frugtmodningen kugleformigt tillukt; Skalfrugterne femkantede, tistribede, med kort, hindeagtig, faatandet Fnok. (Kronerne gule).

3. **Cichórium** L. Blomsterleiet afdeelt i Rum med børsteformigt tandet Rand; Kurvdækket toradet, i den ydre Kreds 5, i den indre 8 Blade; Skalfrugten fladtrykt-kantet, fint stribet; Fnokken dannet af en kort, hindeagtig, fryndset Rand (Kronerne blaae, røde eller hvide).

B. Fnokken haarformet (c: Straalerne udeelte, alm. fint saugtakket-rue).

a. Bægerrøret forlænget udover Skalfrugten i Form af et Næb nedenfor Fnokken.

4. **Taráxacum** Hall. Kurven mangeblomstret; Blomsterleiet nøgent; Kurvbladene i 2—3 Kredse, i den indre Kreds længere; Skalfrugten trind, svagt sammentrykt, ribbet; Ribberne foroven (henimod Næbet) skjælformigt piggede.

5. **Lactúca** L. (part.) Kurven faablomstret; Blomsterleiet nøgent; Kurvbladene i 2—3 Kredse, i den ydre Kreds meget korte, Skalfrugten fladtrykt, med jævne Ribber; Fnokken sneehvid.

b. Skalfrugterne uden Næb (eller svagt indsnørede mod Spidsen),

aa. fladtrykte.

6. **Sonchus** L. Blomsterleiet nøgent; Kurvdækket efter Afblostringen ved Grunden udvidet, med taglagte (spiralstillede) Kurvblade; Skalfrugten ribbet paalangs og ofte svagt stribet paatværs; Fnokken blød, sneehvid.

bb. Skalfrugterne i Gjennemsnit næsten trinde.

7. **Crepis** L. Blomsterleiet grubet med svagt haaret-tandet Rand, uden Avner; Kurvbladene toradede, den ydre

Kreds kortere; Skalfrugten 10—20-stribet, med jævne Striber, lidet bredere ved Grunden og i Midten end i Spidsen (foroven afstumpet eller svagt afsmalnet), med blød, sneehvid Fnok.

8. **Arácium** Neck. Blomsterleiet grubet, uden tandet Rand; Kurvdækket under Blomstringen valseformet, med toradede, i den ydre Kreds kortere Kurvblade; Skalfrugten ti-stribet, med jævne Striber, lidet bredere ved Grunden og i Midten end i Spidsen; Fnokken skjør, skidenguul.

9. **Hierácium** L. (part.) Blomsterleiet grubet, med svagt tandet Rand; Kurvdækket taglagt; Skalfrugten tiribbet, med jævne Ribber, ligebred overalt eller smalere ved Grunden; Fnokken skjør, guulhvid eller skidenguul.

C. Fnokken fjerformet (o: Straalerne med tydelige Sidegrene).

a. Skalfrugten med Næb.

10. **Hypocháris** L. Blomsterleiet beklædt med hurtigt affaldende, linieformede Avner; Kurvbladene spiralformigt taglagte; Skalfrugten stribet paalangs, og langs Striberne ru. (Bladene tandede).

11. **Tragopógon** L. Blomsterleiet grubet, Gruberne med en ophøiet Rand; Kurvdækket toradet med ligelange, ved Grunden sammenvoxne Kurvblade; Skalfrugten af Randblomsterne ribbet paalangs og, især foroven, langs Ribberne pigget. (Bladene heelrandede).

b. Skalfrugten uden Næb (eller svagt indsnøret i Spidsen).

aa. *Fnokkens Sidestraaler indvævede i hinanden.*

12. **Scorzonéra** L. Kurvbladene spiralformigt taglagte, de ydre brede, de indre i Randen hindeagtige; Blomsterleiet fint vortet, uden Avner; nogle af Fnokkens Straaler længere, i Spidsen ikke fjerede. (Bladene heelrandede).

bb. Fnokkens Sidestraaler frie.

α. Randblomsternes Fnok kort, hindeagtig, tandet.

13. **Thrinicia** Roth. Kurvdækket taglagt; Skalfrugten i Spidsen indsnøret, oventil ru; Fnokken sneehvid.

β. Fnokken eens hos Rand- og Skiveblomster.

14. **Leontodon** L. (part.) Kurvdækket taglagt; Skalfrugten i Spidsen indsnøret, riflet paatværs eller lidet ru; Fnokken skjør, skidenguul, vedblivende, dens Straaler frie, alle eens eller en ydre Kreds kortere, haarformede.

15. **Picris** L. De ydre Kurvblade taglagte, tilbagebøiede, de indre meget længere og indbyrdes ligelange, oprette; Skalfrugten indsnøret i Spidsen, riflet paatværs; Fnokken blød, sneehvid, affaldende, dens Straaler ved Grunden sammenhængende.

(*Hypochaeris glabra* var.).

II. *Capitatæ.* Alle Kronerne rørformede; Kurvbladene alm. stive, Kurven mere eller mindre kugleformet. Ingen Mælkesaft (N. F. Synanthereæ b, Cynareæ).

A. Kurvbladene i Spidsen hagekrummede.

16. **Lappa** Tournef. (*Arctium* L.). Blomsterleiet beklædt med børsteformede Avner; Støvknapperne med traadformede Tilhængsler ved Grunden; Fnokkens Straaler i flere Kredse, korte, haarformede, affaldende.

B. Kurvbladene spidse, alm. stikkende.

a. Fnokken haarformet, ru.

17. **Serratula** L. Blomsterleiet beklædt med Avner; Kurvdækket ægformet med taglagte, spidse, ikke tornspidsede Kurvblade; Støvknapperne uden Tilhængsler; Fnokken vedblivende, dens Straaler frie, i flere Kredse, den indre Kreds længere end de øvrige.

18. **Onopórdon** L. Blomsterleiet afdeelt i flere Rum med hindeagtigt tandet Rand; Kurvdækket kugleformet med taglagte, tornspidsede Kurvblade; Støvtraadene glatte, Støvknapperne uden Tilhængsler; Fnokkens Straaler forneden sammenvoxne til en Ring, tidligt affaldende.

19. **Cárduus** L. (part.). Blomsterleiet beklædt med Børster eller Haar; Kurvdækket kugleformet eller aflangt; Støvtraadene haarede; forøvrigt som foreg.

(*Centaurea decipiens*) 19, 3.

b. Fnokken fjerformet.

20. **Cirsium** Tournef. Blomsterleiet beklædt med Børster eller Avner; Kurvdækket taglagt; Støvtraadene frie, Støvknapperne uden Tilhængsler; Skalfrugten glat; Fnokkens Straaler enkelte, ved Grunden sammenvoxne til en Ring.

21. **Silybum** Gärt. Støvtraadene sammenvoxne; Fnokkens Straaler med meget korte Sidegrene; forøvrigt som foreg.

22. **Carlina** L. Blomsterleiet beklædt med fligede Avner; Kurvbladene taglagte, de ydre oprette, stikkende, de indre udstaaende, hindeagtigt-raslende; Støvtraadene frie, Støvknapperne med hver 2 traadformede og fjerede Tilhængsler ved Grunden; Fnokken grenet, med fjerede Grene; Skalfrugten tæt beklædt med tiltrykte Haar.

III. *Discoideæ*. Alle Kronerne rørformede; Kurven valseformet, med urteagtige eller hindeagtige Kurvblade. Ingen Mælkesaft (N. F. Synanthereæ c, Eupatoriaceæ).

23. **Bidens** L. Blomsterleiet beklædt med skjælagtige Avner; Kurvbladene i 2 Kredse, den ydre Kreds udstaaende; Arrene lancetformede; Skalfrugten fladtrykt; Fnokken dannet af 2—5 Børster eller Stak med nedadvendte Smaatorne.

24. **Eupatorium** L. Blomsterleiet nøgent; Kurvdækket faabladet, taglagt; Arrene meget lange, traadformede; Skal-

frugten sribet eller kantet, med haarformet, mangestraalet Fnok.

(*Artemisia maritima*) 19, 2.

2. Orden. *S. superflua* (Overflødig Sambo).

Blomsterne i Kurven forskjelligkjønnede (i Randen ♀, i Skiven ♂).

I. *Discoideæ*. Alle Kronerne rørformede (undtagen hos Nr. 26). N. F. *Synanthereæ* c, *Eupatoriaceæ*.

A. Kurvbladene i 1 eller 2 Kredse (i den ydre Kreds mindre).

25. **Petasites** Gärt. Fleerbo (den ene Plante (♂) bærer Kurve med ♂ Blomster i Skiven og faae ♀ Blomster i Randen, den anden (♀) med ♀ Blomster i Randen og faae ♂ Blomster eller golde ♂ Blomster i Skiven*). Blomsterleiet nøgent; ♀ Blomsterne skjævt afskaarne, næsten tungeformede, ♂ og ♂ Blomsterne femtandet-rørformede; Fnokken haaret. (Blomsterkurvene klaseformigt samlede).

26. **Tussilago** L. (part.) **). Enbo: Randblomsterne ♀ i flere Kredse, med tungeformet Krone. Skiveblomsterne ♂ med rørformet, femtandet Krone, forøvrigt som foreg., men Blomsterkurven enlig, endestillet.

(*Senecio vulgaris*) Enbo (II).

B. Kurvdækket taglagt.

a. Fnokken 0 eller avneformet.

27. **Artemisia** L. Blomsterkurvene kugleformede eller ægformede; Blomsterleiet nøgent eller haaret; Skivekronerne

*) Hos ♂ Planten af *P. officinalis* har jeg fundet Skiveblomsterne ♀ og frugtbare, Randblomsterne ♂ ufrugtbare, med kort Griffel og ofte firekløvet Krone.

**) Denne Slægt hører ifølge den kunstige Inddeling til den følgende Afdeling (*Radiatæ*), men paa Grund af dens nøie naturlige Slægtskab med *Petasites* har jeg anført den ved Siden af denne.

rørformede; Randkronerne traadformede; Skalfrugterne fladtrykt-trekantede, uden Fnok (Blomsterstanden en Top).

28. **Tanacétum** L. Blomsterkurvene fladtrykt-halvkugleformede; Blomsterleiet nøgent, med ophøiede Vorter; Skivekronerne femtandede, Randkronerne tretandede; Skalfrugterne femkantede; Fnokken dannet af en svag Hindekant (Blomsterstanden en Halvskjærm).

29. **Cótula** L. Blomsterkurv og Blomsterleie som foreg.; Skivekronerne firetandede, Randblomsterne kronløse; Støvdragerne med hornformede Tilhængsler i Spidsen; Skalfrugterne fladtrykt-vingede, uden Fnok; Randblomsternes Frugter stilkede, Skiveblomsternes siddende. (Blomsterkurvene enlige i Spidsen af Grenene).

(*Matricaria discoidea*) II.

(*Anthemis Cotula* β , *disciflora*) II.

b. Fnokken haarformet.

30. **Cnaphálum** L. Kurvbladene hindeagtigt-raslende; Skivekronerne rørformede, femtandede, Randkronerne traadformede, i Spidsen udvidede, 3—5-tandede; ingen Blomster mellem Kurvbladene; Arret tokløvet saavel hos Rand- som Skiveblomsterne; Fnokken hos alle Blomsterne eens.

31. **Antennária** Gärt. Tvebo: Den ene Plante (σ) bærer golde \varnothing Blomster, den anden (φ) frugtbar φ Blomster. σ : Kronerne rørformede; Arret udeelt; Fnokkens Straaler i Spidsen kølleformigt udvidede. φ : Kronerne traadformede; Arret tokløvet; forøvrigt som foreg.

32. **Filágo** L. (Fr. Nov. p. 267). Kurvbladene urteagtige eller kun i Randen hindeagtige; i den yderste Kreds 5 lige-store; Skivekronerne rørformede, firetandede, Randkronerne traadformede, i Spidsen udvidede, 4—5-tandede; 1 eller flere Rækker Blomster uden Fnok mellem de øvre Kronblade.

(*Inula Conyza*) II.

II. *Radiatæ*. Skivekronerne rørformede, Randkronerne tungeformede. (N. F. *Synanthereæ* d, *Radiatæ*).

A. Fnokken 0 eller hindeagtig.

a. Blomsterleiet uden Avner.

aa. *Kurvbladene ligelange*.

33. **Bellis** L. Skiveblomsternes Ar i Spidsen fladtrykte; Skalkrugterne fladtrykte med en smalvinget Rand, uden Fnok.

bb. *Kurvbladene taglagte*.

34. **Chrysanthemum** L. (part.). Kurvdækket halvkugleformet; Blomsterleiet hvælvet eller fladt, ikke huult; Skiveblomsternes Skalkrugter trinde, sribede, Randblomsternes trekantede eller mangefurede; Fnokken 0 eller i Form af en svag Hindekant.

35. **Matricaria** L. (part., Fr. Mant. 3, 114). Kurvdækket under Blomstringen fladt; Blomsterleiet kegleformet eller hvælvet, mod Frugtmodningen indvendig huult; Skiveblomsternes Skalkrugter trekantede, forøvrigt som foreg.

b. Blomsterleiet beklædt med Avner eller Skjæl.

36. **Ánthemis** L. Blomsterkurven flad eller halvkugleformet; Straaleblomsterne talrige, med afgang Krave; Skalkrugterne trinde eller fladtrykt-firekantede, med en svag Hindekant istedetfor Fnok.

37. **Achilléa** L. Blomsterkurven valseformet; Straaleblomsterne faae (4—10) med rundagtig Krave; Skalkrugterne fladtrykte, uden Fnok.

† *Galinsóga* Ruiz & Pav. Blomsterkurven halvkugleformet; Straaleblomsterne faae (4—5) med rundagtig Krave; Skalkrugten kantet, tiltrykt-haaret, Fnokken hindeagtig, med oventil fryndesede Flige.

B. Fnokken haarformet.

a. Kurvbladene taglagte, uligelange (Skiveblomsternes Ar fladtrykte, paa Inderfladen haarede).

aa. *Støvknapperne med haarformede Tilhængsler ved Grunden.*

38. *Ínula* L. Blomsterleiet nøgent, punkteret; Straaleblomsterne talrige, eensfarvede med Skiveblomsterne (gule).

bb. *Støvknapperne uden Tilhængsler.*

a. Straale- og Skiveblomsterne eensfarvede (gule).

39. *Solidágo* L. Blomsterkurvene valseformede; Blomsterleiet nøgent, grubet; Straaleblomsterne faae; Skalfrugterne trinde.

β. Straale- og Skiveblomsterne forskjelligfarvede.

40. *Erigeron* L. Blomsterleiet grubet, uden Avner; Straaleblomsterne talrige, i flere Kredse, de indre ofte med traadformet eller ingen Krave; Skalfrugterne fladtrykte, med enradet, mangestraalet Fnok.

41. *Aster* L. (part.) Blomsterleiet grubet, Gruberne omgivne af en tandet Rand; Straaleblomsterne talrige, i 1 Kreds, alle tungeformede; Skalfrugterne fladtrykte, med fleerradet, mangestraalet Fnok.

b. Kurvbladene i 1—3 Kredse (med indbyrdes ligelange Blade i hver Kreds).

aa. *Skiveblomsternes Ar fladtrykte, paa Inderfladen haarede.*

† *Stendáctis* Cassin. Kurvbladene i 2 Kredse; Blomsterleiet med fine (kun under Lupen synlige) Avner; Straaleblomsterne i 2 Kredse (forskjelligfarvede fra Skiveblomsterne); Skalfrugterne fladtrykte; Fnokken hos Skiveblomsterne toradet (den ydre Kreds kort), hos Straaleblomsterne enradet.

bb. Skiveblomsternes Ar trinde, i Spidsen udvidede og penselhaarede.

α. Skiveblomsterne med, Straaleblomsterne uden Fnok.

42. **Doronicum** L. Blomsterleiet grubet, mellem Gruberne finthaaret; Kurvdækket fladt eller halvkugleformet, dets Blade i 2—3 Kredse; Skalfrugterne næsten trinde, furede.

β. Alle Blomsterne uden Fnok.

43. **Senecio** L. Blomsterleiet grubet, mellem Gruberne finthaaret; Kurvdækket valseformet eller klokkeformet, dets Blade i 2 Kredse, den ydre Kreds kortere (Kurvbladene i Spidsen brandplettede; Stængelbladene spredte).

44. **Cineraria** L. Blomsterleiet nøgent; Kurvdækket valseformet, dets Blade i 1 Kreds (ikke brandplettede), forøvrigt som foreg.

45. **Arnica** L. Blomsterleiet grubet, Grubernes Rand finthaaret; Kurvdækket valseformet, med 2 Kredse af lige-lange Kurvblade; Straaleblomsterne ved Grunden af Kraven forsynede med 5 ikke sammenvoxne golde Støvdragere (Stængelbladene modsatte).

Tussilago (I).

3. Orden. *S. frustranea* (Unyttig Sambo).

Skiveblomsterne ♂, Randblomsterne kjønsløse.

46. **Centaurea** L. Blomsterleiet beklædt med Børster eller Avner; Kurvdækket æg- eller kugleformet, dets Blade taglagte, med hindeagtige, ofte frynsede eller tornede Tilhængsler; Skivekronerne rørformede, Randkronerne uregelm. tragtformede; Griffelen under Arret udvidet; Fnokken haarformet eller 0.

† *Helianthus* L. Blomsterleiet fladt eller lidet hvælvet, beklædt med skjælformede Avner; Kurvdækket dannet af taglagte, grønne Kurvblade, Skivekronerne rørformede, Randkronerne tungeformede; Griffelen valseformet, ikke udvidet;

Skalfrugten kantet-fladtrykt; Fnokken dannet af 2—flere af-faldende Børster.

† *Rudbékia* L. Blomsterleiet kegleformet; Kurvbladene toradede, udstaaende; Skalfrugten firekantet, bredere foroven, Fnok 0 eller kort, uregelmæssigt tandet, forøvrigt som foreg. (*Bidenæ cernua radiata*). (19, 1).

4. Orden. *S. necessaria* (Nødvendig Sambo).

47. *Caléndula* L. Randkronerne frugtbare med tunge-formede Kroner og toffigede Ar; Skiveblomsterne ♀ ufrugtbare med rørformede Kroner og kugleformede Ar; Skalfrugterne forskjelligformede (alm. baadformede), uden Fnok.

5. Orden. *S. segregata* (Særskilt Sambo).

48. *Echinops* L. Blomsterkurvene enblomstrede, med taglagt Kurvdække; mange Kurve samlede i et kugleformet Hoved; Fnokken kort, børsteformet.

6. Orden. *Monogamia* (Særbo).

<i>Impatiens</i>	}	Blomsterne ikke samlede i en Blomsterkurv. (5, 1).
<i>Lobelia</i>		
<i>Viola</i>		
<i>Solanum</i>		

I. Syngenesia æqualis.

1. Lapsana. Haremad.

1000. *L. communis* L. (Almindelig H.) *Lapsana* comm. H. 827; Drej. n. 762; F. D. 500; Rehb. ic. fl. germ. XIX, tab. 1353.

Stængelen opret, foroven grenet og dannende en sammen-sat Halvskjærm*); *de nedre Blade* lyreformet-fjersnitdeelte, *Stængelbladene* bugtet-tandede; *Blomsterkurvene* faablomstrede.

Mere eller mindre haaret, Haarene ofte med røde Kirtler. 7—8. ☉.
Ved Veigrøfter, i Haver, Skove o. s. v., meget alm.

*) Den alm. saakaldte Halvskjærm hos en stor Mængde Arter i denne Familie er strængt taget en Qvast, idet den øvre Kurv

2. Arnoseris. Svineøie.

1001. *A. pusilla* [Gärtn. Fruct. 2, p. 355 t. 157] (Liden S.) *Hyoseris minima* L., H. 825; F. D. 201; Rchb. l. c. XIX, tab. 1354, fig. 1; H. N. II, 17.

Bladene omvendt-ægformede, tandede, rosetteformigt samlede ved Grunden; *Stænglerne* flere fra Grunden, bladløse, udeelte eller 1—2-grenede; *Grenene* med et skjælformet *Dækblad* ved Udgangspunktet fra Stængelen, forneden traadsmale, opadtil efterhaanden tykkere og under Blomsterkurven hule.

2—10" høi. Kronerne gule. 7—8. ☉.

Dyrkede Marker paa let, sandig Grund: paa *Halvøen* hyppig i Hedeegnene, paa Øerne temmelig sjelden: *F. Strib*, Assens (H.), Kirkeby! *Thorseng* ved Bregninge (12); *Langel.* ved Steengade (19); *Loll.* mellem Kjettinge og Grønnegade (5); *Falst.* Bregninge Mølle, Halskov (14); *Sj.* Skaaninge By ved Jægerspriis, mellem Ørs-holt og Louisenlyst ved Helsingør (21); *Bornh.* Arnager! o. fl. St. (H.).

3. Cichorium. Cikorie.

1002. *C. Intybus* L. (Almindelig C.) H. 827; Drej. n. 763; F. D. 907; Rchb. l. c. XIX, tab. 1357, fig. 2.

Stængelen opret, med stive Grene; *de nedre Blade* halvt-omfattende, høvlformet-halvfinnede med tandede Flige, *de øvre* lancetformede med püilformet omfattende Basis, heelrandede; *Kurvene* 1—3, siddende eller kortstilkede, i hvert af de øvre Bladhjørner.

Stængelen og Bladene haaret-rue. Kurvbladene ofte kirtelhaarede. Kronerne blaae, sjeldnere hvide eller lila. 7—9. ♀.

Ved Veie og Gjærder, paa udyrkede Marker: alm. i de fleste Egne, men aftager eller forsvinder i de magrere Egne, savnes f. Ex. omkring Helsingør (21) og er sjelden i det Indre af Halvøen: *J. Skjærhoved!* *Sl. Rødding*, Husum (16).

4. Taraxacum. Mælkebøtte.

1003. *T. officinale* [Web. Prim. fl. Hols. p. 56] (Almindelig M.) Drej. n. 781; T. off. α , genuinum Koch, Lge.

udvikles først og derpaa efterhaanden de i Ordenen nedenfor samme, men da de nedre Grene alm. overgaae de øvre i Længde, naae de sædvanligt lige Høide foroven.

Haandb. 1 Udg. S. 447; Rchb. l. c. XIX, tab. 1404; Leontodon Taraxacum L., H. 812; F. D. 574.

Roden tapformet; *Bladene* alle samlede ved Grunden, høvlformet-halvfinnede eller tandede; *Skafterne* oprette eller opstigende, bladløse, trinde, hule, med en enlig Kurv i Spidsen; *de ydre Kurvblade* tilbagebøiede, lancetformede, foroven afrundede, uden eller med en svag Pukkel i Spidsen; *Skalfrugten* grønlig-graa, foroven stærkt pigget.

Kronerne gule. 5—9. 4. Var. betydeligt i Henseende til Bladenes Indskjæring, Beklædning o. s. v.

Paa Græsmarker, i Haver, ved Veie o. s. v., overalt et almindeligt Ukrud.

1004. **T. erythrospermum** [Andrz. i Bess. Fl. podol. II, n. 1586] (Kambladet M.) F. D. 2594; T. offic. β , *glaucescens* Koch Syn. II, 492, Rchb. l. c. tab. 1405, fig. 1; Lge. l. c. S. 448; T. off. β , *arenarium* Drej.; L. Tarax. 3, *obliquus* Fr. nov. p. 243; H. N. XIII, 31; L. *corniculatus* Kit.

Bladene mellembrudt- og høvlformet-snitdeelte med langstrakt-triangelformede, kamagtigt tætsiddende Afsnit; *de ydre Kurvblade* æg-lancetformede, vandret udstaaende, *de indre* linieformede, med udvidet, afrundet Spidse og en Pukkel umiddelbart nedenfor samme; *Skalfrugten* rødbrun (eller graabrun), forøvrigt som foreg.

Planten blaagraa, alle dens Dele mindre og finere end foreg. Var. med de ydre Kurvblade tiltrykte. 5—6. 4.

Paa Lyngheder, tørre Marker og Sandbakker, ikke alm., men bemærket i alle Provindserne.

1005. **T. palustre** [DC. Fl. Fr. IV, p. 45] (Eng-M.) T. off. 1, *palustre* Fr. l. c., H. N. XIII, 29, Lge. S. 448; L. *palustris* Sm., F. D. 1708 og (L. *obliquus*) 1935; T. off. ϵ , *lividum* Koch.

Bladene høvlformet-snitdeelte, med fjerne, smalt-linieformede eller korte triangelformede Afsnit; *Skafte*t nedbøiet eller opstigende; *de ydre Kurvblade* ægformede, tiltrykte, *de indre* uden Pukkel i Spidsen; *Skalfrugten* grønlig-brun, foroven svagt pigget.

Aldeles glat og næsten glindsende, Skaft og Bladstilke ved Grunden rødviolette. 5—6. 4.

Paa Enge, især Strandenge: *Sj.* Helsingør (Heiberg), Frederikssund, Bognæs (19), Kattinge (14) og Herslöv ved Roeskilde! Engen ved Leersøen! Amager (27), bag Flaskekroen (Dr.); *Bornh.* ved Listed Fiskerleie (Baagøe)! Rønne (19); *Loll.* ved Ulsløv Sø (Koch)! Bukkehave Mølle paa *Thorseng* (12); *J.* alm. ved Ranum (8), Hobro (16); *Sl.* Strandenge ved Flensborg, Langballe Aa i Angel (16).

Anm. Ifølge Hr. Rostrups lagttagelse gaaer Skalkrugten hos denne Art jævnt over i Næbet, hvis nedre farvede Deel er $\frac{1}{3}$ af Frugtens Længde, hos de 2 foreg. Arter er Overgangen fra Skalkrugten til Næbet mere pludselig og dettes farvede Deel kun $\frac{1}{4}$ af Frugtens Længde.

5. *Lactuca.* Laktuk.

a. Næbet halvt saa langt som eller af lige Længde med Skalkrugten. Blomsterne gule.

1006. *L. muralis* [Fresenius Taschenb. 1832, p. 484] (Skov-L.) *Prenanthes* L., H. 812; F. D. 509; *Mycelis* Rehb. ic. fl. germ. XIX, tab. 1417; Drej. n. 783.

Bladene med vinget, ved Grunden piilformigt-øret Bladstilk, høvlformet-snitdeelte, med kantede eller grovt tandede Afsnit; *Blomsterne* i en Top med traadfine, faablomstrede *Grene*; *Kurvbladene* i 2 Kredse: den indre Kreds fembladet, mange Gange længere end den ydre; *Blomsterkurvene* omtrent femblomstrede; *Skalkrugtens* Næb flere Gange kortere end Fnokken.

Bladene glatte, mat-blaagrønne. Kurvbladene alm. rødbrune. Kronerne gule, Skalkrugten mørkbrun. 7—8. ☉ eller 4.

Paa løs Muldjord i Løvskov, alm. udbredt.

1007. *L. Scariola* L. (Tornbladet L.) H. 811; Drej. n. 782; F. D. 1227; Rehb. l. c. XIX, tab. 1421, fig. 1; H. N. VIII, 4.

Bladene tværstilte, siddende, med piilformet Basis, høvlformet-halvfinnede, (de øvre hele), i Randen tornet-tandede, paa Rygnerven tornede; *Toppen* pyramideformet, med mangeblomstrede *Grene*; *Blomsterkurvene* mangeblomstrede, med taglagte *Kurvblade*; *Skalkrugtens* Næb af Længde med Fnokken.

Kronerne gule. Skalkrugterne blegbrune. 7—8. ☉.

Ved Veigrøfter omkring Byer og beboede Steder: *Sj.* i Kbhavns Omegn alm., f. Ex. hist og her paa Voldene, langs Veien til Lunde-

huset! Amager (Dr.), forøvrigt sjelden: Magleby, Skjelskør (Nielsen), Vordingborg; *F.* ved Odense Kanal (H.); *J.* Diger ved Ribe (6). *

† *L. sativa* L. (Salat) Rchb. l. c. tab. 1421, fig. 3. Adskilt fra foreg. ved bredere, mindre indskaarne, ikke tværstilte Blade alm. uden Torne, Blomsterne i en halvskjærmformet Top, dyrkes i Køkkenhaver og forekommer stundom forvildet omkring disse.

b. Næbet meget kort. Blomsterne lila. (*Mulgedium* Cass.).

† *L. Plumieri* Gren. & Godr.; *Sonchus* L.; *Mulgedium* DC., Rchb. l. c. XIX, tab. 1416; *Stængelen* opret, sribet, glat, blaadugget; *Rodbladene* store, høvlformet-fjersnitdeelte med spydformet Endeafsnit og vinget Bladstilk; *Stængelbladene* omfattende *Stængelen* med afrundede Ører; *Blomsterkurvene* talrige i Halvskjærm; *Kurvbladene* taglagte, glatte. 7—8. 4.

Forvildet ved Nykjøbing paa Falster (Lütken)! (Vildvoxende i Syd-Europa).

† *L. macrophylla* (*Sonchus macrophyllus* Willd.). *Stængelen* foroven, Bladenes Underflade og *Kurvbladene* tæt stivhaarede af alm. kirtelbærende Haar; *Rodbladene* meget store, hjerteformede eller lyreformede med hjerteformet Endeafsnit; *Kurvene* større, høiere af Væxt, forøvrigt som foreg. 7—8. 4.

Paa Bakken ved Søllerød Kro, forvildet (Petersen, 15)! (Vildvoxende i Nordamerika).

6. *Sonchus*. Svinemælk.

a. Blomsterstilkene og *Kurvbladene* kirtlet-børstehaarede. 4.

1008. *S. palustris* L. (Kjær-S.) H. 808; Drej. n. 787; F. D. 606 (*S. arvensis*) og 1109; Rchb. ic. XIX, tab. 1414.

Stængelen i Spidsen skjærm- eller halvskjærmformigt grenet, med qvastblomstrede Grene; *Bladene* i Randen fint tornetandede, ved Grunden piilformigt omfattende med nedadvendte Ører, de nedre høvlformede, de øvre hele; *Skalfrugterne* furede paalangs og svagt riflede paatværs.

4—8' høi. Rodstokken uden Udløbere. Kronerne lysgule. 7—8.

Ved Aaer og Grøfter, især i Strandegne, hvor Saltvandet af og til gaaer op i Grøtterne, sjældnere ved Færskvandssøer og Bredderne af selve Havet: paa *Halvoens* Østkyst alm. ved Fjordene fra Veile-Fjord til Eiderkanalen! paa Øerne sporadisk: *F.* Middelfart (12), Langensø (13), Odense Kanal, Ulriksholm, Hverringe (H.), Christiansminde ved Svendborg! *Thorseng* og *Langel.* ikke sjelden (12); *Loll.* Gottesgabe (19), Fuglsang Slots Ruiner; *Falst.* ikke sjelden mod V. (14); *Sj.* Vordingborg (14), Lindersvold (H.), Holsteinborg, Basnæs, Borreby (Nielsen), Parnas ved Sorø (Bredsd.), Kastelet og Kirsebærgangene ved Kbhavn (H.), Arre Sø (Rafn). *

1009. *S. arvensis* L. (Ager-S.) H. 809; Drej. n. 786; Rehb. l. c. XIX, tab. 1412.

Rodstokken med Udløbere; *Stængelen* i Spidsen skjærm- eller halvskjærmformigt grenet, med 1 eller faae til en Qvast samlede Kurve paa Grenene; *Bladene* høvlformede, halvfinnede eller bugtede, ved Grunden hjerteformigt omfattende med tilbagebøiede Ører, i Randen grovt tornet-tandede; *Skalfrugterne* sribede paalangs og svagt riflede paatværs.

2—4' høi. Kronerne mørkgule. 7—8. Var:

β, *integrifolius*! *F. D.* 2543. Bladene hele, linieformede, fint tandede, *Stængelen* med 1 eller faae Kurve.

γ, *lævipēs* Koch. (maritimus Retz.) Blomsterstilkene glatte, Kurvbladene svagt kirtelhaarede eller glatte.

Almindeligt og meget besværligt Ukrud paa Marker mellem Sæden, ved Veie o. s. v. — *β*, i Sandklitter ved Skagen (Drej.) og Fjaltring! *γ*, hist og her, især ved Strandbredder.

b. Kurvbladene typisk glatte. ☉.

1010. *S. asper* [Vill. Fl. delph. 3 p. 158] (Ru S.) Drej. n. 785; *F. P.* 843; Rehb. l. c. XIX, tab. 1410, fig. 2; *S. oleaceus asper* H. 810.

Blomsterstanden skjærmformet; *Bladene* hele eller høvlformet-bugtede, ved Grunden hjerteformigt omfattende med tilbagebøiede Ører, i Randen tornet-tandede med uligestore Tænder; *Skalfrugterne* smalt vingede, jævne, sribede paalangs.

1—2' høi. Bladene alm. læderagtige, ofte glindsende. Kronerne gule, paa Underfladen rødlig. 6—9.

β, *inermis* Bischoff, Rehb. l. c. XIX, tab. 1411; Bladene høvlformet-fjersnitdeelte eller halvfinnede, med færre og ikke tornede Tænder. (Ligner i Udseende følg. Art.)

Paa dyrket Jord i Haver, ved Gjærder og mellem Sæden, ikke sjelden. β , hist og her med Hovedarten.

1011. **S. oleraceus** L. (Almindelig S.) H. 809; Drej. n. 784; F. D. 682; Rchb. l. c. XIX, tab. 1410 fig. 1.

Bladene høvlformet-halvfinnede eller -fjersnitdeelte, ved Grunden piilformigt omfattende med lige udstaaende Ører, i Randen grovt tandede; *Skalfrugterne* uvingede, sribede 'paa-langs og riflede paatværs; forøvrigt som foreg.

1—2' høi. Bladene mere slappe, matgrønne eller blaagraae. Kronerne bleggule. Var. med kirtelhaaret Kurvdække. 6—9.

Paa dyrket Jord alm., især et besværligt Ukrud i Haver.

7. **Crepis. Høgeskjæg.**

a. Stængelen bladbærende (*Crepis* DC., Fr.).

1012. **C. biennis** L. (Toaarig H.) H. 824; Drej. n. 769; F. D. 1997; Rchb. ic. fl. germ. XIX, tab. 1439; H. N. II, 5.

Stængelen opret, i Spidsen halvskjærmformigt grenet; *Bladene* høvlformet-halvfinnede, i Randen flade; *Stængelbladene* med øreformigt omfattende Basis; *Kurvbladene* linie-lancetformede, paa Inderfladen silkehaarede, de ydre udstaaende, de indre tiltrykte; *Griflerne* gule; *Skalfrugterne* 13—16-sribede, skident straagule, i Spidsen uden Næb.

Stængelen furet, 1—3' høi, tilligemed Bladene mere eller mindre stivhaaret. Kurvene meget større end hos de følg. 6—7. ☹.

Ved Veie og paa Marker, især paa Leer- og Kalkgrund, hist og her i alle Provindser, især hyppig i Roeskilde-Egnen, *Syd-* og *Vest-sjælland*, sydl. *Fyen*, *Loll.*, *Falst.* og *Bornh.* $\frac{3}{4}$

1013. **C. tectorum** L. (Tag-H.) H. 823; Drej. n. 770; Rchb. l. c. XIX, tab. 1442 (1452).

Stængelen opret, omtrent fra Midten halvskjærmformigt grenet; *Rodbladene* lancetformede, høvlformet-halvfinnede eller tandede, *Stængelbladene* linieformede, heelrandede, med tilbage-rullet Rand og piilformigt halvt-omfattende Basis; *de ydre Kurv-blade* linieformede, udstaaende, *de indre* lancetformede, tiltrykte, paa Inderfladen tiltrykt-haarede; *Griflerne* grønligt brune; *Skal-*

frugterne kastaniebrune, tistribede, i Spidsen afsmalnede til et kort, ru Næb.

Stængelen 1—2' høi, furet, dunshaaret. Kronerne gule. 6—8. ☉.

β , *segetalis* Roth, H. N. II, 6; *C. stricta* Schultz, H. 824. Bladene heelrandede eller svagt tandede, Grenene stivt oprette, fine, en- eller faablomstrede.

Paa dyrkede Marker mellem Sæden, ved Veie, alm. udbredt. (Navnet, som er hentet fra dens tilfældige Forekomst paa Huustage, er mindre passende). β , med Hovedarten. !*

1014. **C. virens** L. (Grøn H.) Drej. n. 768; F. D. 2544; Rchb. l. c. XIX, tab. 1441 (1451).

Stængelen opret eller opstigende, grenet, ofte fra Grunden af; *Rodbladene* høvlformet-snitdeelte, halvfinnede eller tandede; *Stængelbladene* linie-lancetformede, i Randen flade, heelrandede eller især mod Grunden fliget-tandede og piilformigt omfattende; *Kurvbladene* alle tiltrykte, de ydre linie-børsteformede, de indre linie-lancetformede, paa Inderfladen glatte; *Griflerne* gule; *Skalfrugterne* skident blegbrune, tistribede, jævne, uden Næb.

Bladene frisk grønne, tilligemed Stængelen næsten glatte. Kronerne gule. 7—9. ☉. Var. betydeligt i Henseende til Høiden, Stængelens Retning, Bladenes Form og Indskjæring. De meest iøjnefaldende Former ere:

β , *elator* Drej. 1½—2' høi, opret, de nedre Blade høvlformet-snitdeelte, de øvre linieformede, ved Grunden fligede.

γ , *capillaris* Fr. (α . *multicaulis* Kph. i Drej. fl. exc.) F. D. 2545; *C. diffusa* DC. Lav og spæd, med oftest talrige, nedliggende Stængler, traadfine Blomsterstilke.

Ved Gjærder, paa Marker o. s. v., ikke sjelden i de fleste Egne af Landet, især hyppig paa Østkysten af *Halvøen* (omtrent fra Randers mod S.) og i *Fyen*. Ikke bemærket paa *Bornh.*! og i det *nordlige Jyll.* (Dr.). — β , med Hovedarten, paa frodig Jordbund. γ , paa tørre Marker (er ofte, men ikke altid, frembragt ved Hovedstængelens Afhugning). *

b. Stængelen bladløs (Intybus Fr.)

1015. **C. præmorsa** [Tausch, Bot. Zeit. II, 1, p. 79] (Afbidt H.) Drej. n. 767; Rchb. l. c. XIX, tab. 1444 (1454);

Hieracium præmorsum L., H. 819; F. D. 942; Intybus Fr., Lge. Haandb. 1 Udg. n. 971; H. N. XIII, 28.

Rodstokken nedentil afbidt; *Stængelen* et udeelt og bladløst, duunhaaret Skaft; *Rodbladene* oval-lancetformede, jævnt nedløbende i *Bladstilken*, fjernt og utydeligt tandede, duunhaarede; *Blomsterkurvene* i Klase, *de nedre Blomsterstilke* 2—3-blomstrede, *de øvre* enblomstrede; *Skalfrugterne* olivenbrune, linieformede, lidet afsmalnede imod Spidsen.

1—1½' høi. Kronerne bleggule. 6. 4.

Paa Enge og i Moser, ikke alm.: Sj. Grøndal og Lundehuus-mosen ved Kjøbenhavn! Kjøge Aas mod Lellinge (9), Bidstrupgaards Mose! Hareskoven ved Ballerup (H.), mellem Knardrup og Bringe, Jonstrup Vang (14)! J. Aalborg (Strandg.), Lundsgaard mellem Skive og Viborg, Hødal Mølle ved Hobro (16). ¹³

8. *Aracium*. Ørneøie.

1016. *A. paludosum* [Monn. Ess. p. 73] (Kjær-Ø.) Drej. n. 771; *Hieracium* L., H. 821; F. D. 928; H. N. XII, 7; *Crepis* Moench, Koch. Syn. II, 506; Rehb. ic. XIX, tab. 1463.

Stængelen opret; *Rodbladene* stilkede, lancetformede, mod Grunden halvfinnet-tandede; *Stængelbladene* med hjerteformigt-øret Basis, omfattende, æg-lancetformede, tilspidsede, skarpt tandede; *Blomsterkurvene* i en faablomstret Halvskjærm; *Kurvbladene* tiltrykte, sort-kirtelhaarede.

1—2' høi, glat, mørkgrøn. Kronerne gule. 6—7. 4.

Paa Enge og i fugtige Skove, alm.

9. *Hieracium*. Høgeurt*).

a. *Pilosella*. Skalfrugterne meget smaae, med fine, ligelange Straaler i Fnokken. (Udskyde i Regelen bladbærende Vandgrene fra Rodstokken).

aa. *Blomsterkurven* enlig i Spidsen af Stængelen, Kronerne paa Overfladen gule, paa Underfladen rødtribede.

1017. *H. Pilosella* L. (Haarrig H.) Fr. Symb. Hierac.

*) Til Undersøgelse af denne paa Grund af Arternes Mangfoldighed og Foranderlighed yderst vanskelige Slægt maa især benyttes

p. 2; Epicr. p. 10; H. 816; Drej. n. 772; F. D. 1110; Rehb. ic. fl. germ. XIX, tab. 1468; H. N. VI, 4; L. Herb. VIII, 155.

Bladene omvendt-ægformet-lancetformede, graagrønne, paa begge Flader stivhaarede og paa Underfladen hvidgraae af en tæt stjerneformet Duun; *Skaftet* bladløst; *de ydre Kurvblade* budte, *de indre* spidse.

Skaftet 2—8" høit, tilligemed Vandgrenene stivhaaret, desuden ofte oventil, ligesom Kurvbladene, beklædt med sorte Kirtelhaar. Blomsterkurvene meget større end hos de andre Arter af Afdelingen a. 5—7. 4. Var. med Vandgrenene omdannede til bladede Blomsterstængler, uden Vandgrene og

β, pilosissimum (Vaill.) Fr. Symb. p. 3. Rodstokken stærkt udviklet, Skaft og Vandgrene korte, tæt beklædte med stive, ved Tørring rustbrune Haar.

Ved Gjærder, paa tørre Græsmarker og Bakker meget alm. — *β, Sj.* paa Nykjøbings Lyng (9)! *J.* i det nordvestlige hyppig i Pletter mellem Lyngen! De øvrige af Fr. anførte Former har jeg ikke fundet hos os.

bb. Blomsterkurvene i Regelen flere, kvast- eller halvskjærmformigt samlede i Spidsen af Stængelen. Kronen ensfarvet paa begge Flader.

α, Rodstokken krybende, med forlængede Vandgrene; Kurvbladene budte.

1018. *H. Auricula* L. (Lancetbladet H.) Fr. Symb. p. 14, Epicr. p. 19; H. 817; Drej. n. 773; F. D. 1111; Rehb. l. c. XIX, tab. 1475, fig. 2; H. N. VI, 6 og XI, 14.

Bladene lancetformede, i Spidsen bredere og budte, heelerandede, nøgne*), glatte, ved Grunden randhaarede, blaaagtigt

Fries "Symbolæ ad historiam Hieraciorum" og "Epicrisis generis Hieraciorum" Ups. 1862 (i Forening med de i H. N. indeholdte Original-Exemplarer). Blandt de talrige Arter, som ere beskrevne i disse vigtige Værker, er det muligt at endnu flere end de her anførte ville findes hos os, skjøndt Danmark er forholdsviis fattigere paa Hieracier end de tilgrændsende Bjerglande.

*) Udtrykket *nøgen* bruges i denne Slægt for at betegne Mangel af den stjerneformede Duun, *glat* om Mangel af længere Haar-beklædning.

duggede; *Skaflet* alm. enbladet; *Halvskjærmen* dannet af 2—5 Blomsterkurve; *alle Kurvbladene* budte; *Griffelen* gul.

Vandgrenene mod Spidsen stivhaarede, paa kraftige Expl. ofte i Spidsen blomsterbærende; Skaflet $\frac{1}{3}$ —1' høit, nedentil næsten glat, foroven beklædt med Haar, sorte Kirtler og stjerneformet Duun (Paa smaae Expl. forekommer ofte kun 1 Kurv, paa store stundom flere end 5 og 2—3 Blade paa Skaflet (H. dubium H. 817). Kronerne guldgule. 6—7. 4.

Paa Bakker, Græsmarker og høie Enge, alm. udbredt, dog neppe saa alm. som foreg. 1*

1019. **H. pratense** [Tausch, Bot. Zeit. 11, 1, p. 56] (Eng-H.) . Fr. Symb. p. 19, Epicr. p. 23; F. D. 2660; H. N. VI, 10; H. collinum Rchb. l. c. XIX, tab. 1477 (ikke Gochn.).

Rodstokken vidtkrybende; *Rodbladene* bredt lancetformede eller omvendt-ægformede, budte, fjernt og svagt tandede, frisk grønne, nøgne, i Randen og paa Underfladen, især langs Nerverne, stivhaarede; *Skaflet* 1—2-bladet, langhaaret; *Halvskjærmen* qvastformet, med talrige smaae Blomsterkurve; *alle Kurvbladene* budte, alm. sort-kirtelhaarede; *Griffelen* gul.

Vandgrenene kortere eller længere, stundom rodslaaende; Skaflet $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ ' høit, især forneden beklædt med lange, hvide Haar, imod Spidsen tillige med stjerneformet Duun; Kronerne gule. 6. 4.

Paa Enge. Kun funden her i Landet paa »Ryerne« mellem Lundehuset og Strandveien ved Kbhavn (Rostrup 1857)! 1*

† 1020. **H. aurantiacum** L. (Pomeransfarvet H.) Fr. Symb. p. 23, Epicr. p. 24; H. 819; F. D. 1112; Rchb. l. c. XIX, tab. 1474; H. N. X, 9.

Skaflet flerbladet, forneden tæt og langhaaret; *Rodbladene* omvendt-ægformede, *Stængelbladene* lancetformede, alle Bladene frisk grønne, heelrandede eller svagt tandede, stivhaarede; *Halvskjærmen* med 3—10 Kurve; *alle Kurvbladene* budte; *Griffelen* bruen.

Forekommer stundom uden Vandgrene. Skaflet $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ ' høit, Kurvene større og færre end hos foreg., var. i Hens. til Kronernes Farve (alm. hørøde, sjeldnere orange eller gule). Kurvbladene sorte, tilligemed den øvre Deel af Stængelen stivhaarede af alm. sorte Haar;

Haarene paa Bladene og Stængelens nedre Deel skidengule eller rustfarvede. 6—7. 4.

En Bjergplante, som neppe har sit Hjem her, men forekommer stundom forvildet, f. Ex. *Sj.* Græsmarker ved Nøddebo (A. Rafn)! Charlottenlund (H.), Karlsberg ved Valby! *J.* Hatting ved Horsens (*Jørg.*), *St.* Stapelholm (Forchhammer), mellem Schwabstedt og Bergenhusen (F. Müll.).

β , Rodstokken sammentrængt; Vandgrene korte eller 0; de indre Kurvblade spidse eller tilspidsede.

1021. *H. cymosum* L. (Qvastblomstret H.) Fr. Epier. p. 35—36; H. N. XIII, 12 og 14; H. 818; Drej. n. 774; F. D. 810 (var.); *H. glomeratum macilentum* Fr. Symb. p. 39, Lge. Haandb. 2 Udg., p. 518; *H. Nestleri* Vill., Rehb. l. c. XIX, tab. 1486 (*H. poliotrichum*) og tab. 1485 (*H. cymigerum* Rehb.).

Skaftet 3—6-bladet, beklædt med tæt stjerneformet Duun, faae sorte Kirtelhaar og længere Haar; *Bladene* lange, linie-lancetformede, svagt tandede, stivhaarede og graaagtigt duunhaarede, især paa Underfladen; *Halvskjærmen* sammensat, qvastformet, med mange, smaae, paa Grenene tæt sammenhobede Kurve; *Griffelen* guul.

Skaftet 1—3' høit; Rodstokken ofte uden Vandgrene; Kurvbladene stivhaarede og graafiltede. Har de mindste Kurve af alle danske Arter i denne Slægt. Kronerne gule. 6—7. 4.

Paa Skræuter og Bakker mellem Krat, sjelden: *Sj.* Strandklinerne mod Øresundet mellem Taarbæk og Strandmøllen! Stevns Klint ved Tommestrup (16, 28)! *F.* Lundsgaards Klint ved Kjerteminde (A. Lange); *Æbelø* (H.). 1*

b. *Pulmonarea* Koch. Overvintre ved Bladrosetter, hvis vedblivende Blade tilligemed de i følgende Aar udviklede Rodblade ved Grunden omgive Stængelen (*phyllopoda* Fr.). Kurvbladene i afbrudte Spiraler (o: næsten toradede); Fnokkens Straaler stive, uligelange.

1022. *H. murorum* L. (Muur-H.) Fr. Symb. p. 108; Epier. p. 91; H. 820; Drej. n. 775; Rehb. l. c. XIX, tab. 1519—20.

Rodbladene talrige, frisk grønne, hjerteformede eller ægformede, tandede, med større, nedadvendte eller udspærrede

Tænder ved Grunden; *Stængelen* en- eller faabladet; *Kurvene* i en fra det øvre Stængelblad fjernet Halvskjærm med opstigende *Grene*; *Kurvbladene* tilspidsede, grønne med sorte Kirtelhaar; *Griffelen* brunagtig eller grønlig gul; *Fnokken* næsten hvid.

1—2' høi. Bladene bløddhaarede eller næsten glatte, nøgne. Kronerne gule, deres Tænder glatte. $\frac{6}{1} - \frac{7}{1}$. 4. Var. betydeligt i Henseende til Bladformen, Stængelbladenes Antal, Beklædningen o. s. v. De i vor Flora meest afvigende Former ere:

α , *silvaticum* L. Sp., Fr. Epicr. p. 91, H. murorum α , Fr. Symb. p. 108; H. N. II, 7. Bladene langstilkede, meget tynde og slappe, tandede i forskjellig Dybde.

β , *rotundatum* (H. rotundatum Kitaib.) Stængelen ofte bladløs; Rodbladene hjerteformede, næsten heelrandede.

γ , *subcæsium* Fr. Epicr. p. 92; H. murorum * incisum Fr. Symb. p. 110; H. incisum Koch, Rehb. l. c. XIX, tab. 1521 fig. 2; F. D. 2598 (H. cæsium). Bladene ved Grunden dybt tandede, blege, næsten blaagrønne; Kurvbladene graafiltede, uden Kirtler. (Har nogen Ligbed med H. cæsium).

I Skove og Krat ikke sjelden: β , Marselisborg Skov ved Aarhus! γ , *Stevns* og *Moens* Klint!

1023. H. *integrifolium* [Lge. Haandb. 2 Udg. p. 520] (Ovalbladet H.) F. D. 2661; H. vulgatum * integrifolium Fr. Symb. p. 117; Lge. Haandb. 1 Udg. p. 456; H. rotundatum Hans. Herb. Nr. 1234 (ikke Kit.) H. murorum integrifolium H. N. XII, 23.

Rodstokken langstrakt, krybende; *Rodbladene* talrige, langstilkede, med langhaarede Bladstilke, omvendt-ægformet-ovale eller bredt elliptiske, heelrandede eller utydeligt tandede; *Stængelen* 1—5-bladet; *Halvskjærmens Grene* opstigende, tilligemed Kurvdækket beklædte med graae stjerneformede Duun og sorte Kirtelhaar; *Kurvbladene* budte; *Griffelen* olivenbrun; *Fnokken* skident hvid.

1—2' høi. Bladene frisk grønne, i Randen og paa Underfladens Nerver langhaarede, nøgne. Kronerne gule, i Spidsen randhaarede. 7. 4.

I Kratskove, sjelden, og kun funden paa *Halvøen*: J. Smidstrup Krat i Gadbjerg Sogn ved Veile, Steenvad Mølle ved Kolding (30)! Paaby Krat ved Kolding (28)! ¹²

Anm. Denne Art forekommer mig at være saa forskjellig baade fra *H. murorum* og fra *H. vulgatum*, at den med god Grund kan opstilles som egen Art. Fra hiin adskilles den ved en alm. fleerbladet Stængel og skident guulhvid Fnok, fra denne ved talrige Rodblade og en olivenfarvet Griffel, fra begge ved den eiendommelige Bladform, budte Kurvblade og i Spidsen randhaarede Kroner. (Dette sidste Kjendetegn findes dog ikke hos de norske Expl., som forøvrigt aldeles ligne vore). I Habitus ligner den meget den sydeuropæiske *Crepis succisæfolia* Tausch. En Form af denne har været benævnt *Hierac. integrifolium* (Hopp.), men da den hører til en anden Slægt, turde dette Navn, som synes det meest passende for vor Art, overføres paa denne uden Frygt for Forvexling.

1024. *H. cæsius* [Fr. Nov. ed. I, p. 76, Symb. Hierac. p. 112] (Blaagrøn H.) H. N. XII, 19; Rchb. l. c. XIX, 1524 fig. 2.

Bladene æg-lancetformede eller elliptiske, dybt tandede, ved Grunden afsmalnede, blaagrønne, haarede eller næsten glatte, paa Underfladen svagt beklædte med stjerneformet Duun; *Rodbladene* talrige; *Stængelen* en—faabladet; *Halvskjærmens* *Grene* opret-aabne, duunhaarede, uden Kirtler; *Kurvbladene*, især de ydre, budte, graafiltede; men med faae Kirtler; *Griffelen* mørk blyfarvet eller olivenbrun; *Fnokken* skident guulhvid.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi. Bladene ofte plettede, alm. fastere end hos de 2 foreg. Arter. I Skygge tabe de undertiden den blaaagtige Farve. Kronerne gule, deres Tænder glatte. 6—7. 4. Var.

β , *nemorum* Fr. H. N. XII, 20. Bleggrøn, med tyndere Blade; Kurvbladene graafiltede med enkelte Kirtelhaar, Bladenes Filt spindelvævagtig, let affaldende.

α , paa aabne Bakker, i Kratskove, især paa Klippegrund, ikke alm.: *Bornh.* ved Hammershuus! *Moens* Klint i Selskab med var. γ af foreg., men sjeldnere end denne. *J.* i det østlige Vendsyssel alm. (12), Silkeborg Vesterskov! *Sl.* Nygaard Skov ved Haderslev (8), Louisenlund ved Egerstørde (20)! β , i Skove, hyppigere end Hovedarten og maaskee ligesaa almindelig som *H. murorum*, med hvilken den let kan forvexles.

Anm. Denne Art er, ligesom *H. murorum* og *vulgatum*, meget foranderlig i sine Former, og enkelte af disse (hvis Bestemmelse ofte forarsager Vanskelighed) nærme sig til *H. murorum*, andre til *H. pallescens* eller *saxifragum*. Formen *H. murorum* γ har jeg tidligere, i Overeensstemmelse med Prof. Fries's Bestemmelse, henført til denne.

1025. **H. vulgatum** [Fr. Nov. p. 258, Symb. p. 115] (Skov-H.) H. N. II, 8—10, XIII, 22—23; Rechb. l. c. XIX, 1526; H. *sylvaticum* Lam., Gren. & Godr. fl. Fr. II, p. 375.

Bladene lancetformede eller elliptiske, skarpt tandede, haarede, nøgne; *Rodbladene* faae; *Stængelen* fleerbladet; *Halvskjærmens Grene* opret-aabne, tilligemed *Kurv*dækket graafiltede og ofte sort-kirtelhaarede; *Kurvbladene* smale, spidse; *Griffelen* gul; *Fnokken* skident hvid.

1—3' høi. De nedre Rodblade og Stængelen ved Grunden ofte rødviolette. Kronerne gule, med glatte Tænder. $\frac{6}{2} - \frac{8}{1}$. 4. Forekommer i forskellige Afændringer i Henseende til Bladformen, Beklædningen, Stængelbladenes Antal o. s. v. De vigtigste hos os forekommende Former ere:

β, *angustifolium* Fr. Bladene smale, lancetformede, svagt haarede; Stængelbladene alm. talrigere end hos Hovedarten.

γ, *latifolium* Fr. Bladene bredt elliptiske, tilligemed Bladstilke og Stængler langhaarede; Stængelbladene faae.

δ, *ramosum* Fr. in litt. (non H. *ramosum* W. K.) Stængelen næsten fra Grunden af grenet, mangebladet, hvashaaret; Bladene lancetformede, dybt (næsten fliget-) saugtaktede, langhaarede; Halvskjærmen bladbærende.

I Skove og Krat, sjældnere paa aabne Steder, den hyppigste Art i Danmark af Afdelingen b. Formen **γ**, er temmelig hyppig, især i Skove, **β**, sjældnere; **δ**, en meget afvigende Form, som efter Beskr. af H. *ramosum* W. K., nærmer sig endeel til denne, har jeg fundet mellem Vedbæk og Tryggerød og i Frederiksdals Skov.

Anm. Som en alm. Regel for Afændringerne i denne Art angiver Fr. at den alm. paa aabne Pladser faaer smalere Blade og talrigere Stængelblade, men i Skygge er mere bred- og faabladet, medens det Modsatte er Tilfældet med H. *murorum*.

1026. **H. anfractum** [Fr. i Vet. Ac. Forhandl. 1856 p. 148] (Bugtøt H.) F. D. ined.; M. T. Lange i Naturh. Foren. vid. Medd. 1861 p. 9.

Stængelen faa (2—3)-bladet, zigzagbøiet; *Bladene* stilkede, smalt lancetformede, skarpt og ofte dobbelt saugtakket-tandede, paa Underfladen langs Midtnerven haarede, forøvrigt næsten glatte; *Halvskjærmens Grene* udspærrede, fine; *Kurvene* smaae,

Kurvbladene spidse, graadunede og mere eller mindre beklædte med sorte Haar og Kirtler; Kronens Tænder glatte, *Griffelen* grønlig-guul; *Skalfrugterne* mindre og med mere hvid Fnok end hos foreg.

Bladene alm. blaaagtig-grønne, ofte rødplettede, Rodbladene tidligt henvisnende. Kronerne gule. 7—8. 4.

I Hornbæks Plantage ved Helsingør (12)!

c. *Accipitrina* Koch. Overvintre med lukkede Knopper, som udvikle en fleerbladet Stængel; Rodbladene ikke udviklede, de nedre Stængelblade tidligt henvisnende (aphyllopoda Fr.). Kurvbladene i uafbrudte Spiraler (regelm. taglagte); Fnok som foreg.

1027. *H. tridentatum* [Fr. S. Veg. Sc. p. 6; Symb. p. 471] (Tretandet H.) H. N. III, 4; XII, 14; Rehb. l. c. XIX, 1531, fig. 1—2; *H. murorum silvaticum* F. D. 1113; *H. rigidum* β , *tridentatum* Griseb. l. c. p. 47.

Stængelen huul, stivt opret; *Bladene* paa Midten skarpt, men faatandede (omtr. 3 Tænder paa hver Side), *de nedre* elliptiske, kortstilkede, *de øvre* æg-lancetformede, Bladene fortsættes indtil Grunden af Halvskjærmen; *Grenene* oprette, tynde; *Kurvene* smaae, efter Afblostringen nedenfor Midten sammenknebne, med graafiltede, svagt haarede og sjeldent kirtelhaarede, grønne, i Randen blegere *Kurvblade* (de ydre budte, tilbagebøiede, de indre spidse, tiltrykte); *Griffelen* olivenbrun; *Fnokken* næsten hvid.

1—2' høi. Kronerne gule. 7. 4. Var.

β , *angustifolium* Fr., *H. rigidum* Rehb. l. c. tab. 1531, fig. 1. Stængelen høiere, Bladene smalere og mindre haarede.

γ , *integrifolium* Fr. in litt. Bladene linie-lancetformede, de nedre budte, næsten heelrandede, de øvre langt tilspidsede, med faae og fjerne Tænder.

I Skove, ikke alm., f. Ex. *Sj.* Ordrup, Bernstorf (27)! *J.* Viborg (Morville)! Støvringgaard! β , *Sj.* Hornbæks Plantage! *J.* Silkeborg (12); *Sl.* Egernefælde (20)! γ , i Silkeborg Vesterskov!

Ann. Fig. i Fl. dan. 1113 henføres alm. til *H. vulgatum*, mere paa Grund af de dybt tretandede Blade, Mangelen af Rodblade og især det taglagte Kurvdække maa jeg antage at den snarere er tegnet efter Expl. af *H. tridentatum*.

1028. *H. gothicum* [Fr. Symb. p. 121] (Gothisk *H.*) Fr. Epicr. p. 114; *H. N.* II, 12—14 (*H. boreale* var.); *H. tridentatum asperum* (Fr.?) Lge. Haandb. 2 Udg. p. 522; *H. vulgatum irriguum* Rehb. l. c. XIX, 1527 (ikke Fr.).

Stængelen stivt opret, ikke huul; *Bladene* lancetformede, fra Midten til henimod Grunden tandede eller fligget-saugtakkede (med 3—5 Tænder paa hver Side), de nedre kortstilkede (stundom vedblivende), *Bladene* fortsættes jævnt aftagende indtil Grunden af Halvskjærmen; *Grenene* stive, oprette; *Kurvbladene* nøgne, sortgrønne (i tørret Tilstand næsten sorte), med en Række sorte Kirtelhaar paa Ryggen, de ydre brede og budte, de indre linieformede, næsten spidse; *Griffelen* i frisk Tilstand guul, tørret brunnagtig; *Fnokken* skident guulhvid.

1—4' høi. Kronerne mørkere gule end hos foreg. og de to efterfølgende Arter. *Stængelen* ofte rødligt anløben. 7—8. 4.

Paa Bakker og i solaabne Krat, temmelig alm. udbredt paa Halvøen, ikke sjelden i *Nordsjæll.* og paa *Bornh.*

Ann. Denne Art er ikke lidet foranderlig og kan let forvexles med smalbladede Former af foreg. og efterfølg.; med *H. vulgatum* og *H. boreale* har den kun fjerne Lighed. Her i Landet er den smalbladede Form (β , *angustifolium* Fr.) den fremtrædende, hvorimod jeg ikke har bemærket den bredbladede (α , *latifolium* Fr.), medmindre de under *H. rigidum* med Tvivl anførte Voxesteder skulde tilhøre denne. Fra *H. rigidum* adskilles den ved spædere *Stængel* og mere oprette *Grene*, mindre *Kurve*, spidsere og mere tiltrykte *Kurvblade* o. s. v., fra *H. tridentatum* ved en alm. høiere, mere ru og fastere (ikke huul) *Stængel*, mindre sammenknæbne *Kurve* uden *Filt* men med *Kirtler* paa *Ryggen* af *Kurvbladene*, mørkere gule *Kroner* og hele *Plantens* mørkere Farve. Melleformer ere dog yderst vanskelige at henføre med Sikkerhed til nogen bestemt af disse 3 Arter. Til saadanne tvivlsomme Former ere maaskee at henregne *H. tridentatum asperum* og *H. rigidum subgothicum* Fr. Symb.

? 1029. *H. rigidum* [Hartm. Skand. Fl. ed. I, p. 300] (Rank *H.*) Fr. Symb. p. 173; *H. N.* IX, 3; XII, 13; F. D. 2597.

Stængelen ikke huul, stivt opret; *Bladene* lancetformede, i Midten skarpt-, men faa- (omtrent 3-) tandede, siddende, *de nedre* kortstilkede; *Bladene* fortsættes indtil Grunden af Halvskjærmen; *Grenene* udstaaende; *Kurvvene* større end hos foreg., efter Afblomstringen ved Grunden budte, med budte, tiltrykte, eensformigt grønne, ved Tørring sorte *Kurvblade*; *Griffelen* gul eller brun; *Fnokken* skident gulhvid med rustfarvet Anstrøg.

Stgl. 2—4' høi, alm. ru, ved Grunden rødlig; *Bladene* alm. mere tætsiddende end hos foreg. Kurvdækket i Begyndelsen beklædt med Duun, som hurtigt forsvinde, samt med vedblivende sorte Haar og Kirtler. Kronerne gule. 7—8. 4.

I Skove og Krat, paa Bakker, sjeldnere end foreg.: *Sjæll.* (det specielle Voxested erindrer jeg ikke, Expl. bestemte af Lector Lindeberg)! *J. Marselisborg*! (?) Skatskov ved Eveldrup (Dr. herb.), (?) Egekrat ved Karup Aa (Feddersen)? (Dens Forekomst her i Landet bør nærmere iagttages. Efter Prof. Fries's Meddelelse er det tvivlsomt om den findes i Danmark, men i Symb. Hierac. p. 174 anfører han den blandt de danske Planter (*H. rigidum subgothicum*), men denne Form er sandsynligviis nu forenet med *H. gothicum*).

1030. **H. boreale** [Fr. Nov. ed. I, p. 77; Symb. p. 190] (Bredbladet H.) H. 821; Rchb. l. c. XIX, 1541; H. N. XI, 10; XII, 12.

Stængelen opret, ikke huul, mangebladet; *Bladene* ægformede eller elliptiske, fra Grunden til Midten tandede, de nedre med smalere Basis (eller kortstilkede), de øvre siddende (paa bredbladede Former halvt omfattende), naaende til Grunden af Blomsterstanden, hvis *Grene* ere stivt oprette, samlede til en halvskjærminformet Top; *Blomsterstilkene* oventil tykkere og beklædte med skjælformede Blade; *Kurvbladene* brede, budte, tiltrykte, mørkgrønne, ved Tørring sorte, nøgne, uden Kirtelhaar og næsten glatte; *Griffelen* grønlig-gulbrun.

2—4' høi, *Stængelen* alm. ru, var. haaret eller glat. Har af alle danske Arter i denne Afdeling de bredeste Blade, men disse var. forøvrigt i Brede, Form og Indskjæring. Kronerne bleggule. 8—9. 4.

I høitliggende Skove, ikke sjelden paa Østkysten af Halvøen: paa Øerne sporadisk: *F. Æbelø*, Ulriksholm (18), Egebjerg (en meget bredbladet Form)! Thurø (12), *Loll.* temmelig alm. (19)! *Falst.* hist og her (14)! *Sj.* Springforbi! Charlottenlund! Viborggaard pr. Nestved (Visby)! Steensby Møller ved Vordingborg (19). En smalbladet Form (*β*, *angusti-*

folium Fr. H. N. XI, 10) er funden paa *Falster* ved Korselitze og Hallerup (Koch)!

Anm. Fr. bemærker, at jo færre Blade denne Plante har, desto smalere ere de, og omvendt, medens det *Motsatte* finder Sted hos *H. umbellatum*. Den ved Egebjerg i Fyen samlede Form er meget udmærket ved en næsten mandshøi Stængel, tætsiddende, brede, hjerteformede Blade, som tilligemed Stængelen ere beklædte med stjerneformet Duun. Den sildige Blomstringstid, de ved Grunden bredere Blade, blegere Kroner og især Kurvda-kket adskille tilstrækkeligt *H. boreale* fra de øvrige her i Landet forekommende Arter.

1031. *H. umbellatum* L. (Smalbladet H.) Fr. Symb. p. 177; H. 822; Drej. n. 777; F. D. 680 og 872 (*H. sabaudum*); H. N. IX, 1; Rechb. l. c. XIX, 1533.

Stængelen ikke huul, tætbladet; *Bladene* siddende, linieformede eller lancetformede, heelrandede eller svagt tandede, med tilbagebøiet Rand; *Blomsterstanden* skjærm- eller halvskjærmformet med udstaaende Grene; *Blomsterstilkene* oventil tykkere; *Kurvbladene* ensfarvet-mørkgrønne, ved Tørring sorte, tilligemed *Blomsterstilkene* beklædte med hurtigt affaldende, stjernehaaret Duun, forøvrigt glatte, *de ydre* i Spidsen udsperrede eller tilbagebøiede, *de indre* oprette; *Griffelen* guul (i tørret Tilstand grønlig-bruun).

1—3' høi. Var. i Henseende til Beklædning, Bladenes Form og Indskjæring. Af de hos Fr. nævnte Former forekomme hos os:

β, filifolium Fr., Rechb. l. c. 1534, fig. 2. Bladene meget lange, smalt linieformede, heelrandede. Planten glat.

γ, humile Schum. Fra Rodstokken udgaae talrige smale, rosettestillede Blade, og faabladede, 3—6" lange Stængler med enlige Blomsterkurve.

δ, coronopifolium (Gmel.) Fr. Bladene smale, dybt tandede eller fjerfligede.

ε, dunense Reynier (*β, villosum!* i Bot. Foren. Catal.) Bladene bredt lancetformede, tandede, tilligemed den opstigende eller fremliggende Stængel rue og stivhaarede.

Ved Gjærder, i Krat og paa udyrkede Marker meget alm. — *β*, paa Lyngheder og i Sandklitter: *J. Skagen*, Eveldrup (Drej. Herb.), Thorsted pr. Ringkjøbing! *Røme* (16); *Amrom* (Jessen); *γ*, i Sand: *Thorseng* ved Bregninge (12)! *Falst.* (14); *Røme* (Nolt); *δ, J. Flyvesandet* ved Skagen (Drej.), Brøndersløv (Grønlund); *Thorseng*

(12); *Sj.* Helsingør (27); *ε*, ved sandige Strandbredder: *J.* Skagen (Drej. herb.), Hanstholm! Hvide Bjerge ved Veile Fjord! *Samsø* (Jacobs.); *F.* Knudshoved (19); *Loll.* Bredfjed ved Rødby Fjord! *Sj.* Adserbo Overdrev ved Frederiksværk! *Bornh.* Rønne, Klaus Mølle!

10. *Hypochæris*. Kongepen.

a. Stængelen glat; Fnokken toradet med børsteformede (ikke fjerede) Straaler i den ydre Kreds.

(*Euhypochæris Duby*).

1032. *H. glabra* L. (Glat K.) H. 826; Drej. n. 780; F. D. 424; Rchb. ic. fl. germ. XIX, tab. 1398; H. N. II, 16.

Bladene alle samlede ved Grunden, bugtet-tandede eller høvlformede; *Kurvbladene* glatte, ligesaa lange som Blomsterne; *Randblomsternes Skalfrugter* uden eller med meget kort Næb.

Stænglerne alm. flere, $\frac{1}{3}$ —1' lange, oprette eller nedliggende, grenede; *Bladene* glatte eller beklædte med faae, spredte Haar. Kronerne gule. 7—8. ☉.

Paa tørre, sandige Bakker: hist og her i det *nordligste Jyll.* (Dr), *Nordsjæll.* og især alm. paa *Bornh.*! I de sydlige Egne af Halvøen, *Fyen* og *Sydsjæll.* sjeldnere; *Loll.* Bregneholt (19); paa *Falst.* ikke bemærket.

1033. *H. radicata* L. (Almindelig K.) H. 826; Drej. n. 779; F. D. 150; Rchb. l. c. XIX, tab. 1397; H. N. XIV, 10.

Bladene samlede ved Grunden, bugtet-tandede eller høvlformet-halvfinnede, rue; *Kurvbladene* glatte, i Spidsen paa Rygnerven stivhaarede; *Blomsterne* længere end Kurvdækket; *alle Skalfrugterne* med Næb.

1—2' høi. En- eller fleerstænglet, Stænglerne alm. grenede. Kurvene flere Gange større end hos foreg. Kronerne gule, udvendig grønlig-brune. 7—8. ♀.

Ved Veigrøfter, paa Græsmarker o. s. v. meget alm.

b. Stængelen stivhaaret-ru, Fnokken enradet, alle Straalerne fjerede. *Achyrophorus* Scop.).

1034. *H. maculata* L. (Plettet K.) H. 825; Drej. n. 778; F. D. 149; Rchb. l. c. XIX, tab. 1396; *Achyrophorus maculatus* Scop.

Stængelen udeelt eller faagrenet; *Bladene* tandede, rue; *Kurvbladene* stivhaarede, ovenfor Midten filtet-randhaarede, kortere end Blomsterne; alle *Skalfrugterne* med Næb.

1—2' høi, alm. enstænglet; *Stængelen* ofte 1—2-bladet; *Bladene* alm. uregelmæssigt bruunplettede, Blomsterkurvene færre (1—3), men større end hos foreg. Kronerne gule. 6—7. 4. Var.

β, *Mülleri* Lge. (*Leontodon hirtum* F. D. 901). *Bladene* halvfinnede, med lancetformede, budte Flige. *Stængelen* fra Grunden af grenet, Grenene opstigende, beklædte med talrige, linieformet-skjælformede Blade; Kurvene mindre (Maaskee en egen Art).

Paa Skov- og Lyngbakker, forekommer i alle danske Provindser, men sporadisk og i enkelte Egne sjelden (i det sydlige Fyen kun bemærket paa Svanninge Bakker (15). β, *Sj.* Drosselhjerg paa Skrænter mod Storebælt (Lund)! *Lolland* (O. F. Müller).

11. *Tragopogon. Gedeskjæg.*

† 1035. *T. porrifolius* L. (Porrebladet G.) H. 806; F. D. 797; Rehb. ic. fl. germ. XIX, tab. 1387; H. N. X, 3.

Bladene fra en bred, omfattende Basis efterhaanden linieformigt afsmalnede, stivt oprette; *Grenene* kølleformigt opsvulmede under Blomsterkurvene; *Kurvbladene* 8, længere end de ydre Kroner; *Skalfrugterne* af Randblomsterne skjælformigt piggede.

Kronerne violette. 6—7. ☉.

Ved Gårder og paa Marker, især omkring Byer, sporadisk og temmelig sjelden: *J.* Aalborg (Strandg.), Kolding (28!); *Sl.* Husum (16); *F.* Hvidkilde (12), Svendborg (19); *Sj.* Rude, Haarsløv, Tjæreby (Nielsen) og Ørsløv ved Skjelskør! Holsteinborg (22); *Loll.* Vintersborg, Engestofte, Saxkjøbing (19), Nakskov (F. D.); *Falst.* Stubbe-kjøbing (Rasm.), Maglebrænde (14), Veggerløse (Koch), Nykjøbing, Moseby (H.); *Bornh.* Kanegaard ved Rønne (21), Rønne Vang (Hjorth). Er maaskee ikke oprindelig indenlandsk, men forvildet fra Dyrkning i tidligere Tid. *

≍ *T. pratensi-porrifolius* [Rostr. mscr.]. De ydre Kroner i Kurvene bruunviolette, de indre gule.

Formodenlig en Bastardform af foregaaende og efterfølgende og funden i Selskab med disse: *F.* Hvidkilde (12); *Loll.* Vesterborg (19).

1036. **T. pratensis** L. (Eng-G.) H. 805; Drej. n. 789; Fr. nov. p. 240; F. D. 906; Rehb. l. c. XIX, 1389, fig. 1.

Bladene fra en bred, omfattende Basis jævnt linieformigt afsmalnede, oprette eller i Spidsen nedbøiede; *Grenene* under Blomsterkurvene lidet opsvulmede; *Kurvbladene* 8, omtrent af Længde med de ydre Kroner; Randblomsternes *Skalfrugter* knudret-rue, ligelange med Næbet.

Blomsterne kun aabne om Formiddagen. Kronerne gule. 6—7. ☉.

♂, *tortilis* Mey. chl. Hanov., Rehb. l. c. fig. 2. *Bladene* snoede, i Randen bølget-krusede.

Ved Veie, paa Marker og høie Enge, alm. udbredt. — ♂, med Hovedarten.

1037. **T. minor** [Fr. Nov. p. 241] (Smaablomstret G.) H. N. XV, 6; Rehb. l. c. XIX, tab. 1390, fig. 2.

Bladene fra en bred, omfattende Basis pludseligt linieformede, meget smalt og langt tilspidsede, slapt nedhængende; *Kurvbladene* omtrent dobbelt saa lange som de ydre Kroner; *Skalfrugtens* *Næb* kortere end selve Frugten; forøvrigt som foreg., men alm. lavere af Væxt.

6—7. ☉.

Paa lignende Steder som foreg. og, idetmindste i *Sjæll.*, ikke sjelden.

Anm. Denne Art har ved Dyrkning i vor botaniske Have bevaret et fra den foreg. Art forskjelligt Udseende, men Characteren som hentes fra Kronernes og Kurvbladenes indbyrdes Længdeforhold, maa benyttes med Varsomhed, da Kronernes Længde hos *T. pratensis* er meget forskjellig, snart længere (*grandiflorus* Fr.), snart betydeligt kortere end Kurven (*brachyglossus* Fr.).

12. Scorzonera. Skorzonere.

1038. **S. humilis** L. (Lav S.) H. 806; Drej. n. 788; Rehb. ic. fl. germ. XIX, tab. 1383; H. N. VII, 3; L. Herb. III, 59.

Rodstokken foroven skjældækt, med talrige, stilkede, heelrandede *Blade*; *Skaftet* 1—3-blomstret, med 1—3 smalt linieformede *Blade*; *Kurvbladene* $\frac{1}{2}$ Gang kortere end Kronen; *Skalfrugterne* stribede, med jævne *Striber*.

Skaft og Bladstilke beklædte med en løs Uld, som let afgnides. Kronerne gule. 5—6. 4. Forekommer under 2 Former:

α , *latifolia* (F. D. 816, slet). Bladene elliptiske eller bredt lancetformede.

β , *angustifolia* (F. D. 1653). Bladene linieformede eller lancet-linieformede.

Begge Formerne, mellem hvilke ingen skarp Grændse kan drages, forekomme hist og her i alle Provindser, almindeligst paa *Halvøen* og *Bornholm*: α , paa høie Enge og aabne Steder i Skove; β , paa tørre Steder, f. Ex. Lyngbakker. 1*

† *S. hispanica* L. (Spansk S.) Rchb. l. c. XIX, tab. 1384. *Stængelen* fleerbladet; *Bladene* elliptiske eller lancetformede, tilspidsede, *de ydre Kurvblade* triangel-ægformede; *Skalfrugterne* piggede, forøvrigt som foreg.

Kronerne gule, vellugtende (som Vanille). 5—7. ☉.

Dyrkes i Haver paa Grund af den spiselige Rod, og forekommer tilfældigt forvildet, f. Ex. *Sj. Tømmerup* paa Amager (19), Engen mellem Peblingesøen og Farimagsvæien! *J. Viborg* (Feddersen).

13. *Thrincia*. *Hundesalat*.

1039. *T. hirta* [Roth. Cat. bot. 1, p. 98] (Haaret H.) H. N. XIII, 32; *Apargia* Sm., H. 814; F. D. 1827; Rchb. ic. fl. germ. XIX, tab. 1365.

Bladene rosetteformigt samlede ved Grunden, linie-lancetformede, tandede eller høvlformede, mere eller mindre haarede af i Spidsen alm. tokløvede Haar; *Skafterne* flere, bladløse, enblomstrede; *Blomsterkurven* før Udspringningen nikkende.

Kurvbladene var. haarede eller glatte; *Bladene* var. i Henseende til Indskjæring og Beklædning. Kronerne gule, paa Underfladen graaagtigt-røde. 7—9. 4.

Paa tørre Græsmarker og Bakker, sjældn: *J. Haraldslund*! *Fjeldsted Bakker* (H.); *F. Ulriksholm* (H.); *Loll. Aalholm*! *Sj. Vesterfælle* (19). 2)

Anm. *Leontodon hirtus* L., som alm. citeres til denne Art, beskrives med udeelte Haar og Kronerne gule paa Underfladen, hvorfor den neppe kan høre herhid. Koch antager *Leont. Villarsii* Lois. for den linneiske *L. hirtus*.

14. Leontodon. Løvetand.

1040. **L. hispidus** L. (Stivhaaret L.) F. D. 862; Rehb. ic. XIX, tab. 1368—69; H. N. VII, 4; Apargia Host, H. 813; Drej. n. 765; L. hastilis Koch Syn. II, 481.

Stængelen furet, bladløs, i Spidsen udvidet, før Blomstringen nikkende, alm. udeelt; *Bladene* tandede eller høvlformet-halv-finnede, tilligemed Skaft og Kurvdække mere eller mindre stivhaarede af 1—3-kløvede Haar; *Fnokkens Straaler* i 2 Kredse, den indre fjeret, den ydre kortere, ru.

Bladene var. i Indskjæring og Behaaring. Den glatte Form (*L. hastilis* L.) er saavidt mig bekjendt, ikke funden hos os. Ligner foreg., men er i alle Dele større. Kronerne gule. 6—9. 4.

Paa høie Enge, ved Randen af Veie o. a. udyrkede Steder almindeligt.

1041. **L. autumnalis** L. (Høst-L.) Rehb. l. c. XIX, tab. 1366, fig. 2—3; Apargia Willd., H. 815; Drej. n. 764; F. D. 1996; Oporina Don.

Stængelen grenet (sjældnere udeelt), *Grenene* oprette, i Spidsen udvidede og beklædte med skjælformede Blade; *Rodbladene* glatte eller svagthaarede af ugreneede Haar; *Fnokkens Straaler* alle fjerformede.

Kronerne gule. 7—10. 4. Var. betydeligt i Henseende til Bladenes Indskjæring, Kurvdækkets Beklædning o. s. v. Blandt de mange Former udhæves:

β, *salinus* Aspeg. (*integrifolius* Bot. For. Cat.!) Bladene heelrandede eller med faae og utydelige Tænder; Kurvbladene glatte.

γ, *coronopifolius* (Bot. For. Cat.!) Bladene enkelt eller dobbelt fjersnitdeelte med smalt linieformede Afsnit; Kurvdækket beklædt med løs, hvidagtig Duun.

δ, *nigro-lanatus* Fr. (Apargia Taraxaci Sm., H. 815; F. D. 1523; Hieracium Taraxaci L., Leontodon Lois. Rehb. l. c. fig. 1). Stængelen alm. udeelt, Blomsterkurven større, med sorthaarede Kurvblade.

Meget alm. paa Enge, Græsmarker, ved Veie o. s. v., spiller især en betydelig Rolle paa vore Syltenger, paa hvilke Formen **β**, lige-

ledes forekommer (f. Ex. ved Lillestrand i *Jyll.*). γ , paa tørre Marker og Overdrev ikke sjelden; δ , paa Øerne i Vesterhavet: *Fanø*, *Syllt*, *Rømø* (N.); *Bornh.* (H.), Christiansø (Didrichsen).

15. *Pieris*. Bittermælk.

1042. *P. hieracioides* L. (Rubladet B.) H. 807; Drej. n. 766; F. D. 1522; Rchb. ic. fl. germ. XIX, tab. 1375; H. N. 1, 8.

Stængelen opret, bladet, i Spidsen halvskjærmformigt grenet; *Bladene* elliptisk-lancetformede, bugtet-tandede; *Stængelbladene* halvt-omfattende; *Kurvbladene* i de ydre Kredse udstaaende eller tilbagebøjede.

Stængelen $1\frac{1}{2}$ —3' høj, tilligemed Bladene stivhaaret-ru, Kronerne gule. 7—8. ☉.

Ved Randen af Veie, i Kratskove, bemærket i alle Provindser, (undt. Bornh.), ikke sjelden, men sporadisk. ☼

16. *Lappa*. Burre.

a. *Kurvbladene* indvævede i en spindelvævagtig Filt.

aa. *Blomsterstanden* halvskjærmformet (*Grenene* forlængede).

1043. *L. tomentosa* [Arctium toment. Schk. Handb. 3, p. 49] (Filtet B.) Drej. n. 794; Rchb. ic. fl. germ. XV, tab. 811, fig. 2.; A. Bardana Willd., H. 829; A. *Lappa* β , L., F. D. 642 og 2423 B.

Bladene budte, heelrandede eller svagt tandede, de nedre hjerteformede; *Blomsterkurvene* før Udspringningen ægformet-pyramideformede, efter samme kugleformede, tæt hvidfildede; *de ydre Kurvblade* udstaaende, fra en bredere, grøn Basis sylformede, i Spidsen hagekrummede, gulbrune, *de indre* oprette, linieformede, i Spidsen mørkrøde, budte eller krusede (ikke hagekrummede).

2—4' høj. Kronerne mørk-rosenrøde, Støvdragerne blaae. 7—8. ☉.

β , *denudata*! (*L. tomentosa* var. F. D. 2423 A). *Kurvbladene* uden Filt.

Ved Veie og omkring Byer: i *Sjæll.* meget alm. (den hyppigste Art); hist og her paa *Bornh.*, *Loll.-Falster* og *Als*! alm. paa Hindsholm! meget sjelden i de øvrige Egne af *Fyen* (Vibeltsdal ved Svendborg! Tvede (12) og paa *Halvøen*: hist og her mellem Aalborg (Dr.) og Nibe (12), Randers (7), ved det nye Veianlæg S. for Horsens,

Veile, Flensborg, Hyrup, Huusby (12), Husum! β , Sj. Snekkesteen (Grønlund), Kjøbenhavns Volde! Ørslev og Bjerre ved Skjelskør (Nielsen)! !*

bb. Blomsterstanden klaseformigt forlænget (Grenene korte).

1044. **L. minor** [Arctium minus Schk. l. c.] (Liden B.) Drej. n. 793; F. D. 2662; Rchb. l. c. XV, tab. 811, fig. 1; H. N. XIII, 6; A. Lappa L. (tildeels) H. 829 (var. minus).

Bladene grovt tandede, spidse eller budte, de nedre hjerteformede; *Blomsterkurvene* før Udspringningen ægformede, efter samme nedtrykt-kugleformede, tyndt filtede; *alle Kurvbladene* sylformede, hagekrummede, *de ydre* udstaaende, grønne, i Spidsen skidengule, *de indre* oprette, lidet bredere, heelt grønne.

Hele Planten graagrøn, lavere ($1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ ') og mere sammentrængt end de øvrige Arter; Kurvene neppe mere end halvt saa store som hos følgende. Kronerne blegrøde; Støvdragerne lila. 7—8. ☉.

Ved Veie og Gjærder, især omkring Byer, meget alm., især i Landets magrere Egne, hvor den ofte er den eneste forekommende Art.

1045. **L. intermedia** [Arct. intermed. Lge. mscr. (1843), Haandb. 1 Udg. n. 1000] (Skov-B.) F. D. 2663; Rchb. l. c. XV, tab. 812, fig. 1; A. Lappa β , majuscula Hartm. Skand. fl. ed. 4 p. 260 (?); Lappa minor* campestris Fr. S. Veg. Sc. p. 5.

Bladene spidse, fjernt og svagt tandede, *de nedre* hjerteformede; *Blomsterkurvene* store, tyndt filtede, før Udspringningen rundagtige, efter samme ægformede; *alle Kurvbladene* hagekrummede, *de ydre* nedbøiede, sylformede, grønne, i Spidsen skidengule, *de mellemste* udspærret aabne, *de indre* oprette, lancetformede, i Spidsen mørkrøde; *Skalfrugterne* mere end dobbelt saa store som hos foreg.

Hele Planten mørkgrøn, Stængelen ofte rødlig. Høiere end de øvrige Arter (3—5'), men tillige af slankere Væxt. Kronerne rosenrøde, Støvdragerne blaae. Var. med hvide Kroner og alle Kurvbladene grønne med skidengule Spidser. 7—9. ☉.

Paa skyggefulde Steder saavel i Skove og Krat som ved levende Hegn, ikke sjelden i Danmarks Skovegne (Østkysten af Halvøen og paa Øerne).

Anm. Denne Art, som jeg i flere Aar har iagttaget og adskilt, er nærmest beslægtet med foreg., og Mange ville kun ansee den for en

Skovform af denne. Da den imidlertid afviger ikke lidet, saavel ved flere Characterer som især ved et forskjelligt Habitus, og da denne Forskjellighed har vedligeholdt sig ved gjentagne Udsædsforsøg i den herværende bot. Have, har jeg ingen Tvivl om dens Ret til at opstilles som en egen Art. (Om Schkuhr har kjendt og indbefattet denne under sin *A. minus*, har jeg ikke kunnet udfinde, men at han fortrinsviis skulde have tænkt paa den, anseer jeg ikke for rimeligt paa Grund af dens stedse høie Væxt).

b. Kurvbladene glatte (uden Filt).

1046. **L. major** [Schk. l. c. (*Arctium*)] (Glat B.) Drej. n. 792; F. D. 2424; *Arctium* Lappa L. (tildeels), H. 828; *Lappa officinalis* All., Rechb. l. c. XV, tab. 812, fig. 2.

Bladene hjerteformede, spidse eller budte, paa Overfladen grønne, paa Underfladen svagt filtede; *Blomsterstanden* halvskjærmformet; *Blomsterkurvene* i yngre Tilstand kugleformede, tilsidst noget nedtrykte; *alle Kurvbladene* linieformede, grønne, i Spidsen gulbrune, hagekrummede, *de ydre* tilbagebøiede, *de mellemste og indre* oprette.

3—4' høi og kraftig af Væxt. Kronerne violetrøde, Støvdragerne blaae. 7—9. ☉.

β, *subtomentosa* Lge. *Bladene* paa Underfladen tæt hvidfiltede, *Blomsterkurvene* uden eller med meget svag Filt, *Kurvbladene* violetbrune. (Kunde muligviis antages for en Bastardform af *L. major* og *L. tomentosa*, dersom den ikke forekom paa Steder hvor sidstnævnte aldeles ikke findes).

Ved Veigrøfter, omkring Byer: alm. i Landets frugtbare Egne (den hyppigste Art i *Fyen* og paa *Østkysten af Halvøen*), men bliver sjældnere eller forsvinder aldeles paa den magrere Jordbund (mangler f. Ex. aldeles ved Helsingør (21) og i Jyllands Hedeegne!). *β*, hist og her med Hovedarten, men sjældnere: f. Ex. *Sj. Esrom*! *F. Svendborg*, *St. Jørgensgaard*!

17. *Serratula*. Skjær.

1047. **S. tinctoria** L. (Engeskjær). H. 830; Drej. n. 791; F. D. 281; Rechb. l. c. XV, tab. 802.

Stængelen opret, i Spidsen halvskjærmformigt grenet; *Bladene* lancetformede eller elliptiske, tilspidsede, skarpt sang-

takkede, varierende i Indskjæring mellem hele og lyreformet-fjersnitdeelte, med i Dybde tiltagende Indsnit mod Bladets Basis.

Bladene ofte lidet rue paa Underfladen; Planten forøvrigt glat; Kurvbladene i Spidsen brune, Kronerne mørkrøde, sjeldent hvide (14). 7—8. ☿.

Paa høie Enge, sjeldnere i Kratskove: meget alm. paa *Bornh.*! ikke sjelden paa *Loll.*! paa *Falst.* og i *Sj.* hist og her (ikke alm.); længere mod V. sjelden: *Thorseng* ved Stioul (9), *F.* Vesteraaby! Lunde pr. Odense (18); *J.* Aarhus (H.); *Sl.* Ellenberg ved Slien (Lund). ☿

18. Onopordon. Æselsfoder.

1048. **O. Acanthium** L. (Tornvinget Æ.) H. 837; Drej. n. 795; F. D. 909; Rehb. l. c. XV, tab. 813.

Stængelen opret, bredvinget af de nedløbende Blade; *Bladene* elliptiske, tandede eller bugtet-lappede, Nerverne i Blade og Vinger ende i Torne; *Kurvbladene* filtede, lancet-sylformede, de ydre udspilede.

3—5' høi. Hele Planten tæt beklædt af en hvidgraa, spindelvæv-agtig Filt. Kurvene store. Kronerne rosenrøde. 7—8. ☹.

Paa Diger og udyrkede Pladser omkring Byer, især Kjøbstæder, funden hist og her i alle Provindser, men ikke alm.

19. Carduus. Tidsel.

a. Blomsterkurvene aflang-valseformede.

1049. **C. tenuiflorus** [Curt. Fl. Lond. f. 6, t. 55] (Tynd-blomstret T.) H. 833; F. D. 2058; Rehb. ic. fl. germ. XV, tab. 865.

Stængelen tornet-vinget; *Stængelbladene* nedløbende, bugtet-lappede, med tornet-tandede Lapper; Kurvene 2—flere sammenhobede i Spidsen af Stængelen og Grenene, mindre og smalere end hos de følgende Arter.

2—3' høi. Bladene paa Underfladen graafiltede; Kurvbladene bleggrønne og næsten glatte. Kronerne lysrød-violette. 7—8. ☹ (?)

Sjelden og hidtil kun funden paa Digerne i Sydslesvigs Marskegne: Husum (N.), Rødemishof, Papenburg, Steenslusen ved Süderstapel (16), Eidersted (F. Müll.). ☿

b. Blomsterkurvene ægformede eller rundagtige.

aa. Kurvbladene ikke indsnørede.

1050. **C. crispus** L. (Kruset T.) H. 833; Drej. n. 802; F. D. 621; Rechb. l. c. XV, tab. 880, fig. 1; H. N. XI, 4 (var.).

Stængelen opret, tornet-vinget; *Bladene* paa Overfladen grønne, næsten glatte, paa Underfladen hvidfildede, bugtet-tandede, lappede eller halvfinnede, i Bugterne randhaaret-tornede; *Tænderne* ende i en stærkere Torn; *Kurvne* rundagtige, enlige eller sammenhobede paa korte, tornet-vingede eller i Spidsen nøgne Blomsterstilke; *Skalfrugterne* under Lupen riflede paatværs og utydeligt stribede paalangs.

Bladene meget foranderlige i Henseende til Indskjæringen. Kronerne mørk- eller violet-røde. 6—9. ☉. Var.

β , *ochroleucus*! Kronerne hvidgule.

Ved Gjærder, omkring Byer, alm. udbredt, undtagen paa *Bornholm*, hvor den er sjelden: Rønne Vang (Hjorth). β , *Sj.* Lygteveien udenfor Kjøbenhavn! *Sl.* Haderslev (Grønlund)!

Anm. *C. crispus* β , *polyanthemus* Godr. (*C. multiflorus* Gaud., Koch Syn. II, 459), Rechb. XV, 880, fig. 2, med halvfinnede, paa Underfladen uldhaarede eller spindelvævfildede Blade, ægformede, 3—5 tæt sammenhobede Kurve, Skalfrugterne fint stribede paalangs og utydeligt riflede paatværs, vil muligviis ogsaa findes i vor Flora. Den danner ligesom et forbindende Led mellem foreg. og følg. og forekommer mig at have noget Udseende af en Bastardform.

1051. **C. acanthoides** L. (Tornstænglet T.) H. 832; Drej. n. 803; Rechb. l. c. XV, tab. 873; H. N. XI, 3.

Stængelen tæt tornet-vinget; *Bladene* graaagtige, næsten glatte eller paa Underfladens Nerver haarede, dybt halvfinnede eller fjersnitdeelte med tredeelte eller bugtet-lappede Afsnit; *Lapperne* ende i en lang og stærk Torn; *Kurvne* rundagtige, enlige eller sammenhobede paa korte, tornet-vingede Blomsterstilke; *Skalfrugterne* under Lupen tydeligt riflede paatværs.

Kurvbladene alm. i Spidsen tilbageboiede, sjældnere rette. Let kjendelig fra foreg. ved den forskjellige Beklædning og de talrigere, meget stærkere, straagule Torne. Kronerne smukt purpurrøde, men ogsaa af denne forekommer en Form med hvidgule Kroner (β , *ochroleucus*!). 7—9. ☉.

Ved Veie og omkring Byer: paa *Bornh.* og i de fleste Egne af *Sjæll.* meget alm., paa *Samø* (Jacobs.); *F.* hyppig paa Hindsholm! I det øvrige *Fyen*, paa *Loll.-Falst.* og de mindre Øer ikke bemærket; paa *Halvøen* er den mig kun bekjendt at være funden ved Haderslev (16). β , *Sj.* Værebros Møller (14); *Bornh.* (Hoff)! En Form med talrigere og længere, næsten guldgule Torne (γ , *horridus*!) er funden ved Gjærder i Ramløse i Nordsjæll. (Schütz)!

\simeq *C. crispo-acanthoides*! Bladene paa Underfladen hvidfildede; Tornene svagere, Kronerne violetrøde, forøvrigt som foreg. og uden Tvivl en Bastardform mellem denne og *C. crispus*.

Mellem Hovedarterne ved Brøndshøj og Strandveien nærved Kalkbrænderiet!

bb. De mellemste Kurvblade nedenfor Midten indsnørede, tilligemed de ydre tilbagebøjet-udstaaende.

1052. *C. nutans* L. (Nikkende T.) H. 832; F. D. 675; *Rehb.* ic. fl. germ. XV, tab. 877; H. N. VII, 5.

Stængelen tornet-vinget; *Bladene* dybt halvfinnede, graagrønne, paa Overfladen haarede eller næsten glatte, paa Underfladen langs Nerverne uldhaarede; *Blomsterkurvene* enlige, paa forlængede, uvingede, i Spidsen nikkende *Blomsterstilke*; *Kurvbladene* ved Grunden ægformede, ovenfor Indsnøringen tornspidset-sylformede; *Skalfrugterne* tydeligt stribede paalangs, svagt riflede paatværs.

Væksten lavere, Blomsterkurvene mere end dobbelt saa store som hos foreg. Kronerne mørkt purpurrøde. 7—8. ☹.

Ved Veigrøfter og Randen af Marker, meget sjelden i Danmark: *Falst.* S. Kirkeby (Koch); *F.* Dalby paa Hindsholm! mellem Peirup og Holstenshuus! Skaarup (19); *Strynø* (Glahn); *Sl.* Høirup 1 Miil V. for Christiansfeld (12), mellem Hestehjerget og Nyværk ved Slesvig (16); *J.* Thisted (Jacobsen)!

\simeq *C. crispo-nutans* Koch (Sond. Fl. Hamburg. p. 237). *C. acanthoides* Gren. & Godr. fl. Fr. II, p. 231 (ikke L.).

Forskjellig fra *C. nutans* ved højere og mere grenet Stængel, 1—3-blomstrede, indtil Spidsen tornet-vingede Blomsterstilke, mindre Kurve og smalere Kurvblade; fra *C. crispus* ved fjersnitdeelte, paa begge Flader grønne Blade, som i Randen tilligemed Stængelens Vinger ere stærkere tornede;

meget større, noget nikkende Blomsterkurve, nedenfor Midten indsnørede, i Spidsen stikkende Kurvblade.

I Selskab med Hovedarterne ved Skaarup (19) og Dalby paa Hindsholm!

20. *Cirsium*. Bladhoved.

a. Stængelen tornet-vinget af nedløbende Blade. ☉.

1053. *C. lanceolatum* [Scop. Fl. carn. 2, p. 130] (Lancetbladet B.) Drej. n. 797; Nägeli i Koch Syn. p. 989; Rchb. ic. fl. germ. XV, tab. 826; Carduus L., H. 831; F. D. 1173.

Bladene dybt halvfinnede; *Fligene* dybt todeelte, med lancetformede Smaaflige og fremstaaende, i en stærk og spids Torn endende Nerver, paa Overfladen tiltrykt-stivhaaret-rue, paa Underfladen hvidfiltede; *Blomsterkurvene* enlige eller 2—3 samlede, rundagtigt-ægformede, tæt filtede; *Kurvbladene* udstaaende, lancetformede, endende i en lang og spids Torn.

2—4' høi, med store Kurve. Kronerne rosenrøde, sjældnere hvide. 7—8. Var. i Henseende til Bladenes Indskjæring, Kurvenes Form og Antal paa Grenene o. s. v. Følgende afvigende Former (som af Rchb. ansees for adskilte Arter) høre uden Tvivl herhid:

* *nemorale* Nägeli l. c. p. 990 (*C. nemorale* Rchb. fl. germ. exc. p. 286; ic. fl. germ. XV, tab. 826). *Bladene* mindre dybt deelte, paa Underfladen spindelvævfiltede; *Kurvene* næsten kugleformede.

** *Drejeri* (*C. Drejeri* Rchb. ic. fl. germ. XV, tab. 827). Stængelens Vinger bredere; *Bladene* kortere og mindre dybt deelte, paa Overfladen kort-stivhaarede, paa Underfladen graa-filtede; *Kurvene* nedtrykt-kugleformede, de indre Kurvblade forlængede.

Ved Gjærder og paa udyrkede Steder meget alm. i hele Landet. — * *Moen* (Fries); *Slesvig* (Rchb.). ** *Moens* Klint! Hjermelev og Thise i Vendsyssel, Korsøgaard ved Hobro (Drej.).

⌞ *C. oleracco-lanceolatum* [J. Vahl mscr.].

Stængelen kantet-furet, overalt klæbrig-duunhaaret; *Bladene* halvt nedløbende, fjersnitdeelte med 2—3-fligede Afsnit; *Fligene* lancetformede, svagt tornspidsede, paa Overfladen næsten

glatte, paa Underfladen svagt graafiltede; *Blomsterkurvene* i en mangegrenet Halvskjærm, paa forlængede, duunhaarede Blomsterstilke; *Kurvbladene* næsten glatte, svagt tornspidsede; *Kronbladene* skident røde.

Ved Kongekilden i Ordrups Krat med Hovedarterne (27)!

1054. *C. palustre* [Scop. l. c. p. 128] (Kjær-B.) Drej. n. 796; Näg. l. c. p. 990; Rechb. l. c. XV, tab. 831; Carduus L., H. 833; Carduus acanthoides F. D. 1341.

Bladene fjersnitdeelte eller halvfinnede, med lancetformede, 2—3-fligede, tornet-tandede *Afsnit*, paa Overfladen spredthaarede, paa Underfladen graafiltede; *Blomsterkurvene* sammenhobede i Spidsen af Stængelen og de øvre Grene, svagt filtede, efter Udspringningen ægformede; *Kurvbladene* æg-lancetformede, tiltrykte, med en kort, udstaaende Braad.

Stængelen 3—5' høi, alm. brunnagtig. Kronerne rødviolette, sjeldnere hvide. 7—8.

β , *putatum* Nägeli l. c. (*C. Chailleti* Gaud.). *Bladene* halvt nedløbende, paa begge Flader næsten ensfarvede; *Kurvene* enlige, paa uvingede, forlængede Blomsterstilke.

I Tørvmoser, Kjær og fugtige Enge alm. udbredt. — β , som har et meget afvigende Udseende, men kun er en ved Hovedstængelens Afhugning frembragt Form, har jeg fundet ved Leersøen udenfor Kbhvn.

b. *Bladene ikke nedløbende.* 4.

aa. *Kronens Krave spaltet til Midten.*

⌞ *C. palustri-oleraceum* [Näg. l. c. p. 999]. Rechb. l. c. XV, tab. 846.

Stængelen kantet-furet; *Bladene* omfattende, dybt halvfinnede med lancetformede, 2—3-lappede, tornet-tandede *Flige*, paa Underfladen lidet filtede; *Blomsterkurvene* flere samlede i Spidsen af Stængelen og de øvre Bladhjørner, kortstilkede, med smaae, lancetformede, tornet-saugtakkede *Dækblade*; *Kurvbladene* lancetformede, ved en mod Spidsen fremstaaende Nerve paa Ryggen tornspidsede.

Kronerne hvidgule, Støvdragerne i Spidsen og Griflerne lila-røde. (Ligner i Bladformen og de smaae Blomsterkurve *C. palustre*, ved Stængelen og de ikke nedløbende Blade samt Blomsternes Farve *C. oleraceum*. 7—8.

Paa Mosegrund med Hovedarterne, sjelden: *Sj. Tryggerød* Mose ved Vedbæk (et Expl.)! Raavaddam, Bidstrupgaard (19). En Form med halvt nedløbende Blade funden ved Tønder (Branth).

1055. **C. oleraceum** [Scop. l. c. p. 124] (Grøn B.) Drej. n. 798; Nägeli l. c. p. 995; Rchb. l. c. XV, tab. 834; Cnicus L., F. D. 860; Carduus Vill., H. 837.

Stængelen trind, furet, bladet indtil Spidsen og oventil grenet; *Bladene* lysgrønne, glatte eller svagt haarede, med omfattende Basis, de nedre halvfinnede eller fjersnitdeelte med hele, lancetformede, tornet-saugtakkede *Flige*, de øvre hjerteformede, tornet-saugtakkede eller fligede; *Blomsterkurvene* tæt omgivne af flere ægformet-elliptiske, lysgulgrønne *Dækblade*; *Kurvbladene* jævnt sylformet-tornspidsede; *Kronens Krave* lidet længere end Røret.

3—5' høi. Kronerne bleggule; Støvdragerne skident violette. Ved den svage Behaaring, lysgrønne Farve og de forskjelligfarvede Dækblade let kjendelig fra de øvrige Arter. 7—8.

Paa Enge og i fugtige Skove: i de fleste Egne alm., men ikke overalt: (sjelden paa *Falster* (Moseby (5), Liselund, Korselitze, Ravnsø (Koch), Næsgaard, Bregninge, Bellinge (14)) og *Loll.* (Egholm, Hunseby (5); ikke bemærket i V. Hanherred (12) eller paa *Bornholm!* [*

⌞ *C. oleraceo-acaule* [Hampe i Linnæa 1837 p. 1] Näg. l. c. p. 1010; *C. acauli-oleraceum* Rchb. l. c. XV, tab. 858; *C. decoloratum* Koch Syn. I, p. 398; *Carduus rigens* La Chen., H. II, 243.

Stængelen grenet; *Bladene* paa Overfladen svagt, paa Underfladens Nerver tæt duunhaarede; *Stængelbladene* lancetformede, siddende (ikke omfattende), halvfinnede, med trelappede *Flige*, Lapperne ægformede, tornet-tandede; *Blomsterkurvene* enlige, omgivne af 2—3 lancetformede, med de øvre Blade ensfarvede *Dækblade*; *Kurvbladene* lancetformede, jævnt, men kort tornspidsede; *Kronens Krave* som højs foreg.

1—1½' høi. Kronerne bleggule eller svagt rødlig-gule. Ligner foreg. i Henseende til Blomsterkurvene og den forlængede, gredede Stængel, følg. i Bladene og Dækbladene. 7—8.

Forekommer med Hovedarterne, men sjelden, og sædvanligviis kun faae Expl.: *Sj.* Hesttangs Mølle, Jonstrup Vang (14), Græsvænget ved Skjelskør (Nielsen)! *J.* en Grøft ved Veien mellem Kolding og Seest! *Sl.* en Skoveng ved Aabenraa (Bargum).

1056. *C. acaule* [All. Fl. ped. I, p. 153] (Kortstænglet B.) Drej. n. 800; Näg. l. c. p. 993; Rehb. l. c. XV, tab. 840; Carduus L., H. 836; F. D. 1114.

Den overjordiske Stængel udeelt, sædvanlig meget kort eller 0; *Bladene* kortstilkede (ikke omfattende), paa Underfladens Nerver duunhaarede, lancetformede, halvfinnede eller fjersnitteelte, med ægformede, 3—4-lappede, tornet-tandede *Flige*; *Blomsterkurven* omgivet af 1—3 lancetformede, med de øvrige Blade ensfarvede *Dækblade*; *Kurvbladene* æg-lancetformede, budte, pludseligt og kort tornspidsede; *Kronens Rør* længere end Kraven.

Kronerne smukt og mørkt rosenrøde, sjældent hvide. 7—8. Var.

β, *caulescens* F. D. 1884. Stængelen forlænget (indtil 1' høi), fra Grunden til Spidsen bladet.

Paa høie Enge, græsklædte Bakker og Overdrev, ikke sjelden. *β*, med Hovedarten, men sjeldnere og oftest i Skygge eller paa frodigere Jordbund. *

1057. *C. heterophyllum* [All. l. c. p. 152, t. 34] (Forskjelligbladet B.) Drej. n. 801; Näg. l. c. p. 993; Rehb. l. c. XV, tab. 838; Carduus L., H. 835; F. D. 109.

Stængelen opret, filtet; *Bladene* paa Overfladen mørkgrønne, glatte, paa Underfladen tæt sølvhvid-filtede, i Randen fiint tornet-saugtakke; *Rodbladene* stilkede, lancetformede, hele eller halvfinnede; *Stængelbladene* fra en bred hjerteformet Basis jævnt og langt tilspidsede, linie-lancetformede, de øvre hele, de nedre halvfinnede; *Blomsterkurven* enlig, ved en nøgen Blomsterstilk fjernet fra det øvre Blad og uden Dækblade; *Kurvbladene* lancetformede, budte, kort tornspidsede; *Kronens Rør* og *Krave* omtrent ligelange.

Stængelen 2—4' høi, udeelt eller sjeldnere med 2—flere Grene og 1 Kurv paa hver Green. Kronerne smukt purpurrøde. 6—7.

I Skove paa Leergrund: i *Halvøens* østlige Skovegne ikke sjelden, sparsommere mod V., f. Ex. Skjærhoved! Nørholm (H.), Ribe (16); paa Øerne sjelden: *F.* Krat ved Lunde pr. Odense, Østrupgaards Skov (18); *Loll.* Bjerremark (5); *Sj.* Slangerup, Hareskoven mod Ballerup (H.), Jonstrup Vang!

bb. *Kronens Krave spaltet til Grunden.* (*Breea Less.*).

1058. *C. arvense* [Scop. l. c. p. 126] (Agertidsel) Drej. n. 799; Näg. l. c. p. 995; Rehb. l. c. XV, tab. 842; *Serratula* L., F. D. 644; *Carduus* Curt., H. 834.

Stængelen grenet (de nedre Grene blomsterløse), i Spidsen halvskjærmformet med 2—5 nøgleformigt sammenhobede *Kurve* i Spidsen af Grenene; *Bladene* hele eller bugtet-halvfinnede med tornet-tandede *Flige*; *Blomsterkurvene* ægformet-valseformede, filtede, med tiltrykte, ægformigt tilspidsede og i Spidsen udstaaende *Kurvblade*; *Kronrøret* i Spidsen bøiet.

Bladene var. glatte eller paa Underfladen filtede. Kurvene mindre end hos de foreg. (undtagen Nr. 1054). Blomsterne ofte tveboe (det ene Kjøen (♂) med ufrugtbare Blomster, større Kroner, hvis Rør er omtrent dobbelt saa langt som Kraven, det andet Kjøen (♀) med mindre Kroner, Kronrøret 4 Gange længere end Kraven, svagt udviklede Støvdragere. Kronerne skident violette eller lila-røde, sjældent hvide. 7—8. Var.

β, horridum W. & Gr. Bladene halvfinnede, i Randen bølgede, tæt og stærkt tornede.

γ, mite Koch. Bladene bugtet-tandede, de øvre hele, svagt tornede.

δ, integrifolium W. & Gr., Fr. H. N. XIV, 9. Alle Bladene heelrandede eller svagttandede, paa Underfladen tæt hvidfiltede.

ε, semidecurrrens Lge. Stængelens Ledstykker foroven tornede af de halvt nedløbende Blade; Grenene meget talrige og langstrakte; Blomsterkurvene enlige i Spidsen af forlængede Blomsterstilke.

Paa dyrkede Marker mellem Sæden et meget almindeligt og besværligt Ukrud. Afarterne med Hovedarten, men sjeldnere: *δ*, Kjøbenhavns Glacier mellem Nørre- og Vesterport! *J.* Hjørring (Grønlund)! *ε*, Klitter paa Sydenden af Amrom (20)! En Form med hvide Kroner paa *Falst.* ved Holgershaab (Koch)!

21. Silybum. Sølvblad.

† 1059. *S. marianum* [Gärtn. fruct. 2, p. 378, t. 162] (Marietidsel). Drej. p. 259; Rehb. l. c. XV, tab. 882; Car-
duus L., H. 835.

Stængelbladene omfattende, i Randen bølgede, tornet-tandede, de nedre bugtet-halvfinnede, de øvre hele; *Kurvbladene* med ægformet, tornet-randhaaret Basis og udstaaende, sylformet, i en lang Torn udløbende Spidse; *Kronrøret* meget længere end *Kraven*.

2—4' høi. Bladene grønne med hvide Pletter og Striber. Kur-
vene meget store. Kronerne violette. 7—8. ☉.

Omkring Byer, oprindelig forvildet fra Haver: *J.* Randers (H.), Løvskal (3), Aarhus (16), Hatting ved Horsens (Jørg.): *Sl.* Haderslev (Nielsen), Hesteberger Koppel ved Slesvig (Esmarch), Husum (16); *F.* Bogen, Ulriksholm (H.), Assens (Kyll.), Faaborg (24); *Møen* ved Stege (Dr.); *Sj.* Stillinge (Lund). ☼

22. Carlina. Bakketidsel.

1060. *C. vulgaris* L. (Almindelig B.) H. 838; Drej.
n. 790; F. D. 1174; Rehb. l. c. XV, tab. 742.

Stængelen stivt opret, tætbladet, udeelt eller i Spidsen halvkjærmformigt grenet; *Bladene* bugtet-halvfinnede eller tandede, i Randen tornede, paa Underfladen filtede; *de ydre Kurvblade* lancetformede, dobbelt halvfinnede, tornede; *de indre linieformede*, hindeagtigt-hvidgule, nedenfor Midten raandhaarede.

1—1½' høi. Kronerne rødgule, Støvdragerne gule. 7—8. ☉.

Paa Bakker og udyrkede Steder, ikke sjelden i Danmark, især paa Leergrund.

23. Bidens. Brøndsel.

1061. *B. tripartita* L. (Fligbladet B.) H. 839; Drej.
n. 805; F. D. 2178; Rehb. l. c. XVI, tab. 941.

Bladene modsatte, stilkede, fjersnitdeelte med lancetformede, saugtakke Afsnit (de 1—2 nedre Par Afsnit større og derved 3—5-deelte); *Blomsterkurvene* oprette, i halvkjærmformet Qvast, først næsten valseformede, efter Afblomstringen nedtrykt-halvkugleformede, indeholdende 40—60 Blomster; *de ydre Kurv-*

blade 6—8, lancetformet-spadeformede, tæt tornet-randhaarede, *de indre Kurvblade* smalt ægformede, pludseligt udløbende i en budt Spidse; *Avnerne* linieformede, trenervede, kun naaende til Grunden af Fnokken; *Kronen* halvt saa lang som Bægerrøret; *Skalfrugterne* kileformede, brune, rynket-vortede, med alm. 2 Børster i *Fnokken*.

$1\frac{1}{2}$ —2' høi. Planten mørkgrøn, ofte brunnagtigt anløben. Kronerne gulbrune. $\frac{7}{8}$ —9. ☉. Var.

β , *minor*. Lavere (2—6" høi), med udeelte, lancetformede, saugtakke Blade.

Ved Bredder af Moser og Gadekjær, i Dynd o. s. v. meget alm. β , paa mere tør Jordbund, sjeldnere.

1062. **B. platycephala** [Ørsted i Ind. sem. hort. haun. 1859, p. 27] (Fladhoved-B.) Ørd. i Naturh. Foren. vid. Medd. 1862, p. 312, tab. 3.

Bladene modsatte, kortstilkede eller de øvre siddende, i Forhold til Plantens Størrelse hele eller ved Grunden dybt 3—5-deelte, Afsnittene lancetformede, fjernt og ikke dybt saugtakke; *Blomsterkurvene* i en halvskjærmformet Qvast eller enlige i Spidsen af Stængelen, før og efter Blomstringen stærkt nedtrykte (Breden meget større end Hoiden), indeholdende 100—150 Blomster; *de ydre Kurvblade* 10—12, lancetformede, kort og fjernt tornet-randhaarede, *de indre* æg-lancetformede, spidse; *Avnerne* smalt linieformede, alm. ennervede, naaende til Midten eller Spidsen af Fnokken; *Kronen* firetandet, af Længde med Bægerrøret; *Skalfrugterne* graaagtig-olivenbrune, bredt omvendt-ægformede, jævne, med 2—3 Børster i Stakken.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi. Hele Planten gulgrøn, Stængelen forneden ofte rødlig, Kronerne gule. Frugterne flere Gange mindre end hos foreg. Art. $\frac{8}{1}$ —9 (alm. 8—14 Dage senere end foreg., men tidligere end følg.).

Ved Randen af Søer, Damme og Tørvgrave, hidtil kun bemærket i *Sjælland*, sporadisk, men paa nogle Steder i Mængde: Bredderne af St. Jørgens Sø (Ørsted)! Dam mellem Taarbæk og Strandmøllen! Tikjøb! Rostgaards Dam ved Hellebæk!

Anm. I Udseende har den endeel tilfælles med følg., i Characterer staaer den nærmere ved foreg. Art, men er væsenlig forskjellig fra begge og kan neppe antages for en Bastardform, bl. a. fordi den

stedse bærer rigeligt spiredygtigt Frø. Nærmest er den beslægtet med *B. radiata* Thuill. (*B. fastigiata* Michxet), men denne synes dog (efter Expl. dyrkede i bot. Have) at være tilstrækkelig adskilt ved en mørkere grøn Farve, højere, oventil kirtelhaaret Stængel, ved Blad-afsnittene, som have talrigere og mere udstaaende Sideaarer, flere og spidsere Takker, ved de kortere og smalere ydre Kurvblade og ved sildigere Blomstringstid (9—10).

1063. **B. cernua** L. (Nikkende B.) H. 839; Drej. n. 806; Rchb. l. c. XVI, tab. 941.

Bladene modsatte, siddende eller kortstilkede, ved Grunden næsten sammenvoxne, lancetformede, fjernt, men skarpt og alm. dybt saugtakke; *Blomsterkurvene* enlige eller i klaseformet Blomsterstand, nikkende, fladtrykt-halvkugleformede, indeholdende 70—100 Blomster; *de ydre Kurvblade* lancetformede, kort og fjernt randhaaret-takke, *de indre* ovale eller bredt ægformede, budte; *Avnerne* lancet-spadeformede, alm. femnervede, naaende omtr. til Midten af Fnokken; *Kronen* halvt saa lang som Bægerrøret; *Skalfrugterne* omvendt-ægformet-kileformede, sort-brune; *Fnokken* lysere, alm. dannet af 3—4 Børster.

1—2' høi. Planten frisk grøn, foroven kirtelhaaret, Blomsterne lys-bruungule. $\frac{s}{2}$ —9. ☉. Var.

β , *radiata* F. D. 841; Coreopsis Bidens L. Randkronerne tungeformede, kjønsløse, gule.

γ , *minima* (L.) F. D. 312. Dværgform (1—2" høi), Blomsterkurven enlig, alm. opret (uden eller med tungeformede Randkroner).

Ved Randen af Damme og Tørvmoser, alm. udbredt. β , hist og her med Hovedarten. γ , paa mere tør Grund og ved grasede Søbredder ikke sjelden.

24. Eupatorium. Hjortetrøst.

1064. **E. cannabinum** L. (Hampagtig H.) H. 840; Drej. n. 804; F. D. 745; Rchb. l. c. XVI, 892.

Bladene modsatte, kortstilkede, dybt 3—5-deelte, med lancetformede, saugtakke *Afsnit*, det midterste størst; *Kurvene* smaae, valseformede, faablomstrede, talrigt samlede i en tæt *Halvskjærm*; *Kurvbladene* budte.

Stængelen opret, 2—4' høi, tilligemed Bladenes Underflade duunhaaret. Kronerne blegrøde. 7—9. 4.

Ved Søbredder, paa Enge mellem Krat, i fugtige Skove, almindeligt.

II. Syngenesia superflua.

25. Petasites. Hestehov.

1065. **P. officinalis** [Moench Meth. p. 568] (Pestilensurt). Drej. n. 807; Tussilago Petasites L., H. 856; F. D. 842; H. N. I, 7; P. vulgaris Desf., Rechb. l. c. XVI, tab. 901.

Bladene bredt hjerteformede med afrundede Lapper ved Grunden, i Randen uregelm. tandede, paa Underfladen graaagtigt uldhaarede; ♀ (*T. Petasites* L.): *Klasen* æg-valseformet; *Kurvbladene* i den indre Kreds budte; *Arrene* korte, ægformede; ♀ (*T. hybrida* L.): *Klasen* pyramideformet; *Blomsterkurvene* $\frac{1}{2}$ Gang mindre; *Kronerne* traadformede; *Arrene* linieformede.

Bladene ofte meget store (Stilken indtil 4' lang, Pladen indtil 1½' i Gjennemsnit). Blomsterne fremkomme, som hos de øvrige Arter, før Bladene paa et med rødlig Skjæl (Bladskeder) beklædt Skaft. De nedre Skeder have ofte en svag Begyndelse til en Plade. ♀ er hos os langt hyppigere end ♀. Kronerne rosenrøde. 4—5. 4.

Ved Aa- og Søbredder, i sumpige Skove, ikke sjelden, men sporadisk: hyppigst i *Sydsjæll.*, paa *Øerne* og i det sydl. *Fyen*, hvor den ofte følger Aaløbene i lange Strækninger og aldeles beklæder disses Bredder med Udelukkelse af al anden Vegetation, f. Ex. Aaen mellem V. Aaby og Rødkilde i Fyen!

1066. **P. albus** [Gärtn. fruct. 2, p. 406] (Hvidblomstret H.) Drej. n. 808; Rechb. l. c. XVI, tab. 899; Tussilago L., H. 855; F. D. 524; H. N. II, 3.

Bladene nyreformede, med afrundede Lapper ved Grunden, skarpt og uregelm. tandede, mellem de større Tænder bugtet-udrandede, paa Underfladen hvidgraa-filtede; *Kurvbladene* i den indre Kreds smale, spidse; ♀ (*T. alba* L.): *Klasen* kort, ægformet, næsten halvskjærmformet; *Arrene* linie-lancetformede, tilspidsede; ♀ (*T. ramosa* Hopp.): *Klasen* forlænget, med fleer-

blomstrede Blomsterstilke; *Kronerne* traadformede, *Arrene* korte, linieformede.

Bladene mindre end hos foreg. *Kronerne* guulhvide. 3—4. 4.

I fugtige Skove paa Leergrund, ved Søbredder: *J.* Rold Skov (8), Odder, Rathlousdal (Aabye), Lundum Mølle ved Horsens (2), Brandbjerg (28), og derfra mod S. hist og her i de østlige Skove paa *Halvøen*; paa Øerne meget sjelden: *Sj.* Sorø? (H.), Petersværft (West), Næsgaard ved Dronninggaard (20). [*

1067. *P. spurius* [Rchb. Fl. exc. p. 279] (Hvidbladet H.) Rchb. l. c. XVI, tab. 897; Tussilago Retz., H. 857; F. D. 1828; H. N. II, 4.

Bladene triangelformet-piilformede eller hjerteformede, med 2—3-lappede, udadtil udspilede, indadtil indbøiede *Lapper* ved Grunden, i Randen fiint og næsten regelm. tandede, paa Overfladen bleggrønne, paa Underfladen sneehvidt og fløielagtigt filtede; *Klasen* kort, tilsidst ofte halvskjærmformet; *Kurvbladene* i den indre Kreds brede, budte; ♀: *Kronerne* udvidede foroven, (næsten tungeformede); *Arrene* korte, ægformede; ♂: *Arrene* budt-tungeformede.

Kronerne hvide eller bleggrøde. 4—5. 4.

Ved sandige Bredder af Havet (eller Indsøer), sjelden i Danmark (og ikke i alle Aar blomstrende): *Bornh.* ved Arnager (H.), fra Sosa-Odden til Pythuset (Lotze), Hasle (20); *Falst* ved Grønsund! Hesnæs (14); Stubbekjøbing (25), Gaabense! *Sj.* Langebæk Skov (West). [†

26. Tussilago. Følfod.

1068. *T. Farfara* L. (Almindelig F.) H. 854; Drej. n. 809; F. D. 595; Rchb. l. c. XVI, tab. 904.

Bladene nyreformet-hjerteformede, grovt og bugtet-tandede, med mindre Tænder mellem de større; *Blomsterkurven* efter Afblomstringen nikkende; *Randkronerne* smalt tungeformede.

Blomsterne udvikles, ligesom hos foreg. Slægt, før Bladene; Skaftet $\frac{1}{2}$ —1' høit, beklædt med skjælformede Blade og tilligemed Bladenes Underflade overtrukket af en hvid Uld, som let afgnides. *Kronerne* gule. 3—4 (5-fr.) 4.

Paa leret Jordbund, meget alm. i Danmark.

27. Artemisia. Bynke.

a. *Absinthium* Tournef. Blomsterleiet haaret.

1069. **A. Absinthium** L. (Malurt). H. 844; Drej. n. 811; F. D. 1654; Reh. l. c. XVI, tab. 1029.

Stængelen opret; *Bladene* 2—3-dobbelt fjersnitdeelte, med budt-lancetformede *Afsnit*; *Blomsterkurvene* kugleformede eller halvkugleformede, nikkende; *Kurvbladene* ligelange, *de ydre* linieformede, i Spidsen hindeagtige, *de indre* budte, med bred, hindeagtig Rand.

Hele Planten sølvglindsende graa af fine og tæt-tiltrykte Silkehaar, har en stærk Lugt og bitter Smag. Kronerne guulagtige. 7—8. 4.

Ved Randen af Marker og Veie, omkring Landsbyer: meget alm. paa *Bornh.* og *Loll.*, temmelig alm. langs Kattegattet N. f. Nykjøbing i Odsherred (14), i de øvrige Provindser sporadisk og temmelig sjelden.

b. Blomsterleiet nøgent.

aa. *Seriphidium* Bess. Alle Kronerne ♂, med en skjæv *Basis* befestede til *Frugtknuden*.

1070. **A. maritima** L. (Strand-Malurt). H. 842; Drej. n. 814; F. D. 1655; H. N. IV, 4.

Stænglerne opstigende eller oprette; *Bladene* 2—3-dobbelt fjersnitdeelte, med smalt linieformede, budte *Afsnit*; *de nedre Stængelblade* med Ører ved Grunden; *Blomsterkurvene* æg-valseformede; *Kurvbladene* omvendt-ægformede, *de ydre* kortere, fildede, *de indre* i Randen hindeagtige.

De golde Stængler danne Tuer. Bladene mere eller mindre sølvgraa-fildede, have en behagelig krydret Lugt og en mildt bitter Smag. Kronerne rødgule. Var. i Henseende til Grenenes og Blomsterkurvenes Retning. 8—9. 4.

α , *typica*. Grenene i Spidsen nikkende, Blomsterkurvene oprette.

β , *gallica* (A. *gallica* Willd., F. D. 2119; Reh. l. c. XVI, tab. 1034). Grene og Blomsterkurve oprette.

γ , *salina* Koch, Reh. l. c. XVI, tab. 1039 (A. *salina* Willd.). Grene og Kurve hængende.

Ved Strandbredder, især paa feed og leret Marskbund, funden i alle Provindser (undt. Bornh.), men i de fleste Egne ikke alm.; hyppigst i Slesvigs Marskegne og paa Øerne i Østersøen (f. Ex. i det sydl. Loll.). De 3 Former voxe i Selskab med hverandre og synes at være omtr. lige almindelige.

bb. Abrotanum Tourn. Randkronerne ♀.

1071. **A. campestris** L. (Mark-B.) H. 842; Drej. n. 812; F. D. 1175; Rechb. l. c. XVI, tab. 1036.

Stænglerne opstigende; *Bladene* enkelt eller 2—3-dobbelt fjersnitdeelte med linieformede, kort braadspidsede *Afsnit*; *Stængelbladene* med Ører ved Grunden; *Blomsterkurvene* ægformet-kugleformede, oprette eller nikkende; *Kurvbladene* ægformede, glatte; med hindeagtig Rand, *de ydre* kortere.

De blomsterløse Stængler danne Tuer, de blomsterbærende tynde, riisformede, ofte rødbrune. Planten næsten ulugtende. Kronerne rødlike. 8—9. 4. En i Henseende til Stænglernes Retning, Bladformen og Kurvenes Størrelse meget foranderlig Art. Var. desuden glat eller duunhaaret af tilsidst affaldende Haar og

β. sericea Fr. Bladene sølvglindsende af en tæt, vedblivende Filt.

Paa tørre, sandige Marker, ikke sjelden i de fleste Egne af Landet. **β**, i Sandklitter og paa Strandskrænter, f. Ex. *Sj.* Hellebæk, Stevns Klint alm! *Falst.* Ulsøv Strand (Koch); *Loll.* paa Bredfjed i Rødby Fjord! *Bornh.* Sandflugtsstrækningen ved Rønne!

1072. **A. vulgaris** L. (Graa B.) H. 844; Drej. n. 813; F. D. 1176; Rechb. l. c. XVI, tab. 1038.

Stængelen opret; *Bladene* dobbelt fjersnitdeelte med spidst lancetformede (hele, saugtakke eller fligede) *Afsnit*, paa Underfladen hvidfiltede; *Stængelbladene* med Ører ved Grunden; *Blomsterkurvene* oprette eller lidet nikkende, æg-valseformede; *Kurvbladene* filtete, i Randen hindeagtige, *de ydre* kortere.

Bladene have en svagt krydret, ikke behagelig Lugt. Kronerne rødgule. 7—6. 4.

Ved Veigrøfter, i Randen af Skove, omkring Byer o. s. v., meget alm.

28. Tanacetum. Regnfang.

1073. **T. vulgare** L. (Almindelig R.) H. 841; Drej. n. 810; F. D. 871; Rechb. l. c. XVI, tab. 996.

Stængelen opret; *Bladene* enkelt eller dobbelt fjersnitdeelte, med linie-lancetformede, saugtakke *Afsnit*; *Blomsterkurvene* i Halvskjærmen naae lige høit.

2—3' høi. Bladene have en stærk, krydret Lugt. Kronerne gule. $\frac{7}{2}$ —9. 4.

Ved Gjærder og Veigrøfter, alm. i de fleste Egne: hyppigst paa *Loll.-Falst.*, sparsomt i *Halvøens* Hedeegne.

29. *Cotula*. Fiirkløft.

1074. *C. coronopifolia* L. (Fligbladet F.) H. 874; F. D. 341; Rehb. l. c. XVI, tab. 998; H. N. XIV, 6.

Stængelen fra Grunden af grenet, med svage, opstigende Grene; *Bladene* omfattende, lancet-linieformede, halvfinnede; *Blomsterkurvene* enlige, i Spidsen af Grenene.

3—6" høi, glat; Grenene ofte rødagtige. Kronerne gule. 7—8. ☉.

Paa dyndfuld, leret Grund, saavel inde i Landet som paa Strandenge, hidtil kun funden paa faae Steder i Danmark: *J.* Harbøre (24); *Thorseng* i den sydlige Deel alm., især ved Gadekjær i Byerne (H., 12!); *Ærø* (Riise i Kph. Herb.). [5]

30. *Gnaphalium*. Evighedsblomst.

a. *Helichrysum* Gärt. ♀ Blomsterne i Randen i een Kreds.

1075. *G. arenarium* L. (Gul E.) H. 845; F. D. 641; Rehb. l. c. XVI, tab. 950; H. N. II, 1; *Helichrysum* DC., Drej. n. 820.

Stængelen opstigende eller opret; *Rodbladene* spadeformede, budte; *Stængelbladene* linie-lancetformede; *Blomsterkurvene* i en endestillet, af flere Nøgler tæt sammensat Halvskjærm.

$\frac{1}{2}$ —1' høi, hele Planten graafiltet. Kronerne stærkt gule, Kurvbladene citrongule (sjældnere brandgule med hørøde Spidser eller hvide). 7—9. 4.

Sandige Marker og Bakker, funden i alle Provindser, men ikke overalt: hyppigst i *Nordsjæll.* og paa *Bornh.* [6]

b. *Gnaphalium* Koch. ♀ Blomsterne i flere Kredse.

aa. *Blomsterkurvene* nøgleformigt samlede i Spidsen af Grenene. ☉.

1076. *G. luteo-album* L. (Gulhvid E.) H. 846; F. D. 1763; Rehb. l. c. XVI, tab. 947; H. N. I, 1.

En—fleurstænglet, med nedentil udeelte *Stængler*, Hovedstængelen opret, Sidestænglerne opstigende eller nedliggende; *Bladene* halvt omfattende, i Randen bølgede, *de nedre* lancet-spadeformede, budte, *de øvre* lancet-linieformede, spidse; *Skalfrugterne* ru-punkterede.

$\frac{1}{4}$ —1' høi, hele Planten hvidgraa-filtet. Kronerne kjødfarvet-gule, Kurvbladene sølvglindsende straagule. 7—8.

Paa sandige Overdrev, meget sjelden og kun funden i de sydligste Provindser: *Bornh.* ved Veie i Sandstrækningen mellem Pyt-
huset og Stampen! Rønne (Hjorth); *Sl.* Sorgvold N. for Rendsborg (16). *

1077. *G. uliginosum* L. (Sump-E.) H. 849; Drej. n. 817; F. D. 859; Rchb. l. c. XVI, tab. 948.

Stængelen fra Grunden af grenet, *de nedre Grene* opstigende; *Bladene* lancetformede, med størst Brede foroven, spidse, heelrandede eller svagt bølgede, tilligemed *Stængelen* graafiltede; *Skalfrugterne* jævne; *Fnokkens* Straaler 8—12.

3—6" høi. Kurvbladene olivengrønne med hindeagtig, straaguul Rand. Kronerne guulagtige. 7—8.

Pa. fugtige Agre, i sumpig Grund alm. udbredt.

* 1078. *G. nudum* [Hoffm. Bot. Taschen. 1791, p. 292] (Glat E.) F. D. 2474; H. N. XII, 6; *G. uliginosum* γ , glabrum Koch Syn. II, 400; Rchb. ic. crit. VIII, 999.

En—fleurstænglet, med svage, udstrakte, udeelte eller grenede *Stængler*; *Bladene* linieformede, spidse, heelrandede, tilligemed *Stænglerne* glatte, grønne; *Skalfrugterne* korthaaret-rue (eller jævne?), med 6—10-straalet *Fnok*.

Stænglerne 1—2" lange. 7—8.

Ved Sø og Aabredder, paa fugtige Overdrev, sjelden: *Amager* Fæled; Borgsum og Klaus Limbæks Borg paa *Føhr* (20). *

Anm. Ved dens finere og mere udstrakte *Stængler*, smalere, aldeles grønne og glatte Blade samt færre, til en kort og tæt Klase samlede Kurve i Spidsen af *Stænglerne* let kjendelig og saa forskjellig fra foreg. at den synes at fortjene Plads som en egen Art. Expl. fra det angivne Voxested saavel som fra Geesthacht i Lauenborg (hvor jeg samlede den i Mængde i Selskab med foreg. uden Overgange) have rue *Skalfrugter*, hvorimod Koch (l. c.) beskriver dem jævne. Dette Kjendetegn synes altsaa at være foranderligt, hvilket muligviis ogsaa gjælder om *G. pilulare* Wahlenb. (H. N. X, 2), som i andre Henseender er langt mere lig *G. uliginosum*.

bb. Blomsterkurvene i Nøgler fra Bladhjørnerne, danne en bladets, azformet Klasse. 4.

1079. **G. silvaticum** L. (Rank E.) H. 847; F. D. 1229; Rchb. ic. fl. germ. XVI, tab. 949; G. rectum Sm., Drej. n. 818.

Stængelen opret eller ved Grunden opstigende; *Rodbladene* lancetformede; *Stængelbladene* linieformede, spidse; *Skalfrugterne* korthaaret-rue; *Fnokken* mangestraalet.

Stængel og Blade graafiltede, de sidste ofte paa Overfladen glatte; Kurvbladene grønne, i Randen hindeagtige, i Spidsen brune. 7—8.

Paa Bakker, Lyngheder, i Krat og Randen af Skove alm.

31. *Antennaria. Kattetod.*

1080. **A. dioeca** [Gärtn. fruct. 2, p. 410, t. 167] (Sand-K.) Drej. n. 819; Rchb. l. c. XVI, tab. 951; Gnaphalium L., H. 846; F. D. 1228.

Bladene paa de blomsterløse, krybende *Sidestængler* omvendt-ægformede eller spadeformede, budte, paa den oprette *Blomsterstængel* linie-lancetformede, spidse, tiltrykte; *Blomsterstængelen* udeelt, med 4—6 Kurve samlede til en tæt, kort *Halvskjærm* i Spidsen.

Kurvbladene og Kronerne rosenrøde eller hvide. Bladene paa Overfladen grønne, paa Underfladen hvidfiltede. Var. β , *hyperborea* (D. Don), med Bladene filtede paa begge Flader. 5—6. 4.

Paa sandige Marker, Bakker og Lyngheder alm. β , *Bornh.* ved Rønne (19), flere Steder i Bodilsker Sogn (Baagøe)!

32. *Filago. Museurt.*

a, *Oglifa* Cass. Kurvbladene budte, efter Frugtens Modenhed udbredte i Stjerneform.

1081. **F. minima** [Fr. Nov. p. 268] (Liden M.) Drej. n. 815; H. N. I, 3; F. montana F. D. 1276 (ikke L.); Gnaphalium montanum Willd., H. 850; Oglifa minima Rchb. l. c. XVI, tab. 946.

En—fleurstænglet; *Stænglerne* oventil gaffeldeelte med opret-

aaabne Grene; 3—5 Kurve samlede i ende- og axelstillede Nøgler; *Bladene* tiltrykte, lancet-sylformede, spidse; *Kurvene* femkantet-kugleformede, med budte, i Randen glatte *Kurvblade*; *Skalfrugterne* jævne eller under Lupen hvidt punkterede.

Spædere og lavere (2—6" høi), mindre stærkt graafiltet end den følg. 7—8. ☉.

Paa sandige Marker og Bakker alm.

1082. **F. arvensis** L. [Fr. l. c. 267] (Ager-M.) Drej. n. 816; F. D. 1275; F. montana—arvensis H. N. I, 2; Gnaphalium arvense Willd., H. 851; Oglifa arvensis Cass., Rchb. l. c. XVI, tab. 946.

Stængelen fra Grunden af grenet, med 3—7 nøgleformigt samlede *Kurve* i Spidsen af de oprette Grene; *Bladene* lancetformede, budte; *Kurvbladene* budte, overalt filtede; *Skalfrugterne* under Lupen hvidt punkterede.

4—8" høi, hele Planten tæt hvidfiltet. 7—8 ☉.

Paa tørre, især sandige Marker og Bakker ikke sjelden. [a]

Anm. Den ægte F. montana L. (Fr.), som især er kjendelig ved Grene beklædte med Nøgler fra Grunden af, og fra hvilken foreg. kun er en lidet afvigende Form, er saavidt mig bekjendt, ikke funden i Danmark.

b. *Gifola* Cass. Kurvbladene braadspidsede, efter Afblomstringen ikke stjerneformigt udbredte.

1083. **F. germanica** L. (part.) (Hvidgraa M.) Drej. n. 817; Rchb. l. c. XVI, tab. 945, fig. I; H. N. VI, 3; Gnaphalium Willd., H. 850 (part.); F. canescens Jord. fragm. 3, p. 201, tab. 7 A.

Stængelen oventil gaffeldeelt, med 20—30 *Kurve* samlede i axel- eller endestillede, kugleformede Hoveder; *Bladene* smalt lancetformede, i Randen bølgede; *Kurvbladene* forneden filtede, i Spidsen glatte, straagule, hindeagtigt-braadspidsede; *Skalfrugterne* hvidt punkterede.

$\frac{1}{3}$ —1' høi. Stængelen enkelt eller med opstigende Grene ved Grunden. Hovederne større og med talrigere Kurve end hos de foreg. Hele Planten beklædt med en hvidgraa Filt. "Svagt lugtende" (G. E. Sm.). 7—8. ☉.

Paa tørre Marker og Bakker, ved Randen af Veie o. s. v., ikke sjelden. ☞

* 1084. **F. apiculata** [G. E. Smith, Phytol. II (1846), p. 575] (Guulgraa M.) **F. lutescens** Jord. l. c. tab. 7 B; Rehb. l. c. fig. II; *Filago* germ. L. (part.); *Gnaphalium germanicum* F. D. 997.

Bladene bredere lancetformede, overalt beklædte med guulgraa eller graagrøn Filt; 15—20 Kurve i Hovederne; *Kurvbladene* i Spidsen mere eller mindre purpurrøde, forøvrigt som foreg.

«Lugter omtrent som Regnfang» (Sm.) 7—8. ☉.

Paa sandige Marker og Bakker: *Bornh.* alm.! *Sj.* Stevns Klint (14), Kjøge, Borød ved Sorø! *Langel.* ved Steengade (19); *J.* Ødstedgaard! Synes at være udbredt over hele Landet, men noget mindre alm. end foreg., fra hvilken den forekommer mig vel adskilt. ☞

Anm. Navnet *F. germanica* L. er saavel hos Linné som de fleste senere Forff. collectivt, og indbefatter baade denne og foreg. Art, hvorfor det neppe vil være muligt at paavise, om L. har havt nogen af disse særligt for Øie ved sin Beskrivelse. Jeg har imidlertid med de engelske Botanikere beholdt det almindelige Navn for den almindeligst forekommende Art.

33. **Bellis. Tusindfryd.**

1085. **B. perennis** L. (Almindelig T.) H. 868; Drej. n. 836; F. D. 503; Rehb. l. c. XVI, tab. 918.

Bladene udgaae rosetteformigt fra en meget forkortet Rodstok, omvendt-ægformede eller spadeformede, rundtakkede eller rundbugtede; *Blomsterkurvene* enlige i Spidsen af Skafterne; *Kurvbladene* budte, ved Grunden sammenvoxne

Skafterne 2—3" lange. Skivekronerne gule, Randkronerne hvide eller røde. Afændringer med lutter tungeformede (1, *liguliflora*) og lutter rørformede Kroner (2, *tubuliflora*) dyrkes i Haver. Skalkrugten haaret og Kronrøret ved Grunden stundom beklædt med Haar, hvorved Frugten faaer Udseende af at være forsynet med en Fnok. 1—12. ♀.

♂, *caulescens*! (*B. hybrida* Ten.?) Rodstokken udsender flere forlængede, overjordiske Grene med langstilkede Blade; Skafterne $\frac{1}{2}$ —1' lange.

Paa side Græsmarker og høie Enge meget alm. ♂, i Skove, f. Ex. Ruderhegn (19)! Jonstrup (14).

34. Chrysanthemum. Oxeøie.

a. *Chrysanthemum* Tournef. Alle Kronerne gule; Randblomsternes Skalfrugter 3—4-kantede med 2 skarpt fremstaaende Vinger, Skiveblomsternes trinde, stribede.

1086. *C. segetum* L. (Gul O., Onde Urter). H. 869; Drej. n. 837; F. D. 995; Rehb. l. c. XVI, tab. 986.

Stængelen udeelt eller faagrenet; *Kurvene* enlige i Spidsen af Stængelen og Grenene; *Bladene* lancetformede, ved Grunden tandede, i Spidsen fligede, de øvre med omfattende Basis; *Kurvbladene* rundagtigt-ovale, med en bred, hindeagtig Rand; *Skalfrugterne* uden Hindekant.

Hele Planten glat, blaa-grøn. 7—8. ☉.

Et besværligt Ukrud i Kornmarker, især i Vaarkornet, overalt i Danmark (under forskellige Benævnelser), kun mindre hyppig hvor et bedre Agerbrug har udryddet den.

b. *Leucanthemum* Tournef. Skivekronerne gule, Straalekronerne hvide; alle Skalfrugterne trinde, de ydre furede, de indre stribede.

1087. *C. Leucanthemum* L. (Hvid O., Præstekrave). H. 869; Drej. n. 838; F. D. 994; *Leucanthemum* vulgare Lam.; *Tanacetum Leucanthemum* Schultz bip., Rehb. l. c. XVI, tab. 988.

En — fleerstænglet, *Stænglerne* udeelte eller faagrenede, med enlige *Kurve* i Spidsen; *de nedre Blade* stilkede, omvendt-ægformede, rundtakkede, *de øvre* siddende, linie-lancetformede, ved Grunden fjersnitdeelte, i Spidsen fliget-saagtakkede; *Kurvbladene* æg-lancetformede, grønne med brunn Indfatning og smal, hvid-hindeagtig, uregelm. tandet Rand; *Straalekronerne* linieformet-ovale, af Længde med eller længere end Skiven; *Skalfrugterne* (typisk) uden Hindekant.

Lugtløs. 6—7. ♀. Bladene alm. glatte, var. i Beklædning og og Indskjæring:

β, *coronopifolium* Hartm. Alle Bladene fjersnitdeelte eller dybt halvfinnede, med øreformigt omfattende Basis.

γ, *hirsutum* Hartm. Stængel og Blade tæt beklædte med kort, kruset Uld.

Forekommer desuden med skjævttandet Hindekant paa Skalkrugten — *auriculatum* etc. Peterm.

Paa Græsmarker og ved Veie, meget alm. — *β*, og *γ*, med Hovedarten, men sjældnere.

1088. **C. Parthenium** [Pers. Syn. 2, 462] (Matrem.) Drej. n. 839; Pyrethrum Sm., H. 870; Matricaria L., F. D. 674; Tanacetum Schultz bip., Rehb. l. c. XVI, tab. 992.

Bladene stilkede, fjersnitdeelte med ægformede, fjerlappede Afsnit; *Stængelen* oventil halvskjærmformigt grenet, med udspærrede *Grene*; *Kurvbladene* linie-lancetformede med hvid-hindeagtig, duunhaaret Rand; *Straalekronerne* rundagtigt ovale, kortere end Skiven; *Skalkfrugterne* med meget kort Hindekant.

Stængel og Blade kort-duunhaarede; Planten stærkt lugtende. 7—8. 4.

Paa Grøftevolde, især omkring Haver og Landsbyer, funden hist og her i alle Provindser, men ikke alm. (Dyrkes ofte i Haver, især en Var. med lutter tungeformede Kroner).

† *C. corymbosum* L. (Tanacetum corymbosum Schultz bip., Rehb. l. c. XVI, tab. 993). *Bladene* dobbelt fjersnitdeelte med linie lancetformede, fliget-saugtakke *Afsnit*; *Kurvene* i Halvskjærm med oprette *Grene*; *Randkronerne* linieformet-ovale, længere end Skiven; *Skalkfrugterne* med tydelig Hindekant. 7—8. 4.

Forvildet paa en Høi ved Bidstrupgaard!

35. Matricaria. Kamille.

1089. **M. inodora** [L. Fl. Suec. 2, p. 765] (Lugtløs K., Baldersbraa). Fr. mant. 3, 115; Chrysanthemum inodorum L. Sp., Drej. n. 840; F. D. 696; Pyrethrum Sm., H. 871; Tripleurospermum Schultz bip.; Chamæmelum Vis., Rehb. l. c. XVI, 985.

Stængelen opret, oventil halvskjærmformigt grenet; *Bladene* dobbelt fjersnitdeelte, med traadformet-børsteformede Afsnit; *Kurvbladene* linieformet-ovale, budte med en bruunt-hindeagtig, ujævn Rand; *Blomsterleiet* halvkugleformet, under Blomstringen

heelt; *Straalekronerne* udstaaende; *Skalfrugterne* brune med 3 tykke, blege Ribber paa Inderfladen, paa Yderfladen hvælvende, sribede paatværs, med 2 Kirtler under den svagt tandede Hindekant.

Uden eller med meget svag Lugt. Randkronerne hvide, Skivekronerne gule. Misdannelser med lutter tungedannede Kroner eller med lutter rørformede Kroner og topskydende Kurve findes undertiden. 6—10. ☉ (eller ☺).

* *salina* Wallr. (*Pyrethrum inodorum* var. F. D. 1936; *Tripleurospermum maritimum* Koch Syn. II, 1026). Stængelen udstrakt, fra Grunden af grenet, ofte rødlig; Bladenes Afsnit kødfulde.

** *borealis* Hartm. (*M. inod. ambigua* Fr.). Vedvarende, Kurvbladene større, med bred, sortbrun Rand.

Paa Grøftevolde, Agre og omkring Byer, i de fleste Egne alm. og ofte et besværligt Ukrud, især omkring Kjøbenhavn i stor Mængde. * ved Strandbredder, ikke sjelden. ** *Bornh.* Klipper ved Hammershuus (8)!

Anm. Alt hvad jeg har seet fra Danmark under Navn af *Matricaria maritima* hører til Var. * af foreg., fra hvilken (ifølge Fr. l. c.) den ægte linneiske *M. maritima* (H. N. VII, 1, XII, 2) skal adskilles især ved hvidhindede, heelrandede Kurvblade, større og tykkere Frugter samt bredere og kortere Bladafsnit. Da denne findes i Sverige ved Kysterne af Kattegattet indtil Kullen, kunde den muligviis ogsaa forekomme ved de nordlige danske Kyster.

1090. **M. Chamomilla** L. (Vellugtende K.) H. 872; Drej. n. 841; F. D. 1764; Rchb. l. c. XVI, tab. 997.

Stængel og *Blade* som hos foreg.; *Kurvbladene* oval-linieformede, budte, med en hvid bindeagtig, heel Rand; *Blomsterleiet* kegleformet, efter Blomstringen buult; *Straalekronerne* mod Afblomstringen nedhængende; *Skalfrugterne* blege, budt femkantede og femsribede, uden Hindekant.

Kronernes Farve som hos foreg., som den er meget lig, men fra hvilken den, foruden de angivne Kjendetegn, let adskilles ved mindre Kurve og især ved en stærk og ret behagelig Lugt. 6—10. ☉.

Ved Veie og mellem Sæden, men især omkring Byer paa leret og gjødet Jordbund, funden i alle Provindser, men ikke lige hyppig overalt, og i enkelte Egne (f. Ex. i det sydlige Fyen og paa Smaaøerne, 12) aldeles ikke tilstede. En Form med lutter tungedannede Kroner findes i Hornemanns Herb., samlet ved Kalkbrønderiet, S. for Flaskekroen.

† *M. discoidea* [DC. Prodr. VI, 50] (Skiveblomstret K.)
Chamomilla discoidea J. Gay, *Cotula matricarioides* Bong.

Glat, skidengrøn, *Bladenes Afsnit* bredere og kortere end hos de foreg.; *Kurvene* kortstilkede; *Kurvbladene* ovale, budte, med en bred, hvid-hindeagtig Rand; *Blomsterleiet* kegleformet, tilsidst buult, ingen tungeformede *Randkroner*; *Skivekronerne* firetandede; *Skalfrugterne* blege, større end hos foreg., mindre end hos næstforeg., med en meget smal Hindekant. 7—9. ☉.

En fra det vestlige og nordvestlige Amerika indvandret Plante, som i de senere Aar er funden forvildet paa flere Steder i Europa omkring Byer. Her er den iagttaget 1861—64 ved Rendestene langs Sortedamsveien ved Kbh. (Ørsted)!

36. *Anthemis*. Gaaseurt.

a. *Maruta* Cass. Avnerne paa Blomsterleiet linie-
 børsteformede, spidse.

1091. **A. *Cotula* L.** (Stinkende G.) H. 873; Drej. n. 846; F. D. 1179; *Maruta Cotula* Cass., Rehb. l. c. XVI, tab. 1000.

Stængelen opret, furet; *Bladene* 2—3-dobbelt fjersnitdeelte med linie-sylformede Afsnit; *Blomsterleiet* kegleformet; *Skalfrugterne* trinde, knudret-stribede med en rundtakket Rand foroven.

Bladene var. tiltrykt-duunhaarede eller næsten glatte. Har en stærk, men ubehagelig Lugt. Skivekronerne gule, Straalekronerne hvide. 6—9. ☉.

β, *disciflora*! Alle Kronerne rørformede.

Ved Veie, Gadekær og lignende noget fugtige Steder omkring Landsbyer, ikke sjelden, især meget hyppig paa **Lolland!** — **β, J.** ved den nye Landevei S. for Horsens! **Sj.** ved Veien mellem Herløv og Husum (14); **Bornh.** Bodilsker (Baagøe).

b. Avnerne lancetformede, braadspidsede.

1092. **A. *arvensis* L.** (Ager-G.) H. 872; Drej. n. 845; F. D. 1178; Rehb. l. c. XVI, tab. 1004; H. N. XV, 1.

Stængelen opret eller opstigende, stribet; *Bladene* dobbelt fjersnitdeelte, med linie-lancetformede Afsnit; *Blomsterleiet* kegle-

formet; *Kurebladene* med en hindeagtig, uregelm. tandet Rand; *Skalfrugterne* firekantede, jævnt sribede, *Randblomsternes* med en tydelig, bølget-ujævn, *Skiveblomsternes* med en svag, heel-randet Hindekant foroven.

Bladene tiltrykt-silkehaarede, have en svag, men ret behagelig Lugt*). Randkronerne hvide, Skivekronerne gule. Forekommer, ligesom foreg., uden Straalekroner (β , *disciflora* M. T. Lange i Naturh. Foren. vid. Medd. 1861 p. 10). 6—8. ☉.

Paa Grøstevolde, i Kornagre o. a. dyrkede Steder, alm. udbredt. β , *F.* Ollerup (12)!

1093. *A. tinctoria* L. (Farve-G.) H. 874; Drej. n. 844; F. D. 741; Rehb. l. c. XVI, tab. 1010; H. N. VI, 1.

Bladene enkelt eller dobbelt fjersnitdeelte, med halvfinnede eller saugtaktede Afsnit; *Blomsterleiet* halvkugleformet; *Skalfrugterne* fladtrykt-firekantede, smalt vingede, paa begge Sider femsribede, med en skarp Rand foroven.

Stængel og Blade, især paa Underfladen, duunhaarede. Alle Kronerne gule. $\frac{5}{2}$ —9. 4.

β , *discolor* Fr. Straalekronerne hvide, Bladene næsten glatte.

Paa tørre Bakker og Diger, sjelden: *Sj.* Ankersmedbakken ved Helsingør (Dr.), Gårder ved Rudersdals Kro, Veien mellem Lyngby og Viintappergaarden! mellem Herløv og Husum (14); *F.* Svendborg (H.); *J.* Viborg (Morville). — β , mellem Hovedarten ved Rudersdal! $\frac{5}{2}$

37. *Achillea*. Røllike.

1094. *A. Ptarmica* L. (Nyse-R.) H. 875; Drej. n. 842; F. D. 643; Rehb. l. c. XVI, tab. 1014.

Bladene lancet-linieformede, skarpt og ru-saugtaktede; *Blomsterkurvene* i en Halvskjærm i Spidsen af Stængelen, de enkelte *Blomsterstilke* tykkere foroven, flere Gange længere

*) Denne og flere af de foreg. Arter forvexles ofte og bringes iflæng til Apotheket under Navn af Kamilleblomster. Foruden de angivne Slægts- og Arts-Kjendetegn skjælnes de let ved liden Øvelse paa Lugten, som hos hver af de paagjældende Arter er eendommelig.

end Kurven; *Straaleblomsterne* omtrent 8—10, af Længde med eller længere end Kurvdækket.

Stængelen foroven duunhaaret, Bladene alm. glatte, Kronerne hvide. 7—8. 4.

Paa Enge, ved Grøfter, alm. i de fleste Egne af Danmark. (Paa Falst. temmelig sjelden).

1095. **A. Millefolium** L. (Almindelig R.) H. 875; Drej. n. 843; F. D. 737; Rchb. l. c. XVI, tab. 1026.

Bladene i Omrids lancetformede, 2—3-dobbelt fjersnitdeelte, med linieformede, spidse Afsnit; *Kurvene* samlede i Spidsen af Stængelen til en tæt Halvskjærm; *Smaablomsterstilkene* omtrent af Længde med Kurven; *Straaleblomsterne* 4—6, af Kurvdækkets halve Længde.

Halvskjærmen indeholder flere, men mange Gange mindre Kurve end hos foreg. Kronerne hvide, sjeldnere rosenrøde (F. D. 1937). 7—9. 4. Var. i Henseende til Beklædningen: duunhaaret eller næsten glat og

β , *lanata* Koch. Stængel, Blade og de meget korte Grene i Halvskjærmen filtet-uldhaarede.

γ , *magna* Sond. fl. Hamburg. p. 466, høi og kraftig, Bladene bredere, tredobbelt fjersnitdeelte med ægformede Flige, bredere Midtnerve, Halvskjærmen meget stor og udbredt.

Paa Græsmarker, ved Veie og i Krat meget alm. — β , paa tørre, solaabne Bakker sjeldnere: *Sj.* mellem Hellebæk og Helsingør (Heiberg); *Bornh.* ved Allinge og Rømersdal! γ , *F.* Svendborg (14).

† *Galinsoga*.

† *G. parviflora* [Cav. Ic. III, p. 41, t. 281]. *Viborgia* Acmella Roth.

Bladene modsatte, stilkede, ægformede, saugtakket-tandede; *Kurvene* smaae, paa meget lange Stilke, som danne en fjernblomstret Halvskjærm; *Straaleblomsterne* hvide, kortere end Kurvdækket, Skivekronerne gule; *Skalfrugten* sort, omvendt-kegleformet, omtrent dobbelt saa lang som den hvide hindeagtige Fnok.

1—1½' høi, glat eller foroven (sjeldnere overalt) haaret. 7—8. 4.

Oprindelig fra Amerika, funden forvildet hist og her, f. Ex. *Sj.* ved Sorø (Lund); *F.* Hofmanskave (18)!

38. Inula. Alant.

a. *Conyzoides*. Randkronerne trekløvede, af Længde med Kurvbladene, ikke udstraalende.

1096. **I. Conyza** [DC. Prodr. 5, p. 464] (Trekløft-A.)
Rehb. l. c. XVI, tab. 923; *Conyza squarrosa* L., H. 852;
F. D. 622.

Bladene elliptisk-lancetformede, svagt saugtakkede, paa Overfladen duunhaarede, paa Underfladen kort, men tæt graa-filtede, de nedre stilkede; *Blomsterkurvene* nøgleformigt samlede i Spidsen af Grenene og dannende en sammensat Halvskjærm; *Kurvbladene* i Spidsen tilbagebøiede, randhaarede; *Skalfrugterne* trinde, ovenfor Midten stivhaarede, med enradet *Fnok*.

1—2' høi. Kronerne gule. Kurvbladene rødlige, med grøn Ryg-nerve og Spidse. 7—8. ☉.

Paa tørre, udyrkede Bakker, sjelden: **J.** Vosnæsgaard (28)! **F.** Fyenshoved (Schouw, Hofm. Bang)! Assens (Kyll.). ☞

b. Randkronerne tungeformede, udstraalende.

aa. *Pulicaria Gärtn.* *Fnokken* toradet, den ydre Kreds kort, ved Grunden sammenvokset til en Krands.

1097. **I. pulicaria** (Loppe-A.) H. 865; F. D. 613;
Pulicaria vulgaris Gärtn., Drej. n. 829; Rehb. l. c. XVI, tab. 933; *P. dysenterica* H. N. XV, 2.

Bladene lancetformede, forneden smalere, med afrundet, halvt omfattende Basis, duunhaarede, i Randen bølgede; *Blomsterstanden* qvastformet; *Kurvene* halvkugleformede; *Straalekronerne* lidet længere end Kurvbladene; *Skalfrugten* duunhaaret; den ydre *Fnok* børsteformigt fliget.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Stængelen oventil og Blomsterkurvene tæthaarede. (Randkronerne meget smaae). 7—9. ☉.

Ved Gadekjær, Randen af Veie, især omkring Byer, sporadisk og i de fleste Egne ikke alm., hyppigst paa de sydlige Øer, i *Sydsjæll.* og det sydl. *Fyen*. ☞

1098. **I. dysenterica** L. (Strand-A.) H. 865; F. D. 410;
Pulicaria Gärtn., Rehb. l. c. XVI, tab. 933; H. N. XIII, 2.

Bladene elliptiske eller lancetformede, med hjerteformet eller piilformet-omfattende Basis, i Randen svagt tandede, paa Overfladen korthaarede, paa Underfladen graafiltede; *Blomsterkurvene* halvskjærmformigt samlede i Spidsen af Stængelen; *Straalekronerne* meget længere end Kurvbladene; *Skalfrugten* haaret; *den ydre Fnok* meget kort, takket.

1—1½' høi. Beklædning som hos foreg. Kurvene over dobbelt saa store som hos foreg., meget mindre end følg. 7—9. 4.

Ved Grøfter og andre fugtige Steder, især paa Leergrund og stedse i Nærheden af Havet: ved Kysterne af Østersøen (3: de sydlige Øer fra Møen til Als, sydl. Fyen og Slesvigs Østkyst) ikke sjelden; sjelden i *Sj.*: Vordingborg (29)! Korsør (13), Holbæk (15)! Eriks-holm (Feddersen) og i det nordlige *Fyen*: Hofmangave (H.), Rørbæk, Odense! (I *Jyll.* ikke bemærket). ^[3]

bb. Inula. Fnokkens Straaler i een Kreds.

α, Skalfrugterne haarede.

1099. **I. Britanica** L. (Soløie-A.) H. 864; Drej. n. 831; F. D. 413 (slet); Rehb. l. c. XVI, tab. 926; H. N. IV, 5.

Bladene lancetformede, beelrandede eller fjernt tandede, paa begge Flader haarede, de nedre stilkede, de øvre med en bredere, hjerteformet Basis omfattende; *Kurvene* enlige i Halvskjærm fra Spidsen af Stængelen; *Kurvbladene* spidse, hvidfiltede.

1—1½' høi. Stængelen og især Grenene hvidfiltede, Bladene var. i Beklædning, Kurvbladene i Længde. 7—9. 4.

Strandenge og Overdrev i Nærheden af Strandkysterne: paa de sydlige Øer fra Falster til Ærø hist og her ikke sjelden; i de andre Provindser sparsommere: *Sj.* Amager ved Kastup og flere Steder! Flaskekroen (Drej.), alm. ved Skjelskør (Nielsen), Korsør (Lund), Reersø (Dr.), Rørby pr. Kalundborg (Baagøe), Lammefjorden ved Adlersborg (Rafn); *F.* Langø paa Hinds-holm! Kjersteminde! Odense Fjord (H.), Østerøen ved Nyborg (Lund); *J.* True ved Aarhus (2), Ødstedgaard! *Sl.* Aabenraa (Rafn), Langballe Aa i Angel (H.), Slie-minde (16), Kappel (Lund), Svansø (28), Fredriksort, Femern (16); Midlum paa Føhr (20)! (I det nordl. Jyll. og paa Bornh. er den ikke funden). ^[3]

Anm. Hornemanns Navn »brittanisk Alant« er upassende, da den ikke forekommer i Storbritanien. Artsnavnet »Britanica« hidrører fra en i Oldtiden omtalt Lægeplante af dette Navn (*βρετανική* Diosc.), som af Fortolkerne har været overført paa forskellige Planter, hvorefter Navnet af Linné benyttedes saavel for en Rumex-Art som for vor Plante.

β , Skalfrugterne glatte.

1100. **I. salicina** L. (Pilebladet A.) H. 866; Drej. n. 832; F. D. 786; Rchb. l. c. XVI, tab. 928.

Bladene lancetformede (alle med størst Brede paa Midten), omfattende, heelrandede eller svagt tandede og i Randen rue, glatte eller paa Underfladen svagthaarede, med ophøiede Nerver paa Underfladen; *Kurvene* enlige eller i en faablomstret Halvskjærm; *Kurvbladene* spidse, randhaarede.

1—1 $\frac{1}{2}$ ' høi. Stængelen glat eller forneden haaret, Grenene glatte. 7—8. 4.

Paa høie Enge, ved Gjærder og i Kratskove, især paa Kalkgrund: fra *Slesv.* er intet bestemt Voxested mig bekjendt, forøvrigt findes den hist og her, men ikke alm., i alle de andre Provindser, paa *Bornh.* meget hyppig paa Engene. [*

1101. **I. Helenium** L. (Almindelig A.) H. 684; Drej. n. 830; F. D. 728; Corvisartia *Helenium* Mérat, Rchb. l. c. XVI, tab. 921.

Rodbladene lancetformede, stilkede; *Stængelbladene* æg-hjerteformede, halvt omfattende; alle *Bladene* grovt og dobbelt tandede, paa Underfladen hvidfiltede; *Blomsterstanden* halvskjærmformet; *de ydre Kurvblade* ægformede, *de indre* linieformede, indsnørede paa Midten, mod Spidsen bredere, budte, med fryndset-tandet Rand; *Skalfrugterne* firekantede.

3—4' høi. Blomsterkurvene meget store. 7—8. 4.

Paa fugtig Grund omkring Landsbyer o. a. heboede Steder, hist og her i alle Provindser, hyppigst paa *Loll.-Falster!* Paa de fleste Steder formodenlig forvildet fra Dyrkning i ældre Tid som en anseet Lægeplante, dog er den funden i *Sj.* paa Stignæs ved Skjelskør (14) og *J.* paa Kalkbakker S. for Haraldskjær (9), som det synes vildvoxende. *

39. **Solidago. Gyldenriis.**

1102. **S. Virga aurea** L. (Almindelig G.) H. 862; Drej. n. 833; F. D. 663; Rchb. l. c. XVI, tab. 911.

Bladene elliptiske eller lancetformede, nedentil afsmalnede i en vinget Bladstilk, de nedre saugtakke, de øvre ofte heelrandede; *Blomsterkurvene* paa længere eller kortere Grene fra Bladbjørnerne, danne en forlænget, enkelt eller sammensat Klase med oprette *Grene*.

Planten næsten glat. Var. i Henseende til Høiden, Bladenes Brede og Grenenes Længde o. s. v. 7—9. 4.

I Kratskove, paa udyrkede Bakker, Diger o. s. v. i de fleste Egne af Landet alm., sjældnere i det sydvestl. *Sj.* (17) og *Loll.-Falst.*

† *S. canadensis* L. Bladene smalt lancetformede, heelrandede, Blomsterstanden en Top, sammensat af bueformigt udstaaende, enlige Klaser; Kurvene mindre.

Forvildet fra Haver, f. Ex. i Charlottenlund! *F.* Svendborg (19).

40. *Erigeron*. Bakkestjerne.

† 1103. *E. canadensis* L. (Kanadisk B.) H. 852; Drej. p. 269; *F. D.* 1274; *Rehb.* l. c. XVI, tab. 917.

Stængelen stivhaaret-ru; *Bladene* linie-lancetformede, stivhaarede, især i Randen; *Rodbladene* noget bredere foroven, i Spidsen svagt tandede; *Blomsterstanden* en forlænget Top, sammensat af mangeblomstrede Klaser paa oprette *Grene*; *Kurvbladene* glatte, i Spidsen randhaaret-saugtakkede.

Stængelen grøn. Kurvene meget mindre, men talrigere end hos følg. Straalekronerne hvidgule. 7—8. ☉.

Oprindelig indført fra Nordamerika, forekommer nu paa enkelte Steder som Ukrud, f. Ex. *Sj.* Helsingør (H.), Hellebæk! Christiansholm ved Kbhavn (Baagøe), Nestved (Dr.); *Falst.* Bregninge (Hansen); *Loll.* Stokkemærke (19); *Thorseng* ved Bregninge! *F.* Hofmangave (18), Svendborg (H.); *Sl.* Haderslev (16), Flensborg! Rendsborg (20). ☼

1104. *E. acris* L. (Bitter B.) H. 853; Drej. n. 835; *F. D.* 2595 (var.); *Rehb.* l. c. XVI, tab. 917.

Stængelen duunhaaret; *Bladene* linie-lancetformede, heelrandede, haarede; *Rodbladene* omvendt-ægformet-lancetformede; *Blomsterstanden* en enkelt eller lidet sammensat Klase; *Grenene* opret-aabne eller opstigende, med 1—3 Kurve; *Kurvdækket* graafiltet.

Stængelen alm. rødbruun. Straalekronerne lila, af Længde med eller lidet længere end Skivekronerne. 7—8. ☉ eller 4.

* *strictus*! Alle Bladene omvendt-ægformet-lancetformede; Grenene stivt oprette, danne en Halvskjærm; Kurvbladene

svagere haarede, hvorved deres violetbrune Farve bliver synlig (som hos Hovedarten næsten skjules af den tætte Filt).

Paa tørre, især sandige Marker, Bakker og Diger, alm. udbredt.
* paa Bastionerne mellem N. og Ø. Port ved Kjøbenhavn!

Anm. Maaskee hører Formen *, som ved gjentagne Udsædsforsøg i bot. Have har bevaret sit Udseende, til E. a. — serotinus Fr. mant. 3, 107, som er mig ubekjendt. — Fig i F. D. 874, som af Flere henføres til E. acris, hører efter Fr. og Lund (Christianias Fl. p. 21) ikke herhen, og har ogsaa kun liden Lighed med vor.

† *E. speciosus* [DC. Prodr. V, 284]. *Stenactis speciosa* Lindl. Bot. Reg. tab. 1577.

Stængelen opret, $1\frac{1}{2}$ —2' høj, glat eller foroven svagt haaret, *de nedre Blade* stilkede, spadeformet-linieformede, de mellemste og øvre siddende og halvt omfattende, tungeformet-lancetformede, alle heelrandede, fint randhaarede; *Blomsterstanden* en Halvskjærm, dannet af faae, store, før Udspringningen nikkende *Kurve*; Kurvbladene langt randhaarede, Randkronerne i meget stort Antal, linieformet-traadformede, lysviolette. 7—8. 4.

Forvildet i stor Mængde paa Gurre Slots Ruiner! (Oprindelig hjemmehørende i Californien).

41. Aster.

1105. **A. Tripolium** L. (Strand-A.) H. 861; Drej. n. 834; F. D. 615; Rehb. l. c. XVI, 907; L. Herb. IX, 169.

Bladene linie lancetformede, heelrandede eller svagt saugtakkert-rue, kjødfulde; *Blomsterstanden* halvskjærmformet, med oprette *Grene*; *Kurvbladene* budte, tiltrykte.

1—2' høj, hele Planten glat. Straalekronerne violette, Skivekronerne gule, tilsidst rødbrune. (Var. med hvide Straalekroner). 8—9. ☉.

Paa saltholdig Jordbund i Dynd, Leer og Slik, alm. ved Danmarks Kyster, især i Marskegnene. (Den hvidblomstrede Form er iagttaget ved Nyborg (Lund), Ribe (30).

1106. **A. salignus** [Willd. Sp. pl. 3, p. 2040] (Pilebladet A.) H. II, 251; F. D. 2475; H. N. XIII, 1.

Bladene lancetformede, fint saugtakkede, paa Overfladen henimod Randen rue; *Blomsterstanden* en Top med halvskjærm-

formede, opret-aabne *Grene*; *Kurvbladene* spidse, oventil udstaaende.

Straalekronerne lila eller hvide, Skivekronerne gule. 7—8. 4.

Forekommer forvildet, især omkring Haver og Byer, f. Ex. *Sj.* mellem Egelund og Fredensborg (Jørg.), Farumgaard (14)! Pesthuset ved Kjøbenhavn! ved Sorø Sø (12); *Falst.* Stubbekjøbing (19); *J.* Eng ved Nonmølle ved Viborg (Feddersen); *Sl.* Eiderens Nordbred ved Rendsborg (16). [✱]

Stenactis. Smalstraale.

† 1107. *S. annua* [N. Es. Ast. p. 273] (Enaarig *S.*) Rehb. l. c. XVI, tab. 912; *Aster annuus* L., H. 861; F. D. 486; *Stenactis bellidiflora* A. Braun, Lge. Haandb. 1 Udg. S. 488.

De nedre Blade elliptiske eller omvendt-ægformede, grovt, men fjernt saugtakkede, *de øvre* lancetformede, næsten heelerandede; *Blomsterstanden* halvskjærmformet.

Blade, *Grene* og Kurvdække haarede, Randkronerne smalt linieformede, hvide eller lila, Skivekronerne gule. 7—8. ☉.

Tilfældigt forvildet omkring Haver: *Sj.* Frydenlund (H.), Næsgaard ved Dronninggaard (14)! Flommen ved Sorø (Bredsd.); *Sl.* Gottorp (Hornem. Herb.). [✱]

42. *Doronicum. Gemserod.*

† 1108. *D. Pardalianches* L. (Hjertebladet *G*) Jacq. Fl. austr. t. 350; Rehb. l. c. XVI, tab. 955.

Rodstokken med krybende, i Spidsen knolleformigt opsvulmede Udløbere; *Bladene* hjerteformede, tandede; *Rodbladene* langstilkede, *de nedre Stængelblade* stilkede med øreformigt omskedende Bladstilk, *de øvre* siddende, omfattende; *Stængelen* med een eller faae Blomsterkurve i Spidsen; *Kurvbladene* sylformigt tilspidsede.

1½—2' høi. Planten haaret. Kronerne gule. 5—6. 4.

Oprindelig en Bjergplante, som nu forekommer forvildet paa flere Steder: *Sj.* Skjelskør (Nielsen), Plantagen ved Sorø Akademihave! Næsgaard ved Dronninggaard (19); *F.* Brobygaard (18); *J.* Bjørnkjær i Vendsyssel (Juel), Fusing Skov (Selmer), Lillerup ved Horsens (E. H. Lange), Bygholm (Jørg.); *Sl.* Gram (6), Nyværk ved Slesvig! [✱]

43. Senecio. Brandbæger.

a. Randkronerne rørformede eller tungeformede med tilbagerullet Krave.

1109. *S. vulgaris* L. (Almindelig B.) H. 857; Drej. n. 821; F. D. 513; Rchb. l. c. XVI, tab. 959.

Bladene halvfinnede eller fjersnitdeelte, *de øvre* med øreformet-omfattende Basis; *Afsnittene* tandede; *Blomsterkurvene* i en nikkende, alm. tætblomstret Halvskjærm; *Kurvbladene* i den *ydre Kreds* talrige, tiltrykte, stærkt brandplettede, meget kortere end *de indre*; alle *Kronerne* rørformede; *Skalfrugterne* tiltrykt-duunhaarede.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Bladene var. glindsende, næsten glatte og løst filthaarede. 3—10. ☉.

β , *radiatus* Koch (*S. denticulatus* F. D. 791)*. Randkronerne tungeformede.

Paa dyrket Jord, især i Haver og paa sandige Marker meget alm. β , i Strandsandet paa *Lolland* (F. D.); *J. Skagen* (Drej. Herb.), Sandklitter paa Øerne i Vesterhavet: *Fanø*, *Manø*, *Sylt* (N.)!

1110. *S. silvaticus* L. (Skov-B.) H. 858; Drej. n. 822; F. D. 869; Rchb. l. c. XVI, tab. 960.

Bladene fjersnitdeelte, med halvfinnede eller tandede *Afsnit*; *Blomsterkurvene* i en opret Halvskjærm; *de ydre Kurvblade* faae, tiltrykte, svagt brandplettede, meget kortere end *de indre*; *Randkronerne* tungeformede; *Skalfrugterne* tiltrykt-duunhaarede.

$\frac{1}{2}$ —2' høi. Stængelen, især oventil, og Bladene, især paa Underfladen, duunhaarede, ofte lidt klæbrige. Kurvene længere og smalere end hos foreg. 7—8. ☉.

*) Uagtet Fries (Mant. 3, 104) og Koch (Syn. II, 1026) henføre F. D. 791 til *S. silvaticus*, kan jeg dog ikke tiltræde denne Anskuelse, men maa, paa Grund af dens Mangel paa Haar og de talrige ydre Kurvblade, med Nolte (nov. p. 7) antage den for en Var. med Straalekroner af *S. vulgaris*. Former af denne sidste, som aldeles ligne den afbildede Fig. i Udseende (dog uden Straalekroner) fandt jeg i Strandsandet ved Rønne paa Bornh.

Paa tørre, aabne Steder i Skove, sandige Marker, Heder (især efterat Lyngen er afbrændt), ikke sjelden.

1111. **S. viscosus** L. (Klæbrig B.) H. 858; Drej. n. 823; F. D. 1230 (ikke god, ligner mere foreg.); Rchb. l. c. XVI, tab. 960.

Bladene fjersnitdeelte, med tandet halvfinnede *Afsnit*; *Blomsterstanden* en opret Halvskjærm; *de ydre Kurvblade* 6—8, udstaaende, svagt brandplettede, omtrent halvt saa lange som *de indre*; *Randkronerne* tungeformede; *Skalfrugterne* glatte.

1—1½' høi, klæbrig-kirtelhaaret. Kurvene større, men færre i Halvskjærmen end hos de foreg. 7—10. ☉.

Ved sandige Strandbredder, paa Ryddepladser, sløifede Steder omkring Byer, især paa sandig Grund, ikke alm.: *Bornh.* Hasle Skandse (20), Rønne, Christiansø (Baagøe); *Sj.* paa den sandige Havstok mellem Hornbæk og Helsingør almindelig! Snekkesteen (Grønlund), Birkerød (H.); i Kbhavn hyppig efter Ildebranden, nu sparsommere (f. Ex. omkring Universitetet). *Amager* ved Götchens Batteri (Dr), Bisserup (Drej. Herb.); *Falst.* Stubbekjøbing; *Loll.* mellem Krønge og Søholt (Rasm.); *Ærø* (10).

b. *Jacobæa* Moench. *Randkronerne* tungeformede, med fladt udstaaende Krave.

aa. *Bladene* fjersnitdeelte eller dybt halvfinnede.

† 1112. **S. vernalis** [Waldst. & Kit. pl. rar. Hung. I, p. 23, t. 24] (Vaar-B.) Rchb. l. c. XVI, tab. 959.

Rodbladene stilkede, omvendt-ægformede, bugtet grovt-tandede, *Stængelbladene* linie-lancetformede med øreformigt-omfattende Basis, bugtet-halvfinnede med ægformede, budte, kruset-tandede *Lapper*; *de ydre Kurvblade* 6—10, tiltrykte, stærkt brandplettede, omtr. 4 Gange kortere end *de indre*; *Skalfrugterne* tiltrykt-haarede, med hvid, blød, vedblivende *Fnok*.

½—1' høi. Stængel og Blade beklædte med kruset, spindelvævagtig hvid Uld. Ifølge Varigheden og Bladformen hører den nærmere til foreg. Afdeling, fra hvilken den adskilles ved større og udstaaende Randkroner. Kronerne gule. 5—6. ☉.

Dyrkede Marker i Landets sydligere Egne, sporadisk og formodenlig indført med fremmed Sæd: *Falst.* S. Kirkeby (Koch)! *Bornh.* Teign S. for Allinge, Bakkegaard i Ruthsker Sogn, Fævagten ved Rønne (Baagøe)! Almegaard i Knudsker Sogn (Hoff)! Nyker (Zahrtmann).

1113. **S. erucifolius** L. (Smalfliget B.) H. 859; F. D. 1885; Rehb. ic. crit. IV, tab. 516; H. N. I, 4.

Bladene fjersnitdeelte, med linieformede, i Randen tilbage-rullede, tandede eller (mere eller mindre dybt) halvfinnede *Afsnit*, det nedre Par *Afsnit* heelrandede, øreformigt omgivende *Stængelen*; *de ydre Kurvblade* flere, tiltrykte, omtrent halvt saa lange som *de indre*; alle *Skalfrugterne* haaret-rue, med vedblivende, mangestraalet *Fnok*.

Bladene paa Underfladen løst uldhaarede, var. betydeligt i Henseende til Indskjæringerne og dissers Brede. Kronerne gule. 8—9. 4.

Paa Græsmarker eg ved Veie, sporadisk og temmelig sjelden: **J.** Randrup og Viskum Ø. for Viborg (Morville); **Sl.** Angel, Gottorp Slotsvold, Dreisprung ved Husum (16), Nordstrand (N.), Fredriksstad, Süderstapel (F. Müll.); **F.** Seden (12), Gjørder mellem Hessum og Skeby! o. fl. Steder N. for Odense Fjord (4); **Langel.** Fuglsbølle; **Loll.** Veilø (19), Løitofte, Aalstrup, Christianssæde (14), Bjerremark, Grønnegade (5); **Bornh.** Ø. Larsker! ☞

1114. **S. Jacobæa** L. (Eng-B.) H. 859; F. D. 944; Rehb. ic. fl. germ. XVI, tab. 964; *Jacobæa vulgaris* Moench, Drej. n. 824.

Rodbladene og *de nedre Stængelblade* lyreformet-fjersnitdeelte, stilkede, *de øvre* fjersnitdeelte med aflang-lancetformede, tandede eller halvfinnede *Afsnit* og mangedeelte, omfattende Ører ved Grunden; *de ydre Kurvblade* 2—4, meget kortere end *de indre*; *Randblomsterne* med faastraalet, affaldende *Fnok* og glatte *Skalfrugter*; *Skiveblomsterne* med mangestraalet, vedblivende *Fnok*, duunhaarede *Skalfrugter*.

Bladene glatte eller ved Grunden hviduldede. Kronerne gule. 7—9. 4.

Paa Enge og ved Veigrøfter alm. udbredt.

1115. **S. aquaticus** [Huds. Fl. angl. 366] (Vand-B.) H. 860; F. D. 784; Rehb. l. c. XVI, tab. 965; H. N. III, 2; *Jacobæa aquatica* Drej. n. 825.

De nedre Blade stilkede, hele eller lyreformede med et ægformet, rundtakket eller tandet Endeafsnit, *de øvre* siddende eller kortstilkede, lyreformet-snitdeelte, med rundtakket-lappet

Endeafsnit, linieformede, skjæve, tandede Sideafsnit og øret-halvomfattende Basis; alle *Skalfrugterne* glatte; forøvrigt som foreg.

Halvskjærmens Grene mere slappe, Kurvene større, men færre og fjernere end hos foreg. Kronerne gule. 7—9. ☉. (4).

β, *pinnatifidus* Gren. & Godr. (*S. pratensis* Richt., Rehb. ic fl. germ. XVI, p. 38; *S. barbareaefolius* Rehb. l. c. tab. 965 (ikke Krock.). Høiere, med længere Grene; de nedre Blade lyreformet-fjersnitdeelte, de øvre dybt fjersnitdeelte.

Ved Sø- og Aabredder, Gadekjær, i fugtige Skove: alm. paa *Halvøen*, især den vestlige Deel, i det sydlige *Fyen* og paa *Øerne* (undt. Falster: 14); sparsommere i *Sjæll.* (især mod N og Ø.). β, paa flere Steder i *Lolland* (19); *Sl. Angel* (Frølich i Hornem. Herb.).

bb. *Alle Bladene hele, saugtakke.*

1116. *S. paludosus* L. (Kjær-B.) H. 860; F. D. 385; Rehb. l. c. XVI, tab. 974; H. N. II, 2; Jacobæa paludosa Drej. n. 826.

Bladene siddende, linie-lancetformede; *de ydre Kurvblade* omtrent 10, halvt saa lange som *de indre*; *Straaleblomsterne* 12—15; *Skalfrugterne* glatte eller svagt duunhaarede, med skidenguul *Fnok*.

Stængelen 4—6' høj, huul, uldhaaret; *Bladene* glatte eller paa Underfladen uldhaarede. Kronerne gule. 7—8. ♀.

I Aaer og Moser, sjelden i Danmark: *Sj.* en Aa ved Beldringe (Schum.); *J.* ved Langby Kro (Beck); *Sl. Eiderens* Nordbred ved Rendsborg! ☼

† 1117. *S. saracenicus* L. (Saracenisk B.) H. 861; F. D. 2059; Rehb. l. c. XVI, tab. 970; Jacobæa sarracenica Drej. p. 267; *S. salicetorum* Godr.

Bladene lancetformede, de øvre siddende, de nedre afsmalnede til en kort Bladstilk, ved Grunden beelrandede; *de ydre Kurvblade* omtr. 5, over halvt saa lange som *de indre*; *Straalekronerne* 7—8; *Skalfrugterne* glatte; *Fnokken* hvid.

Rodstokken krybende, Stængelen 3—5' høj, heel, tilligemed *Bladene* glat. Kronerne gule. 8—9. ♀.

Oprindelig indvandret, forekommer omkring Haver og dyrkede Steder: Sj. et Gjærde mellem Hillerød og Fredensborg! Dronninggaard (9, 14), Frederiksberg Have, Søndermarken (Dr.), ved Leersøen (19), Ledreborg (Thomsen), Gisselsfeld (Smith); S. Nyværk ved Slesvig (16). *

44. Cineraria. Fnokurt.

1118. *C. palustris* L. (Almindelig F.) H. 863; Drej. n. 827; F. D. 573; H. N. I, 5; Senecio palustris DC., Rchb. l. c. XVI, tab. 978.

Bladene lancetformede, i Randen bølgede, *de nedre* saugtakket-fligede, stilkede, *de øvre* heelrandede eller tandede, halvt omfattende; *Halvskjærmen* grenet; *Skalfrugterne* kantede, glatte.

Stængelen hunl, 2—4' høj, hele Planten klæbrig-haaret af leddede Haar. Kronerne gule. 6—7. ☉.

I Tørvmoser og dybe Kjær, alm. udbredt. *

1119. *C. campestris* [Retz. Prodr. fl. Scand. ed. I, p. 159] (Mark-F.) H. 863; F. D. 1177; *C. alpina* γ, L., Fr. H. N. I, 6; Senecio campestris DC., Rchb. l. c. XVI, tab. 978.

Rodbladene omvendt-ægformede eller lancetformet-ovale, rundbugtede eller næsten heelrandede, sammendragne til en kort Bladstilk; *Stængelbladene* lancetformede, svagt tandede, *de øvre* linie-lancetformede, heelrandede, siddende; *Halvskjærmens Grene* udeelte; *Skalfrugterne* stivhaarede.

$\frac{1}{3}$ —1' høj. Stængel og Blade i yngre Tilstand beklædte med en løs, hvid Filt, som let afgnides. Kronerne gule. 6—7. ♀.

Paa aabne Kalk- og Kridtbakker, kun funden paa *Halvøen*: Thy (16), Aalborg, Horsekjær Riis (H.), Mergelbakker ved Hodal Mølle pr. Hobro, Raasted Dalen ved Randers (16)! Randers (M. Vahl). *

45. Arnica. Volverlei.

1120. *A. montana* L. (Bjerg-V.) H. 866; Drej. n. 828; F. D. 63; Rchb. l. c. XVI, tab. 958.

Rodbladene oval-lancetformede eller omvendt-ægformede, med 2 stærke Nerver paa hver Side af Midtnerven, heelrandede eller bølgede i Randen; *Stængelbladene* modsatte, siddende; *Blomsterkurvene* store, enlige i Spidsen af den udeelte eller faagrenede *Stængel*; *Skalfrugterne* stivhaarede.

1—2' høi. Stængelen og Kurvbladene klæbrig-haarede af brune Kirtelhaar, som meddele Planten en stærk Lugt. Kronerne orange. 6—7. 4.

Paa Lyngheder, høie Enge, Skovbakker: paa *Halvøen* alm., i *Fyen* hist og her, aftagende i Hyppighed mod Ø.; i *Sjæll.* sjeldnere: Odsherred, Antvorskov (H), Hørsbørg ved Sorø! Landlyst (14), Hammermøllen o. fl. Steder ved Helsingør (21), Donze (28), Fredensborg, Rudergaard, Ballerup (H.), Jonstrup Vang (14), Bagsværd! (Paa *Bornh.*, *Loll.* og *Falst.* ikke bemærket. !*

III. Syngenesia frustranea.

46. Centaurea. Knopurt.

a. Skalfrugterne uden Fnok.

1121. **C. Jacea** L. (Almindelig K.) H. 878; Drej. n. 847; F. D. 519; Rehb. l. c. XV, tab. 754.

Bladene lancetformede eller linie-lancetformede, heelrandede, tandede eller ved Grunden øreformigt fligede; *Kurvbladene* med rundagtigt-ægformede, hule, bredt hindeagtige *Tilhængsler* i Spidsen; *Randblomsterne* kjønsløse, meget større end *Skiveblomsterne*.

Stængel og Blade haaret-rue. Kurvbladene lysere eller mørkere brune; Kronerne smukt violetrøde, sjeldnere hvide. 7—9. 4. Var. betydeligt i Henseende til Stængelens Forgrening, Bladformen, Beklædningen og Kurvbladenes Indskjæring. De vigtigste Former ere:

α, genuina. Alle Kurvbladenes Tilhængsler heelrandede eller uregelm. spaltede.

β, cuculligera Rehb. l. c. XV, tab. 754. Kurvbladenes Tilhængsler kappeformigt udhulede, næsten alle heelrandede.

* *fuscescens!* Tilhængslerne brune.

** *argyrolepis!* Tilhængslerne hvid - hindeagtige, sølvglindsende, Kronerne stundom hvide. (Ligner *C. alba* L.)

γ, lacera Koch. Tilhængslerne paa de indre Kurvblade uregelm. spaltede, paa de ydre regelm. fryndset-fligede; Bladene linieformede.

♂, *laciniata* M. T. Lange (Naturh. Foren. vid. Medd. 1861 p. 11). Bladene halvfinnet-fligede.

Paa høie Enge, udyrkede Steder, alm. udbredt. — β*, Østervold ved Kjøbenhavn! Sorø (12); ** *Sj.* Tikjøb! *J.* Aarhus (Mohr)! γ, *Falst.* Riserup (Koch); *Loll.* Søllested (19); ved Blykobbæaen paa *Bornholm!* *J.* Lille Vildmose ved Gudumlund! ♂, *F.* Ø. Skjerlinge (12).

1122. *C. decipiens* [Thuill. Fl. Paris. ed. 2, p. 445] (Mørkskjællet K.) *Rehb.* l. c. XV, tab. 759; *C. nigrescens* Gren. & Godr. fl. Fr. II, 241, DC. prodr. VI, 571, Lge. Haandb. 2 Udg. S. 563 (ikke Willd.); *C. Jacea* var. *capitata* Koch & Ziz.

Bladene lancetformede, heelrandede eller bugtet-tandede, *Kurvbladene* med rundagtigt-ægformede, sortbrune, fryndset-randhaarede *Tilhængsler*; *Fryndserne* omtrent af Længde med selve Tilhængslens Brede, de 2—3 øvre Kredse af Tilhængsler fjernede fra de øvrige; alle *Blomsterne* ♂; *Randkronerne* lidet større end *Skivekronerne*.

Stængel og Blade haaret-rue. Kronerne violetrøde. 7—8. 4.

Ved Gjærder, sjelden: *Sj.* S. for Lillehedinge i Stevns (1860)! *F.* Skaarup (19)! *

Anm. 1. Fra foreg. let kjendelig ved de sortbrune, mindre hule *Kurvblade* med længere *Fryndser*, ved alm. frugtbare *Randblomster*; fra *C. nigra* L. ved Mangel af *Fnok*, kortere *Fryndser* og de øvre *Kurvblades* større Afstand fra de nedre. Efter Koch forekommer den hyppigst med større *Straaleblomster* (*C. Jacea* ε, *commutata* Koch Syn.), dette er ikke Tilfældet med de af mig fundne Expl., som henhøre til den Form, der er kaldet *C. Jacea* var. *capitata* Koch & Ziz. Ifølge Prof. A. Brauns velvillige Meddelelse er den i Willdenows Herbarium opbevarede *C. nigrescens* den samme Plante, som senere er kaldet *C. transalpina* Schleich. og ikke, som jeg tidligere efter Decandolles, Grenier & Godrons Autoritet havde antaget, den her beskrevne Plante, hvorfor det tidligere anvendte Navn maa forandres.

Anm. 2. *C. nigra* L. (F. D. 996; *Rehb.* l. c. XV, tab. 761), som findes saavel i Norge som i det sydligere Europa, har hidtil ikke været angivet fra Danmark. Til en af denne Arts talrige Former hører dog muligviis den af M. T. Lange (Naturhist. Foren. vid. Medd. 1861, p. 11) under Navn af *C. Jacea* var. (?) beskrevne Form, som ifølge Beskrivelsen og navnlig paa Grund af de med en kort *Fnok* forsynede Frugter ikke synes at henhøre til nogen af de ovenfor beskrevne Arter. Den er funden ved Veien mellem Jellinge og Greis i *Jyll.* (12) og maa nærmere eftersøges.

b. Skalfrugterne fnokbærende.

1123. **C. phrygia** L. (Fjeret K.) H. 876; F. D. 520 (ikke god); Rchb. l. c. XV, tab. 764; H. N. XIII, 4; C. austriaca Willd.

Bladene elliptiske eller æg-lancetformede, heelrandede eller fjernt tandede; *Kurvbladene* ved Grunden lancetformede, med langt sylspidsede, tilbagekrummede, haarformigt-fryndsede *Tilhængsler*; *Fnokken* neppe $\frac{1}{3}$ af Skalfrugtens Længde.

Stængel og Blade korthaaret-rue. Kronerne rødviolette. 7—8. 4.

Ved Gjærder og i Kratskove: paa *Halvøen*, især dens sydlige og østlige Egne ikke sjelden! i *Fyen* sporadisk: Gremmelykke! Kjærsgaard (H.), Langensø (13), Hunderup ved Odense, Lykkesholm, Ringe (H.), V. Hæsing (24), Grønnerup! Svendborg (H.). I *Sjæll.* og paa de øvrige Øer mangler den. [s]

1124. **C. Scabiosa** L. (Stor K.) H. 878; Drej. n. 849; F. D. 1231; Rchb. l. c. XV, tab. 774.

Bladene enkelt eller dobbelt fjersnitdeelte, med lancetformede, tandede eller heelrandede *Afsnit*, der ofte ende i en bruskagtig Spids; *Kurvdækket* kugleformet; *de ydre Kurvblade* ægformede, fryndset-randhaarede, *de indre* æg-lancetformede, sortgrønne, med ægformede, sortbrune, børsteformigt-fligede *Tilhængsler*; *Fnokken* af Længde med Skalfrugten.

Kurvene større end hos de øvrige Arter. Kronerne violette, sjældnere hvide. Var. i Henseende til Beklædning. 7—9. 4.

I Krat, ved Gjærder og Veie, alm. i de fleste Egne af Landet.

1125. **C. Cyanus** L. (Kornblomst). H. 877; Drej. n. 848; F. D. 993; Rchb. l. c. XV, tab. 768.

Bladene lancet-linieformede, heelrandede eller med en enkelt Tand ved Grunden; *Kurvdækket* ægformet, med ægformede eller æg-lancetformede, foroven i Randen mørkbrune, børsteformigt saugtakke *Kurvblade*; *Fnokken* af Længde med Skalfrugten.

Stængel og Blade, især paa Underfladen, filtede. Kronerne himmelblaa (i Haver dyrkes stundom hvide, røde eller violette Afændringer). 6—7. ☉.

Alm. Ukrudsplante i Vintersæden.

† *C. montana* L. (Rchb. l. c. XV, tab. 771). *Stænglerne* oprette; *Bladene* lancetformede, nedløbende, løst fildede; *Blomsterkurvene* enlige med ægformede, i Randen sortbruunt-fryndsede *Kurvblade*, himmelblaa *Kroner*; *Fnokken* meget kortere end *Skalfrugten*. 6. 4.

Dyrkes hist og her som Siirplante i Haver, og er funden forvildet ved gl. Kongevei og Ryssensteens Bastioner ved Kjøbenhavn (Heiberg), Svenstrup! *F. Svindinge* (Leth).

† *Helianthus. Solsikke.*

† *H. tuberosus* L. (Jordæble). Rchb. l. c. XVI, tab. 940.

Bladene tilspidsede, saugtakke, rue, de nedre æg-hjerteformede, de øvre elliptiske; *Stængelen* foroven halvskjærmformigt grenet, med oprette *Blomsterkurve*.

Kronerne gule; spiselige Rodknoller. 10—11 (blomstrer sjældent hos os). 4.

Dyrkes i Haver som Surrogat for Kartofler.

Rudbeckia.

† *R. fulgida* [Ait. H. Kew. ed. I, 3, p. 251] Bot. mag. 1996.

Stængelen hvasshaaret, grenet eller udeelt; *Bladene* lancetformede eller elliptiske, heelrandede eller svagt tandede, stivhæret-rue; *Blomsterkurvene* enlige i Spidsen af *Stængelen* eller *Grenene*; *Kurvbladene* grønne, lidet kortere end de orangegule *Straalekroner*; *Skiveblomsterne* sortrøde, tæt samlede i Halvkugleform. 7—8. ☉.

Dyrkes stundom i Haver som Siirplante, indført fra Nordamerika. Funden i de senere Aar paa flere Steder i Landet: *J. Græsmarker* i Torslev Sogn (8)! *Viborg* (Feddersen), *Heder* ved *Hobro* (Joh. Mørch)! *Bornh.* (Hoff)!

IV. Syngenesia necessaria.

47. *Calendula. Morgenfrue.*

† 1126. *C. officinalis* L. (Læge-M.) H. 879; Rchb. ic. fl. germ. XV, tab. 890.

Rodbladene stilkede, omvendt-ægformede; *Stængelbladene* siddende, elliptisk-lancetformede, svagt tandede; *Skalfrugterne* halvmaaneformede, paa Ryggen tornet-knudrede.

Kronerne brandgule. 7—9. ☉.

Forekommer hist og her forvildet som Ukrud i og omkring Haver.

V. Syngenesia segregata.

48. Echinops. Tidselkugle.

1127. *E. sphærocephalus* L. (Fligbladet T.) H. 880; Drej. p. 272; F. D. 2179; Rehb. ic. fl. germ. XV, tab. 734.

Stængelen opret, trind, furet; *Bladene* halvfinnede, med tornet-tandede Flige; *Kurvne* lancetformede; *de ydre Kurvblade* talrige, børsteformede, halvt saa lange som *de indre*, lancetformede, børsteformet-randhaarede.

2—4' høi. Stængelen oventil tæt hvidfiltet; Bladene paa Overfladen klæbrigt-duunhaarede, paa Underfladen hvidfildede. Hovederne graaagtigt sølvglindsende. Kronerne blaae. 7—8. ♀.

Paa Marker og ved Veie, sjelden: *Sj.* Asnæs Skov ved Skovriderboligen (Smith), Snedinge, Holsteinborg (H.)! Glænø (17); *F.* Landeveien mellem Nyborg og Odense ved Birkende! *J.* Engelsholm (forvildet? 12). ☼

20^{de} Klasse. Gynandria (Hunbo).

1. Orden. Monandria (Enhannede).

Alle Slægterne i denne Orden (1—16) høre til N. F. Orchideæ: Blomsten dannet af et sexbladet Blomsterdække i 2 Kredse: i den ydre Kreds 3 ligestore Blade (de 2 sidestillede, det tredie nedadvendt, men ved Blomstens Dreining opadvendt), i den indre Kreds 2 ligestore, sidestillede Blade, det tredie opad- (ved Dreiningen nedad-) vendte (Læben) af forskjelligt Udseende fra de øvrige, ofte med en sporeformet Tilhængsel; 1 torummet Støvknep fasthæftet til Arret og ved denne Sammenvoxning dannende en Griffelstøtte; Støvet i Masser (1—2 i hvert Rum), ofte ved en stilkformet Basis (Støvholderen) befestede til en Kirtel; Arret ender ofte i et Næb mellem

Støvknappens Rum; Frugten undersædig Kapsel. (Blomsterne i Ax eller Klase).

A. Støvknappen heelt tilvoxet til Støvveien (1—2 Knoller fra Rodstokken).

a. Læben forsynet med en Spore.

aa. Støvknappens Rum ved Grunden sammenstødende, med et Næb mellem Rummene.

1. **Orchis** L. (part.). Læben fliget; Støvknappens Rum ved Grunden forenede i en fælles torummet Pung; Støvmasserne adskilte (med hver sin Støvholder); Knollerne udeelte eller haanddeelte.

2. **Anacamptis** Rich. Læben fliget; Støvknappens Rum ved Grunden forenede i en fælles enrummet Pung; Støvholderne ved Grunden sammenvoxne (Knollerne udeelte).

3. **Gymnadenia** R. Br. Læben fliget; Støvknappens Rum uden Pung; Støvholderne adskilte (Knollerne haanddeelte).

bb. Støvknappens Rum ved Grunden adskilte.

4. **Platanthera** Rich. Læben udeelt; Sporen lang, traadsmal; Støvknappens Rum uden Pung (Knollerne udeelte).

5. **Coeloglossum** Hartm. Læben fliget; Sporen kort, sækformet; Støvknappens Rum uden Pung (Knollerne haanddeelte).

b. Læben uden Spore.

6. **Hermidium** R. Br. Blomsterdækket klokkeformigt til-lukt; Læben fliget, ved Grunden stundom puklet (Antydning af en Spore); Frugtknuden snoet; Støvmasserne uden Pung, en kirtelformet Tilhængsel paa hver Side af Næbet (Knollerne udeelte).

7. **Ophrys** L. (part.) Blomsterdækkets Blade udstaaende; Læben fliget, lappet eller tandet; Frugtknuden ikke snoet; Støvmasserne hver indesluttede i sin Pung (Knollerne udeelte).

B. Støvknappen fri (kun med sin nedre Deel tilhæftet til Arret).

a. Læben med en Spore (Rodstokken uden Knoller, koralformig grenet).

8. **Epipogon** Gmel. (*Epipogium* Sw.). Blomsterdækket med opadvendt, i Midten dybt indskaaren (toledet) Læbe; Frugtknuden ikke snoet; Støvmasserne 2, udeelte, kornede, ved 2 forlængede Støvholdere befæstede til en fælles Kirtel. (Bladene skjælformede).

b. Læben uden Spore,

aa. i Midten dybt indskaaren (toledet). Rodstokken uden Knoller, Roden trævlet.

9. **Cephalanthëra** Rich. Frugtknuden stilkløs, snoet; Griffelstøtten uddragen; Støvmasserne til Grunden todeelte, kornede, uden Støvholder og Kirtel.

10. **Epipactis** Rich. Frugtknuden stilket, ikke snoet; Griffelstøtten kort, Læbens yderste Led ved Grunden puklet; Støvmasserne til Grunden todeelte, kornede, uden Støvholder befæstede til en fælles Kirtel.

bb. Læben uledet,

α, lappet eller fliget. Rodstokken koralformigt grenet eller krybende, med Trævlerødder, uden Knoller.

11. **Listëra** R. Br. Læben 2—3-fliget; Griffelstøtten forlænget ud over Støvknappen; Støvmasserne kølleformede, kornede, til Grunden todeelte, uden Støvholder befæstede til en fælles Kirtel (Bladene 2, modsatte, med udviklet Plade).

12. **Neottia** (L.) Læben tofliget; Griffelstøtten naaer ikke udover Støvknappen; Støvmasserne kølleformede, kornede, til Grunden todeelte, uden Støvholder befæstede til en fælles Kirtel (Bladene spredte, skjæl- eller skedformede, uden Plade).

13. **Corallorhiza** R. Br. Læben trelappet, ved Grunden sammenhængende med Blomsterdækkets 2 ydre Sideblade; Støvknappens Rum tværdeelte i 2 Smaarum, med 2 kuglerunde,

voxagtige Støvmasser i hvert Rum (Bladene spredte, skjælformede uden Plade).

β, Læben udeelt eller svagt tandet. Rodstokken med 1—3 Knoller.

14. *Spiránthes* Rich. Perigonbladene ved Grunden sammen-sluttende og dannende en ret Vinkel med Frugtknuden, i Spidsen tilbagebøiede; Læben nedadvendt, ved Grunden huul, i Spidsen rundtakket; Griffelstøtten kort, med 2 Tænder bagtil og en paa hver Side af Støvknappen; Støvknappen vedblivende, Støvmasserne kølleformede, kornede, dybt todeelte, uden Støvholder befæstede til en fælles Kirtel.

15. *Stúrmia* Rehb. Perigonbladene udstaaende, Læben opadvendt, beelrandet eller tandet; Griffelstøtten uddragen, bøiet, oventil tovinget; Støvknappen affaldende; Rummene adskilte, med 2 runde, voxagtige Støvmasser i hvert.

16. *Maláxis* Sw. (part.) Griffelstøtten kort, ret, med 2 Tænder foroven; Støvknappen vedblivende, Støvmasserne kølleformede, voxagtige, i Spidsen todeelte; forøvrigt som foreg.

2. Orden. *Hexandria* (*Sexhannede*).

17. *Aristolóchia* L. Blomsterdækket enkelt, sambladet, med skraat afskaaren Krave; Støvknapperne siddende, danne en sexlappet Krands omkring det straaleformede Ar; Frugten en sexrummet, mangefrøet, undersædig Kapsel (N. F. *Aristolochiææ*).

I. *Monandria*.

1. *Orchis*. Gjøgeurt.

a. Knollerne*) udeelte, kuglerunde eller ovale.

aa. Læben dybt treftiget, den midterste Flig tolappet, alm. med en Tand i Indskjæringen.

1128. *O. fusca* [Jacq. Fl. austr. 4, t. 307] (Storkronet G.)
O. purpurea Huds., Rehb. ic. Fl. germ. XIII—XIV, tab. 378;

*) Knollerne hos Slægten *Orchis* (o. fl. Slægter i denne Familie) 2: den ene fremskyder det indeværende Aars Stængel, den anden indeholder Knoppen til Blomsterstængelen for det følgende Aar.

O. militaris β , L., H. 885; Drej. n. 852; F. D. 1277; H. N. X, 61.

Bladene elliptiske; *Dækbladene* hindeagtige, mange Gange kortere end Frugtknuden; *de ydre Perigonblade* forneden sammenvoxne, foroven sammenstødende i Form af en Hjelm; *Læbens Sideflige* linieformede, udrandede eller takkede, *Midtfligen* omvendt-hjerteformet med afrundede, uregelmæssigt rundtakkede Lapper og en Tand i Indskjæringen; *Sporen* ikke halvt saa lang som Frugtknuden.

1—2' høi. Hjelmen mørk purpurrød med brune Punkter; Læben hvid eller lysrød med ophøiede, mørkrøde Punkter. 5—6. 4.

I Skove og Krat paa Kalkgrund meget sjelden: *Møen* i Mængde paa Store- og Lilleklint! *J.* Trelde Skov ved Fredericia (!)

1129. *O. ustulata* L. (Rulæbet G.) H. 885; Drej. n. 853; Rehb. ic. fl. germ. XIII—XIV, tab. 368; H. N. XV, 65; *Ophrys anthropophora* F. D. 103.

Bladene lancetformede; *Dækbladene* hindeagtige, over halvt saa lange som Frugtknuden; *de ydre Perigonblade* frie, foroven sammenstødende til en halvkugleformet Hjelm; *Læbens Sideflige* og den dybt kløvede *Midtfligs* Lapper linieformede, i Spidsen rundtakkede eller udrandede; *Sporen* $\frac{1}{3}$ af Frugtknudens Længde.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Axet tætblomstret, valseformet, Blomsterne meget mindre end hos foreg., Hjelmen mørk purpurrød, Læben hvid med fløielsagtigt ophøiede, purpurfarvede Punkter. 6—7. 4.

Paa høie Enge og Bakker, især paa Kalkgrund, sporadisk og temmelig sjelden: *J.* Engskræuter ved Aagaards Kalkbakker (16), Buderupholm (H.), Blegkilde ved Aalborg (Branth), Horsens (Jørg.); *F.* Hunderup (H.); *Sj.* en Klint ved Tudsenæs, Tiisvilde (H.), Skullerupholm (Weilbach), Herthadalen (Sommerfeldt), Alindelille (20), Søllerød, bag Flaskekroen, Kjøge Aas (Dr.), Gjorsløv (d'Origny), Præstø (H.), Rosenfeldt Teglværk (29), mellem Ravnstrup og Nestved (20), Herlufsholm (H.), Søllerød Skov ved Rude næved Fiurendal (22); *Møen* paa Aborrejserget o. fl. St.! *Falst.* ved Stubbekjøbing (25)! Bønuit (Koch); *Bornh.* Rønne, Aakirkeby, Bodilsker (20), Randklevn (8).

bb. Læben trelappet, med korte, brede Lapper, den midterste svagt udrandet.

1130. *O. Morio* L. (Grøntribet G.) H. 883; Drej. n. 855; F. D. 253 (slet); Rehb. l. c. tab. 363; H. N. I, 66.

Knollerne kuglerunde; *Bladene* lancetformede, *de nedre* udbredte, *de øvre* tiltrykte; *Dækbladene* farvede, af Længde med Frugtknuden; *de ydre* og 2 *indre Perigonblade* budte, sammenstødende foroven til en Hjelm; *Læbens Midtflig* svagt udrandet; *Sporen* vandret udstaaende eller opadbøiet, lidet kortere end Frugtknuden.

4—10" høi. Perigonbladene med grønne Aarer, carmoisinrøde eller violette, sjældnere hvide. 5—6. 4.

Paa høie Enge og udyrkede Marker, ikke sjelden, dog mindre hyppig end følg. og i adskillige Egne ikke bemærket: hyppigst i det sydl. og vestl. *Sjæll.* samt paa *Møen*.

1131. **O. mascula** L. (Tyndaxet G.) H. 884; Drej. n. 856; F. D. 457; Rchb. l. c. tab. 390.

Knollerne ovale; *Bladene* omvendt-ægformet-lancetformede; *Dækbladene* farvede; af Længde med Frugtknuden; *Blomsterdækkets ydre Sideblade* ægformede, spidse, foroven udadbøiede, det øvre budt eller spidst, længere end de af samme bedækkede 2 *indre Sideblade*; *Læbens Midtflig* udrandet (ofte med en Tand i Indskjæringen); *Sporen* vandret eller opadbøiet, lidet længere end Frugtknuden.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Bladene alm. brunnplettede; Perigonbladene violet-røde, uden grønne Aarer, Læben dybere lappet end hos foreg. Blomsterne have alm. en sødlig Lugt. 5—6. 4.

Paa høie Enge, i Skove og Krat, meget alm. (En Var. uden Spore funden paa *Loll.* ved Ourebygaard (Rosenørn Lehn)!

b. *Knollerne* aflange, hele eller i Spidsen

2—3-deelte.

1132. **O. sambucina** L. (Bredlæbet G.) H. 886; Drej. n. 854 (bis); F. D. 1232; Rchb. l. c. tab. 412; H. N. XIV, 65.

Bladene omvendt-ægformet-lancetformede; *Dækbladene* hindeagtigt farvede, *de nedre* bladagtige, fleernervede, længere end Frugtknuden og omtrent af Længde med Blomsterne; *de ydre Perigonblade* udstaaende; *Læben* svagt trelappet; *Sporen* nedadbøiet, af Længde med Frugtknuden.

4—10" høi. Var. med gule og violet-lysrøde Blomster. 5—6. 4.

Paa Bakker mellem Krat, sjelden: *J. Sønderskovgaards Krat* i Ø. Hanherred (16), Estruplund (3), Aarslev (H.), Brabrand Mark (2), Lyngbakker ved Agrie (13); *Sj.* en Høi ved Slagelse (H.), Vordingborg (11); *Bornh.* Hammershuus, Lindholms Klipper, Nexø, Vældensby (20)! Almegaard ved Rønne (Hjorth) o. fl. St. (Baagøe).

Ann. I flere Henseender, f. Ex. ved Dækbladene og især ved de snart hele, snart i Spidsen deelte Knoller danner denne Art en Overgang mellem foreg. og følg. Afdeling.

c. Knollerne dybt haanddeelte. (Dækbladene trefnervede, bladagtige, Sporen nedadrettet, kortere end Frugtknuden).

1133. *O. majalis* [Rchb. ic. crit. VI, p. 7, tab. 770] (Mai-G.) F. D. 2664; *O. latifolia* L., Fr. mant. 2, 53; H. 886 (part.); Dr. n. 855; Rchb. ic. fl. germ. XIII—IV, tab. 402.

Stængelen huul, 4—6-bladet; *Bladene* udstaaende, lancetformede eller elliptiske, med størst Brede paa Midten, *de øvre* naae omtrent til Axets Basis; *de nedre Dækblade* længere, *de øvre* kortere end Blomsterne; *Blomsterdækkets ydre Sideblade* opstigende; *Læben* omvendt-hjerteformet, trelappet, *Sidelapperne* rundtakkede, den midterste spids; *Støvmasserne* alm. bleggule.

Bladene alm. med mørkbrune Pletter. Blomsterne violet-røde sjældnere blegrøde eller hvide. $\frac{5}{2}$ — $\frac{6}{1}$. 4.

Paa fugtige Enge, ikke sjelden i Danmark, dog ikke i alle Egne lige almindelig. ☞

1134. *O. incarnata* L. [Fr. Mant. 3, 140] (Kjødfarvet G.) Drej. p. 275; F. D. 266 (*O. latifol.*) og 2476; Rchb. l. c. tab. 397—99; H. N. VII, 65—66; *O. angustifolia* W. & Gr., *O. latifolia* Rafn D. Fl. I, 376.

Stængelen huul, 4—6-bladet; *Bladene* opret-tiltrykte, sværdformet-lancetformede, med størst Brede ved Grunden og en kappeformigt sammentrukken Spidse, *de øvre* naae op over Axets Basis; alle *Dækbladene* længere end Blomsterne; *Blomsterdækkets ydre Sideblade* tilsidst (næsten parallelt) tilbagebøiede; *Læben* omvendt ægformet, utydeligt trelappet (med alm. nedbøiede Sidelapper); *Støvmasserne* alm. blaagrønne.

Bladene uplettede. Blomsterne kjødfarvede, sjældnere rødviolette eller hvide. Efter Doc. Didrichsens Iagttagelse ere begge Knollerne

i Blomstringstiden hos denne Art hvide, hos foreg. derimod den ældre Knol bruun (læderfarvet). 6 (blomstrer omtr. 8 Dage senere end foreg.) 4. Var. (ligesom foreg.) med smalere (α , *angustifolia*) eller bredere Blade (*latifolia* Fr. l. c.) og desuden:

β , *hæmatodes* Rchb. l. c. XIII—XIV, p. 51, tab. 398, med tæt og fint bruunplettede Blade, mørkere Blomster.

I dybe Moser med Hængedynd, paa fugtige Enge, ikke sjelden, og i mange Egne (f. Ex. omkring Kbhavn) hyppigere end foreg. Forekommer snart i Selskab med, snart adskilt fra biin. β , Lade-gaarden ved Kjøbenhavn (I. Vahl jun.)!

Ann. Saavel fordi begge Arterne variere bred- eller smalbladede, som fordi Navnene *O. angustifolia* og *latifolia* have været saa yderst forskjelligt anvendte, har jeg foretrukket de valgte Navne, som efter den kritiske Undersøgelse over disse Arter af Prof. Fries (l. c.), sml. med Fig. hos Rchb., ikke kunne være udsatte for Misforstaaelse. Arterne selv ere ofte vanskelige nok at adskille, og man finder (skjøndt sjældent) Former, der have Kjendetegn tilfælles med begge. En saadan Form er den ovenfor nævnte β , som endeel ligner den i det nordlige Skandinavien forekommende *O. cruenta* Müll. F. D. 876, hvilken af Rchb. (l. c.) ogsaa henregnes til *O. incarnata*.

1135. ***O. maculata*** L. (Plettet G.) H. 887; Drej. n. 856 (bis); F. D. 933; Rchb. l. c. tab. 407.

Stængelen heel, 6—10-bladet; *de nedre Blade* bredt, *de mellemste* smalt lancetformede, *de øvre* linieformede, det øverste ikke naaende Axets Basis; *Axet* tætblomstret; *de nedre Dækblade* af Længde med, *de øvre* kortere end Blomsterne; *Blomsterdækkets Blade* tilspidsede, *de ydre Sideblade* udstaaende; *Læben* flad, omvendt-nyreformet, tydeligt trelappet.

Bladene plettede. 6—7. 4. Var. betydeligt i Henseende til Høiden, Bladenes Brede og Blomsternes Farve (alm. blegt rosenrøde eller lila med mørkrøde Pletter og Striber).

β , *concolor*! Bladene uplettede; Blomsterdækket sneehvidt uden Pletter.

I Skove, Tørv- og Hedemoser, paa Lyngbakker o. s. v., meget alm. — β , ved Aborre Sø paa Møen! Sj. Græsvænget ved Skjelskør (Nielsen); J. Nørup ved Veile (30).

2. *Anacamptis*. **Horndrager.**

1136. ***A. pyramidalis*** [Rich. Mem. mus. d'hist. nat. 4, p. 55] (Pyramideaxet H.) Rchb. l. c. tab. 351; Orchis L., H. 883; Drej. n. 854; F. D. 2113; H. N. VI, 57.

Knollerne 2, rundagtige, udeelte; *Bladene* lancet-linieformede, *de øvre* skedeformigt sammenrullede; *Axet* tæt blomstret; *Dækbladene* farvede; *Læben* trelappet med 2 Folder ved Grunden og heelrandede Lapper; *Sporen* traadformet, af Længde med eller længere end Frugtknuden.

8—15" høi. De fleste Blade ere visnede naar Blomstringen begynder. Blomsterne smukt og mørkt purpurrøde. 7. 4.

I aabne Skove paa Kalkgrund, sjelden: *Møen* paa Storeklint! Aborrebjerg! Krat ved Kjølby (Mørch); *Sj.* Alindelille Fredskov! ☛

3. *Gymnadenia*. Traadspore.

1137. *G. conopsea* [R. Br. i H. Kew. ed. 2, V, 191] (Langaxet T.) Drej. n. 857; Rehb. l. c. tab. 422; H. N. IX, 67; Orchis L., H. 888; F. D. 224.

Knollerne 2, haandformigt deelte; *Bladene* linie-lancetformede; *Axet* valseformet, forlænget; *de ydre Perigonblade* udstaaende; *Læben* trelappet med budte, ligestore Lapper; *Sporen* traadformet, spids, bøiet, næsten dobbelt saa lang som Frugtknuden.

1—1½" høi. Blomsterne mørk rosenrøde. $\frac{6}{2}$ — $\frac{7}{1}$.

Paa Enge: sporadisk paa Øerne, hyppigst paa *Bornh.* (20) og i det *nordlige Fyen* (4); paa *Halvøen* sjeldnere: *J.* Teglgaards-holm mellem Varde og Henne (H.).

1138. *G. albida* [Rich. l. c. p. 57] (Hvid T.) Rehb. l. c. tab. 419; H. N. XIV, 66; Satyrium L., H. 890; F. D. 115; Habenaria R. Br., Drej. n. 862.

Knollerne til Grunden deelte i tyndt kegleformede Trævler (som giver Udseende af en knippeformet Trævlerod); *de nedre Blade* omvendt-ægformede, *de øvre* lancetformede; *Axet* valseformet; *de ydre Perigonblade* sammenluttende til en rundagtig Hjelm; *Læben* dybt trefliget, den midterste Flig størst; *Sporen* budt, ret eller svagt bøiet, 3 Gange kortere end Frugtknuden.

6—10" høi. Axet næsten ensidigt; Blomsterne hvidgule. 7. 4.

Paa Bakker og tørre Enge, sporadisk og temmelig sjelden, især paa Øerne: *J.* Lindenberg, Torslev (H.), mellem Thostrup og Tovestrup, Eveldrup (Dr.), V. Velling, Meilgaard, Grenaa, Kalø (H.), Donneruplund! Fredericia (H.), Bakker S. for Kolding Aa (7); *Sl.* Arrild

Hede (20), Brecklum (F. Müll.), Schauendal og Lyngheder nær Mølle-dammen ved Husum (16); *Sj.* Bakker mellem Hjortekjærshuset og Nymølle! Brede (Dr.); *Bornh.* Rytterknægten (Lotze), Bodilsker (20), Klemensker (19)!

4. *Platanthera*. Fladknap.

1139. *P. solstitialis* [Drej. l. c. n. 850, cf. Krøyt. Tidskr. IV, p. 45] (Vellugtende F.) Rehb. l. c. p. 120; *P. bifolia* Rich. (part.), H. N. VI, 62; *Orchis bifolia* H. 882 (part.); F. D. 235.

Knollerne udeelte, elliptiske eller kegleformede; ovenfor de 2—3 *nedre* skedeformede *Blade* (uden *Plade*) 2 tætsiddende, tilsyneladende modsatte *Blade* med lancetformet-omvendt-ægformet *Plade*, de 2—4 derpaa følgende spredte, meget mindre, linie-lancetformede; *Sporen* traadformet, meget længere end *Frugtknuden*; *Støvknappens Rum* parallelle; »*de gølge Støvdragere* kugleformet-nyreformede«.

8—12" høi. Blomsterne vellugtende. De ydre *Perigonblade* hvide, de indre (tilligemed *Læben* og *Sporen*) i *Spidsen* grøngule. 6—7. 4. Drej. (Krøyt. Tidskr. l. c.) adskiller følgende *Former*:

α, latiflora (F. D. 2360; Rehb. l. c. tab. 428 (*laxiflora*)). *Blomsterdækkets* 2 indre *Sideblade* tilspidsede, opstigende og i *Spidsen* sammenstødende; *Griffelstøtten* foroven afrundet.

β, densiflora (F. D. 2361 a—h; Rehb. l. c. tab. 428, fig. 2 og 429, fig. 4; *P. brachyglossa* Rehb. ic. crit. IX, tab. 1144). De to indre *Sideblade* budte, i *Spidsen* sammenstødende; *Griffelstøtten* afstumpet eller udrandet.

γ, patula F. D. 2361 i. De to *Sideblade* budte, *frastaaende*; *Griffelstøtten* budt.

Paa *Bakker* og høie *Enge*, findes i alle *Provindser*, hyppigst paa *Halvøen*, i *Fyen*, paa *Møen* og *Bornh.*, sparsommere i det *vestl. Sjæll.*, paa *Loll* og *Falster*. *Formen β*, synes at være den almindeligste; *α*, sjældnere, f. Ex. *Sj.* *Kjøbenhavns Omegn* (Drej.), *Jonstrup Vang* (14), *Gyrstinge* (19); *γ, Sj.* ved *Flaskekroen* (Drej.).

1140. *P. chlorantha* [Custor i Rehb. Mössl. Handb. 2, p. 1565] (Grønlig F.) Drej. n. 851; F. D. 2362; H. N. VI, 61; *P. montana* Rehb. l. c. tab. 430; *Orchis bifolia* Crantz et plur. autt. (part.).

Sporen traadformet, i Spidsen fladtrykt-kølleformet, omtrent dobbelt saa lang som Frugtknuden; *Støvknappens Rum* forneden divergerende; »de gølge *Støvdragere* store, omvendt-ægformede«; forøvrigt som foreg.

10—15" høi. Blomsterne mindre tætsiddende, men større end hos foreg., af svagere Lugt (idetmindste om Dagen), deres Farve som foreg., men ved den store Saftplet (Arrets frie Deel) have de et mere grønligt Udseende. 6—7. 4.

Paa Enge og mellem Krat, ikke sjelden, og i *Sjæll.* hyppigere end foreg.

Anm. Navnet *O. bifolia* L. indbefatter begge Arter og kan derfor ikke citeres som Synonym til nogen af dem. Det Samme gjælder om Navnet *Platanthera bif.* Rich., der alm. anvendes paa den første Art. For denne har jeg derfor beholdt det Navn, som af Drej. er tillagt den i den ovenfor citerede klare og udførlige Afhandling, i hvilken en nøjagtig Beskrivelse og Synonymik af de 2 Arter er givet. Det af G. Rehb. for *P. chlorantha* forestrukne Navn *P. montana* (efter *Orchis montana* Schmidt) er ikke heldigt, da denne Art netop hyppigst findes paa Enge, hiin paa Bakker.

5. Coeloglossum. Poselæbe.

1141. *C. viride* [Hartm. Skand. Fl. ed. I, p. 329] (Grøn P.) H. N. XV, 66; *Satyrium* L., H. 890; F. D. 77; *Himantoglossum* Drej. n. 858; *Platanthera* Lindl., Rehb. l. c. tab. 434.

Knollerne dybt haanddeelte; *Bladene* elliptiske eller lancetformede; *Perigonbladene* budte, sammenstødende til en Hjelm; *Læben* linieformet, tretandet, den midterste Tand meget kort.

4—10" høi. Blomsterne skident guulgrønne med rødtligt Anstrøg. 6—7. 4.

Paa høie Enge og græsklædte Skrænter, sporadisk og sjelden: *J. Ørsted* (3), *Brabrand* (Viborg); *Sj.* en Klint ved Tudsenæs (H.), *Charlottenlund* (Kyll.); *Falst.* ved Stubbekjøbing (25)! *Bornh.* ved Rønne (20).

6. Herminium. Pukkellæbe.

1142. *H. Monorchis* [R. Br. l. c. p. 191] (Grøn P.) Drej. n. 859; Rehb. l. c. tab. 415; H. N. XI, 66; *Ophrys* L., H. 895; F. D. 102.

Knollen kugleformet; *Bladene* lancetformede; *Æxet* linieformet; *de indre Perigonblade* ved Grunden svagt trelappede; *Læben* dybt tæstet, *Fligene* linieformede, den midterste størst.

3—6" høi. De nye Knoller (1—2) dannes i Spidsen af vandrete Udløbere, fjernede fra Moderknollen, og meget mindre end denne. Alm. 2 større Blade nedenfor Midten og 1—2 mindre højere oppe paa Stængelen. Blomsterne grønne. 6—7. 4.

I Enge og Moser: funden i alle danske Provindser, men sporadisk og ikke alm., forekommer sjældnere paa Bakker (f. Ex. Møens Klint!).

7. Ophrys. Flueblomst.

1143. **O. Myodes** L. (Bruunlæbet F.) H. 896; Drej. n. 860; F. D. 1398; H. N. XV, 67; *O. muscifera* Huds., Rechb. l. c. tab. 447.

Knollerne 2, kugleformede; *Bladene* oval-lancetformede; *Æret* forlænget, fjernblomstret; de 3 *ydre Perigonblade* ovale, de 2 *indre* kortere, linieformet-traadformede; *Læben* trekløvet, med linieformede *Sideflige* og tolappet *Midtflig*.

1—1½' høi. Læben mørk brunrød, fløielshaaret, med Undertagelse af en glat, firekantet, blaaagtig Plet i Midten. Blomsterne have i Form Lighed med Fluier (ligesom overhovedet Blomsten hos flere Arter af denne Familie ligner Insekter). Planten bliver sort ved Tørring. 6. 4.

I aabne Skove paa Kalkgrund: kun funden i Alindelille Fredskov i *Sjæll.*, hvor den voxer i Mængde.

8. Epipogon. Knælæbe.

1144. **E. aphyllum** [Swartz Sv. bot. 512, Epipogium] (Bladløs K.) Rechb. l. c. tab. 468; H. N. XV, 68; *Satyrium Epipogium* L., H. 892; *Limodorum Epipogium* Sw., F. D. 1233 og 1399; *Epipogium Gmelini* Rich., Drej. n. 875 (*Epigogium*).

Rodstokken koralformigt grenet, ofte med lange, traadfine Udløbere; *Stængelen* ved Leddene omgivet af korte *Bladskeder* uden Plade; forøvrigt bladløs; *Klasen* faablomstret; *Blomsterne* hængende, hvorved *Sporen* bliver opadvendt; de *ydre* og 2 *indre Perigonblade* linie-lancetformede, næsten ligelange; *Læben* trelappet, de to Sidelapper afrundede, den midterste spids, hjerteformet, rundtakket, med 2 Rækker takkede Vorter langs nedad hver Side; *Frugtknuden* næsten kugleformet.

Planten af en lysbrun, gjennemsigtig Farve. Blomsterne have en stærk Lugt. Læben bleg med violette Pletter, de øvrige Perigonblade bleggule. 8. 4.

I skyggefulde Skove paa raadent Træ, meget sjelden: *Sj.* Gyrstinge Skov (Albrecht); *Møens* Klint (4, 9, 28)! Synes ikke at komme til Udvikling i alle Aar. [*

9. Cephalanthera. Skovlilie.

a. Blomsterne røde, Frugtknuden duunhaaret.

1145. *C. rubra* [Rich. Ann. Mus. IV, p. 60] (Rød S.) Drej. n. 864; Rechb. l. c. tab. 464; Serapias L., H. 901; F. D. 345; Epipactis All., H. N. VIII, 66.

Bladene sværdformet-lancetformede; *Dækbladene* længere end Frugtknuden; alle *Perigonbladene* spidse; *Læbens yderste Led* ægformet, tilspidset.

1' høi. Blomsterne rosenrøde, Læben hvidgul med ophøiede Striber. $\frac{6}{2}$ —7. 4.

I Skove paa Kalkgrund, sjelden: *Møens* Storeklint alm.! *Sj.* Alindelille Fredskov! Gyrstinge Skov (Albr.)! Braaby Vesterskov og Tuel Skov ved Sorø (7); *J.* Buderupholm (Beck); *Sl.* Graasteen (Freuchen).

b. Blomsterne hvide, Frugtknuden glat.

1146. *C. grandiflora* [Bab. Man. p. 296] (Hvidgul S.) H. N. XIV, 70; Serapias grandiflora L. (part.) Scop., H. 900; Epipactis pallens Sw., F. D. 1400; Cephalanthera pallens Rich., Drej. n. 865; Lge. Haandb. 1 Udg. n. 1097; *C. Lonchophyllum* Rechb. l. c. tab. 471.

Bladene ellipiske eller ægformede; *Dækbladene* længere end Frugtknuden; alle *Perigonbladene* budte; *Læbens ydre Led* æg-hjerteformet.

1' høi. Blomsterne hvide, Læben med gule, ophøiede Striber. $6-\frac{7}{1}$. 4.

I Skove paa Kalkgrund, sjelden: *Møens* Klint i Mængde! *Sj.* Kjøge Aas (9), Ledreborg Dyrehave (15), Alindelille Fredskov! Gyrstinge, Braaby Vesterskov (7). [†]

1147. *C. ensifolia* [Rich. l. c.] (Sværdbladet S.) Drej. n. 866; H. N. XIV, 69; Epipactis Sw., Serapias Sm., H. 900; *S. grandiflora* F. D. 506; *Ceph. Xiphophyllum* Rechb. l. c. tab. 470.

Bladene sværdformet-lancetformede, *de øvre* linieformede; *Dækbladene* (undtagen de 1—2 nederste) meget kortere end *Frugtknuden*; *de ydre Perigonblade* spidse, *de indre* budte; *Læbens yderste Led* budt, af større Brede end Længde.

1' høi. Blomsterne sneehvide med en gul Plet i Spidsen af Læben. $\frac{5}{2}$ — $\frac{7}{1}$. 4.

I Skove, temmelig sjelden: *Bornh.* Hollændergaarden i Olsker Sogn (Baagø), Almindingen (20), Almegaard ved Rønne (Hjorth); *Sj.* Udby (Badstüb.), Valø, Kjøge Aas (9), Aldershvile, Gjels Skov, Dronninggaard (H.), Alindelille og Kastrup Skove (20)! Alsted Skov, Glumsø Østerskov! Dragerup Skov ved Holbæk (15); *F.* Hverringe (H.), Hallenskov ved Svendborg (11), Kogtved (E. C. Kragh)!

10. Epipactis. Huullæbe.

a. Læbens yderste Led budt, med en enkelt Pukkel ved Grunden; det inderste Led tovinget. Krybende Udløbere fra Rodstokken. (*Arthrochilium* Irm.)

1148. *E. palustris* [Crantz Stirp. austr. 462] (Sump-H.) Drej. n. 870; Rchb. l. c. tab. 483; H. N. XIV, 68; Serapias Scop., H. 899; *S. longifolia* L.; *Helleborine latifolia* F. D. 267.

De nedre Blade bredt, *de øvre* smalt lancetformede; *Blomsterne* nikkende; *de ydre Perigonblade* æg-lancetformede; *Læbens ydre Led* hjerteformet eller nyreformet, rundtakket; *Frugtknuden* duunhaaret.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. De ydre Perigonblade blegbrune, de indre og Læbens inderste Led hvide med røde Striber, det ydre Led hvidt. 7. 4.

I vaade Enge og Moser, forekommer hist og her i alle danske Provindser.

b. Læbens ydre Led spidst, med en Pukkel paa hver Side forneden, det inderste Led uvinget. Udløbere 0. (*Euepipactis* Irm.)

1149. *E. latifolia* [All. Fl. ped. 2, p. 152] (Bredbladet H.) Drej. n. 871; H. N. XIV, 67; Serapias L., H. 898; *Epipactis Helleborine* 4 *viridans* Crantz, Rchb. l. c. tab. 488.

*Bladene**) bredt ægformede, spidse, langs Nerverne flint

*) Da Bladene hos Arterne i denne Slægt ere meget forskellige i Farve, Størrelse og indbyrdes Afstand paa forskjellig Høide af

duunhaaret-rue, tætsiddende (omtrent 2—3 Gange længere end Ledstykket ovenfor samme); *Klasen* tætblomstret, alsidig, *Blomsterne* under og efter Blomstringen udstaaende; *Perigonbladene* spidse, aabne, længere end den klæbrigt duunhaarede *Frugtknude*; *Læbens yderste Led* bredt hjerteformet, tilbagebøiet, dets *Pukler* jævne, i Gjennemsnit rundagtige.

1—2' høi. Stængelen opadtil klæbrig-haaret. Bladene mørkgrønne (de nedre omskedende uden Plade, de øvre æg-lancetformede). Blomsterne grønne, alm. indvendig skident violetrøde. $\frac{7}{2}$ —8. 4.

I Skove, ved levende Hegn o. a. skyggefulde Steder: alm. paa *Halvøens* Østkyst, i det sydl. *Fyen* og paa *Øerne*, sparsommere i *Sjæll.*

1150. **E. microphylla** [Swartz Vet. Ac. Handl. 1800 p. 232] Serapias Ehrh.; *S. latifolia* F. D. 811; Epipactis Helleborine 1, *microphylla* og 3, *varians* (viridiflora Irm.) Rchb. l. c. tab. 484 og 487.

Bladene ægformede eller elliptiske, tilspidsede, glatte, fjernt-siddende (af Længde med eller $\frac{1}{2}$ —1 Gang længere end Ledstykket ovenfor); *Klasen* ensidig, faablomstret; *Blomsterne* efter Blomstringen nedhængende; *Perigonbladene* tilspidsede, lukkede, kortere end den glatte *Frugtknude*; *Læbens yderste Led* æghjerteformet, tilspidset, dets *Pukler* i Gjennemsnit kantet-krusede.

1—1 $\frac{1}{2}$ ' høi. Hele Planten næsten glat. Foruden de angivne Mærker let kjendelig fra foreg. ved spædere Væxt, smalere og friskgrønne Blade. Blomsterne har jeg stedse fundet grønne eller med et svagt rødligt Anstrøg; Læben i Randen hvidagtig. $\frac{7}{2}$ —8. 4.

I skyggefulde og fugtige Løvskove: i *Sjæll.* hist og her og i mange Egne hyppigere end foreg.; i de andre Provindser sparsommere: *Møens* Klinteskov (14); *Falst.* Guldborg (19), Hanenov Skov (Koch); *Loll.* Sæbyholm o. fl. St. (19); *F.* Skaarup, Svendborg (19), Faaborg (12), Vissenberg! *Bornh.* i Almindingen ved Gamleborg! *J.* Rugtved i Vendsyssel (12), Ø. Velling, Randers (Drej. Herb.), Urup ved Horsens (2); *Sl.* Veerriis ved Rylskov (12).

1151. **E. atrorubens** [Hoffm. Bot. Tasch. 1801, p. 182, under Serap. latif.] (Rødblomstret H.) Drej. n. 872; *E. rubiginosa* Gaud., Koch Syn. II, 801; *E. media* Fr. mant. 2, p. 54;

Stængelen, er her stedse, naar ikke andet udtrykkelig er nævnt, Tale om de midterste og meest fuldkomment udviklede Blade.

H. N. VIII, 65; E. Helleborine 2, rubiginosa Crtz., Rehb. l. c. tab. 485; Serapias microphylla H. 899; S. latifolia-atrorubens H. II, 260; F. D. 1938.

Bladene æg-lancetformede eller elliptiske, tilspidsede, sværdformigt tilbagebøiede, langs Nerverne finthaaret-rue, tætsiddende (3—5 Gange længere end Ledstykket ovenfor); *Klasen* ensidig, tætblomstret; *Blomsterne* opret-udstaaende, efter Blomstringen nikkende; *de ydre Perigonblade* aabne, tilspidsede, duunhaarede; *Løbens yderste Led* omvendt-nyreformet, meget kort tilspidset, med tilbagebøiet Spids, dets *Pukler* i Gjennemsnit kantet-krusede; *Frugtknuden* klæbrig-duunhaaret.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Rodtrævlerne tæthaarede. Stængelen foroven ligesom Blomsterstilkene klæbrigt haarede, Bladene mørkt og noget brunagtigt grønne. Blomsterne smukt og mørkt rosenrøde. $\frac{6}{2}$ —7. 4.

I Skove paa Kalkgrund: *Møens* Klint meget alm.! Saavidt mig bekendt, det eneste Voxested i Danmark.

Anm. Fries anfører (l. c.) Afændringer (α) med hvide og (β) med grønne Blomster. Disse ere mig ubekjendte; men skjøndt denne Art altsaa, ligesom de foreg., kan forekomme af forskjellig Farve, har dog enhver Art (idetmindste i vor Flora) en typisk Grundfarve, nemlig hos denne mørk rosenrød, hos foreg. grøn og hos næstforeg. skident violet, hvorfor Navnet *atrorubens* synes mig meget passende, og det er derfor her beholdt, saa meget mere som det er det ældste (om end som Varietetsnavn). Flere Botanikere, og senest Irmisch (Linnæa XVI, 449; smk. Rehb. l. c. p. 141—44) have forenet den med *E. latifolia*. Jeg har i vor Flora stedse fundet dem vel adskilte, f. Ex. ogsaa ved forskjellig Blomstringstid, og jeg har derfor vedligeholdt Adskillelsen. Jeg anseer det for saare vanskeligt og ofte beroende paa Godtbeholdende, at afgjøre, hvorvidt en Plante skal ansees for en Art eller en constant Underart, og troer det derfor rigtigere i en Localflora at adskille end at forene for meget. *E. microphylla*, som tidligere af Irmisch (l. c.) ligeledes forenedes med *E. latifolia*, ansees nu af samme Forf. (Beitr. z. Biol. u. Morphol. de Orch.) for en god Art, adskilt foruden de øvrige Kjendetegn ogsaa derved, at den fremskyder lutter blomsterbærende, og ikke, som de 2 andre Arter, tillige blomsterløse Stængler.

11. Listera. Fliglæbe.

1152. *L. ovata* [R. Br. l. c. p. 201] (Ægbladet F.) Drej. n. 868; Rehb. l. c. tab. 479; Ophrys L., H. 893; F. D. 137.

Rodstokken krybende, med talrige spredte Trævlerødder; *Skaftet* opret, med 2—3 Bladskeder ved Grunden og 1 Par

modsatte, ovale eller ægformede *Blade* nedenfor Midten af Stængelen; *Klasen* forlænget, mangeblomstret; *Perigonbladene* hjælformigt sammensluttende, *de ydre* ægformede, spidse, *de 2 indre* linieformede; *Læben* tokløvet (uden Sideflige), med udeelte, linieformede, næsten parallelle *Lapper*.

Stængelen 1—1½' høi, foroven duunhaaret; Blomsterne grønne med gulgrøn Læbe, lugte svagt af Moskus. 5—6. 4.

I sumpige Skove, paa Enge mellem Krat, ikke sjelden.

1153. **L. cordata** [R. Br. l. c.] (Hjertebladet F.) Drej. n. 869; Rchb. l. c. tab. 480; Ophrys L., H. 894; F. D. 1278.

Bladene hjerteformede, omtrent paa Midten af Stængelen; *Klasen* kort, faablomstret; *Perigonbladene* aabne, *de 3 ydre* ægformede, *de 2 indre* budte, linieformet-ovale; *Læben* trefliget med korte, opadbøiede, linieformede *Sideflige*, den midterste Flig tokløvet med linieformede, divergerende *Lapper*; forøvrigt som foreg.

4—6" høi. Stængelen glat. Blomsterne brunlig-grønne eller kobberfarvede. 5—6. 4.

I Skove, især Naaleskove, meget sjelden: *J.* Stagsted Skov i Vendsyssel (Branth), Gjesing N. for Aarhus (Lyngby); *Sj.* Hornbæks Plantage (17!), Frederiksberg Have (M. Vahl, nu forsvunden).

12. Neottia. Fuglerede.

1154. **N. Nidus avis** [Rich. l. c.] (Gulbruun F.) Drej. n. 867; Rchb. l. c. tab. 473; Ophrys L., H. 892; F. D. 181.

Rodtrævlerne talrige, korte, knippeformigt sammenslyngede; *Stængelen* beklædt med brune Skeder uden Plade, forøvrigt bladløs; *Klasen* mangeblomstret; *Blomsterstilkene* kortere end Dækbladene (eller 0); *Perigonbladene* omvendt-ægformede, budte; *Læbens Flige* budte, divergerende.

½—1' høi. Blomsterne, ligesom hele Planten, bleg-brunagtige. 6—7. 4.

I skyggefulde Løvskove, funden i alle Provindser og ikke sjelden, men sporadisk.

Anm. Den almindelige Anskuelse, at denne Art skulde leve som Snylteplante paa Træernes Rødder, modsiges udtrykkelig af Irmisch (Beitr. z. Biol. u. Morphol. der Orchideen).

13. Corallorhiza. Koralrod.

1155. *C. virescens* [Drej. i F. D. tab. 2363] (Skov-K.)
C. innata R. Br., Drej. n. 863; Rehb. l. c. tab. 490; Ophrys
 Corallorhiza L., H. 893; F. D. 451.

Rodstokken koralformigt grenet; *Stængelen* jævn, omgivet af
 3—4 Skeder uden Plade, forøvrigt bladløs; *Klasen* faablomstret;
Læben aflang-firekantet, udrandet, forøvrigt udeelt med en
 budt Tand ved Grunden paa hver Side; *Griffelstøtten* bueformigt
 indbøiet; *Frugtknuden* sribet.

2—6" høi. Blomsterne grønne, Læben hvid med purpurrøde
 Punkter. $\frac{5}{2} - \frac{6}{1}$. 4.

I Løvskov, meget sjelden: *Møens* Klinteskov, f. Ex. bag
 Maglevandsfaldet! *Sj.* Krat ved Tibirke!

* 1156. *C. ericetorum* [Drej. i F. D. tab. 2364] (Lyng-K.);
 Rehb. l. c. tab. 491.

Rodstokken koralformigt grenet; *Stængelen* sribet, omgivet
 af omtrent 3 omskedende Blade uden Plade, forøvrigt bladløs;
Klasen faablomstret; *Læben* aflang, trelappet, den midterste Lap
 udrandet; *Griffelstøtten* opret, S-formigt bøiet; *Frugtknuden* rund-
 takket-vinget.

2—4" høi. Blomsterne gualgrønne med rødligt Anstrøg, Læben
 hvid med purpurrøde Pletter. $\frac{5}{2} - \frac{6}{1}$. 4.

Paa Lyngheder ved Kjøge Bugt $\frac{1}{2}$ Mil N. for Skillingskroen,
 mellem *Calluna* vulg. og *Salix repens*, i Mængde 1838! Hornbæks
 Plantage (20). ☞

Anm. Reichenbach (l. c. p. 160) anseer denne Plante for en ved
 Forskjellighed i Voxested frembragt Afart af foreg.

14. Spiranthes. Skrueax.

1157. *S. autumnalis* [Rich. l. c.] (Høst-S.) Drej. n. 861;
 Rehb. l. c. tab. 474; Ophrys spiralis L., H. 894; F. D. 387.

Knollerne (alm. 2) langstrakt ægformede eller pæreformede,
 fildede, udgaaende fra en meget kort Rodstok med et *Blomster-*
skaft og et sidestillet *Bladknippe* i Spidsen; *Rodbladene* æg-
 lancetformede eller elliptiske; *Stængelbladene* omskedende, uden
 eller med en kort, sylformet Plade; *Axet* ensidigt, spiralformigt
 snoet; *Læben* omvendt-ægformet, huul, rundtakket.

4—6" høi. Stængelen foroven duunhaaret. Blomsterne grønlig-hvide. 9—10. 4.

Paa Græsmarker, sjelden: *Sl.* Aabenraa (Oeder), Langbjerg Bakker (Rafn); *Sj.* Steenved Overdrev ved Kjelsbjergene, en Høi ved Præstø (H.); *Falst.* ved Næsgaard (Olufsen), mellem Øverup og Kraghave (14)! *Bornh.* ved Gaasebækken, nordre Teglværk, Baggeaaen, Terkels Mølle (Rafn), Rønne (8), mellem Rønne Castel og Pythuset (Hoff), Fynegaard, Kanegaard og Buskegaard i Knudsker Sogn (Hjorth). ☞

15. *Malaxis. Hjertelæbe.*

1158. *M. paludosa* [Swartz Vet. ac. handl. 1800 p. 235] (Sump-H.) H. 897; Drej. n. 874; Rehb. l. c. 494; H. N. XIV, 71; Ophrys L., F. D. 1234.

Rodstokken forlænget, næsten lodret, bærende 2 *løgformede Knoller*, den ældre forneden, beklædt med visnede Blade, den yngre ovenfor Jorden, dannet af 2—3 *Bladskeder* og 2—3 ægformede *Blade*; indenfor det øvre af disse en løgformigt opsvulmet *Axedeel* med et femkantet *Skaft* i Spidsen; *Axet* tæt-blomstret; *de ydre Perigonblade* ægformede, spidse; *Læben* æghjerteformet, spids, heelrandet, halvt saa lang som de ydre og af Længde med de indre (oval-linieformede) *Perigonblade*.

1—3" høi. Blomsterne grønne, meget smaae. 7—8. 4.

I Tørv- og Hedemoser mellem Sphagnum, temmelig sjelden: *J.* Klitterne i Thy, Viborg, Fusing Vaschuus, Ø. Velling (7), V. Velling (3), Riis Mose mellem Horsens og Skanderborg (13), Ø. Nykirke! Nebbegaard! Søviggaard N. V. for Varde (30), Ribe (6); *Sl.* Rødding (7), Flensborg, Tolkvade Sø ved Slesvig (16), Eidersted (F. Müll.); *Sj.* Dybendal ved Munkebjergby (Lund), Aamosen (7), Tepri og Lyngby Moser (H.)! Kjøge Aas (9), Holmegaardsmosen! *Loll.* Birket (9); *Falst.* Lidstrup Lyng (Koch), Horreby Lyng!

16. *Sturmia. Mygblomst.*

1159. *S. Loeselii* [Rehb. ic. crit. X, tab. 1286] (Trøskantet M.) Rehb. l. c. tab. 492; *Malaxis* Sw., H. 897; Drej. n. 875; H. N. VI, 65; Ophrys Loeselii L.; *O. paludosa* F. D. 877.

Rodstokken kort, vandret, nedsender haarede Rodtrævler og bærer 2 *Knopper* ved Siden af hinanden: den ældre knolleformigt opsvulmet, omgivet af visnede Blade (og ofte med det forrige Aars

Blomsterskift i Spidsen), den yngre ved Siden af hin, med 3 *Bladskeder* forneden og 2 oval-lancetformede *Blade* foroven; indenfor det øvre Blad en svagt opsvulmet Axedeel med et trekantet *Skift* i Spidsen; *Axet* faablomstret; *de ydre Perigonblade* linieformede, bølgede eller snoede, *de indre* traadformede; *Læben* omvendt-ægformet, budt, heel eller 3—5-tandet, rundtakket, meget bredere end de øvrige Perigonblade.

3—6" høi. Bladene glindsende, tilligemed Blomsterne guulgrønne. Den ældre Knol alm. ribbet af de visnede Bladskeders Karbundter. Stundom findes endnu Rester af en tredie Knol (fra det næstforeg. Aar) tilbage. 6—7. 4.

I dybe Moser og Hængedynd mellem Mosser, sporadisk og ikke alm.: *Sj.* Mose mellem Strandmøllen og Raavaddam! Lyngby Mose (H.), Lundehuusmosen! Bidstrupgaards Mose! Værebros Møller (14), Bromme (Lund), Flommen ved Sorø! *Loll.* Birket (9), *F.* Birkende, Hofmansgave (H.); *J.* Hillerslev Eng i Thy (Dr.), Gjellerup Eng ved Brabrand Sø (2); *Sl.* Pulverholz ved Slesvig (16).

II. Hexandria.

17. Aristolochia. Slangerod.

1160. *A. Clematitis* L. (Hjertebladet S.) H. 902; F. D. 1235; Rehb. ic. fl. g. XII, tab. 1340.

Bladene stilkede, hjerteformede, heelerandede, med fint forgrenet Aarenæt; *Blomsterne* knippeformigt samlede i Bladhjørnerne; *Blomsterdækket* kræmmerhuusformet, ved Grunden kugleformigt opsvulmet.

1—2' høi. Blomsterne gule. 7—8. 4.

Ved Gjærder omkring Byer, sjelden, og formodenlig i ældre Tider indført: *J.* Aalborg (H.), Viborg (Dr.), Mariager (7), Ørsted, Veile (H.), Kolding! Kirkegaarden ved Ribe (6); *Falst.* Nykjøbing Slots Ruiner (9); *Sj.* Vemmetofte Dyrehave forvildet (Visby).

21^{de} Klasse. Monoecia (Enbo).

1. Orden. Monandria (Enhannede).

A. Frugterne bæragtige (Urteagtige Væxter).

1. **Arum** L. Blomsterne samlede paa en i Spidsen nogen Kolbe med ♂ Blomsterne ovenfor og adskilte fra ♀ Blomsterne; Kolben omgivet af et sammenrullet Hylster. (N. F. Aroideæ).

Calla. Kolben heelt beklædt af Blomster, Hylsteret fladt udbredt (6, 1).

B. Frugterne tørre (Nødder eller Hindefrugter). Urteagtige Væxter.

a. 1 Griffel for hver Frugtknude.

2. **Zostéra** L. ♂ og ♀ Blomsterne i 2 Rækker paa den ydre Side af en linieformet Kolbe, omgivne af et fælles, i Spidsen bladagtigt Hylster; ♂ Blomsterne bestaae af en enkelt Støvdrager, ♀ af en enkelt Frugtknude med forlænget Griffel og 2 Ar. (N. F. Fluviales, a.)

3. **Najas** L. Blomsterne enlige i Bladhjørnerne, hver omgivet af et sambladet, tandet eller fliget Hylster, ♂: enkelt Blomsterdække, 1 firerummet Støvknop; ♀: Griffelen 0 eller meget kort, med utydeligt tolappet Ar. (N. F. Fluviales, b.)

4. **Zannichéllia** L. Begge Kjøen omgivne af et fælles Hylster; ♂: uden Blomsterdække, 1 Støvdrager; ♀: Blomsterdækket klokkeformet; 3—6 Frugtknuder med tydelig Griffel og skjoldformet Ar. (N. F. Fluviales, c.)

Lemna (21, 2).

b. 2—3 Grifler (eller Ar).

5. **Callitriche** L. Blomsterne i Bladhjørnerne, omgivne af 2 hindeagtige Dækblade; 2 lange, traadformede Ar; Frugten firefrøet, uopspringende eller tilsidst deelt i 4 Smaafrugter. (Vandplante med modsatte Blade. N. F. Callitrichineæ).

6. **Euphórbia** L. Blomsterne (i Greenvinklerne) i en Blomsterkop med et sambladet, 3—10-lappet Hylster (Kop-dække); ♂ Blomsterne flere i en Kreds, hver bestaaende af 1 nøgen Støvdrager tilleddet til en Blomsterstilk og omgivet af et Dækblad; ♀ Blomsten enlig i Midten, stillet, nøgen; 3 Grifler; tredelelig Spaltefrugt (Springfrugt) med toklappede, enfrøede Smaafrugter. (Urter med Mælkesaft, spredte eller modsatte Blade. N. F. Euphorbiaceæ.)

C. Frøene nøgne i aabne Frugtblade (Træagtige Væxter med naaleformede, spredte eller (paa en forkortet Green) knippestillede Blade; Blomster i Rakler: ♂ Raklen omgivet af skjælformede Dækblade, indsluttende talrige enhannede, nøgne Blomster; ♀ Raklen med talrige, spiralstillede, affaldende Dækblade, og indenfor hvert af disse 1 tilsidst træ- eller læderagtigt udvoxende Frugtblad (Kogleskjæl), som i Forening danne en Kogle). (7—10. N. F. Coniferæ, Abietineæ.)

a. ♂ Raklen grenet.

7. **Pinus** L. (part.) Kogleskjællene i Spidsen tykkere og forsynede med et kantet, træagtigt Skjold; Bladene 2—5 knippeformigt samlede, vedblivende.

b. ♂ Raklen udeelt.

8. **Abies** Link. Koglerne oprette, Kogleskjællene læderagtige, mod Spidsen tyndere, alm. kortere end de tilspidsede Dækblade og tilligemed disse affaldende ved Modenheden; Bladene spredte, stilkede, fladtrykte, vedblivende.

9. **Picea** Link. Koglerne hængende; Dækbladene tidligt henvisnende, kortere end de vedblivende, jævne, læderagtige, mod Spidsen tyndere Kogleskjæl; Bladene spredte, siddende, firekantede, vedblivende.

10. **Larix** DC. Kogleskjællene som hos foreg., fra Begyndelsen kortere end de tidligt henvisnende Dækblade; Bladene talrige, knippestillede, slappe og flade, affaldende.

2. Orden. *Diandria* (Tohannede).

11. **Lemna** L. Bladløse, svømmende Planter; Rodtrævernerne med en Rodhætte i Spidsen; ♂ og ♀ Blomster omgivne af et fælles hindeagtigt Hylster; Blomsterdække 0; 1—2 Støvdragere; 1 Frugtknude (N. F. Lemnaceæ.)

3. Orden. *Triandria* (Trehannede).

a. Bladene parallelnervede.

12. **Typha** L. Blomsterne tæt samlede i valseformede Ax (eller Kolber), ♂ ovenfor ♀ Axet; Blomsterne omgivne af flere Børster; Støvtraadene sammenvoxne; Frugten stilket, nødagtig (med hindeagtigt Frøgjemme); Arret udeelt. (N. F. Typhaceæ.)

13. **Sparganium** L. Blomsterne tæt samlede i kugleformede Hoveder (♂ ovenfor ♀); Blomsterne omgivne af 3—5 Skjæl; Støvtraadene frie; Frugten siddende, steenfrugtagtig (med svampagtigt Mellemlag); Arret udeelt. (N. F. Typhaceæ.)

14. **Carex** L. Blomsterne i enkelte eller sammensatte Ax, hver Blomst omgivet af et Dækskjæl; ♀: Blomsterdækket sambladet, krukkeformet, omgivende den siddende, nødagtige Frugt; 2—3 Ar; ♂: Blomsterdække 0; Støvtraadene frie (N. F. Cyperaceæ, b.)

b. Bladene fjernervede.

15. **Amarantus** L. Blomsterdækket enkelt, 3—5-deelt; 3 Ar; Frugten enfrøet, uopspringende*) Hindefrugt; Frøets Kim kredsformigt omgivende Frøhviden. (N. F. Amarantaceæ.)

*) Hos de fleste udenlandske Arter i denne Slægt er Hindefrugten tværsopspringende; mange have 5 Støvdragere.

4. Orden. *Tetrandria* (*Firehannede*).

a. Blomsterdækket dobbelt.

16. **Littorella** Berg. ♂: Blomsterne stilkede; Bægeret dybt firedeelt; Kronen firefliget; ♀: Blomsterne stikløse; Bægeret trebladet; Kronen sambladet, hindeagtig, med svagt firetandet Krave; Griffelen forlænget, udeelt; Frugten nødagtig. (N. F. *Piantagineæ*.)

b. Blomsterdækket enkelt eller 0.

aa. *Urteagtige Væxter. Arret penselformet. (N. F. Urticaceæ.)*

17. **Urtica** L. ♂: Blomsterdækket firedeelt; ♀: Blomsterdækket firedeelt i 2 ydre, mindre. og 2 indre, større Flige; Frugten nødagtig, omgivet af det vedblivende, hindeagtige Blomsterdække. (Haarene indeholde en brændende Vædske.)

Parietaria. ♀ og ♂ Blomsterdækket firedeelt, ♀ Blomsterdækket firetandet, klokkeformet. (Haarene ikke brændende). (4, 1).

bb. *Træagtige Væxter. 2 traadformede Ar.*

18. **Alnus** Tournef. Blomsterne af begge Kjøen i Rakler, som ere tilsyne om Efteraaret. ♂: Rakleskjællene udeelte, med 4—5 Biskjæl omgivende 3 Blomster; Blomsterdækket enkelt, firefliget; ♀: Rakleskjællene udeelte, toblomstrede; 1 Frugtknude med 2 Ar; Frugten Nød, omgivet af de vedblivende, tilsidst træagtige Rakleskjæl. (Knopperne stilkede, omgivne af et enkelt Knopskjæl. N. F. *Betulineæ*.)

19. **Bétula** L. (part.) ♂: Raklerne synlige om Efteraaret; Rakleskjællene skjoldformede med 2 Sidelapper og indsluttende 2—3 Biskjæl: Støvdragerne 8—12 (2: 4 for hvert Biskjæl); ♀ Raklerne om Efteraaret indsluttede i Knoppen; Skjællene trelappede, 2—3-blomstrede, ved Frugtmodningen affaldende; Vingefrugt. (Knopskjællene taglagte. N. F. *Betulineæ*.)

† **Morus** L. Blomsterne af begge Kjøen i Ax; ♂: Blomsterdækket dybt firedeelt; ♀: Blomsterdækket firebladet, med parviis modsatte Perigonblade (de ydre størst); Frugten en Nød,

omgivet af det vedblivende og tilsidst kjødfulde Blomsterdække, hvorved Frugtknuden faaer Udseende af et Bær. (N. F. Moreæ.)

Corylus (21, 6).

5. Orden. *Pentandria* (Femhannede).

a. Blomsterdækket enkelt. Frugten nødagtig.

20. *Átriplex* L. ♂ og ♀: Blomsterdækket 3—5-deelt; 3—5 Støvdragere; ♀: Blomsterdækket tobladet eller todeelt, fladtrykt, omsluttende (ikke sammenvoxet med) Frugten; 2 Griffler; Frugten uopspringende Hindefrugt, Frøets Skal hornagtig. (N. F. Salsolaceæ).

21. *Hálymus* Wallr. ♀: Blomsterdækket fladtrykt, i hele sin Længde sammenvoxet, omsluttende Frugten og foroven udløbende i 2 hornagtige Flige; Frøets Skal hindeagtig; forøvrigt som foreg. (N. F. Salsolaceæ).

Quercus. Frugten Nød, omgivet af en Skaal (21, 6).

Xanthium. Støvtraadene sammenvoxne; Frugten Skalfrugt (21, 7).

b. Blomsterdækket dobbelt; Frugten Bær.

Bryonia (21, 8).

6. Orden. *Hex—Polyandria* (Sex—Mangehannede).

a. Blomsterdækket dobbelt.

22. *Sagittaria* L. Bæger og Krone trebladede; ♂: Støvdragerne ∞ ; ♀: Frugtknuderne ∞ , oversædige paa en kugleformet Frugtbund; *Griffelen* kort; Arret haaret; enfrøede, nødagtige Flerfoldfrugter. (N. F. Alismaceæ, b.)

23. *Myriophýllum* L. ♂: Bægeret firedeelt; Kronen firebladet, affaldende; Støvdragerne 8; ♀: Bægeret firetandet, affaldende; Krone 0 eller firebladet, affaldende; 4 siddende Ar; Frugten undersædig, firedelelig Spaltefrugt. (N. F. Halorrhageæ.)

b. Blomsterdækket enkelt (eller 0).

aa. Urteagtige Væxter.

24. **Ceratophyllum** L. ♂ og ♀: Blomsterdækket uregelm. 8—12-fliget med tandede Flige; ♂: Støvknapperne omtr. 12, siddende, i Spidsen hornede; ♀: 1 Frugtknude med sylformet Griffel; Frugt fri, enfrøet Nød (Vandplante med Blomsterne i Bladhjørnerne). (N. F. *Ceratophylleæ*.)

25. **Potérium** L. Bægeret regelm. firedeelt, ved Grunden omgivet af 3—4 affaldende Dækblade; Krone 0; ♂: Støvdragerne 20—30, med lange, fine Støvtraade; ♀: 2—3 Frugtknuder med traadformet Griffel og penselformet Ar; Frugten 2—3-rummet Skalfrugt 2: 2—3 Nødder tæt omgivne af Bæger-røret (Vedvarende Urt med Blomster i Hoved, foroven ♀, forneden ♂, i Midten ofte ♀ Blomster). (N. F. *Rosaceæ*, a.)

Arum } Blomster i Kolbe, omgivet af et Hylster (21, 1).
Calla }

bb. Træagtige Væxter med Blomsterne i Rakler (25—28.

N. F. *Cupuliferæ*).

a. Ar eller Grifler 2, Støvdragerne befæstede paa Rakleskjællene, med en Haardusk i Spidsen af Støvknappen; Skaalen bladagtig, dannet af et fliget Dækblad eller Hylster; Frugtknuden torummet, med eet Æg i hvert Rum.

26. **Carpinus** L. Begge Kjøen i Rakler. ♂: Støvdragere omtrent 12, befæstede ved Grunden af de udeelte Rakleskjæl; Biskjæl 0; ♀: Blomsterne parviis, omgivne af 2 hele, affaldende Dækblade; Frugt nødagtig, beklædt med det efter Afblomstringen tilvoxende, tandede, oversædige Blomsterdække og omgivet af et bladagtigt og vedblivende, tilsidst treffliget Hylster.

27. **Corylus** L. ♂: Blomsterne i Rakler; 1 udeelt Rakleskjæl; Støvdragerne omtrent 8, befæstede paa Midten af de to-fligede Biskjæl; ♀: Blomsterne i Hoved; Frugten Nød, beklædt af det vedblivende, svagt tandede, oversædige Blomsterdække og omgivet af et bladagtigt fliget Hylster.

Betula. Vingefrugt (21, 4).

β. Ar eller Grifler 3—7, Støvdragerne befæstede i et Blomsterdække, med glatte Støvknapper; Frugtknuden trerummet, med 2 Æg i hvert Rum; Frugten heelt eller tildeels omgivet af flere med den udvidede Blomsteraxe sammenvoxne Dækblade i Form af en Skaal.

28. **Fagus** L. ♂: Raklen kugleformet, langstillet, hængende; Blomsterdækket klokkeformet, 8—10 Støvdragere; ♀: Skaalen firefliget, toblomstret; Blomsterdækket oversædigt, 3—5 fliget; 3 Grifler, Frugterne trekantede Nødder, heelt omgivne af Skaalen, som er beklædt med traadformede Fryndser.

† *Castanea* Tournef. ♂: Raklen forlænget, kortstillet, opret; Blomsterdækket hjulformet; 10—15 Støvdragere; ♀: Skaalen firefliget, treblomstret; Blomsterdækket oversædigt, 5—7-lappet; 5—7 Grifler; Frugterne ægformede Nødder, heelt omgivne af den tæt piggede Skaal.

29. **Quercus** L. ♂: Raklen forlænget, hængende; Blomsterdækket hjulformet; 8—10 Støvdragere; ♀: Skaalen udeelt, enblomstret; Blomsterdækket oversædigt, svagt tandet; 3 sidende Ar; Frugten en oval, trind Nød, ved Grunden omgivet af den kopformede, med taglagte Skjæl beklædte Skaal.

γ. Ar 2; Støvdragerne befæstede til et Blomsterdække; Frugterne uden skaalformede Dækblade.

† *Juglans* L. ♂: Blomsterne i Rakler; Blomsterdækket 2—6 fliget; ♀: Blomsterne 2—3 sammen; Blomsterdækket firedeelt, oversædigt; Frugten Steenfrugt. (N. F. Juglandeæ.)

7. Orden. (*Monadelphia* (*Enknippede*)).

30. **Xanthium** L. ♂: Flere Blomster omgivne af et mangebladet Svøb; Blomsterdækket sambladet, femtandet; 5 Støvdragere; ♀: 2 Blomster omgivne af et dobbelt Svøb: det ydre dybt 5—8 deelt, det indre i Spidsen tohornet og omgivende de modnende Skalfrugter; Blomsterdækket oversædigt, dannet af en meget svag, skraa Rand, som undertiden paa den ene Side løber ud i en traadformet Flig; 2 Ar. (N. F. Ambrosieæ).

Pinus }
Abies } (21, 1).
Picea }
Larix }
Typha (21, 3).

8. Orden. *Polyadelphia* (*Fleerknippede*).

31. **Bryonia** L. Bæger og Krone femfligede; ♂: Støvdragere 5, sammenvoxne i 3 Bundter (2. 2. 1.); ♀: Frugten et 3—6-frøet, undersædigt Bær. (Vedvarende Urt med klatrende Stængel. N. F. Cucurbitaceæ).

I. Monandria.

1. Arum.

1161. **A. maculatum** L. (Dansk Ingefær). H. 960; Drej. n. 949; F. D. 505; Rehb. ic. fl. germ. VII, fig. 8.

Rodstokken knollet; *Bladene* piilformede; *Hylsteret* længere end den i Spidsen nøgne, kølleformede, violetbrune, ovenfor Støvdragerne med snoede Traade beklædte *Kolbe*.

Bladene hos os alm. uplettede. Bær hørøde. 5—6 (fr. 7). 7.

I fugtige Skove: **J.** Aalborg (H.), Kalø (13), Aarhus, Palsgaard (H.), derfra mod S. ikke sjelden paa Halvøens Østkyst, Øerne fra Als til Møen, det sydl. Fyen og Sydsjæll.; i Nordsjælland sparsom: Odsherred (H.), Agersvold (16), Dronninggaard (14), Kbhavn bag Vesterbro, Rosenborg Have, Kastelsvolden (H.); **Bornh.** ved St Jons Kapel (Hjorth), Helligdommen i Røe Sogn (Hoff), Slammebjergs Skov ved Nexø (20). *

2. *Zostera*. Bændeltang.

1162. **Z. marina** L. (Hav-B.) H. 6; Drej. n. 877; F. D. 15; Rehb. ic. fl. germ. VII, fig. 4; H. N. XV, 83.

Bladene linieformede, (omtrent 2''' brede), 3—5-nervede; *Kolbens Stilk* opadtil bredere; *Frugterne* stribede paalangs.

Bladene meget lange, overalt ligebrede, olivengrønne. 6—8. 7.

β , *angustifolia* F. D. 1501; Rchb. l. c. fig. 3, H. N. VI, 70; *Z. nana* Roth (efter Cit. af F. D. og Caulin.). Rodstokken tyndere, Bladene smalere, omtrent 1''' brede, trenervede, med utydelige Sidenerver; Kolbestilken længere, forneden meget tynd.

Paa Sandbund i Havet overalt ved de danske Kyster, især paa dybere Vand. β , med Hovedarten, men sjældnere.

Anm. Formen β , maa nøiere undersøges; efter flere Forfatters Mening er den en egen Art (cf. Durieu de Maisonneuve, not. pl. de Girond. p. 77).

1163. *Z. minor* [Nolt. i Rchb. l. c. VII, p. 2 t. 2] (Dværg-B.) *Z. Noltei* H. II, 107; F. D. 2041; *Z. nana* Koch Syn. II, 783 (ikke Roth); H. N. XI, 70.

Bladene smalt linieformede (neppe 1''' brede), ennervede; *Kolbens Stilk* traadformet, ligebred overalt; *Frugterne* jævne.

Meget lavere og finere, med kortere Blade end foreg. 7—8. 4.

Paa Sandbund i Salt- og Brakvand, især i Fjordene hvor Vandet ikke er dybt, og fornemlig i de vestligere Egne: *J.* Liimfjorden ved Aalborg (Dr.), Løgstør, Sebbesund (8)! mellem Fanø og Jylland (16), Føhr (20), Rømø, Sylt, Amrom (N.), Eidermundingen (F. Müll.); Aarø Sund (8) og derfra mod S. i alle Fjordene paa Slesvigs Østkyst; *F.* Falsled Bugt (15), Skaarupør (19)! *Loll.* ved Ravnshy (19); *Falst.* Guldborgsund N. for Klodskov (14). ☞

3. *Najas. Najade.*

1164. *N. marina* L. (Enfrøet N.) H. II, 279; F. D. 2121; *N. major* Roth, Koch Syn. II, 783; *N. monosperma* Willd., H. 955 og (*Caulinia fragilis*) 911.

Bladene krandsstillede ($\frac{1}{3}$), linieformede, skarpt tandede, omskedende, med heelrandet *Skede*; *Frugterne* punkterede.

Bladene frisk grønne, Skederne rødlig. 8—9. ☉.

I Salt- og Brakvand, sjelden og kun bekjendt fra *Slesvig*: Noret ved Nordskov i Angel (16, 28)! i Slien 1 Müll Ø. for Slesvig (Frølich, Suhr). ☞

4. *Zannichellia. Vandkrands.*

1165. *Z. palustris* L. (Kjær-V.) H. 911; Fr. Mant. I, 16; F. D. 67; H. N. XV, 76.

Bladene linie-traadformede, krandsstillede ($\frac{1}{3}$); *Frugterne* 3—5, siddende eller med en fælles, kort Stilk, tilspidsede i en vedblivende *Griffel* af lidet over Frugtens halve Længde.

7—9. 4. Var.

α , *repens* (Boenn.) Rchb. VII, fig. 20. Stængelen ved Lødene rodslaaende.

β , *major* (Boenn.) Rchb. l. c. fig. 24. Planten større, med opret Stængel og bredere Blade.

I Færsk- og Saltvand, ikke sjelden: α , især i Damme og Vandhuller med grundt Vand.

* 1166. **Z. pedicellata** [Fr. Mant. I, 18; 3, 135] (Stilkfrugtet V.) F. D. 2610; H. N. III, 66; *Z. pedunculata* Rchb. l. c. fig. 21.

Frugterne 3—4, tydeligt stilkede med *fælles Stilk* og særegne *Smaastilke*; *Griffelen* fin, af Frugtens Længde; forøvrigt som foreg.

Alm. spædere end foreg., men forekommer ogsaa i en større Form. Frugterne have en hindeagtig, rundbugtet, tilsidst tandet Kjel paa Rygsømmen og stundom tillige paa Bugsømmen (i sidste Tilfælde *Z. gibberosa* Rchb. VII, 22). 7—8. 4.

Paa lignende Steder som foreg. og ligesaa hyppig. ☞

* 1167. **Z. polycarpa** [Nolte Nov. fl. Hols. p. 75] (Mangefrugtet V.) Fr. Mant. I, 17; F. D. 2609; Rchb. l. c. fig. 23; H. N. VI, 69 (*Z. palustris*) og X, 66.

Frugterne 4—6, siddende, halvmaaneformede, ved Grunden budte; *Griffelen* kort, omtrent $\frac{1}{4}$ af Frugtens Længde.

7—8. 4.

β , *tenuissima* Fr. Spædere, med omtrent 4 Frugter.

Voxested som de foreg., men sjældnere: *Loll.* Steensgaard; *Falst.* mellem Stubbekjøbing og Liselund (19)! *Slesvig* (N.)? — β , *J.* Havnen ved Sæby (12); *Sj.* Esrom Sø ved Fredensborg (Heiberg), Hvedstrup (8), Gadekjær i Himmeløv pr. Roeskilde (15)! Ørsløv o. fl. St. ved Skjelskør (Nielsen)! *Loll.* Bøllesminde (19). [*

Ann. De her beskrevne Arter af *Zannichellia* høre efter afd. J. Gays Undersøgelse alle til een Art, *Z. brachystemon* Gay, fra hvilken den i det sydlige og vestlige Europa forekommende *Z. macrostemon* Gay adskilles ved meget lange Støvtraade, større og firerummede Støvknapper.

5. Callitriche. Vandstjerne.

a. *Pseudocallitriche* Hegelmaier (monogr. Callitr.) Hele Planten nedsænkt under Vandet. Alle Bladkrandsene adskilte; Dækblade 0; Smaafrugterne adskilte ved et dybt Indsnit og en smal Skillevæg.

1168. *C. autumnalis* L. (Høst-V.) H. 910; Drej. n. 882; F. D. 2120; Rchb. V, fig. 4749; H. N. IV, 83.

Alle *Bladene* ennervede, linieformede, med bredere Basis, i Spidsen udrandede; *Ledstykkerne* korte; *Arrene* meget lange, tilbagebøiede, tidligt affaldende; *Frugternes Kjøl* hindeagtigt vinget.

Bladene af en reen og mørk grøn Farve. 7—9. 2.

I Søer og Aaer hist og her, ikke alm., f. Ex. *Sj.* Aaen ved Raa-vaddam! Frederiksdals Møllebæk (Dr.), Emdrup Sø, Ladegaardsaaen, Damhuussøen (9), Jonstrup (14), Flommen ved Sorø (12), Ondløse! *F.* Egense ved Hofmansgave (4); *J.* Tøihushaven ved Randers (7), Haraldslund! *Sl.* Jels Sø (16).

b. *Eucallitriche* Hegelm. l. c. De øvre Bladkrandse samlede til en paa Vandets Overflade svømmende Rosette*); Blomsterne (alm.) omgivne af Dækblade; et svagt Indsnit og en bred Skillevæg mellem Smaafrugterne (*C. verna* L.).

1169. *C. verna* [Kützing i Linnæa VII, p. 175] (Smaafrugt V.) Drej. n. 881; Rchb. l. c. fig. 4746.

De *nedre Blade* linieformede, med smalere Basis, *de øvre* omvendt-ægformede, trenervede; *Dækbladene* svagt bøiede; *Arrene* oprette, affaldende ved Frugtmodningen; *Frugterne* omvendt-hjerteformede eller ovale, udrandede (Længden større end Breden), Smaafrugterne hvælvede, med skarp, meget smalvinget *Kjøl*.

*) De til denne Afdeling hørende Arter ere typisk Vandplanter med langstrakte Stængler og (med Undtagelse af den endestillede Bladrosette) nedsænkede Blade. Paa fugtig Jordbund, som i Sommerens Løb udtørres, forekomme imidlertid af alle Arterne Former med korte Ledstykker og krybende Stængler, som i Udseende ere yderst forskjellige fra Hovedformerne, men dog have de væsentlige Characterer tilfælles med disse.

Bladene (ligesom hos de følg.) lysere og mere mat grønne end hos foreg. Forekommer undertiden i flydende Vand med lutter linieformede, i Spidsen indtrykte eller udrandede Blade (*C. verna tenuifolia* H. 910). Paa Steder, hvor Planten kun af og til oversvømmes af Vandet, bliver den lavere af Væxt, meget grenet, rodslaaende og med mindre Blade (var. *minima* Hopp. og *caespitosa* Schultz) Rchb. l. c.

I Færskvand (Bække, Grøfter og Moser), hist og her.

1170. **C. hamulata** [Kütz. i Koch Syn. ed. 1, p. 246] (Bredfrugtet V.) Rchb. l. c. fig. 4749; H. N. XV, 64.

Alle *Bladene* smalere ved Grunden, de nedre linieformede, de øvre omvendt-ægformede; *Dækbladene* smale, seglkrummede; *Arrene* meget lange, tilbagebøiede, tidligt affaldende; *Frugterne* kredsround-nyreformede, i Spidsen svagt udrandede (Breden større end Længden), Smaafrugterne fladtrykte, med skarp, næsten retvinklet, smalvinget Kjøl.

Paa lignende Steder som foreg.: Christiansø (Didr.)! *Sl.* Husum Mølle dam (F. Müll.). Andre Voxesteder ere mig ikke bekendte, men den vil sikkert, ved nøiere at eftersøges, findes hist og her.

1171. **C. stagnalis** [Scop. Fl. carn. 2, 151] (Storfrugtet V.) Drej. n. 879; Rchb. l. c. fig. 4747; H. N. XV, 63; *C. verna repens* H. 910; F. D. 129 og 1741 (*C. verna*).

Alle *Bladene* omvendt-ægformede, 3—5-nervede; *Dækbladene* brede, svagt krummede, sammenstødende mod Spidsen; *Arrene* vedblivende, opret-aabne, tilsidst tilbagebøiede; *Frugterne* næsten kredsrounde (Længde og Brede omtrent lige), i Spidsen udrandede, Smaafrugterne fladtrykte eller hvælvede, med skarp, bredvinget Kjøl.

5—8. 4.

I Kjær og Grøfter, paa dyndfulde, oversvømmede Steder. Synes at være den hyppigste Art i Danmark.

Ann. 1. De 3 sidstnævnte Arter, som efter Vandets forskellige Dybde og øvrige Beskaffenhed fremtræde under saa yderst forskellige Former, fortjene nøiere Undersøgelse saavel i Henseende til Characterernes Bestandighed som til deres Forekomst og Udbredelse i vor Flora. De enkelte Voxesteder, som jeg for hver af disse med nogenlunde Sikkerhed kunde angive, har jeg ikke anført, da jeg formoder, at de alle ved nærmere Undersøgelse ville befindes at være udbredte over den hele Flora.

Ann. 2. *C. platycarpa* Kütz. (Rehb. l. c. fig. 4748, Lge Haandb. 2 Udg. S. 594) er efter Hegelmaier (l. c. p. 59) kun en Form af *C. stagnalis* med de nedsænkede Blade smale og Frugterne mere flade og derved næsten parallelle. Paa Steder, som kun til visse Tider af Aaret ere oversvømmede, bliver Planten krybende, grenet, med kortere Ledstykker og mindre Blade (var. *minor* Rebh. l. c.).

6. Euphorbia. Vortemælk.

a. Stængelbladene spredte ($\frac{2}{5}$).

aa. Frøene rynket- eller grubet-punkterede. ☉.

- a. Blomsterstandens første Forgrening en femgrenet Skjærm, med qvastformigt tredeelte Grene; Kopdækkets Lapper rundagtige, heelrandede.

1172. *E. Helioscopia* L. (Kilebladet V.) H. 530; Drej. n. 885; F. D. 725; Rebh. ic. fl. germ. V, fig. 4754.

Bladene kileformede eller omvendt-ægformede, ovenfor Midten saugtaktede; *Smaafrugterne* jævne; *Frøene* nætformigt grubede, næsten kugleformede.

3—8" høi; hele Planten gulgrøn, Dækbladene gule. Smaae Expl. ofte ugrenede. 5—9. ☉.

Almindeligt Ukrud paa dyrkede Steder, især mellem Sæden.

- β. Blomsterstanden 2—4-grenet med gjentaget-gaffeldeelte Grene; Kopdækkets Lapper tohornet-halvmaaneformede.

1173. *E. exigua* L. (Liden V.) H. 529; Drej. n. 883; F. D. 592; Rebh. l. c. fig. 4777, H. N. I, 52.

Bladene siddende, linieformede, heelrandede; *Dækbladene* ved Grunden af Smaagrenene æg-lancetformede med skjævt hjerteformet Basis; *Smaafrugterne* jævne eller ved Grunden utydeligt rue, med skarp, uvinget *Kjøl*; *Frøene* ovale, knudret-rynkede.

2—6" høi. Bladene var. spidse, budte med en Braad eller stumpt afskaarne. Skjærmen er paa store Expl. stundom femgrenet. 7—9. ☉.

Ukrud mellem Sæden: alm. paa de sydlige Øer fra *Lolland* til *Ærø*; i *Fyen* paa Hindsholm! Frangde (16), Holkenhavn, Ørbæk (Lund); *Sjæll.* mod V. og S. hist og her, sparsommere mod N. og O.: Glostrup (24), mellem Herløv og Husum, Eiby og Rødoune (14), Kalkbrænderiet bag Flaskekroen! Amager (1), Roeskilde alm. (15), Kjøge (9), Stevns! *Bornh.* Hasle (Zahrtm.); *J.* Ukrud i Haver ved Aalborg (Klitsch)! ☞

1174. **E. Peplus** L. (Stilkbladet V.) H. 528; Drej. n. 884; F. D. 1100; Rchb. l. c. fig. 4773.

Alle *Bladene* heelrandede; *Stængelbladene* kortstilkede, *de nedre* ovalt-kredsrunde, *de øvre* omvendt-ægformede; *Dækbladene* skjævt triangel-ægformede; *Smaafrugterne* med en dobbelt, smalvinget *Kjøl*; *Frøene* ovale, i begge Ender afstumpede, med 2 Længdefurer paa Inderfladen og 4 Rækker Gruber paa Yderfladen.

6—10" høi. Planten mørkgrøn, ofte rødligt anløben. 7—8.

Paa dyrket Jord, især i Haver, et alm. Ukrud.

Anm. *E. segetalis* L. (Rchb. l. c. fig. 4780) angives med Tvivl fra *Bornh.* af Hornemann. Den kjendes ved linieformede Blade, nyreformet-rudeformede Dækblade, femgrenet Blomsterstand med gaffeldeelte Grene og paatværs parallelt furede Frøe. (Har forgjæves været eftersøgt af Alle, som senere have besøgt Øen).

bb. *Frøene* jævne. 4.

1175. **E. Esula** L. (Lancetbladet V.) H. 530; F. D. 1270; Rchb. l. c. fig. 4791; H. N. IV, 68.

Bladene lancetformede eller linie-lancetformede; *Blomsterstanden* mangegrenet med gjentaget-gaffeldeelte Grene; *Dækbladene* ved Grunden af Smaagrenene triangel-nyreformede, budte med en Braad; *Kopdækkets Lapper* tohornede; *Smaafrugterne* paa Ryggen svagt ru-punkterede.

1—1½' høi. Planten lys- og gulgrøn, Dækbladene gule. 6—7.

Forekommer hist og her omkring dyrkede Steder, oprindelig forvildet, f. Ex. *J.* Horsens (Jørgensen), Thyrsbæk (10); *Sl.* Nyvæk ved Slesvig (16); *Ærø* ved Ærøskjøbing (10); *F.* Dæmninger ved Hofmanskøge (18); *Loll.* mellem Maribo og Refshale (19); *Sj.* Glacieren udenfor Østerport ved Kbhavn (26); *Bornh.* (Rafn). $\frac{1}{2}$

b. *Stængelbladene* korsviis-modsatte ($\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$).

† *E. Lathyris* L. (Rchb. l. c. fig. 4783). *Bladene* linieformet-ovale, *de øvre* ved Grunden hjerteformede; *Blomsterstanden* alm. firegrenet med gjentaget-gaffeldeelte Grene; *Dækbladene* ægformede; *Kopdækkets Lapper* tohornede; *Smaafrugterne* i moden Tilstand rynkede; *Frøene* nætformigt aarede. 5—7. ☉.

Forvildet omkring Haver, f. Ex. Holmdrup i *Fyen* (19); Østoftet i *Loll.* (H.); *Falst.* Stubbekjøbing (Benzon)! ☞

7. Pinus. Fyr.

1176. *P. silvestris* L. (Almindelig F.) H. 972; Drej. p. 305; Rehb. ic. fl. germ. XI, fig. 1127.

Naalene halvtrinde, rue, 2 sammen i hvert Knippe; *Koglen* før Modenheden ægformet-kegleformet.

Middelhøit Træ med ujævn Bark. *Koglen* 1½—2" lang, modnes i det andet og affalder i det tredje Aar efter Blomstringen.

Alm. plantet i Skove, forekommer hist og her forvildet i Moser, f. Ex. *Sj.* Lyngby Mose (28), Rudehegn! *Falst.* Horreby Lyng (Koch). Har i en tidligere Periode været vildvoxende i Danmark, hvilket de talrige Fyrrelevninger i Tørvmoserne vidne om.

† *P. Strobis* L. (Weymouths F.) Drej. p. 305.

Naalene 5 i hvert Knippe; *Koglen* valseformet, 5—6" lang.

Høit og slankt Træ med glat Bark. 5. h.

Forekommer hist og her i Plantager, indført fra Nordamerika. ☞

8. Abies. Ædelgran.

† *A. pectinata* [DC. Fl. fr. 3, p. 276] (Almindelig Æ.) Drej. p. 305; Rehb. l. c. fig. 1139; *P. Picea* L.; *Abies vulgaris* Poir.

Naalene toradede (og Grenene derved fladtrykte), i Spidsen budt-udrandede, mørkgrønne med 2 hvide Striber paa Underfladen; *Støcknappernes* Rum opspringende paatværs; *Kogleskjællene* affaldende, budte.

Høit Træ. Barken hvidagtig, glat. *Koglen* omtrent 8" lang. 5. h.

Plantet ligesom foreg., men sjældnere. (Vildvoxende forekommer den især i Alperne og Pyrenæerne).

9. Picea. Gran.

† *P. excelsa* [Link i Linnæa v. 15, p. 517] (Rød G.) *Pinus Abies* L., H. 971; F. D. 193; *Abies excelsa* Poir. Drej. p. 305; Rehb. l. c. fig. 1138.

Naalene alsidigt vendte, sylspilsede, heelt grønne; *Støcknappernes* Rum opspringende paalaugs; *Kogleskjællene* vedblivende, i Spidsen gnavet-tandede.

Høit Træ med ujævn Bark. Koglen omtr. 6" lang. 5. $\frac{1}{2}$.

Alm. som plantet Træ i Skove og Plantager, ikke oprindelig indenlandsk, men hjemmehørende i Norges, Sveriges og Tydslands Bjergegne. Funden forvildet i Moser i Nyrup Hegn ved Helsingør (Heiberg).

10. Larix. Lærketræ.

† *L. europæa* [DC. Fl. fr. 3, p. 277] (Almindelig L.)
Drej. p. 305; Rehb. l. c. fig. 1137; Pinus Larix L.

Naalene paa de forlængede Grene enlige, spredte, paa de forkortede Grene talrige, knippeformede, med en vorteformet Knude i Midten; ♂ og ♀ *Raklerne* langs opad de forlængede Grene; *Koglen* opret, ægformet, med budte, vedblivende *Skjæl*; *Dækbladene* tilspidsede, vedblivende, men ved Modningen kortere end *Kogleskjællene*.

Høit Træ. Barken afskaller i tynde Plader. Koglen omtrent 1" lang. 5. $\frac{1}{2}$.

Almindelig plantet i Naaleskove. (Dens Fædreland er Sibirien, Karpatherne og Alperne). $\frac{1}{2}$

II. Diandria.

11. Lemna. Andemad *).

a. *Staurogeton* Rehb. Løvet stærkt forgrenet, dets Plader langstrakte, tynde og næsten hindeagtige, jævnt afsmalnede i en længere Stilk.

1177. *L. trisulca* L. (Korsbladet A.) H. 912; Drej. n. 4; F. D. 1586; *Staurogeton* Rehb. ic. fl. germ. VII, fig. 19.

Rodtrævlerne enlige; *Løvets Plader* lancetformet-elliptiske, budte eller kort braadspidsede, skjæve, under Lupen fint randhaaret-tandede.

Lysgrøn, større end de følg., ligger største Delen af Aaret under Vandet. 5—6. 4.

I stillestaende Vand almindelig, men sjældent blomstrende (Charlottenlund 1863, Didrichsen).

*) Flere væsentlige Berigtigelser til Arternes Beskrivelse i denne Slægt skyldes Hr. Professor Steenstrups velvillige Meddelelse.

b. *Lemnæ genuinæ*. Løvet svagere grenet, dets Plader ovale eller kredsrunde, tykkere (med udviklede Luftcellelag, der holde dem flydende paa Vandets Overflade), pludselig overgaaende i en kort, traadsmal Stilk.

1178. *L. polyrrhiza* L. (Stor A.) H. 913; Drej. n. 5; F. D. 1589; *Spirodela* Schleid., Rehb. l. c. fig. 17.

Rodtrævlerne knippeformigt samlede; *Løvets Plader* kredsrunde, flade eller kun paa Overfladen svagt hvælvede.

Løvet større end hos de 2 følgende Arter, paa Underfladen rødagtigt. 6—7. 4.

I Vand, ikke sjelden, dog mindre hyppig end den følgende, og meget sjældent blomstrende.

1179. *L. minor* L. (Liden A.) H. 913; Drej. n. 6; F. D. 1587; Rehb. l. c. fig. 15.

Rodtrævlerne enlige; *Løvets Plader* oval-kredsrunde, svagt hvælvede eller paa begge Sider næsten fladtrykte.

Den mindste af Arterne, omtrent af Størrelse som et Lindsefrø, lysgrøn. 5—8. 4.

Denne Art varierer betydeligt i Henseende til Løvpladernes Størrelse og de paa sammes Underflade forekommende luftfyldte Cellers Udvikling. En meget afvigende Form er

* *tenella* (Stp. i Lge. Haandb. 1 Udg. S. 599). Løvpladerne mindre og smalere, fladtrykte paa Over- og Underfladen (som Følge af de luftfyldte Cellers ringe Størrelse).

I Aaer, Damme og Søer, meget alm. og ofte i stor Mængde. Formen * forekommer dels alene, dels blandet med den typiske Form, som da gjerne bedækker den, fordi den formedelst de større luftfyldte Celler ligger højere paa Vandet. Den er fundet i *Sj.* ved Hørsholm, Suusaaen ved Herlufsholm (23)! *F.* i Skaarup Seminariums Have (19); *J.* Ribe Aa (23); *Sl.* Satrup Mose i Angel! og anbefales til yderligere Eftersøgning.

1180. *L. gibba* L. (Tykbladet A.) H. 913; Drej. n. 7; F. D. 1588; Rehb. l. c. fig. 16; *Telmatophace* Schleid.

Rodtrævlerne enlige; *Løvets Plader* omvendt-ægformede, afrundede, paa Underfladen halvkugleformigt hvælvede.

Løvet ofte rødagtigt, paa Underfladen formedelst de store luftfyldte Celler svampagtigt hvælveth og næsten gjennemsigtigt. 6—8. 4.

β , *major* Koch (Falst. Veget. p. 37) dobbelt saa stor som Hovedarten, med kortere Rodtrævler.

I Grave og Damme, funden i alle Provindser, men ikke saa hyppig som de øvrige Arter. β , *Falst.* i en Dam ved Riserup (Koch)!

III. Triandria.

12. Typha. Duunhammer.

1181. *T. latifolia* L. (Bredbladet D.) H. 914; Drej. n. 890; F. D. 645; Rehb. l. c. IX, fig. 747—48.

Bladene bredt linieformede; *Axene* valseformede, ♂ umiddelbart ovenfor ♀ *Axet*; *Støvtraadene* efter Bestøvningen 2—4 Gange længere end Støvknapperne; *Arret* skjævt ægformet, med den farvede Spidse ragende frem over det børsteformede *Blomsterdække*.

5—6' høi. Var. i Henseende til Bladenes Brede og Axets Tykkelse. 7. 4.

I Tørvmoser og ved Aabredder, alm. udbredt.

1182. *T. angustifolia* L. (Smalbladet D.) H. 914; Drej. n. 889; F. D. 815; Rehb. l. c. fig. 745.

Bladene smalt linieformede, ved Grunden rendede; ♂ *Axet* fjernet fra ♀; *Støvtraadene* efter Bestøvningen $\frac{1}{2}$ Gang længere end Støvknapperne; *Arret* smalt linieformet, ragende langt frem over Børsterne.

4—6' høi; Bladene 2—4''' brede. Afstanden mellem Axene er forskjellig. 7. 4.

Voxested som foreg., funden i alle Provindser (undt. Bornh.), men sjældnere og kun i enkelte Egne i større Mængde eller endog trængende hiin.

13. Sparganium. Pindsviinknop.

- a. Stængelen udeelt; ♂ Hovederne under Blomstringen næsten ligestore med ♀.

1183. *S. minimum* [C. Bauh., Fr. S. Veg. Sc. II, p. 560] (Spæd P.) H. N. XII, 78; *S. natans* H. 916; Drej. n. 886; F. D. 260; Rchb. l. c. fig. 749 (ikke L.)

Stængelen svag; *Bladene* svømmende, langstrakt og smalt linieformede, budte, flade, ved Grunden omskedende; *Blomsterhovederne* (1 ♂ tidligt affaldende, 2—3 ♀) siddende (eller det nedre kortstillet) i Bladhjørnerne; *Frugterne* ustilkede; *Griffelen* kort, tilligemed det vedblivende, aflange, skjævt afskaarne *Ar* $\frac{1}{4}$ af Frugtens Længde.

Lysgrøn, ofte mere langstrakt, men altid spædere end følgende. Ved de budte, smale og svømmende Blade let kjendelig fra de andre Arter. 7. 4.

I Tørvmoser, forekommer i alle danske Provindser, men sparsommere end de følgende Arter.

Anm. Den i det nordlige Skandinavien forekommende ægte *S. natans* L. (Fr. l. c., H. N. XIII, 76) adskiller sig (efter Fr.) ved bredere Bladskeder, flere ♂ Hoveder og omtr. 5 ♀ Hoveder, det nedre ofte langstillet, stilkede Frugter. Den findes neppe i Danmark.

1184. *S. simplex* [Huds. Fl. angl. ed. 2, p. 401] (Rank P.) H. 916; Drej. n. 887; F. D. 932; Rchb. l. c. fig. 750; H. N. XV, 79; *S. erectum* β, L.

Stængelen rank-opret; *Bladene* linieformede, spidse, forneden trekantede med flade Sider, ved Grunden omskedende, i Spidsen flade med en Kjol paa Underfladen; ♂ *Blomsterhovederne* 4—flere, siddende; ♀ *Hovederne* 3—4, stilkede, *Stilkene* (med Undtagelse af den nedre) forneden sammenvoxne med Stængelen og derved udgaaende fra Midten af Ledstykke (ikke fra Bladvinklen); ♀ *Blomsterne* kortstilkede; *Griffelen* forlænget, af Længde med det linieformede *Ar* og tilligemed dette ligesaa lang som eller lidet længere end Frugten.

1—1 $\frac{1}{2}$ ' høi. 7—8. 4.

I Søer, Kjær og Bække alm. udbredt.

b. Stængelen foroven grenet; ♂ Hovederne meget mindre end ♀.

1185. *S. ramosum* [Huds. l. c.] (Grenet P.) H. 915; Drej. n. 888; F. D. 1282; H. N. XV, 77—78; *S. erectum* α, L., Rehb. l. c. fig. 751.

Bladene linieformede, budte, forneden skarpt trekantede med hule Sider, ved Grunden omskedende, mod Spidsen flade med en Kjøl paa Underfladen; *Grenene* udgaae fra Bladhjørnerne, længere end Ledstykket ovenfor, med 1—3 siddende ♀ *Hoveder*, talrige og tætsiddende ♂ *Hoveder*; ♀ *Blomsterne* siddende; *Griffelen* kort, tilligemed det linieformede *Ar* kortere end Frugten.

Høiere end foreg. (2—3'), med meget mindre ♂ *Hoveder*. Mørkgrøn, de nedre Bladskeder og Frugterne ved Grunden violetrøde. 7 8. 4.

Paa lignende Steder som foreg., meget alm.

14. *Carex*. Star. *)

A. *Monostachyæ*. 1 enkelt Ax i Spidsen af Straaet.

a. Tvebo.

1186. *C. diorca* L. (Tvebo-S.) H. 917; Schum. n. 769; Drej. n. 891; F. D. 369; Rehb. ic. fl. germ. VIII, 522; Andersson Cyp. Scand. t. III, f. 10; H. N. 86.

*) *Carex*-Arterne maae undersøges naar Frugterne have naaet deres fuldkomne Udvikling, og de her givne Beskrivelser, f. Ex. af Smaa-axenes Form, de enkelte Deles relative Længde o. s. v., gjælder, naar intet Andet er nævnt, denne Tilstand. Hvad der i Beskrivelserne er betegnet som »Frugten« gjælder egentlig det Nødden tæt omgivende og vedblivende Blomsterdække (perigynium). De fra Formen af Skedens Munding og af Skedehinden (saavel den frie, mod Bladpladen vendte, som den forreste, med Skedens Forside sammenvoxede Deel) hentede Kjendetegn ere af ikke ringe Vigtighed for Arternes indbyrdes Adskillelse, og bør derfor nøiere undersøges og beskrives. Jeg har til en Begyndelse i nærværende Udgave beskrevet disse Forhold for saa mange Arter, som jeg har kunnet undersøge i levende Tilstand.

Rodstokken udskyder Udløbere; *Straaet* opret, jævnt; *Bladene* traadsmale, børsteformigt sammenrullede, *Bladskedens* Munding kredsround, *Skedehindens* frie (mod Pladen vendte) Deel kort afskaaren i en Bue, den forreste Deel afrundet og lige-lang med den bageste Deel, vedblivende og langt fremragende udenfor Skeden; *Dækskjællene* ægformet-ovale, budte; 2 *Ar*; *Frugterne* ægformede, mangenervede, foroven i Randen rue, tilsidst vandret udstaaende.

4—6" høi. ♂ Axene linieformede, ♀ (under Blomstringen) ovale. Frugterne mørkbrune. 5—6. 4. Var.

β, *isogyna* Fr. Mant. 3, 153; H. N. XV, 86. Axet forneden ♀, foroven ♂.

γ, *scabriuscula* Hartm. Straaet høiere, oventil ru.

I vaade Enge, Hængedynd, ikke sjelden. β, *Sj.* ved Raavaddam (19); J. Eveldrup (Drej. Herb.). γ, er angivet fra Danmark, men uden bestemt Voxested.

b. Enbo. Axet foroven ♂, forneden ♀.

1187. *C. pulicaris* L. (Loppe-S.) H. 918; Schum. n. 770; Drej. n. 892; F. D. 166 (slet) og 2546; Rchb. l. c. fig. 524; And. l. c. III, 7; H. N. XIII, 87.

Straaene oprette, jævne, tueformigt samlede, uden Udløbere; *Bladene* børsteformigt sammenrullede, *Skedemundingen* og *Skedehinden* som hos foreg., men *Skedehindens* forreste Deel mindre fremragende udenfor Skeden; *Dækskjællene* ægformede, spidse: ♂ *Blomsternes* vedblivende, ♀ *Blomsternes* af-faldende; 2 *Ar*; *Frugterne* elliptiske, tonervede, jævne, tilsidst nedhængende.

2—6" høi. Axet under Blomstringen lancetformet. Frugterne faae, glindsende brune. 5—6. 4.

I Tørvmoser og fugtige Enge, hist og her i alle Provindser, men sjældnere end foreg.: hyppigst paa *Halvøen*.

1188. *C. pauciflora* [Lightf. Fl. scot. p. 543; t. 6 f. 2] (Faablomstret S.) H. 919; Drej. n. 893; Rchb. l. c. fig. 526; And. III, 2; H. N. XI, 82; *C. leucoglochin* Ehrh., Schum. n. 771; F. D. 1279.

Rodstokken skjævt opstigende, med Udløbere; *det øvre Stængelblad* smalt linieformet, paa Overfladen rendet, *de nedre* meget korte; *Axet* faablomstret (1—2 ♂, 3—5 ♀ Blomster); ♀ *Dækskjællene* tilspidsede, affaldende; 3 *Ar*; *Frugterne* sylformede, langt tilspidsede, jævne, tilsidst nedhængende.

2—6" høi. Frugterne blegt straagule, let affaldende. 6. 4.

I Tørv- og Hedemoser mellem Sphagnum, sjelden: J. Frederikshavn, Hasselriis, Svendstrup, Vesterkjær, Slumstrup (H.), Hørbylund V. for Silkeborg, Ø. Nykirke! Sj. Bidstrupgaard (H.), Bagsværd, Fredriksdal (M. Vahl).

B. *Homostachyæ*. 1 sammensat Ax i Spidsen af Straaet (Smaaaxene nærmere eller fjernere fra hinanden, alle [eller nogle] androgyne ♀: sammensatte af ♂ og ♀ Blomster.

a. *Schelhammeria* Moench. Småaxene samlede til et Hoved, omgivet af et 2—5-bladet Svøb.

X 1189. *C. cyperoides* L. (Fladax-S.) H. 925; Drej. n. 894; F. D. 1465; Rchb. l. c. fig. 576; And. IV, 42.

Straaene tueformigt samlede fra en sammentrængt Rodstok, budt trekantede med plane Sider, jævne, foroven lidt rue; *Hovedet* rundagtigt; *de ydre Svøbblade* meget lange; *Smaaaxene* foruden ♂; *Dækskjællene* langt tilspidsede, tilligemed Frugtens forlængede, tokløvede *Næb* i Randen tornet-saugtakkede; 2 *Ar*.

Hele Planten grøn. 7. 4.

I en udtørret Dam ved Frederiksborg, funden i Mængde af Holbøll, formodenlig indført med Indpakning og i mange Aar søgt forgjæves; gjenfundet 1852 (Knæckenborg)! men senere atter forsvunden. [2]

b. *Vignea* Koch. Småaxene samlede til et forlænget, fortløbende eller afbrudt Ax. 2 *Ar*.

aa. *Acroarrhenæ* Fr. Småaxene foroven ♂.

a. *Chordorrhizæ*. Rodstokken vidtkrybende; Axene brunagtige, enkelt sammensatte.

1190. *C. incurva* [Lightf. Fl. scot. p. 544, t. 24, f. 1] (Krumstænglet S.) H. 920; F. D. 432; Rchb. l. c. fig. 533; And. III, 12; H. N. XIV, 85.

Straaet budtkantet, jævnt, krumbøiet, kortere end eller af Længde med de børsteformigt sammenrullede Blade; *Skedemundingen* kredsround, *Skedehindens* frie Deel kort afskaaren, bueformet eller udrandet, dens forreste Deel svagt udrandet, naaende udover Skeden; *Axet* æg-kugleformet, med tæt sammenhobede Smaaax; ♀ *Axskjællene* bredt ægformede, budte med en Braad, kortere end de ægformede, opblæste, nerveløse, i et jævnt, skjævt afskaaret Næb tilspidsede *Frugter*.

2—6" høi. 6—7. 4.

Ved sandige Strandbredder, meget sjelden: Løkken i det nordvestlige *Jyll.* (Lyngby).

1191. *C. chordorrhiza* [Ehrh. i Linn. suppl. 414] (Mangegrenet S.) H. 921; Drej. n. 895; F. D. 1408; Rchb. l. c. fig. 535; And. III, 14; H. N. IX, 85.

Rodstokken skjævt opstigende, mangegrenet; *Straaene* rette, jævne, forneden trinde og sribede, foroven budt trekantede, meget længere end de smalt linieformede, rendede Blade; *Skedemundingen* oval, *Skedehindens* frie Deel bueformigt afrundet, dens forreste Deel svagt udrandet, tidligt sønderreven, naaende udover Skeden; *Axet* ægformet, med tæt sammenhobede Smaaax; *Frugterne* ægformede, opblæste, tydeligt mangenervede, pludseligt udløbende i et næsten jævnt Næb, ligelange med de ægformede, spidse *Dækskjæl*.

Høiere end foreg. ($\frac{1}{2}$ —1'), med mindre Ax. Den største Deel af Planten nedsænkt mellem Sphagnum o. a. Moseplanter. 6. 4.

I dybe Moser med Hængedynd, sjelden: *Sj.* Dronninggaard (H.), Lyngby Mose! *Sl.* Oxager Mose i Angel (16, 28). 1*

1192. *C. disticha* [Huds. Fl. angl. 403] (Toradet S.) And. III, 15; H. N. XI, 81; *C. intermedia* Good., H. 922; Schum. n. 782; Drej. n. 896; F. D. 1343 (ungt Expl.); Rchb. l. c. fig. 552.

Rodstokken vandret eller skjævt opstigende; *Straaene* rette, trekantede, med rue Kanter; *Bladene* linieformede, flade; *Skedemundingen* ægformet-oval, *Skedehindens* frie Deel bred, brunt-hindeagtig, budt udløbende i Midtnerven, dens forreste Deel

vedblivende, dybt udrandet, lidet fremragende udenfor Skeden; *Axet* forlænget, med toradet stillede og tæt samlede. ovale *Smaaax*, de nedre og øvre ♀, de midterste ♂; *Frugterne* ægformede, mangenervede, foroven smalvingede, jævnt udløbende i et ru, tokløvet *Næb*, længere end de ægformede, tilspidsede *Dækskjæl*.

1—2' høi. En Misdannelse med store, hindeagtigt opblæste og bøiede Frugter er ikke sjelden. 5—6. 4.

I Moser, vaade Enge og Grøfter alm.

1193. *C. arenaria* L. (Sand-S.) H. 921; Schum. n. 783; Drej. n. 897; F. D. 1766; Rehb. l. c. fig. 551; And. III, 16; H. N. XIII, 86; L. Herb. VII, 140.

Rodstokken vandret med talrige og langstrakte Udløbere; *Straaene* trekantede, forneden jævne, foroven rue, mod Frugtmodningen i Spidsen nikkende; *Bladene* smalt linieformede, tilsidst indrullede; *Skedemundingen* kredsround, *Skedehindens* frie Deel kort afskaaren, bruunt-hindeagtig, under Lupen fiint randhaaret-fryndset, dens forreste Deel vedblivende, naaende udover Skeden; *Axet* forlænget, med ægformet-elliptiske *Smaaax*, de øvre ♂, de midterste androgyne, de nedre ♀, ofte adskilte; *Frugterne* ægformede, tydeligt nervede, i Randen bredvingede og langt tilspidsede i et saugtaket-ru, dybt tokløvet *Næb*, ligelange med eller kortere end de æg-lancetformede, tilspidsede *Dækskjæl*.

Rodstokken ofte favnelang, tæt beklædt med visne Bladskeder. *Straaene* $\frac{1}{2}$ —1' høie, foroven et langt Stykke bladløse, nedenfor Midten tætbladede; *Dækskjællene* blegbrune med grøn Rygnerve. 5—6. 4.

Paa Sandmarker og i Sandklitter, hyppig i de fleste Egne og kun sjældnere i de frugtbare Dele af Landet (f. E. i Fyen).

Anm. Den beskrives alm. med de androgyne *Smaaax* i Spidsen ♂, forneden ♀; men paa mange Expl. som jeg har undersøgt, fandt jeg det modsatte Forhold at finde Sted.

β. *Paniculatae*. Rodstokken sammentrængt; Axene brunagtige, alm. dobbelt sammensatte; Frugterne opret-aabne.

1194. *C. teretiuscula* [Good. Trans. Linn. soc. 2, p. 163, t. 19, f. 3] (Trindstænglet S.) H. 925; Schum. n. 786; Drej.

n. 903; F. D. 1886; Rehb. l. c. fig. 572; And. III, 22; H. N. VI, 79.

Rodstokken kort, skjævt krybende, fremskyder i liden Afstand fra binanden flere fornedene trinde, foroven trekantede og rue *Straae* med convexe Sider; *Bladskedens* Munding kreds-rund; *Skedehindens* frie Deel lige afskaaren, dens forreste Deel ligesaa og langt fremragende udenfor Skeden; *Axet* enkelt eller dobbelt sammensat, med kortgrenede eller siddende, tæt samlede (eller de nedre fjerne) *Smaaax*; *Frugterne* ægformede, paa Ryggen hvælvede, ved Grunden svagt stribede, forøvrigt nerveløse, efterhaanden afsmalnede i et tokløvet, i Randen ru-saugtakket *Nøb*, længere end de ægformede, spidse *Dækskjæl*.

Omtrent 1' høi. Bladene smale, blaagrønne. Dækskjællene graa-brune med bred hindeagtig Rand. 5—6. 4.

I Tørvmoser og Kjær, alm. udbredt.

1195. **C. paradoxa** [Willd. Act. acad. berol. 1794, p. 39, t. 1] (Langaxet S.) H. 925; Drej. n. 902; F. D. 1887; Rehb. l. c. fig. 573; And. III, 23; H. N. VI, 78; C. appropinquata Schum. n. 785.

Straaene tueformigt samlede, skarpt trekantede med convexe Sider, foroven rue; *Skedemundingen* kreds-rund, *Skedehindens* frie Deel meget kort og lige afskaaren, dens forreste Deel udrandet, ikke fremragende udenfor Skeden, tidligt sønder-reven; *Blomsterstanden* en sammentrængt Top med sammensatte, tydeligt stilkede *Grene*; *Frugterne* ægformede, paa Ryggen hvælvede, tydeligt nervede, pludseligt udløbende i et tokløvet, i Randen ru-saugtakket *Nøb*; *Dækskjællene* ægformede, spidse, kortere end Frugten.

1½—2½' høi. Adskilt fra foreg. og følg. ved mindre blaagrønne Blade og ved de nedre Bladskeder, som opløses i lange sortbrune Trævler og omgive Tuerne. Dækskjællene brune med smal hindeagtig Rand, og Axene derved før Blomstringen brune. 5—6. 4.

Paa fugtige, især tørvholdige Enge, ikke sjelden, og sandsynligviis udbredt i alle danske Provindser.

1196. **C. paniculata** L. (Top-S.) H. 924; Schum. n. 784; Drej. n. 901; F. D. 1116; Rchb. l. c. fig. 574; And. III, 21; H. N. X, 81.

Straaene tueformigt samlede, skarpt- og ru-trekantede med 2 concave og en plan Side; *Skedemundingen* kredsround, *Skedehindens* frie Deel meget kort, buetformet (næsten utydelig), dens forreste Deel lige afskaaren, vedblivende, lidet fremragende udenfor Skeden; *Blomsterstanden* en dobbelt sammensat Top med forlængede, tydeligt stilkede *Grene*; *Frugterne* ægformede, paa Ryggen hvælvede, ved Grunden svagt stribede, forøvrigt nerveløse, efferhaanden afsmalnede i et tokløvet, i Randen ru-saugtakket *Næb*, af Længde med de ægformede, tilspidsede *Dækskjæl*.

Af Høide med foreg., men kraftigere; Stængelen, især ved Grunden, tykkere, Bladene bredere, blaagrønne. Dækskjællene graabrune med bred, hvid-hindeagtig Rand, hvorved Toppen i yngre Tilstand faaer et graaagtigt glindsende Udseende. 5—6. 4. Forekommer hyppigst med stærkt forgrenet, ofte pyramideformet Top, men *var*.

β, simplicior And. (Cyp. Scand. p. 67). *Blomsterstanden* et sammenknebet, enkelt-sammensat Ax med fjerne, siddende eller meget kortstilkede *Smaaax*.

I Moser og Kjær meget alm. *β*, med Hovedarten, sjeldnere, f. Ex. Flommen ved Sorø! *Falst.* ved Idestrup (Koch).

γ. Muricatæ. Rodstokken sammentrængt; Axene grønlige, *Frugterne* udspærrede, længere end Dækskjællene.

1197. **C. divulsa** [Good. l. c. p. 160] (Melleمبرد S.) H. 924; Drej. n. 900; F. D. 1280; Rchb. l. c. fig. 570; And. III, 20; H. N. VI, 80 (*C. paniculata simplex*).

Straaet fint, trekantet, foroven ru, lidet nikkende; *Skedemundingen* kort og afrundet, *Skedehindens* frie Deel meget kort, udrandet, dens forreste Deel ikke forlænget udover Skeden, med tykkere Rand og vedblivende uforandret; *Axet* forlænget, melleمبرد; *de nedre Smaaax* fjerntsiddende, ofte stilkede, sammensatte og med et Dækblad ved Grunden; *Dækskjællene* ægformede, braadspidsede, hvid-hindeagtige med grøn Ryg-nerve; *Frugterne* æg-kegleformede, plan-convexe, nerveløse, til-

spidsede i et tokløvet, randhaaret-ru *Næb*, uden svampagtigt Cellevæv indvendig; *Nødden* næsten siddende.

1—1½' høi, frisk grøn. 6—7. 4. *Var.*

β, *intermedia* (C. *virens* Lam., C. *muricata* *β*, *virens* Koch, And. III, 18; Lge. Haandb. 2 Udg. p. 607; F. D. 2608). *Smaaaxene* mindre fjerne, kun de nedre adskilte.

I skyggefulde Skove, sjældnere ved Gjærder, sporadisk og ikke alm., men funden i alle danske Provindser. *β*, hist og her paa liggende Steder som Hovedarten.

1198. C. *muricata* L. (Spidskapslet S.) H. 923; Schum. n. 776; Drej. n. 899; F. D. 1526; Rehb. l. c. fig. 561; And. III, 19; H. N. IX, 84.

Straaet opret; *Skedemundingen* aflang, *Skedehindens* frie Deel længere, budt udløbende i Midtnerven, dens forreste Deel naaende udover Skeden, i Randen meget tynd og tilsidst sønderreven; *Smaaaxene* tætsiddende og stilkløse, danne et fortløbende eller kun lidet afbrudt Ax; *Dækskjællene* bruunt-hindeagtige med grøn Rygnerve; *Frugterne* svagt nervede ved Grunden, mere vandret udspærrede, ved Grunden indvendig svampagtigt fortykkede; *Nødden* ved en forlænget Frugtholder fjernet fra Perigyniets Basis; forøvrigt som foreg.

Omtrent 1' høi. 6—7. 4. Hyppigt forekommer en *Var.* (eller rettere Misdannelse) med store, hindeagtigt opblæste og krumbøiede Frugter.

Almindelig over hele Landet: *α*, ved Gjærder, paa Græsmarker og høie Enge; *β*, i Skygge.

Anm. C. *divulsa* *β*, *intermedia* har tidligere snart været henført som Afart til denne, snart opstillet som en egen Art (C. *virens* Lam.), men omhyggelige Undersøgelser af *Durieu de Maisonneure* (Bull. soc. bot. Fr. VI. 621) have godtgjort, at den er en kun lidet fra C. *divulsa* afvigende Form.

1199. C. *vulpina* L. (Ræve-S.) H. 922; Schum. n. 781; Drej. n. 898; F. D. 308; Rehb. l. c. fig. 564; And. III, 17; H. N. IX, 83.

Straaet opret, skarpt og ru-trekantet, med concave Sider; *Skedemundingen* ægformet, *Skedehindens* frie Deel kort, med indbøiet Rand, budt udløbende i Midtnerven, dens forreste

Deel udrandet, vedblivende, lidet fremragende udenfor Skeden. Axet tæt, dobbelt sammensat, med stilkløse, tætsiddende eller ved Grunden lidet adskilte *Smaaax*; *Dækskjællene* ægformede, langt braadspidsede, brunt-hindeagtige med grøn Rygnerve, lidet kortere end de ægformede, plan-convexe, svagt 5—7-nervede, i et tokløvet, ru-saugtakket *Næb* tilspidsede *Frugter*.

1½—3' høi. Kraftigere og med bredere Blade end de foreg. 6—7. 4. Var.

β, *nemorosa* (Rchb. l. c. fig. 563; *C. nemorosa* Rebert., H. 923). Axet fornedet mellembudt, med forlængede Dækblade; *Dækskjællene* blegere.

Paa vaade Enge, i fugtige, lerede Grøfter, alm. β, en Skyggeform (analog med β, af næstforeg. Art), sjældnere end Hovedarten.

bb. *Hyparrhenæ. Smaaaxene* fornedet ♂.

α. *Contiguæ*. *Smaaaxene* tætsiddende eller de nedre lidet adskilte, i Regelen længere end de hindeagtige Dækblade.

aa. *Frugterne* vandret udspærrede.

1200. *C. stellulata* [Good. l. c. p. 144] (Stjerneaxet S.) H. 928; Schum. n. 772; Drej. n. 905; Rchb. l. c. fig. 560; And. IV, 37; H. N. X, 84; *C. muricata* F. D. 284 (ikke god).

Straaene tueformigt samlede, oprette, trekantede, jævne eller foroven lidet rue; *Skedemundingen* oval-kredsround, *Skedehindens* frie Deel tynd, kort afskaaren og afrundet, dens forreste Deel vedblivende, lige afskaaren og fremragende udenfor Skeden; *Smaaaxene* 3—5, rundagtige, lidet adskilte; *Dækskjællene* ægformede, budte, brune med hindeagtig Rand, meget kortere end de bredt ægformede, tydeligt nervede, i et langt, tokløvet, ru-saugtakket *Næb* tilspidsede *Frugter*.

4—10" høi. Bladene smalt linieformede, frisk grønne. Ved de stjerneformigt udspærrede *Frugter* let kjendelig fra alle Arter i denne Afdeling. 5—6. 4.

Paa fugtige Enge, alm.

ββ. Frugterne oprette.

1201. **C. leporina** L. (Hare-S.) Drej. n. 906; Rchb. l. c. fig. 554; And. IV, 26; H. N. VIII, 80; C. ovalis Good., H. 926; Schum. n. 778; F. D. 1115.

Straaene tueformigt samlede, oprette eller opstigende, budt-trekantede, jævne eller oventil lidet rue, foroven et langt Stykke bladløse, forneden tætbladede; *Bladskedens Munding* trekantet-ægformet, *Skedehindens* frie Deel kort afskaaren, hvid-hindeagtig, dens forreste Deel udrandet, vedblivende, langt fremragende udenfor Skeden; *Smaaaxene* 4—6, ovale eller omvendt-ægformede; *Frugterne* ægformede, fladtrykte med en hindeagtig-vinget Rand, tydeligt nervede, tilspidsede i et to-kløvet, ru-saugtakket *Næb*, af Længde med eller kortere end de lancetformede *Dækskjæl*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Bladene faste, rendede. Det nedre Dækblad stundom bladagtigt, af Længde med Axet. Dækskjællene bruun-hindeagtige med grøn Rygnerve. 6—7. 4. Var.

β, *argyroglochis* (Rchb. l. c. fig. 555; H. N. VIII, 77; C. argyroglochis H. 927; F. D. 1710). Bladene længere og slappere, *Smaaaxene* fjernere, omvendt-ægformede, Dækskjællene hvid-hindeagtige med grøn Rygnerve.

Paa høie Enge, Græsgange og ved Veie, alm. — *β*, i Skove, sjældnere: *J.* Haven i Vendsyssel (12); *Sj.* Gurre Vang! Kongens Møller! Sønderskoven ved Sorø!

1202. **C. elongata** L. (Forlænget S.) H. 929; Schum. n. 780; Drej. n. 907; F. D. 1236; Rchb. l. c. fig. 565; And. IV, 32; H. N. X, 83.

Straaene tæt tueformigt samlede, oprette, slappe, ru-trekantede med plane Sider; *Skedemundingen* ægformet, *Skedehindens* frie Deel meget kort afskaaren (i Form af en svag Rand), budt udløbende i Midtnerven, dens forreste Deel udrandet, tynd hindeagtig, tidligt sønderreven, lidet fremragende udenfor Skeden; *Smaaaxene* 6—10, afvejlende eller i 3 Rader, lidet adskilte (især de nedre), elliptisk-valseformede; *Dækskjællene* ægformede, budte med en meget kort Braad, omtrent

halvt saa lange som de lancetformede, fladtrykt-convexe, paa begge Sider mangenervede, i et kort, ru, utydeligt tokløvet *Næb* tilspidsede *Frugter*.

1—2' høi. Bladene lange, gnuigrønne; Dækskjællene brune med hvid-hindeagtig Rand og grøn Rygnerve. Var. med et bladagtigt forlænget Dækblad ved Grunden af det nederste Smaaax. 6. 4.

I Moser og fugtige Skove, hist og her, ikke almindelig.

1203. *C. canescens* L. (Kortkapslet S.) Drej. n. 908; F. D. 285; Rchb. l. c. fig. 546; And. IV, 39; H. N. XI, 80; *C. curta* Good., H. 927; Schum. n. 973—74 (*C. curta* og *canescens*).

Rodstokken sammentrængt, med korte Udløbere; *Straaene* i Tuer, oprette, trekantede med concave Sider, mod Spidsen lidet rue; *Skedemundingen* bredt ægformet, *Skedehindens* frie Deel kort, indbøiet, budt udløbende i Midtnerven, dens forreste Deel næsten lige afskaaren, tynd og tidligt sønderreven, neppe fremragende udenfor Skeden; *Smaaaxene* 5—8, oval-kølleformede, afvexlende eller treradede, de nedre adskilte; *Dækskjællene* bredt ægformede, braadspidsede, kortere end de taglagt-tiltrykte, ægformet-elliptiske, convexe, svagt nervede, i et kort, utydeligt udrandet *Næb* tilspidsede *Frugter*.

Omtrent 1' høi. Hele Planten blaagrøn. Dækskjællene straa-gule med grøn Rygnerve. 6—7. 4.

β , *tenuis* O. F. Lang (Linnæa 1851, p. 538). Spædere, med mere rue Straa, smalere og slappere Blade, Smaaaxene neppe halvt saa store som hos α , det nedre ofte omgivet af et bladagtigt Dækblad.

I fugtige Skove, alm. udbredt. β , *Sl. Marieskoven* ved Flensborg! Wittensee (20)!

Anm. Formen β , er ikke lidet afgivende fra Hovedarten og i Udseende langt mere lig den nærbeslægtede *C. vitilis* Fr. (*C. Persoonii* Sieb.), saa at hvis den ikke afveg fra denne ved mindre dybt udrandede Frugter, hvilket angives som det vigtigste Skjælnemærke mellem *C. canescens* og *C. vitilis*, vilde jeg uden Betænkning have henført den til sidstnævnte, uanseet at denne er en alpmisk Plante. Den slesvigske Form danner altsaa et forbindende Led mellem de 2 Arter, og jeg anbefaler den til nærmere Undersøgelse i den frie Natur.

1204. **C. brizoides** L. (Bævre-S.) H. II, 270; F. D. 2180; Rehb. l. c. fig. 548; And. III, 24.

Rodstokken med Udløbere; *Straaene* oprette, skarpt og rutrekantede; *Axet* kort, toradet, med omtrent 5, tætsiddende, elliptisk-lancetformede, bueformigt udbøiede *Smaaax*; *Frugterne* æg-lancetformede, nerveløse, fra Grunden til Spidsen randhaaret-rue, tilspidsede i et tokløvet *Næb*, lidet længere end de lancetformede, spidse *Dækskjæl*.

Omtrent 1' høi. Dækskjællene straagule. 6—7. 4.

Paa Enge og i fugtige Skove, meget sjelden: *Sl.* Borby og Sehested ved Ekernförde (F. D.). Angives fra Sjælland, funden af Vahl og Schum. (Enum. n. 779), men da Beskrivelsen ikke er god og intet Expl. findes hverken i Vahls eller Schumachers Herb., maa denne Angivelse ansees for tvivlsom. [¶]

β. *Remotæ*. Dækbladene, idetmindste det nedre, bladagtige, forlængede, (meget længere end det tilhørende *Smaaax*), de nedre *Smaaax* langt fjernede fra hinanden.

1205. **C. remota** L. (Axelblomstret S.) H. 928; Schum. n. 775; Drej. n. 904; F. D. 370; Rehb. l. c. fig. 556; And. IV, 40; H. N. VII, 82.

Rodstokken tueformigt sammentrængt; *Straaene* tynde, i Spidsen nikkende, forneden jævne, foroven mellem *Smaaaxene* zigzagbøiede, rue; *Skedemundingen* kredsround, *Skedehindens* frie Deel temmelig bred, opret, hvid-hindeagtig, i Spidsen udrandet, dens forreste Deel vedblivende, langt fremragende udenfor Skeden; *Smaaaxene* 5—8, enkelte, omvendt-ægformede, afvexlende, de 3—4 nedre fjerne, med *Dækblade* længere end *Straaet*; *Dækskjællene* ægformede, spidse, sølvglindsende eller straagule med grøn Rygnerv, kortere end de ægformede, fladtrykte, nervede, i Spidsen saugtakkert-rue og i et tokløvet *Næb* tilspidsede *Frugter*.

1—2' høi. Bladene smale, frisk grønne. 6—7. 4.

I fugtige Skove, almindelig.

1206. *C. Boeninghausenia* [Weihe Bot. Zeit. 9, 2, p. 743] F. D. 2300; Rehb. l. c. fig. 568; And. IV, 41; H. N. X, 82.

Rodstokken tueformet; *Straaene* rette, ru-trekantede; *Skedemundingen* og *Skedehinden* som hos foreg.; *Smaaaxene* 8—12, afvexlende, lancetformede, de 3—4 nedre fjerne, det nederste sammensat, med et *Dækblad* kortere end eller af Længde med *Straaet*, de derpaa følgende uden *Dækblade* og efterhaanden mindre sammensatte, de øvre tætsiddende, enkelte, tilsidst buformigt udbøiede; *Dæskjællene* ægformede, spidse, guulbruun-hindeagtige med grøn Rygnerve, af Længde med de æg-lancetformede, plan-convexe, sribede, fra Grunden randhaaret-rue og i et tokløvet *Næb* tilspidsede *Frugter*.

2—3' høi. Danner tætte Tuer med lange og stærke Rodtrævler. *Straaene* forneden tykkere, *Bladene* bredere end hos foreg., blaa-grønne. 7. 4.

β, *subpaniculata*! *Bladene* bredere, de nedre *Smaaax* paa forlængede, dobbelt sammensatte *Grene* i Form af en Top, det nederste *Dækblad* meget kort.

Ved Randen af Grøfter o. a. fugtige Steder i Skove, sjelden: J. Fusing Skov (3)! *Sj.* Philosophgangen ved Sorø! Braaby Vester-skov (7)! Valø (?) og derfra indplantet i botanisk Have! — *β*, med Hovedarten ved Sorø! *

Anm. O. F. Lang (l. c. p. 492) har fremsat den Formodning, at *C. Boeninghausenia* skulde være en gold Form af *C. paniculata*, fordi han ikke har fundet den med modne *Frugter*. Denne Mening behøver neppe nogen særlig Gjendrivelse; den er himmelvidt forskjellig, saavel i *Characterer* som *Voxested*, fra *C. paniculata* og hører utvivlsomt til samme Gruppe som *C. remota* og *C. axillaris*. Ifølge *Fries* (Bot. not. 1858 p. 129) er den kun en Form af den sidstnævnte Art. Begge disse Arters sjeldne Forekomst og den Omstændighed, at de næsten stedse ere fundne med gølge *Frugter*, har foranlediget flere Botanikere til at frakjende dem Ret som selvstændige Arter, og senest har *Duval-Jouve* (Bull. soc. bot. Fr. XI, 15) fremsat den Anskuelse, at *C. axillaris* skulde være en steril Form af *C. remota*, hvorimod *Crepin* antager den for en Bastard af *C. remota* og *vulpina*. *C. axillaris* er mig for lidet bekjendt til at jeg tør have nogen Mening herom, men hvad *C. Boeningh.* angaaer, kan jeg tilføie, at jeg især hos Formen *β* har fundet talrige fuldmodne og spiredygtige *Frugter*, hvorfor jeg ingenlunde er tilbøielig til at antage denne for en blot gold Form.

C. Heterostachyæ. ♂ og ♀ Axene adskilte fra hinanden*).

a. *Distigmaticæ* (Fr. Bot. not. 1845), med 2 Ar.

aa. *Straaene samlede i tætte Tuer, de nedre Bladskeder med optrævlet Næt.*

1207. *C. stricta* [Good. l. c. p. 196] (Stivtoppet S.) H. 933; Schum. n. 802; Drej. n. 912; F. D. 2548; Rehb. l. c. fig. 583; And. VI, 60; H. N. VIII, 73.

Straaene oprette, skarpt trekantede, rue, med faae eller ingen Straablade; *Bladene* ved Tørring i Randen tilbagerullede; *Skedemundingen* ægformet, *Skedehindens* frie Deel temmelig bred, indbøiet, hindeagtig (hvid eller blegbruun), spidst udløbende i den dybt rendede Midtnerve, dens forreste Deel dybt udrandet, meget tynd og tidligt sønderreven, fremragende udenfor Skeden; *Dækbladene* stivt oprette, kortere end Straaet, uden Skeder, men med 2 Ører ved Grunden; ♂ *Axene* 1—2; ♀ *Axene* 2—3, siddende eller kortstilkede, oprette, langstrakt-valseformede; *Frugterne* elliptisk-ovale, fladtrykte, tydeligt nervede, tilspidsede i et kort, ikke udrandet *Næb*, tidligt affaldende.

2—3' høi, blaagrøn og meget stiv, danner store og tætte Tuer, de bladløse Skeder talrige, med stærkt Trævlenæt. I Spidsen af ♀ *Axene* findes næsten altid ♂ Blomster, hvorved *Axene* blive tilspidsede. Var. betydeligt i Bladenes Brede, Axenes Antal, Form og gjensidige Afstand, Dækskjællenes og Frugternes Farve o. s. v. 5—6. 4.

I Tørvmoser og Kjær meget alm.

1208. *C. caespitosa* L. [Fr. Mant. 3, 156] (Tue-S.) Rehb. l. c. fig. 582; And. VI, 59; F. D. 2547; H. N. VIII, 78;

*) Arterne i denne Afdeling have typisk Ax med adskilt Kjøen, men hos nogle ere i Regelen, hos andre undtagelsesviis, enkelte af *Axene* androgyne (Nr. 1214 har saaledes i Regelen et androgynt Endeax, hos Nr. 1207, 1211, 1212, 1220 o. fl. ere de øvre ♀ Ax næsten altid i Spidsen ♂). Flere Arter i denne Afdeling findes stundom med sammensatte ♀ Ax, hvorved de faae et meget forandret Udseende. Denne Misdannelse har jeg bl. A. iagttaget hos Nr. 1227, 1230, 1231, 1232, 1236 og 1239.

C. pacifica Drej. n. 911; *C. tenuis* Schum. n. 791; *C. Drejeri* Lang.

Straaene oprette, skarpt og ru-trekantede, 3—5-bladede; *de nedre Blade* meget korte, *de øvre* ikke saa lange som *Straaet*; *Bladene* ved *Tørring* i *Randen* tilbagerullede; *Dækbladene* smaae, kortere end *Straaet*, det nedre bladagtigt, med 2 Ører ved *Grunden*, de øvre skedeformede med en Spids; ♂ *Axet* alm. 1, ♀ *Axene* 2—3, siddende eller kortstilkede, tæt samlede, ovale eller kort valseformede; *Frugterne* ægformet-elliptiske, nerveløse, paa begge *Sider* convexe, budte, med et meget kort, ikke ud-randet *Næb*, længere end *Dækskjællene*.

$1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}'$ høi, danner tætte Tuer med lange, frisk grønne Rod-blade med mørkbrune Skeder ved *Grunden*; *Trævlenættet* svagere end hos foreg., men dog tydeligt tilstede (hvilket ikke sees af Fig. i Fl. dan.). Var. i Henseende til ♀ *Axenes* Antal og Form, *Dækskjællenes* Form og Farve. 4—5. 4.

I Tørvmoser og paa Enge: *Sj.* ikke sjelden i det nordøstlige! *F.* Nielstrup (12); *J.* Thy (23), Hodalen o. fl. St. ved Hobro (16), Randers, Mariager (7), Ø. Velling (Dr.), Haraldslund! *Sl.* Husum (16). Fra andre Egne er den mig ikke bekjendt.

* 1209. *C. turfosa* [Fr. Bot. not. 1843, p. 104] (Tørv-S.) And. VI, 58; H. N. X, 75.

Straaene tueformigt samlede, med eller uden Udløbere ved *Grunden* og meget svagt *Trævlenæt* ved de nedre Bladskeder; *Bladene* ved *Tørring* tilbagerullede; *Frugterne* nerveløse, i tørret Tilstand fintstribede, forøvrigt ligesom følgende, med hvilken den er nær beslægtet, og fra hvis var. γ , jeg navnlig ikke formaaer med Sikkerhed at adskille tørrede Exemplarer.

I Tørvmoser, ikke sjelden i Sverige, men findes ogsaa, saavidt jeg af tørrede Expl. kan skjønne, her i Landet (*Sj.* Dyrehaven! Alders-hvile (9), Liunge ved Sorø! *F.* Ollerup (12)) og maaskee vil den ved nærmere Eftersøgning findes paa flere Steder, men den maa undersøges i levende Tilstand. [§]

bb. Rodstokken med kortere eller længere Udløbere; *Bladskederne* uden *Trævlenæt*.

1210. *C. vulgaris* [Fr. Mant. 3, p. 153] (Almindelig S.) And. V, 52; Rehb. l. c. fig. 580—81; H. N. VIII, 76; C.

cæspitosa Good., H. 932; Schum. n. 792; Drej. n. 910; F. D. 1281 og 2478.

Straaene tueformigt samlede, skarpt trekantede, forneden tæt beklædte med *Blade*, som næsten naae *Straaets* Længde; *Skedemundingen* ægformet, *Skedehindens* frie Deel kort afskaaren, budt udløbende i Midtnerven, dens forreste Deel afrundet eller næsten lige afskaaren, tynd, tidligt sønderreven, neppe naaende udenfor Skeden; *Bladene* ved Tørring indrullede; *Dækbladene* bladagtige, uden Skede, men med 2 Ører ved Grunden, det nedre omtrent naaende Spidsen af ♂ *Axet*; ♂ *Axene* 1—2; ♀ *Axene* 2—4, siddende eller kortstilkede, oprette, valseformede; *Frugterne* oval-elliptiske, udadtil hvælvede, indadtil flade, mangenervede, med et kort, udeelt *Næb*, længere end de budte *Dækskjæl*.

5—6. 4. En yderst foranderlig Plante. Blandt de talrige Afændringer i Henseende til Høiden, Voxemaaden, ♀ *Axenes* Form og Stilling, *Frugternes* og *Dækskjællenes* Farve o. s. v., maa fremhæves:

β, *stolonifera* Hartm. Udløberne langstrakte; *Straaet* kort, noget krumbøiet.

γ, *juncella* Fr. (H. N. X, 76). Udløbere 0, *Bladene* smale, børsteformigt sammenrullede, *Axene* fjerne, tynde og langstrakte.

δ, *tenuis* Hartm. *Bladene* flade, smale og slappe, ♀ *Axene* fjerne, de nedre tydeligt stilkede.

Enge og Moser, meget alm. over hele Landet. — β, paa mere tør Grund, f. Ex. Overdrev; γ, i Hedemoser, sjældnere: J. Estrup (12) og Faurholt i Vendsyssel! Hørbylund V. f. Silkeborg! *Bornh.* Poulsker (20)! δ, i fugtige Skove; Sj. Dyrehaven! J. Haldum Skov ved Frysensborg!

? *C. aquatilis* [Wahlenb. Fl. lapp. p. 246] (Vand-S.) F. D. Suppl. t. 33; Rehb. l. c. fig. 587; And. V, 54; H. N. III, 77.

Straaene oprette, budtkantede, jævne; *Bladene* i tørret Tilstand med indrullet Rand; *Dækbladene* bladagtige, naae ud over *Straaet*, det nederste med en kort Skede; ♂ *Axene* 1—3, ♀ *Axene* 3—4, oprette, kølleformet-valseformede, de nedre tydeligt stilkede; *Frugterne* smaae, tæt og regelmæssigt stillede,

ovale, nerveløse, budte, med et meget kort, udeelt *Næb*, lidet længere end *Dækskjællene*.

Et Expl. af denne Art findes i M. Vahls Herb. med Angivelse af at være samlet i Danmark, men uden Voxested (cfr. Drej. i Krøytidsskr. III, 422). Maa nærmere eftersøges, da dens langt nordligere Voxekreds gjør dens Forekomst her i Landet tvivlsom.

Anm. *C. tricostata* Fr. Mant. 3, 152, And. V, 55; H. N. X, 75 (var.) kunde muligviis ogsaa findes i vor Flora. Den beskrives med et høit (omtr. 2'), ru *Straa*, lange *Dækblade*, *Bladene* flade eller ved Tørring lidet tilbagerullede, ♀ *Axene* 3—4, valseformede, *Frugterne* tæt taglagte i 8 Rader, trenervede, budte med en kort Spids. Den maa søges ved Aabredder o. a. fugtige Steder. Om *C. obtusata* Schum. (n. 804) hører herhen, er ikke let at afgjøre, da intet Expl. er opbevaret i hans Herbarium, og Beskrivelsen ikke er tilstrækkeligt betegnende.

1211. *C. trinervis* [Degland i Lois. Fl. gall. ed. 1, II, p. 731 (Klit-S.) Drej. Symb. Caricol. tab. 7; Fr. S. Veg. Sc. II, 561; Kze. Riedgr. t. 1, f. 2; F. D. 2665; *C. frisia* H. Koch i Flora 1846, p. 273.

Rodstokken krybende; *Straaet* kort (3—8") og stivt, ved Grunden tæt omgivet af henvisnede Bladskeder, opret, budttrekantet, jævnt; *Bladene* tætsiddende, rendede, ved Tørring indrullede, i Spidsen trekantede; *Dækbladene* længere end *Straaet*, øreformigt-omskedende; ♀ *Axene* 3 eller flere, tæt samlede, valseformede; *Frugterne* ægformet-elliptiske, fint punkterede, 3—7-nervede, af Længde med de budte, ofte braadspidsede *Dækskjæl*.

Ved Slesvigs vestlige Strandbredder (Nolte), Sandklitter paa Rømø (16)! og Sylt (F. Müll.). [3]

Anm. De af mig undersøgte Expl. afvige fra Beskr. (hos Kunze l. c.) ved Endeaxet i Spidsen ♀, de 2—3 derpaa følgende androgyne (i Spidsen ♂), de 2—3 nederste ♀, Frugterne elliptiske, med 7 Nerver (3 stærkere, 4 svagere), men stemmer forøvrigt aldeles overens med Beskr. og Afbildn. saavelsom med Expl. fra Frankrigs Vestkyst, hvor den er almindelig. Den er en god Art, beslægtet dels med *C. acuta*, dels med *C. aquatilis*, men ved de rendede Blade og tydeligt nervede Frugter forskjellig fra begge, og i Udseende mere lig *C. vulgaris*.

1212. *C. acuta* L. (Spidsaxet S.) H. 934; Schum. n. 803;

Drej. n. 913; F. D. 2247; Rehb. l. c. fig. 584; And. V, 56; H. N. VIII, 74.

Straaet i Spidsen nikkende, skarpt og ru-trekantet; *Bladene* flade, i Randen tilbagerullede; *Skedemundingen* skjævt ægformet-kredsround, *Skedehindens* frie Deel kort afskaaren, bruun-hindeagtig, dens forreste Deel skjæv; *Dækbladene* naae op over Straaet, bladagtige, det nedre uden eller med en kort Skede og 2 korte Ører ved Grunden; ♂ *Axene* 2—3, ♀ *Axene* 3—4, langstrakt valseformede, under og efter Blomstringen nikkende, det nedre kortstilket, de øvrige siddende; *Frugterne* fastsiddende, oval-elliptiske, paa begge Sider hvælvede (eller næsten kugleformede), utydeligt nervede, ende i et kort, ikke kløvet *Næb*; *Dækskjællene* spidse, omtrent af Frugternes Længde.

1 $\frac{1}{2}$ —3' høi. Bladene alm. brede, ofte blaa-grønne. 5—6. Var. med fjerne eller tætsiddende ♀ Ax, samt i Henseende til Dækskjællenes og Frugternes Form og Farve. ♀ Axene ofte i Spidsen ♂, var.

▷ *anomala*. Alle Axene ♂, buetformigt nikkende.

Ved Bredderne af Søer og Aaer, i Kjær, forekommer i alle danske Provindser. ▷ ved Bredderne af Peblingsøen ved Kbhavn!

* 1213. **C. proluxa** [Fr. Mant. 3, 150] And. V, 57, H. N. X, 74.

Rodstokken uden eller med korte Udløbere; *Bladene* bredere, slappe, frisk grønne; ♀ *Axene* adskilte, langstrakt valseformede, tilsidst hængende; *Frugterne* let affaldende, ægformede, fladtrykt-convexe, tydeligt nervede, kortere end de tilspidsede *Dækskjæl*; forøvrigt som foreg.

Paa lignende Steder som foreg.: Sjø. Leire (12), Sorø! F. Høirup Mølle (12); J. Evedrup (Drej. herb.). Jeg har tidligere fundet den paa flere Steder, som jeg ikke nu erindrer; jeg skulde næsten formode, at den her i Landet ikke er sjelden, men paa Grund af den foreg. Arts store Foranderlighed kan den let forveksles med denne, som den i Udseende har megen Lighed med, skjøndt den i flere Characterer nærmer sig mere til C. stricta.

Anm. C. *æmulans* Drej. n. 909 (tildeels); med et kølleformet ♂ Ax; ♀ Axene fjerne, ægformet-ovale; *Dækbladene* brede, længere end Straaet o. s. v., er en eiendommelig Form, som har en fjern Lighed med C. acuta, men hverken kan forbindes med denne eller nogen anden mig bekjendt Art. Saalænge som imidlertid kun et

enkelt, ikke fuldstændigt Expl. foreligger, bør den neppe optages som egen Art i Floraen. (Af Drej. blev den forenet med en aldeles forskjellig Form: cfr. *C. paludosa*). Grøfter ved Røiels Bom (Drej., 11).

b. *Tristigmaticæ* (Fr.), med 3 Ar.

aa. *Frugten uden eller med meget kort Næb*.

α , 1 endestillet androgynt Ax. Frugterne fiint ru-punkterede.

1214. **C. Buxbaumii** [Wahlenb. Vet. ac. handl. 1803, p. 163] H. 943; Drej. n. 914; F. D. 1406; Rchb. l. c. fig. 589; And. VI, 65; H. N. VIII, 79; *C. polygama* Schk. Riedgr. tab. Gg. (1801); *C. subulata* Schum. n. 793.

Straaene skarpkantede, lidet rue, forneden omgivne af *Skeder* med optrævlet Næt; *Skedemundingen* langagtig-ægformet, *Skedehindens* frie Deel temmelig bred, indbøiet, spidst udløbende i Midtnerven, dens forreste Deel meget tynd, tidligt sønderreven, *det nedre Dækblad* omtrent af Længde med (lidet kortere eller længere end) *Straaet*; *Endeaxet* kølleformet, foroven ♀; ♀ *Axene* 2—3 ovale, oprette, kortstilkede eller næsten siddende, det nedre fjernet fra, de øvre tæt ved *Endeaxet*; *Frugterne* elliptisk-ovale, budt-trekantede, tydeligt nervede, budte, med et meget kort, svagt udrandet *Næb*, omtrent af Længde med (længere eller kortere end) de braadspidsede *Dækskjæl*.

$1\frac{1}{2}$ —2' høi. Bladene alm. blaagrønne, *Skederne* rødlig. *Frugterne* blege, *Dækskjællene* sortbrune eller mørkt rødbrune, og *Axene* derved brogede. 6. 4.

I Tørvmoser, meget sjelden: *Sj.* en Mose ved Farum (M. Vahl). Siden den Tid hverken funden der eller andetsteds i Landet.

β , 1 endestillet ♂ Ax. *Frugterne* jævne (ikke punkterede).

1215. **C. limosa** L. (Dynd-S.) H. 945; Schum. n. 797; Drej. n. 915; F. D. 646; Rchb. l. c. fig. 592; And. VII, 73; H. N. X, 71.

Rodstokken skjævt opstigende, med Udløbere; *Straaene* skarpt trekantede, med smale, rendede *Blade*, meget kortere end *Straaet*; *Skedemundingen* ægformet, *Skedehindens* frie Deel temmelig bred, hvid-hindeagtig, budt udløbende i Midtnerven,

dens forreste Deel udrandet, fremragende udenfor den slappe, indfoldede Skede, der foroven er smalere end Bladpladen, *Dækbladene* traadformede, rendede, ved Grunden øreformigt omfattende, kortere end Straaet; ♂ *Axet* linieformet; ♀ *Axene* 1—2, ægformet-elliptiske, langstilkede, mod Frugtmodningen hængende; *Frugterne* omvendt-ægformet-ovale, fladtrykt-trekantede, svagt nervede, med en meget kort, udeelt *Spids*, omtrent af Længde med de elliptiske, tilspidsede *Dækskjæl*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi, blaagrøn. Dækskjællene glindsende rødbrune. 5—6. 4.

I dybe Moser med Hængedynd, ikke alm.: *Sj.* Bøllemosen ved Hillerød (Knæckenborg), Søndersøen ved Værløse (14), Ruderhegn! Lyngby Mose! *Frø* (10); *J.* Estrup i Vendsyssel (12), Sjørring og V. Vandet i Thy (Carst), Vildsted Sø ved Løgstør (8)! Aalborg, Eveldrup (Drej, Herb.), Moser ved Tostrup Sø, alm. mellem Viborg og Skive (16), Moser ved Østbirk (2), Ribe (28); *Sl.* Schirnau ved Eideren (20).

1216. *C. pallescens* L. (Bleg S.) H. 947; Schum. n. 795; Drej. n. 917; F. D. 1050; Rchb. l. c. fig. 617; And. VII, 78; H. N. XII, 84 (var.).

Rodstokken tueformet, uden Udløbere; *Straaene* foroven skarpkantet-rue; *Bladene* finthaarede og rue; *Skedemundingen* omvendt-ægformet, *Skedehindens* frie Deel temmelig bred, opret, hvid-hindeagtig, budt udløbende i Midtnerven, dens forreste Deel langt fremragende udenfor Skeden med 2 Ører og mellem disse en spids Indskjæring; *Dækbladene* længere end Straaet, med meget korte Skeder; ♂ *Axet* lancetformet; ♀ *Axene* 2—3, ovale, tætblomstrede, stilkede, mod Frugtmodningen nikkende; *Frugterne* ovale, budte, uden *Næb*, paa begge Sider convexe eller utydeligt trekantede, svagt sribede, omtrent lige lange med de ægformede, spidse *Dækskjæl*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Hele Planten guulgrøn. ♂ *Axet* straaguult; ♀ *Dækskjællene* hvidhinde eller blegbrune med grøn Rygnerve. (En tilfældig Form med *Dækbladene* ved Grunden rynkede paatværs: *C. undulata* Kunze, Rchb. l. c. fig. 618, er neppe engang at ansee for en Afart). 5—6. 4.

Paa høie Enge og i Skove, ikke sjelden.

1217. *C. strigosa* [Huds. Fl. Angl. II, p. 411] (Tyndaxet

S.) H. 944; F. D. 1237; Rehb. l. c. fig. 602; And. VIII, 99; H. N. XI, 74.

Rodstokken tueformet, med korte Udløbere; *Straaene* budtkantede, jævne; *Bladene* brede, flade; *Dækbladene* bladagtige, langt omskedende, omtrent naaende Spidsen af Straaet; ♀ *Axene* 3—5, smalt linieformede, fjernblomstrede, alle fjernede fra hverandre, mod Frugtmødningen hængende, de nedre langstilkede; *Dækskjællene* æg-lancetformede, spidse, hvid-hindeagtige med grøn Rygnerve, kortere end de elliptiske, nervede, trekantede, i et skjævt afstumpet, udeelt Næb tilspidsede *Frugter*.

1—2' høi, frisk grøn. 5—6. 4.

I Skove, meget sjelden og kun bekjendt fra *Sl.*: Kobbermølleskoven ved Flensborg (H.), Pulverholz og Louisenlund ved Slesvig (16). 31

1218. **C. maxima** [Scop. Fl. carn. II, p. 229] (Kjæmpe-S.) *C. pendula* Huds.; Hans. Herb. n. 248; Rehb. l. c. fig. 604; *C. Agastachys* Ehrh.

Rodstokken tueformet; *Straaene* skarpkantede, oventil lidet rue; *Bladene* brede, flade, i Randen og paa den kjølformede Rygnervæ rue; *Skedemundingen* æg-lancetformet, *Skedehindens* frie Deel temmelig bred, indbøiet, tilspidset udløbende i Midtnerven, dens forreste Deel vedblivende, udrandet, neppe fremragende udenfor Skeden; *Dækbladene* bladagtige, langt omskedende, naaende omtrent til Spidsen af Straaet; ♀ *Axene* 4—5, langstrakt valseformede, tætblomstrede, buiformigt hængende, alle fjernede fra hverandre; *Dækskjællene* lancetformede, tilspidsede, brune med grøn Rygnerve, kortere end de smaae, elliptiske, trekantede, nerveløse, i et kort, udrandet Næb tilspidsede *Frugter*.

Høi (2—3') og bredbladet, Bladene blaa grønne, Frugterne forholdsviis smaae. 6—7. 4.

I fugtige Skove, ved Bredderne af Vandløb, meget sjelden. Prof. Nolte har meddeelt mig at den er funden i Nærheden af Kobbermøllen ved Flensborg (Hansen). 31

1219. **C. panicea** L. (Hirse-S.) H. 947; Schum. n. 796; Drej. n. 916; F. D. 261; Rehb. l. c. fig. 607; And. VII, 76; H. N. IX, 75 (var.); L. Herb. VIII, 144.

Rodstokken med Udløbere; *Straaet* sribet, næsten trindt, jævnt (ikke ru); *Bladene* brede, i Randen og paa Rygnerven lidet rue, forøvrigt jævne; *Skedemundingen* kredsround-hjerteformet, *Skedehindens* frie Deel kort, indbøiet, meget tynd og gjennemsigtig, dens forreste Deel kort afskaaren, meget tynd og tidligt sønderreven; *Dækbladene* langt omskedende, af Længde med eller kortere end det tilhørende Ax, meget kortere end *Straaet*; ♂ *Axet* lancetformet; ♀ *Axene* 1—3, linie-valseformede, fjernblomstrede, stilkede, oprette; *Frugterne* ovale med et kort *Næb*, paa begge Sider convexe, svagt nerveede, lidet længere end de ægformede, budte eller lidet spidse *Dækskjæl*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi, blaagrøn. Dækskjællene kastaniebrune med hvid hindeagtig Rand og guulgrøn Midtnerve. 5—6. 4. Var.

β , *sublivida* Hartm.? *Straaet* fint, *Bladene* meget smale, *Frugterne* og *Axene* mindre, det øvre ♀ Ax naaer ligesaa høit som ♂ *Axet*.

Paa fugtige Enge, meget alm. β , Enge ved Sorø!

γ . ♂ *Axene* flere. *Frugterne* ru-punkterede.

1220. **C. glauca** [Scop. Fl. carn. II, p. 223] (Blaagrøn S.) Drej. n. 931; Rehb. l. c. fig. 648; And. VII, 79; H. N. IX, 76; C. recurva Huds., H. 949; Schum. n. 801; F. D. 1051.

Rodstokken udskyder Udløbere; *Straaet* opret, jævnt, *Bladene* flade, i Randen og paa Underfladens kjølformede Midtnerve rue; *Skedemundingen* næsten kredsround, *Skedehindens* frie Deel temmelig bred, afrundet, opret, bruun-hindeagtig, dens forreste Deel udrandet, tynd, lidet fremragende udover Skeden; *Dækbladene* bladagtige, det nedre kort øreformigt-omfattende, omtrent af *Straaets* Længde; ♂ *Axene* alm. 2; ♀ *Axene* oval-valseformede, tæt blomstrede, stilkede, mod *Frugtmodningen* hængende; *Frugterne* omvendt-ægformede eller ovale, budte, med et meget kort, vorteformet *Næb*, paa begge Sider convexe, paa de 2 Rande svagt haarede, omtrent ligelange med de ægformede, spidse *Dækskjæl*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi, blaagrøn. 6—7. 4. Var. med 1 ♂ Ax og med ♀ Axene i Spidsen androgyne, samt

β, *sphaerostachya* Lge., F. D. 2666 (*C. thuringiaca* Schk. Handb. 4, p. 184 tab. Ppp!) 1 ♂ Ax; 3—5 siddende, næsten kugleformede ♀ Ax.

I lerede Grøfter, ved Kildevæld, paa Enge og fugtige Steder i Skove, alm. β, i stor Mængde paa en Eng mellem Raavaddam og Strandmøllen 1840! (senere ikke gjenfunden).

♂, 1 ♂ Ax. Frugterne duunhaarede.

αα. Dækbladene med meget kort eller ingen Skede; Bladene rue i Randen af opadvendte Smaatorne.

* Rodstokken tueformet, uden Udløbere.

1221. *C. montana* L. (Bakke-S.) Drej. n. 928; F. D. 1769; Rehb. l. c. fig. 633; And. VII, 85; H. N. VI, 72; *C. collina* Willd., H. 937.

Straaene talrige, tynde, oprette, foroven lidet rue, bladløse og kun ved Grunden omgivne af faae og korte *Stængelblade* samt tætte Bladknipper med lange Blade; *Dækbladene* hindeagtige, omfattende og skraat afskaarne, i Spidsen udrandede med en sylformet Spids i Indskjæringen; ♀ *Axene* 1—2, ægformet-ovale, tætsiddende; *Frugterne* omvendt-ægformet-elliptiske, nervede, med et meget kort, svagt udrandet *Næb*, længere end de budte, kort braadspidsede *Dækskjæl*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi, frisk grøn, de nedre Bladskeder mørkrøde, langs Midten nætformigt optrævlede. Bladene fra foregaaende Aar blive henvisnede siddende paa Planten og ere længere end de unge *Straa*. Dækskjællene og de hindeagtige Dækblade mørkt rødbrune. 5—6. 4.

I høitliggende Skove og paa Bakker mellem Krat; er mlg knn bekjendt fra Halvøen og Nordsjælland: J. Aagaards Veirmølle i V. Hanherred (16), Dybdals Bakker ved Aalborg (Dr.), Hobro, Mariager Klosterskov (16), Fusing Skov (Dr.), Haraldslund (Estrup); St. Rødding (16); Sj. Boserup! Jonstrup Vang! Hareskoven (Aabye), Gjels Skov! Fuglevad Mølle (9), Nymølle (1), Charlottenlund! *

1222. *C. pilulifera* L. (Kugleaxet S.) H. 937; Schum. n. 788; Drej. n. 927; Rehb. l. c. fig. 631; And. VII, 82; H. N. XII, 85; *C. filiformis* Poll., F. D. 1048 (ikke L.)

Straaene tynde, tilsidst krumbøiede, foroven lidet rue, et langt Stykke bladløse, ved Grunden med faae tætsiddende

Blade og omgivne af talrige *Bladknipper*; *Skedemundingen* kreds-
rund, *Skedehindens* frie Deel meget kort afskaaren, dens forreste
Deel svagt udrandet, ikke naaende udover Skeden; *det nedre*
Dækblad med 2 korte Ører ved Grunden, bladagtigt, linie-
eller sylformet; ♀ *Axene* 2—3, næsten kugleformede, mere
eller mindre tætsiddende; *Dækskjællene* ægformede, sylspidsede
ved en udløbende Midtnerve, omtrent ligelange med de oval-
kugleformede, nerveløse, finhaarede, meget kortnæbede *Frugter*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Dækskjællene blegbrune med grøn Midtnerve. Alm.
omgivet af visne Blade ved Grunden ligesom foreg. 6—7. 4. Var.

β, *longebracteata*! Det nedre Dækblad meget langt, Axene
blege, det nedre ofte adskilt fra de øvrige.

Paa tørre Bakker, aabne Steder i Skove o. s. v., alm. udbredt.
β, i Skygge.

** Rodstokken med Udløbere.

1223. *C. ericetorum* [Poll. Fl. palat. 2, p. 580] (Lyng-
S.) Drej. n. 929; F. D. 1765; Rchb. l. c. fig. 636; And.
VII, 83; H. N. VII, 75; *C. ciliata* Willd., H. 937.

Straaet jævnt, tilsidst noget bøiet; *det nedre Dækblad*
meget kort, braadspidset, hindeagtigt omfattende; ♀ *Axene*
1—2, tætsiddende, ovale; *Dækskjællene* omvendt-ægformede, af-
rundede, randhaarede, med hvid-hindeagtig Rand og ikke ud-
løbende, bruun Midtnerve, kortere end de oval-rundagtige,
nerveløse, meget kortnæbede *Frugter*.

$\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ ' høi. Bladene brede, korte og stive, næsten aldeles jævne.
Axene have et graaagtigt glindsende Udseende. 5—6. 4.

Paa tørre, solaabne Bakker og Lyngheder paa Halvøen hist og
her, paa Øerne sjeldnere: *Sj.* Nedre Draaby i Hornsherred (19),
Blåsenborg Kro ved Ledreborg (20!), Brinkerne i Frederiksdals Skov
mod Fuursøen! Brede (Dr.), Ørholm (7); *Bornh.* Helveds- og Paradiis-
bakkerne ved Nexø (20). [*

1224. *C. præcox* [Jacq. Fl. austr. V, p. 23, t. 446] (Vaar-
S.) H. 936; Schum. n. 787; Drej. n. 930; F. D. 1527;
Rchb. l. c. fig. 634; And. VII, 84; H. N. XI, 72.

Straaet jævnt, opret; *Skedemundingen* næsten kredsrund,
Skedehindens frie Deel kort, buetformet, dens forreste Deel lige

afskaaren, tynd, ikke naaende udover Skeden; *det nedre Dækblad* kort, bladagtigt, sylformet, omfattende eller kort omskedende; ♀ *Axene* 1—3, siddende eller kortstilkede, valseformet-elliptiske; *Dækskjællene* ægformede, tilspidsede eller budte, brunnagtige med grøn, udløbende Nerve; *Frugterne* omvendt-ægformet-ovale, nerveløse, med et kort, svagt udrandet *Næb*, af Dækskjællenes Længde.

$\frac{1}{3}$ —1' høi. Bladene brede, i Randen rue, forøvrigt jævne. Ved de brune Ax og ikke randhaarede Dækskjæl let kjendelig fra foreg. Det nedre Dækblads Skede stundom forlænget. 5. 4.

Paa tørre Marker, Bakker, ved Randen af Veie o. s. v., ikke sjelden.

ββ. *Dækbladene* omskedende; *Bladene* i Randen rue af nedadvendte *Smaatorne*.

1225. *C. digitata* L. (Fingeraxet S.) H. 940; Schum. n. 784; Drej. n. 926; F. D. 1466; Rehb. l. c. fig. 699; And. VII, 88; H. N. XI, 71.

Rodstokken tueformet, uden Udløbere; *Straaene* talrige, jævne, ved Grunden med skedeformede *Blade* uden eller med meget kort Plade samt tætte Bladknipper; alle *Dækbladene* omskedende, skjævt afskaarue, hindeagtige; ♀ *Axene* 2—3, stilkede, oprette, tilsidst fjernblomstrede; *Dækskjællene* omvendt-ægformede, budte eller udrandede med en meget kort Braad, glindsende brune med hindeagtig Rand og grøn, ikke udløbende Midtnerve; *Frugterne* omvendt-ægformede, med et meget kort *Næb*, ligelange med Dækskjællene.

6—8" høi, de nedre Bladskeder røde. ♀ *Axene* naae ved Stilkens Forlængelse op til eller ud over ♂ *Axet*, hvorved Blomsterstanden faaer et fingerformet Udseende. 5—6. 4.

Skovbrinker, især paa Leer- eller Kalkgrund, sporadisk og ikke alm.: *J.* Palstrup ved Viborg, Himmelbjerget (7), Yding Skov ved Skanderborg, Skaadeklint ved Aarhus (2), Brandbjerg (28), Greis Mølle (12); *Sl.* Rødding, Gram (1). Kobbermølleskoven ved Flensborg, Dyrehaven ved Slesvig (16); *Sj* Alindelille Fredskov! Ledreborg (12), Kattinge ved Roeskilde! Frederiksdals Skov paa Bakkerne mod Fuursøen! Brede (Dr.), Lellinge Skov ved Kjøge! *Møens* Klint alm.! *Bornh.* i Almindingen og i Skove ved Bobbe- og Kobbæ-Aaen (20).

bb. Frugtens Næb forlænget, mere eller mindre dybt tokløvet.

α. 1 ♂ Ax.

αα. ♀ Axene kortstilkede, under Modenheden oprette.

1226. *C. flava* L. (Guul S.) H. 938; Schum. n. 789; Drej. n. 918; F. D. 1047; Rehb. l. c. fig. 654; And. VII, 93; H. N. XIII, 82.

Straaene tæt tueformigt samlede, uden Udløbere, jævne, oprette; *Bladene* flade eller rendede, med kjølformet Midtnerne paa Underfladen; *Skedemundingen* skjævt oval, *Skedehindens* frie Deel temmelig kort, i Randen ujævnt bølget, afrundet, dens forreste Deel udrandet eller skraat afskaaren, naaende udenfor Skeden, *Dækbladene* kort omskedende, bladagtige, meget længere end *Straaet*, tilsidst tilbagebøiede; ♀ *Axene* 2—4, tæt ved ♂ *Axet* og indbyrdes tæt samlede, kortstilkede (det nedre ofte fjernet fra de øvrige og langstilket), oval-kugleformede; *Frugterne* ægformede, opblæste, nervede, tilspidsede i et tilbagebøiet, lidet ru *Næb* af Perigyniets Længde, længere end de budte *Dækskjæl*.

Omtrent 1' høi, guulgrøn, ♂ *Axet* straaguult. 5—6. 4.

* *lepidocarpa* (C. *lepidocarpa* Tausch, Kze. Suppl. Riedgr. t. 13 f. 2; H. N. X, 70). Spædere, med mindre, fra ♂ *Axet* fjernede, rundagtig-ovale ♀ *Ax*; *Frugterne* mindre, *Næbet* kortere end Perigyniet, mindre bøiet.

I Moser og paaa fugtige Enge. * er hos os meget hyppigere end Hovedarten.

Anm. De Kjendetegn, som ere anførte for *C. lepidocarpa*, ere neppe tilstrækkelige til at adskille denne som en særegen Art.

1227. *C. Oederi* [Ehrh. Calam. n. 79] H. 939; Drej. n. 919; Rehb. l. c. fig. 652; And. VII, 92; H. N. V, 85; L. Herb. VIII, 142; *C. divisa* F. D. 371; *C. flava* β, Schum. n. 789.

Straaene i tætte Tuer; *Bladene* smale, rendede, tilsidst i Randen indrullede; *Skedemundingen* kredsround-ægformet, *Skedehindens* frie Deel kort, budt, dens forreste Deel lige afskaaren, lidet fremragende udenfor Skeden; ♀ *Axene* mindre, rundagtig-

ovale; *Frugterne* smaae, ægformet-elliptiske, med svagere Nerver, tilspidsede i et næsten ret, ru Næb af lidet over Perigyniets Længde; forøvrigt som foreg.

2—9" høi. 5—7. En meget foranderlig Plante. Dværgformen (β , *pygmæa* Anders. l. c. p. 25) med Straaene meget lave, kortere end de golde Bladknipper, er *C. demissa* F. D. 1342. En mere afvigende Form er:

* *oedocarpa* Anders. p. 25. Dækbladene opret-aabne, omtrent af Længde med Straaet; ♂ Axet ved en tydelig Stilk fjernet fra de indbyrdes adskilte, ægformet-ovale ♀ Ax; Frugterne med stærkere Nerver og længere Næb.

Meget alm. ved Søbredder, paa oversvømmet Sandgrund og paa Tørvjord, især hvor Grønsværen nylig har været afskaaren. * (en meget afvigende Form, som synes at danne en Overgang til *C. fulva* — eller efter Andersson til *C. speirostachya*), er sjældnere: *Sj.* Hellebæks Vang! Teglstrup Hegn (15), Ordrups Mose! Løngs Almanak ved Sorø! *Falst.* ved Pandebjerg (Estrup)! *Langel.* ved Tranekjær (12).

1228. *C. extensa* [Good. l. c. p. 175] (Udspilet S.) H. 939; Drej. n. 920; F. D. 1709; Rehb. l. c. fig. 655; And. VII, 91; H. N. III, 72.

Rodstokken tueformet, uden Udløbere; *Straaene* oprette, jævne; *Bladene* børsteformigt indrullede; *Dækbladene* meget længere end Straaet; tilsidst bueformigt udspilede, det nederste kort omskedende, de øvrige uden Skede; ♀ *Axene* 2—4, ovale, tæt samlede og siddende (eller det nedre lidet fjernet fra de øvrige og kortstillet); *Frugterne* elliptiske, nervede, med et lige, jævnt (ikke ru) Næb, omtrent $\frac{1}{3}$ af Perigyniets Længde; *Dækskjællene* ægformede, braadspidsede, kortere end Frugterne.

$\frac{1}{2}$ —1' høi og stiv, noget blaagrøn. 6—7. 2. Var.

β , *pumila* Anders. l. c. p. 26. Straaene meget lave (1—2"), noget bøiede, kortere end de seglformigt krummede Blade.

Paa Strandenge: hist og her (ikke alm.) ved Kysterne af Østersøen og Oresundet: *Als* ved Igenhaf (20); *Sl.* Gelting Birk (28) og Bæverør (16)! Sliemunde ved Maasholm (Jessen); *Femern* (16); *Loll.* ved Nakskov Fjord (19); *Falst.* Grønunds Nor mellem Oureby og Næsby! *Saltholm* (Schlichtkrull); *Christiansø* (H). — β , i Vandhuller ved Hammeren paa Bornholm! *F.* ved Fyenshoved! *

Ann. De af mig paa Falster samlede Expl. afvige ved bredere, i frisk Tilstand næsten flade Blade, det nedre Dækblad langt om-

skedende; Næbet længere (næsten af Perigyniets Længde). Maaskee hører denne til Formen *C. Balbisii* Spreng., Rchb. l. c. fig. 655 β .

1229. **C. distans** L. (Fjernaxet S.) F. D. 2434; Rchb. l. c. fig. 622; And. VIII, 96; H. N. VII, 76; *C. binervis* H. 942; Drej. n. 923.

Rodstokken tueformet, uden Udløbere; *Straaene* jævne; *Bladene* flade; *Skedemundingen* næsten kredsround, *Skedehindens* frie Deel kort, budt, noget bølget, dens forreste Deel vedblivende, fremragende udenfor Skeden i Form af et aflangt, budt, Bladpladen modsat Øre; ♂ *Axenes* Skjæl skident straaugule; ♀ *Axene* 2—3, fjerne, alle stilkede (det nedre ofte langstillet), valseformet-ovale, omgivne af bladagtige, langt omskedende *Dækblade*, der ere længere end de til samme hørende og næsten naae det følgende Ax; *Dækskjællene* ægformede, budte med en kort Braad af den udløbende, grønne Nerve; *Frugterne* længere end *Dækskjællene*; ægformede, budt-trekantede, nervede, tilspidsede i et lidet ru (tilsidst jævnt), paa den indre Side af Spaltningen smaatornet-ru *Næb*.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi. Bladene korte, mat- og bleggrønne, med alm. talrige og meget fine røde Punkter paa Bladskeden. Det nedre ♀ Ax udgaaer ofte nærvæd Grunden af Straaet. 6—7. 7.

Paa Strandenge og Overdrev nærvæd Havet, funden i alle danske Provindser, men sporadisk og ikke alm.

Anm. Drejer (l. c.) beskriver Perigyniets Næb som "jævnt", hvilket jeg ogsaa har fundet paa ældre Expl., formodentlig paa Grund af at de rue Fremragninger, som i yngre Tilstand stedse ere tilstede, tidligt forsvinde. — Den ægte *C. binervis* Sm. er en aldeles forskjellig Plante, som ikke er funden og neppe findes i Danmark.

1230. **C. Hornschuchiana** [Hoppe i Flora 1824, p. 599] (Skedestillet S.) Drej. n. 922; Rchb. l. c. fig. 621; And. VIII, 95; *C. speirostachya* Sm. Engl. Fl. (1828); F. D. 2249 og 1049 (*C. distans*); H. N. VI, 73; Lge. Haandb. 1 Udg. n. 1178; *C. distans* Wahlenb., H. 941 (ikke L.); *C. biformis* β , fertilis Schultz i Flora 1841, p. 54.

Rodstokken udskyder korte, buelformigt opstigende Udløbere; *Skedehinden* som hos foreg., men med et mere kort afskaaren, Bladpladen modsat Øre; ♂ *Axenes* *Dækskjæl* glindsende rødbrune med

hvid-hindeagtig Rand og grøn Rygnerve; ♀ *Axene* 2—3, fjerne, alle stilkede, ægformet-ovale, omgivne af langt omskedende, bladagtige, smale *Dækblade*, der ere lidet længere end det tilhørende og ikke naae det følgende ♀ *Ax*; *Dækskjællene* ægformede, spidse, brune med hvidhindet Rand og grøn, næsten udløbeude Rygnerve; *Frugterne* længere end *Dækskjællene*, skjævt ægformede, opstigende, paa begge Sider convexe, nervede, tilspidsede i et ru *Næb* uden Smaatorne i Spaltningen.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Bladene korte, af blaa-grøn Farve. Forekommer ofte med 2 ♂ *Ax*. 6—7. 4.

I Enge og Tørvmoser, hist og her, forekommer i de fleste Egne af Danmark, men hyppigst paa Halvøen.

* 1231. **C. fulva** [Good. l. c. p. 177] (Bruunguul S.) H. 942; Drej. n. 921; F. D. 2435 og 1768 (?); Rechb. l. c. fig. 620; And. VIII, 94; H. N. V, 86; *C. biformis* a, *sterilis* Schultz l. c.

Rodstolken udskyder meget korte, svagt opstigende eller næsten rette Bladknipper; *Straaet* ru; *Dækbladene* bredere, det nedre af Længde med *Straaet* eller idetmindste naaende ♂ *Axet*; *Frugterne* med ret *Næb*; forøvrigt som foreg., men Bladene længere, mere frisk grønne; ♀ *Dækskjællene* rødgule.

1—1 $\frac{1}{2}$ ' høi. 6—7. 4.

Faa Enge mellem Buske, sjældnere end foreg.: *J.* Estrup i Vendsyssel (12), Koustrup i Thy (Dr), Jebjerg mellem Struer og Holstebro (16), Haraldslund! Odder (Aabye); *Sl.* Rødding (7), Gram (Reimers), Husum (16); *F.* Otterup og Norup Moser (18), Ballen ved Ø. Skjerninge (12); *Sj.* Sorø! mellem Rønnede og Kjøge (Dr.), Mose mellem Raavaddam og Strandmøllen!

Anm. Nogle Forff. (Schultz l. c., cf. Lang i Flora 1847) ansee denne for en ved forandret Voxested frembragt Form af foreg., Andre for en Bastardform af *C. flava* og *Hornschuchiana*. Mod den sidste Mening strider det, at den ogsaa findes i Egne hvor den sidstnævnte ikke forekommer. Uagtet den Omstændighed, at den altid (?) findes med golde Frugter, vidner imod dens Berettigelse som en egen Art, optages den dog indtil videre her som en saadan, fordi den stedse har et fra foreg. temmelig forskjelligt Udseende. Overgangsformer har jeg ikke seet. — Fig. i F. D. 1768 er tegnet efter et Have-Exemplar, opkommet af Frø fra Norge, og har et meget forskjelligt Udseende fra den vildvoxende.

ββ. ♀ *Axene* langstilkede, mod *Frugtmodningen* hængende.

1232. **C. silvatica** [Huds. l. c.] (Skov-S.) H. 948; Schum.

n. 799; Drej. n. 925; F. D. 404; Rchb. l. c. fig. 603; And. VIII, 100; H. N. VII, 81; L. Herb. VIII, 143; C. Drymeja Ehrh.

Rodstokken sammentrængt, med buelformigt opstigende Bladknipper; *Straaet* forneden jævnt, foroven ru; *Skedemundingen* skjævt ægformet, *Skedehindens* frie Deel hvid-hindeagtig, indbøiet, budt udløbende i Midtnerven, dens forreste Deel dybt udrandet, vedblivende, naaende udover Skeden; *Dækbladene* bladagtige, langt omskedende, af Længde med eller kortere end *Straaet*; ♀ *Åxene* 3—4, linieformede, fjernblomstrede, alle fjernede fra hinanden og langstilkede, med traadformede *Axstikke*; *Dækskjællene* lancetformede, langt tilspidsede, paa Ryggen og i Spidsen saugtakkert-rue, hindeagtige med grøn Rygnerve, næsten af Længde med de elliptiske, nerveløse, i et langt, tokløvet, jævnt *Næb* tilspidsede *Frugter*.

1—1½' høi; i Henseende til Bladene og Plantens Farve meget lig *C. strigosa*, men ved *Frugter* og *Dækskjæl* aldeles forskjellig fra denne. 6—7. 4.

I skyggefulde Løvskove, alm. udbredt.

1233. **C. Pseudocyperus** L. (Knippeaxet S.) H. 949; Schum. n. 800; Drej. n. 924; F. D. 1117; Rchb. l. c. fig. 657; And. VIII, 111; H. N. XI, 75.

Rodstokken tueformet, uden Udløbere; *Straaet* skarpt trekantet med rue Kanter; *Skedemundingen* langagtig-ægformet, *Skedehindens* frie Deel temmelig kort, spidst udløbende i Midtnerven, dens forreste Deel svagt udrandet, tynd, tidligt sønderreven, lidet fremragende udenfor Skeden; *Dækbladene* bladagtige, naae langt ud over ♂ *Axet*, de nedre med en kort, de øvre uden Skede; ♀ *Åxene* 3—6, tætsiddende, valseformede, tætblomstrede, alle langstilkede; *Dækskjællene* sylformede, langt tilspidsede, fra Midten til Spidsen randhaaret-rue, af Længde med eller længere end de buelformigt-bøiede, nervede, i et langt, dybt tokløvet, jævnt *Næb* tilspidsede *Frugter*.

1½—2' høi, stor og smuk Starart, hele Planten frisk grøn, Bladene brede, meget rue, de nedre Bladskeder med optrævlet Næt. 6—7. 4.

I dybe Moser og ved Søbredder, ikke sjelden; i enkelte Egne af Jyll. sparsom, f. Ex. omkring Randers og Aarhus.

β. ♂ Axene i Regelen flere.

αα. *Frugterne glatte.*

1234. **C. vesicaria** L. (Blære-S.) H. 952; Schum. n. 807; Dréj. n. 933; F. D. 647; Rchb. l. c. fig. 658; And. VIII, 107; H. N. XIV, 81.

Rodstokken krybende; *Straaet* skarpt trekantet med rue Kanter; *Bladene* flade, frisk grønne; *Skedemundingen* langagtig-ægformet, *Skedehindens* frie Deel kort, spidst udløbende i Midtnerven, dens forreste Deel buet, vedblivende, lidet fremragende udenfor Skeden; *Dækbladene* bladagtige, det nedre omtrent naaende Spidsen af Straaet, dets Skede meget kort, øreformet; 1—3 ♂ *Ax*; ♀ *Axene* 2—4, elliptiske eller ovale, de nedre stilkede, mod Modenheden nikkende; *Dækskjællene* æglancetformede, tilspidsede, jævne, meget kortere end de opret-aabne, opblæst-ægformede, nervede, i et tokløvet *Næb* tilspidsede *Frugter*.

1—2' høi. Hele Planten frisk grøn, de nedre Bladskeder nætformigt optrævlede. 5—6. 4. Var. i Henseende til ♀ Axenes Form og Axstilkenes Længde.

I Moser og ved Søbredder, alm. i Danmark.

1235. **C. ampullacea** [Good. l. c. p. 207] (Tosnabet S.) H. 952; Schum. 808 og 809 (*C. obtusangula*); Dréj. n. 932; F. D. 2248; Rchb. l. c. fig. 659; And. VIII, 106; H. N. X, 73.

Rodstokken krybende; *Straaet* budt trekantet med jævne Kanter (foroven mellem Axene lidet rue); *Bladene* blaa-grønne, rendede, med indrullet Rand; *Skedemundingen* kredsround eller omvendt-hjerteformet, *Skedehindens* frie Deel kort, udrandet, blegbrun-bindeagtig, dens forreste Deel buet, lidet fremragende udenfor Skeden; ♀ *Axene* 2—4, valseformede, oprette eller de nedre nikkende, paa kortere eller længere Stilke; *Dækskjællene* spidse (ikke tilspidsede); *Frugterne* næsten kugleformet-opblæste, udspærrede; forøvrigt som foreg.

$\frac{1}{2}$ —1' høi. Let kjendelig fra foreg. ved den mere blaagrønne Farve og de mere guulagtige ♀ Ax. Frugterne mindre, men mere kugleformede. 6. (omtrent 8 Dage senere end foreg.). 4.

β, *robusta* Sond. Fl. hamburg. p. 505, 3—4' høi, med bredere og mere flade Blade, 3—5 ♂ Ax, ♀ Axene tykkere (ofte i Spidsen ♂), større Frugter.

I Tørv- og Hedemoser, Enggrøfter o. s. v., meget alm. β, Klingstrup Mølle-dam i Fyen (14)!

1236. **C. riparia** [Curt. Fl. Lond. IV, t. 60] (Tykaxet S.) H. 951; Schum. n. 806; Drej. n. 935; F. D. 1118; Reh. l. c. fig. 647; And. VIII, 110; H. N. IX, 78.

Rodstokken med krybende Udløbere; *Straaet* skarpt trekantet, oventil ru; *Bladene* flade; *Skedemundingen* rundagtig-ægformet, *Skedehindens* frie Deel temmelig bred, opret, budt udløbende i Midtnerven, dens forreste Deel udrandet, tynd, ikke fremragende udenfor Skeden, som er nætformigt optrævlet langs Midten; *de nedre Dækblade* kort omskedende, naaende op til eller ud over Spidsen af Straaet; ♂ *Axene* 2—5, tykke; ♀ *Axene* 3—4, elliptisk-valseformede, *de nedre* langstilkede, mod Modenheden nikkende, *de øvre* kortstilkede, oprette; *Dækskjællene* æg-lancetformede, langt tilspidsede, i Spidsen saugtakkert-rue, omtrent ligelange med de ægformede, paa begge Sider convexe, mangenervede, i et kort tokløvet *Næb* tilspidsede *Frugter*.

2—4' høi (en af de største danske Carices), *Bladene* brede (indtil $\frac{1}{2}$ "). ♂ og ♀ Axenes Dækskjæl brune. 6—7. 4.

β, *gracilescens* Hartm. (Anders. l. c.). *Straaet* mere ru, *Bladene* smalere, ♀ *Axene* forlængede, oprette; *Frugternes* *Næb* mere dybt kløvet.

I dybe Moser og Kjær, ved Aa- og Søbredder: funden i alle Provindser (undt. Bornh.), men ikke alm. — β, Ordruups Mose ved Kbhavn!

1237. **C. paludosa** [Good. l. c. p. 202] (Kjær-S.) H. 951; Schum. n. 805; Drej. n. 934; F. D. 1767 (et ungt Expl.); Reh. l. c. fig. 644; And. VIII, 109; H. N. IX, 77.

Straaet skarpt trekantet, ru; *Skedemundingen* langagtig-ægformet, *Skedehindens* frie Deel temmelig bred, bruun-hindeagtig, budt udløbende i Midtnerven, dens forreste Deel udrandet, tynd og tidligt sønderreven, lidet fremragende udenfor Skeden; ♂ *Axene* 1—2; ♀ *Axene* 2—4, oprette, det nedre kørtstillet, de øvre siddende; *Frugterne* ægformet-elliptiske, budt trekantede; *de nedre Bladskeder* nætformigt optrævlede; forøvrigt som foreg., fra hvilken den desuden kjendes ved smalere og mere rue *Blade*, færre og tyndere *Ax*.

2—3' høi og stiv, blaagrøn, meget ru. 6. 4. Var. med 2 og 3 Ar, samt i Henseende til Antal og Form af *Axene*, Dækskjællenes Længde o. s. v. De meest afvigende Former ere:

β, *spadicea* Roth (*β. elongata* Schum. l. c.; *C. Kochiana* DC., *Rchb.* l. c. fig. 651). ♀ *Axene* længere og tyndere, alle stilkede, tilsidst udstaaende; Dækskjællene langt og hvast tilspidsede, lidet længere end *Frugterne*; *Bladene* alm. smalere.

γ, *depauperata* Lge. (*Bot. not.* 1849 p. 165); *C. æmulans* Drej. (tildeels). 1 kølleformet ♂ *Ax*, 3 ovale eller rundagtige ♀ *Ax*; *Bladene* smalere; oftest 2 Ar.

Paa lignende Steder som foreg., men mere alm. udbredt. *β*, Skoven mellem Ermelund og Ordrups Mose! *γ*, paa udtørret Mosebund: *F.* Rødkilde (12); *Sj.* ved Lyngby Sø! Ørholm! ved Fuxveien indenfor Dyrehavejærdet!

Anm. Den under *γ*, anførte Plante, som synes at være en ved et mere tørt Voxested frembragt, i Delenes Ansal og Størrelse reduceret Form, er af Drej. (l. c. p. 291) forenet med *C. æmulans*, men er aldeles forskjellig fra det Expl., hvorpaa hiin Arts Beskrivelse fornemmelig var grundet (cf. p. 688 *Anm.*).

ββ. Frugterne haarede.

1238. *C. filiformis* L. (*Traad-S.*) H. 950; Schum. n. 790; Drej. n. 936; F. D. 379 (*C. hirta*) og 1344; *Rchb.* l. c. fig. 643; *And.* VIII, 103; H. N. IX, 79.

Rodstokken krybende; *Straaet* budtkantet, jævnt, oventil lidet ru; *Bladene* og *Dækbladene* traadformigt indrullede, glatte, paa Overfladen rue; *Dækbladene* længere end *Straaet*, uden Skede, det nedre med korte Ører ved Grunden; ♂ *Axene* 1—2, linie-lancetformede, med glatte, lancetformede, spidse

Dækskjæl; ♀ *Axene* 2—3, siddende eller det nedre kortstillet, lancetformede eller elliptisk-valseformede, oprette; *Dækskjællene* tilspidset-lancetformede, brune med hvidguul Rygnerve; *Frugterne* elliptiske, opblæste, med et kort, dybt tokløvet *Næb*.

1 $\frac{1}{2}$ —3' høi, tynd og rank, lettest kjendelig ved de traadsmale, sammenrullede Blade. De nedre Bladskeder med Trævlenæt. 6—7. 4.

I dybe Kjær og ved Søbredder, hist og her, men ikke alm. Fra *Bornh.* har jeg ikke seet Expl.

1239. *C. hirta* L. (Haaret S.) H. 953; Schum. n. 810; Drej. n. 937; F. D. 425 (ungt Expl., Axet Tab. 379 tilvenstre); Rchb. l. c. fig. 628; And. VIII, 101.

Rodstokken vidtkrybende; *Straaet* skarpt trekantet, jævnt; *Bladene* flade, tilligemed Skederne haarede; *Skedemundingene* kredsround, *Skedehindens* frie Deel kort, tyk og i Spidsen unrandet, tilligemed den forreste Deel randhaaret; *Dækbladene* blaaagtige, omskedende, omtrent af Længde med Straaet; ♂ *Axene* 1—2, lancetformede, med omvendt-ægformede, i Randen og paa Ryggen haarede Dækskjæl; ♀ *Axene* 2—3, elliptiske eller lancetformede, oprette, stilkede; *Dækskjællene* æg-lancetformede, langt tilspidsede, i Spidsen randhaaret-rue, hindeagtige, i Midten grønne, omtrent femnervede; *Frugterne* ægformede, tilspidsede i et langt tokløvet *Næb*.

$\frac{4}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ ' høi. Graaagtig af den tætte Beklædning. 6—7. 4. Var.

β , *sublævis* Horn. F. D. 1711; *C. hirtæformis* Pers. Hele Planten, undtagen Frugterne, glat, grøn.

Meget hyppig, saavel paa tørre som oversvømmede Steder, især paa Sandgrund. — β , ved Strandbredder og paa fugtige Steder: *Sj.* en Grøft ved Frederiksdal! *Falst.* paa flere Steder (14); *Loll.* Steensgaard (19); *Als* ved Sønderborg (H.).

15. *Amarantus*. Amarant.

† 1240. *A. Blitum* L. (Fremliggende A.) H. 957; F. D. 2246; Rchb. ic. crit. V, 663; H. N. I, 55; *Euxolus viridis* Moq Tand. i DC. Prodr. XIII, 2, 273.

Stænglerne fremliggende; *Bladene* afvexlende, langstilkede,

æg-rudeformede, budte, i Spidsen indtrykte; *Blomsterne* nøgleformigt samlede i Bladhjørnerne og i Spidsen af Stængelen dannende et bladløst Ax; 3 *Dækblade* ved Grunden af Blomsterdækket, omtrent halvt saa lange som dette.

Bladene var. plettede. Blomsterne grønlig. 7—9. ☉.

Ukrudsplante i Haver o. a. dyrkede Steder, formodenlig indført med Urtefrø og hidtil kun funden paa faae Steder: *Sj.* Fredensborg Slotshave (9), Amager ved Götchens Batteri! Haver i Classens Vænge (Benzon) o. fl. St. omkring Kbhavn (Didr., 12); *Moen* ved Stege (H); *Falst.* Øverup, Nykjøbing (14); *Loll.* Nakskov i Haver og paa Gader (9, 19); *Bornh.* Ukrud i Haver i Rønne (8). ☞

IV. Tetrandra.

16. Littorella. Strandbo.

1241. *L. lacustris* L. (Liden S.) H. 954; Drej. n. 940; Rechb. ic. fl. germ. XVII, 1116; Plantago uniflora F. D. 170.

Bladene meget smalt linieformede, rendede, ved Grunden omskedende, tilligemed de enblomstrede *Blomsterstilke* udgaaende fra Rodstokken; *Støvtraadene* lange, haarfine.

1—2" høi. 6—7. ♀.

Ved Søbredder, især paa sandig Grund: paa *Bornholm* og i *Halvøens* Hedeegne ikke sjelden, paa Øerne sparsom: *F.* Hals ved Hofmangave (H.); *Sj.* Nykjøbing (H.), Rørvig (Schum.), Skarritsø! Tjustrup Sø (Weillb.), Frederiks-und (H), Gurte Sø (11), Donze (H.), Ruderhegn (26), Emdrup, Damhuset (H.); *Loll.* Maribo Sø (Koch), Borgø, Heirede Sø (Kherre Wichfeld). Paa *Falst.* ikke bemærket.

17. Urtica. Nælde.

1242. *U. urens* L. (Brænde-N.) H. 957; Drej. n. 941; F. D. 739; Rechb. ic. fl. germ. XII, fig. 1320.

Bladene modsatte, ovale eller elliptiske, fliget-saugtaktede; *Blomsterne* enbo, i parviis stillede Nøgler fra Bladhjørnerne; Nøglerne kortere end Bladstilk.

$\frac{1}{2}$ —1' høi, frisk grøn. 6—9. ☉.

I dyrket Jord, især i Haver, et almindeligt Ukrud.

1243. **U. dioeca** L. (Tvebo-N.) H. 958; Drej. n. 942; F. D. 746; Rchb. l. c. fig. 1324.

Rodstokken krybende; *Bladene* modsatte, æg-hjerteformede, langt tilspidsede, skarpt saugtakkede; *Blomsternøglerne* samlede i grenede Ax, 2—3 fra hvert Bladhjørne, hængende, længere end Bladstilken. *Tvebo*.

1—3' høi. Bladene var. bredere eller smalere, paa unge Skud ofte dybt haandfligede, af mørkere og mere mat grøn Farve end foreg. 7—8. ♀.

Ved Gjærder, i Skove og paa andre udyrkede Steder alm. En Form med de nedre Ax ♀, de mellemste og øvre i Spidsen ♂ og ♂ (β, *polygama*!) har jeg fundet ved Kalkbrænderiet N. for Kbhvn.!

Anm. Begge Arter ere beklædte med Brændebørster, som ved Berøring udgyde en brændende Saft i Huden.

18. **Alnus. Æl.**

1244. **A. glutinosa** [Gärtn. fruct. 2, t. 90] (Rød Æ.) H. 955; Drej. n. 939; F. D. 2301; Rchb. l. c. XII, fig. 1295; *Betula Alnus α, glutinosa* L.

Bladene rundagtige, ved Grunden kileformede, i Spidsen budte eller udrandede, uregelm. tandet-saugtakkede, rynkede, i Vinklerne mellem Aarerne paa Underfladen dunede, forøvrigt glatte, paa begge Flader grønne, klæbrige; ♀ *Raklerne* ovale.

Høit Træ med rødguult Ved og mørk graabruun, tidligt revnende Bark. $\frac{3}{2}$ —4. (fr. 8—9). ♀.

I fugtige Skove og Moser, alm. udbredt.

1245. **A. incana** [DC. Fl. fr. 3, 304] (Graa Æ.) H. 956; Drej. n. 938; F. D. 2302; Rchb. l. c. fig. 1291; *Betula Alnus β, incana* L.

Bladene ægformede, spidse, dobbelt saugtakkede, rynkede, paa Underfladen overalt graaagtigt duunhaarede; ♀ *Raklerne* ovale, længere end hos foreg., men paa kortere Stilke.

Barken graa, glat, Vedet mere hvidt end hos foreg. 3 (mindst 14 Dage tidligere end hos foreg.). (fr. 8—9). ♀.

Plantes ikke sjældent; forekommer desuden stundom i Udkanten af Skove og Moser, men sjældnere end foreg. (cf. Ex. mellem Bagsværd og Jounstrup!) og er sandsynligvis ikke vildvoxende i Danmark. ¹³

19. *Betula*. Birk.

1246. **B. verrucosa** [Ehrh. Beitr. 6, 98] (Vorte-B.) F. D. 2549; Fr. S. Veg. Sc. p. 211; *B. alba* L. (tildeels), Koch Syn. II, 760; *B. odorata* Rehb. l. c. fig. 1288 (ikke Bechst.)

Bladene æg-triangelformede eller rudeformede, langt tilspidsede, grovt og dobbelt saugtakkede; ♀ *Rakleskjællene* langstilkede, med bredt triangelformet, tiltrykt Midtflig og halvmaaneformet tilbagebøiede Sideflige; *Frugten* med en *Vinge* dobbelt saa bred som det elliptiske *Frø* og naaende op til Spidsen af Griflerne.

Høit Træ. Barken hvid, hos det gamle Træ brunn, revnet, Grenene tynde, ofte hængende (β , *pendula*), de unge alm. rue af talrige gjennemsgtige Vorter. 4-5 (fr. 7-8). $\frac{1}{2}$.

I Skove og Tørvmoser: paa *Bornh.* og i enkelte Egne af *Halvøen* ikke sjelden i Skovene, sparsommere paa *Øerne*.

1247. **B. odorata** [Bechstein Diana I, p. 74 t. 1] (Klæbrig B.) Hentze i Bot. Zeit. 1848, p. 107; *B. alba* L. (Fr.), F. D. 1467; Rehb. l. c. fig. 1282; *B. glutinosa* Wallr., Fr. S. Veg. Sc. p. 212, cf. p. 556; H. N. II, 54.

Bladene ægformede, spidse, enkelt eller dobbelt og mere fint-saugtakkede; ♀ *Rakleskjællene* kortstilkede med en udstaaende Midtflig, Sidefligene afrundede, lige udstaaende; *Frugtens* *Vinger* bredere end (ikke dobbelt saa brede som) det omvendt-ægformede *Frø* og kun lidet længere end dette.

Høit Træ med hvid Bark, Grenene tykkere end hos foreg. (sjeldnere hængende), Knopperne og de unge Blade klæbrige. 4-5. (fr. 7-8). *Var.*

β , *tiliaefolia* Læstad. (Nya bot. Not. 1856, p. 106 t. 3 f. 9). *Bladene* store, (omtrent af Størrelse som *Bladene* af *Tilia parvifolia*) rundagtig-hjerteformede, næsten til Grunden rundtakket-saugtakkede.

* *pubescens* (*B. pubescens* Ehrh., H. II, 284?). Lavere, oftest buskagtig, *Bladene* og de unge Grene duunhaarede; ♀ *Raklerne* kortstilkede, oprette, *Rakleskjællenes* Midtflig for-

længet, Sidefligene afrundede, noget bueformigt tilbagebøiede; Frugtens Vinger naae næsten op til Griflernes Spidse.

** *carpathica* (B. *carpathica* Willd., Hentze l. c. p. 108; B. *carpath.* γ, *hercynica* Rehb. l. c. fig. 1286). Bladene elliptisk-rudeformede, indtil nedenfor Midten skarpt og dobbelt saugtakkede; de frugtbærende Rakler kortstilkede, oprette; Rakleskjællene længere stilkede, med skjævt afrundede Sideflige; forøvrigt som Hovedarten.

Hovedarten hyppigt plantet i Skove, sjældent vildvoxende: Sj. Helsingør! Holmegaardsmosen! β, Tibirke Mose! — * ikke sjelden i Moser og fugtige Kratskove. ** i Skovene ved Silkeborg!

Anm. Birkearternes rette Begrænsning er endnu langt fra at være klar, og om Synonymien ere de fleste Forff. uenige. Ogsaa om Arternes Begrænsning ere Meningerne yderst forskellige, idet Nogle adskille mange flere end de her nævnte Former som egne Arter, Andre derimod forene alle disse tilligemed B. *verrucosa* under det linnéiske Navn B. *alba*. Den udførlige Beskrivelse af B. *odorata* Bechst., som er meddelt af Hentze (l. c.), passer aldeles paa den Art, som alm. er kaldt B. *glutinosa*. De under * og ** anførte Former ere meget forskellige fra Hovedarten, og muligviis virkelige Arter. * *pubescens* nærmer sig i Henseende til Frugterne B. *verrucosa*; den maa ikke forveksles med de unge eller buskagtige Expl. af B. *odorata*, som have en stærk Haarbeklædning. Behaaringen kan overhovedet neppe benyttes til Adskillelse mellem Arterne, da ogsaa B. *verrucosa* forekommer haaret i ung Tilstand.

Morus. Morbærtræ.

† *M. alba* L. (Hvidt M.) Rehb. ic. fl. germ. XII, fig. 657.

Bladene ægformede, grovt saugtakkede eller lappede; ♀ *Axene* af Længde med eller kortere end Blomsterstilkene; *Blomsterdækkets* Blade i Randen glatte; den bæragtige *Frugtstand* ved Modenheden hvid eller bleg rød, af vandagtig Smag. 5—6. 2.

Oprindeligt hjemmehørende i Orienten, dyrkes i de senere Aar hist og her som Næringsplante for Silkeorme.

† *M. nigra* L. (Sort M.) Rehb. l. c. fig. 658.

Bladene hjerteformede, mindre dybt saugtakkede, men mørkere og mere rue end hos foreg.; ♀ *Axene* meget længere end Blomsterstilkene eller næsten siddende; *Blomsterdækkets*

Blade randhaarede; Frugtstanden ved Modenheden sortrød, velsmagende.

Høiere og med større Frugter end foreg., frembringer her i Landet kun sjældent ♂ Ax. 6. (Fr. 8—9). $\frac{1}{2}$.

Dens Hjem er Orienten, den plantes hyppig i Haver paa Grund af dens spiselige Frugter.

V. Pentandria.

20. Atriplex. Mælde.*)

a. *Dichospermum* Dumort. Fleerbo: ♀: Blomsterdækket tobladet, Frugten lodret; ♂: Blomsterdækket 3—5-deelt, Frugten vandret.

† *A. hortensis* L. (Have-M.) H. II, 151; Westerlund Sv. Atripl. p. 29; Schk. Handb. t. 349.

*) Begrænsningen af Arterne i denne Slægt er forbunden med ikke faa Vanskeligheder, dels fordi de kun med nogenlunde Sikkerhed kunne bestemmes naar Frugterne og Blomsterdækket ere fuldvoxne (hvilket hos os sædvanligt indtræffer fra Slutningen af August til September), dels fordi Organerne ere saa foranderlige og Formerne som Følge deraf saa mangfoldige, at det vilde være let at opstille ligesaa mange Arter som man har Exemplarer i sit Herbarium. De vigtigste Kjendetegn hentes fra ♀ Blomsterdækket, Frugten og Frøet samt Bladenes Form og Indskjæring, men da selv intet af disse Organer er aldeles constant indenfor hver enkelt Art, er en fyldestgørende Beskrivelse af de typiske Arter og deres meest eiendommelige Udviklingsformer saare vanskelig. At andre Botanikere, som have beskæftiget sig med denne Slægt, have følt lignende Vanskeligheder, derom vidne de hyppige Uoverensstemmelser eller endog Modsigelser i Beskrivelsen af de med samme Navn betegnede Arter eller Afarter hos forskellige Forfattere. Jeg er tilbøielig til at troe, at flere af de afvigende Former ere frembragte ved Krydsning mellem de forskellige Arter, som ofte voxer i Mængde samlede i store Strækninger langs vore Kyster, men da jeg ikke er saa heldig at have haft Leilighed til at anstille Forsøg, hvormed jeg kunde bestyrke eller be-

Stængelen opret; *Bladene* muurskeefformede eller hjerteformede, tandede, de øvre aflang-spydformede; de frugtbærende *Blomsterdækker* rundagtig-ægformede, heelrandede, nætformigt aarede.

Hele Planten lysgrøn, undertiden findes en Var. med blodrøde Blade. 7—8. ☉.

Dyrkes i Haver og forekommer undertiden forvildet, f. Ex. *Sj. Helsingør* (Heiberg)! *F. Østerøen* o. fl. St. ved Nyborg (Lund).

† *A. nitens* [Rebent. Fl. Neomarch. p. 126]. Westerlund l. c. p. 29; Schkuhr Handb. t. 348.

Bladene triangel-spydformede, dybt tandede eller forneden bugtet-lappede, paa Overfladen mørkgrønne, paa Underfladen sølvglindsende af tiltrykte Skjæl; de frugtbærende *Blomsterdækker* ægformede, kort tilspidsede; forøvrigt som foreg.

7—8. ☉.

Vild i det sydøstlige Europa, funden forvildet i *Loll.* ved Maribo og Taars Færgegaard (19)!

b. *Enbo.* ♀ *Blomsterdækket* mere eller mindre dybt tokløvet; Frugten lodret.

aa. *Obionopsis* Lge. *Støvknapperne* gule. ♀ *Blomsterdækket* ved Frugtmodningen fra Grunden til Midten bruskagtigt, omtrent til Midten todeelt.

1248. **A. arenaria** [Woods, Bab. Man. ed. 3, p. 271] (Sølvbladet M.) *A. laciniata* H. 288; Engl. Bot. t. 165; F. D. 1284; *A. crassifolia* Gren. & Godr. fl. Fr. III, 10; Lge. Haandb. 1 Udg. n. 1199 (undt. synonym.); *A. rosea* Moq. i DC. prodr. XIII, 2, p. 92 (tildeels), Rafn 2, 236? *A. rosea*—*arenaria* Westerlund l. c. p. 82.

vise denne Formodning, henleder jeg de danske Botanikeres Opmærksomhed paa dette Punkt, som ikke vil være uden Betydning med Hensyn til Arternes Bestemmelse. Ved Bearbejdelsen af *Atriplex*-Slægten i nærv. Udgave har jeg benyttet *C. A. Westerlund*, Bidrag till kännedomen af Sveriges *Atriplices*, Lund 1861, et Arbejde, der indeholder flere værdifulde Iagttagelser.

Stænglerne udbredte eller opstigende, kantede, uden af-farvede Striber*), med udspilede Grene; *Bladene* æg-murskeeformede, budt- og rundbugtet-tandede, stundom næsten tre-lappede, de nedre modsatte, budte, de øvre spredte, lancet-spydformede, ♂ Blomsterne tæt samlede i Ax foroven, ♀ Blomsterne adskilte, knippestillende eller enlige i Bladhjørnerne; ♀ *Blomsterdækket* rudeformet-spydformet, tandet, paa Ryggen vortet; »Frøene ujævne, glandsløse«.

Bladene kødfulde, (tilligemed Stængelen) graaagtige, især paa Underfladen, af en tæt Beklædning med hvidgraa Skjel. 8—9. ☉.

♂, *parvifolia* (A. rosea ♂, *parvifolia* Moq. l. c.). Spæd og udstrakt, med meget smaae, rundagtige, svagt rundbugtede eller heelrandede og mindre kødfulde Blade.

Ved Strandbredder, sjelden: J. Røddal ved Limfjorden (Beck). Blaaavands-Huk (28)! Sønderhoe paa Fanø (14)! *Føhr* (M. Vahl, Nolt, Schiøtz!); *Falst.* ved Gjedserodde (H.); *Sj.* Frederikssund (Rafn)? ♂, Diger ved Husum! ☽

Anm. Den her beskrevne og i Fl. dan. 1284 afbildede Plante, som synes at være almindelig udbredt langs det vestlige Europas Kyster, har været henført til forskellige Arter, uden at det, saavidt jeg skjønner, endnu er godtgjort, om den henhører til nogen af disse, eller om den ikke rettere maa ansees for en særskilt Art, hvilket jeg anseer for rimeligt. I saa Fald bør den formeentlig beholde det af de nyere engelske Botanikere brugte Navn *A. arenaria*. Jeg har tidligere med Grenier & Godron o. Fl. henført den til *A. crassifolia* Mey., men denne altaiske Plante afviger, ifølge Ledebours Afbildning og Expl. i Hornemanns Herbarium, navnlig ved de mindre og axformigt sammentrængte ♀ Blomster; altfor meget fra vor Art til at kunne forenes med denne. Den ved Hallands og Bohusläns Kyster voxende *A. crassifolia* Fr. er forskellig saavel fra Meyers og Ledebours Plante som fra den her omhandlede; Expl. fra Dr. Lindeberg tilhøre følgende Afdeling og stemme aldeles overeens med autentiske Expl. af *A. Babingtonii* fra England, meddeelte af Babington. Af de ældre engelske Botanikere, af Hornem. o. Fl. er vor Plante benævnt *A. laciniata* L. Sp., (ikke Fl. succ.), men dette (sandsynligviis collective) Navn anvendes nu almindeligt paa en syd- og østeuropæisk Plante, som er forskellig ved mere opret Stængel, længere, smalere og mere spidst fligede Blade, mindre og paa Ryggen sjældent vortede Blomsterdækker, som ere mere tæt samlede i mellembrudte Ax uden mellemliggende Blade (cf. H. N. XIV, 59). Nærmest forekommer den mig at være beslægtet med *A. rosea* L., hvortil Fl. dan. 1284 ogsaa citeres af Moquin (l. c.), og muligviis er den (saaledes som Westerlund l. c. antager), en Strandform af denne meget polymorphe Plante, skjøndt

*) Hos alle (?) Arter af Afdelingen *bb* er Stængelen forsynet med stærke affarvede Længdestriber.

den ikke stemmer nøie overeens med nogen af de hos Moq. anførte Varieteter og skjøndt de Expl. af den typiske *A. rosea* som jeg har sammenlignet, dels fra Sverige, dels fra det sydlige Europa, ere betydeligt forskellige, f. Ex. ved en mindre skjældækt Stængel og Blade, mindre Blomsterdækker, glindsende Frøe o. s. v. Den ægte *A. rosea* findes neppe i Danmark, thi de af Rafn anførte Voxesteder ere tvivlsomme.

bb. Teutliopsis Dumort. Støvknapperne for Bestøvningen oftest røde. ♀ Blomsterdækket bladagtigt, til nedenfor Midten eller næsten til Grunden todeelt.

1249. **A. Babingtonii** [Woods i Bab. Man. ed. 3, p. 270] (Tykbladet M.) Lindeberg nov. fl. Suec. p. 22, t. 2; Westerlund l. c. p. 39; *A. rosea* Bab. Monogr. Atripl. p. 13, E. B. Suppl. t. 2880 (ikke L.); *A. crassifolia* Fr. mant. 3, 163; S. Veg. Scand. p. 201 (ikke C. A. Mey. eller Godr.); H. N. XIV, 60.

Stængelen udstrakt eller opstigende, bugtet, med udspilede *Grene*, i yngre Tilstand beklædte med hvidgraae Skjæl; *Bladene* æg-triangelformede, bugtet-tandede med 1—2 større Lapper ved Grunden (og derved ofte spydformede); ♀ *Blomsterdækket* tykt og kødfuldt, til lidet nedenfor Midten todeelt, dets *Flige* rudeformet-ægformede med en kort Spids, svagt tandede og paa Ryggen vortede; *Frøene* ujævne, glandsløse.

8—9. ☉. Danner i flere Henseender et Overgangsled mellem foreg. Afdeling og de følgende Arter, i Habitus især lig *A. hastata* β, *salina*. *Bladene* oftest afvejlende, tykke og kødfulde, alm. beklædte med Skjæl eller Meel, *var.*

β, *virescens* Lge. Større og kraftigere, med næsten grønne Blade og mere tandet Blomsterdække.

Ved Strandbredder: Sj. Hellebæk! Flaskekroen! Østkysten af Amager (Lindeberg)! J. Toftlands Klint paa Føhr? (20). β, Strandbredder paa Avernakø (12)! Dragør paa Amager! Hornbæk! Sandsynligviis vil den ved nærmere at efterspores findes paa flere Steder.

1250. **A. hastata** L. [Fr. Mant. 3, 162] (Spydbladet M.) Rafn. II, 238; H. 288 (undt. var. 3); F. D. 1286; *A. latifolia* Wahlenb., Drej. n. 302.

Stængelen opret eller nedliggende; *de nedre Grene* ud-

spilede; *Bladene* spydformede, med vandret udstaaende Lapper, tandede, de *øvre* lancetformede, heelrandede; *Blomsternøglerne* samlede til forneden mellembrudte Ax; ♀ *Blomsterdækket* næsten til Grunden todeelt, dets *Afsnit* triangel-murskeeformede, heelrandede eller svagt tandede ved Grunden; *Frøene* glindsende.

Var. grøn eller graaagtig. 7—9. ☉. De mærkeligste Former af denne meget foranderlige Art ere:

α, *deltoidea* Moq. l. c. p. 94 (A. deltoidea Bab. l. c., E. B. Suppl. t. 2860). *Bladene* ofte modsatte, triangelformede med nedadvendte Lapper ved Grunden, bugtet-tandede eller næsten heelrandede; *Blomsterdækket* større end Frugterne, dets *Afsnit* æg-triangelformede, flade, paa Ryggen vortede.

β, *salina* (Wallr. s. A. patula; A. oppositifolia DC., Koch i Sturm D. Fl. h. 79; A. hastata 2, macrotheca Rafn l. c.). *Bladene* modsatte, kjødfulde, heelrandede eller faatandede, Planten beklædt med Skjæl og derved graaagtig.

γ, *prostrata* (A. prostrata Bouch., H. II, 151, A. hast. γ, triangularis Moq. l. c.). Stænglerne tyndere, ofte nedliggende; *Bladene* triangel-spydformede, heelrandede eller faatandede; *Blomsternøglerne* adskilte, *Blomsterdækket* meget større end Frugterne, dets *Afsnit* æg-rudeformede, tilspidsede, convexe, uden Vorter paa Ryggen.

δ, *platysepala* Guss. (Westerlund l. c. p. 45). Stængelen opret, meget grenet, *Blomsternøglerne* faablomstrede og langt adskilte, *Blomsterdækket* meget fladt, dets *Afsnit* triangel-spydformede, forøvrigt som foreg.

ε, *microcarpa* Koch (A. microsperma W. Kit., Drej. n. 301; A. hastata microtheca Rafn II, 239; H. 289; A. ruderalis Wallr., Koch i Sturm D. Fl. h. 79). *Bladene* tandede eller næsten heelrandede, ofte modsatte; *Blomsternøglerne* danne tætte Ax; ♀ *Blomsterdækket* lidet større end Frugterne, dets *Afsnit* æg-lancetformede, convexe, heelrandede eller tandede, med Vorter paa Ryggen; Frugterne meget smaae.

Ved Strandbredder (især β) og paa dyrkede, gjødede Steder omkring Byer alm. Formen δ, er funden paa Strandbredden ved Krudttaarnene paa Amager (Lindeberg)! Kastrup!

1251. **A. calotheca** [Fr. Mant. 3, 164] (Skjønnebægret M.) H. N. VIII, 45; A. hastata 3, calotheca Rafn II, p. 240; H. 289; F. D. 1638; A. laciniata L. fl. Suec. (tildeels, ikke L. Sp.); A. hastata Sm., Drej. n. 304; Rchb. ic. crit. I, fig. 33.

Stængelen opret eller opstigende; *de nedre Grene* udspilede; *de nedre Blade* spydformede, dybt bugtet-tandede, med opadvendte Tænder ved Grunden, *de øvre* lancet-spydformede; *Blomsternøglerne* danne mellembrudte Ax; *Blomsterdækket* næsten til Grunden todeelt, dets *Afsnit* triangelformede, tilspidsede, dybt fligede med sylspidsede Flige, paa Ryggen ophøiet-nervede (ikke vortede); *Frøene* glandsløse.

Alm. større og kraftigere af Væxt end de følg. Var. graaagtig eller beklædt med hvidgraa Skjæl. Frøene alm. større end hos foreg., mindre end hos følg., og, især hos Formen α , smaae i Forhold til Blomsterdækket. 8—9. ☉. Følgende Former kunne adskilles:

α , *macrosepala*! (β , *macrotheca* Moq. l. c., ikke Rafn). Bladene store, grønne, ofte dybt fligede, endog halvfinnede; Blomsterdækkets Afsnit større.

β , *microsepala*! (γ , *microtheca* Moq. l. c., ikke Rafn). Bladene tilligemed den øvrige Plante alm. meledede, Blomsterdækket mindre.

γ , *parvifolia*! Stærkt melet, Bladene smaae og smale, mindre dybt fligede. (Har Udseende af en Bastardform mellem A. calotheca og A. prostrata).

Ved Strandbredder: alm. i de fleste Egne i Danmark. β , er den hyppigste Form; γ , har jeg fundet ved Kalkbrænderiet og Flaskekroen; α , paa oversvømmet Marskbund længere fra Havet. [*

* 1252. **A. longipes** [Drej. Fl. exc. n. 303] (Stilkblomstret M.) A. stipitata var. longipes Westerlund l. c. p. 54.

Stængelen opret, med opstigende *Grene*; *de nedre Blade* forlænget-spydformede med opadvendte Lapper, næsten heelerandede, *de øvre* æg-lancetformede, heelerandede; *Blomsternøglerne* i mellembrudte Ax; *Blomsterdækket* ofte langstillet, med ægformet-spydformede, heelerandede eller fligede, paa

Ryggen ophøiet-nervede (ikke vortede) *Afsnit*; *Frøene* store, glindsende.

7—9. ☉.

β , *muricata* (A. *patula* γ , *muricata* Ledeb., A. *stipitata* α , *genuina* Westerlund l. c. p. 53. Bladene tykkere, i Randen uregelm. tandede, Blomsterdækkets *Afsnit* store, triangel-spyd-formede, med ofte lange Flige ved Grunden.

Paa Marker (Drej.) og ved Strandbredder (!) i Selskab med de andre Arter ikke sjelden omkring Kjøbenhavn, f. Ex. ved Flaskekroen, ved Kalkbrænderiet! paa Amager! J. Sebbersund ved Limfjorden (8)! β , paa Vesterfælled! ☒

Anm. De af mig samlede Expl. stemme aldeles overeens med Beskrivelsen hos Drej., som dog selv ytrer Tvivl om denne Arts Bestandighed. Jeg er imidlertid tilbøielig til at ansee den for en vel adskilt Art, nærmest beslægtet med foreg. og følgende, men ved flere Kjendetegn saa forskjellig fra begge, at jeg ikke kan forene den med nogen af disse. Fra hin adskilles den ved smalere, næsten heelrandede Blade og større, glindsende Frøe, fra denne ved større, ofte dybt fliget Blomsterdække og større Frøe, fra begge ved de langstilkede Blomster. Fries henfører den til A. *deltoidea* Bab. l. c., som efter Beskrivelsen og de i E. Bot. afbildede Exemplarer er meget forskjellig fra vor Art, og nærmest beslægtet med A. *hastata*. Jeg seer ikke nogen Grund til at ombytte det Drejerske Artsnavn med det nyere A. *stipitata* Westerlund, som har omtrent samme Betydning. Den af mig under β , anførte Form (som Westerlund anseer for Hovedformen, og som synes hyppigere i Sverige), er hos os, saavidt jeg har bemærket, sjeldnere end den ægte A. *longipes* Drej., og jeg er tilbøielig til at ansee den for en Bastardform mellem denne og A. *calotheca*.

1253. A. *patula* L. (Svine-M.) Rafn II, 241; H. 290; Drej. n. 306; F. D. 1285; H. N. VIII, 53 (ikke Bab.).

Stængelen opret eller opstigende; *de nedre Grene* udspilede; *Bladene* spydformet-lancetformede, *de øvre linie-lancetformede*, heelrandede; *Blomsternøglerne* tæt samlede i stivt oprette, kortgrenede Ax; ♀ *Blomsterdækket* næsten til Grunden todeelt, dets *Afsnit* spydformet-rudeformede, paa Ryggen ofte vortede; *Frøene* glindsende.

Bladene eensfarvet grønne. 7—9. ☉. Blandt de talrige under denne Art henhørende Former nævnes følgende:

α , *genuina* (Westerlund l. c. p. 56). Bladene triangel-formede eller æg-lancetformede med spydformet Basis og ud-

staaende eller opadrettede Lapper ved Grunden, forøvrigt alm. heelrandede.

β , *erecta* (A. *erecta* Huds., H. II, 152; Sturm D. Fl. h. 79). Stængelen opret, med opstigende Grene; Bladene alm. tandede, æg-lancetformede med lange opadrettede Lapper ved Grunden; Blomsterdækket lidet større end Frugten, paa Ryggen vortet, hvidmelet.

γ , *oblongifolia* (Waldst. & Kit. pl. rar. Hung. 3, t. 221; Westerlund l. c. p. 56; A. *angustifolia* F. D. 2226). Stængelen opret, Bladene æg-lancetformede, de nedre spydformede, med opadrettede Lapper ved Grunden, de øvre linie-lancetformede, heelrandede; Blomsterstanden i Spidsen nikkende, med adskilte Nøgler, Blomsterdækkets Afsnit rudeformede, heelrandede, paa Ryggen svagt vortede.

δ , *angustifolia* (A. *angustifolia* Sm., Drej. n. 299; H. II, 150). Stængelen ofte nedliggende, Bladene heelrandede, de nedre lancetformede, de øvre linieformede.

Alm. paa dyrkede Steder omkring Byer, mellem Sæden (især δ), sjældnere ved Strandbredder. β , sjældnere end de øvrige Former: Ordrup, Kjøbenhavn! F. Nyborg (Lund).

cc. *Exomideæ* Westerlund l. c. p. 59. Støvknapperne gule. Blomsternøglerne adskilte, tætblomstrede, indsvunke i en tæt Meel (som næsten har Lighed med Filt), Bladene linieformede (ikke spydformede).

1254. **A. littoralis** L. (Strand-M.) Rafn II, 241; H. 291; Drej. n. 298; F. D. 1287; H. N. V, 58.

Stængelen opret, med oprette eller tilsidst udspærrede Grene; Bladene linieformede eller smalt lancetformede, heelrandede eller svagt tandede (uden større Lapper ved Grunden); Blomsternøglerne danne mellembrudte Ax; ♀ Blomsterdækkets Afsnit triangelrudeformede, tilspidsede, i Randen tandede og paa Ryggen vortede; Frøene glindsende.

Planten alm. hvidmelet. Blomsterdækkets Form meget forskjellig, oftest ere Afsnittene meget langt tilspidsede, med tilbagebøiet Spidse. 7—9. ☉.

* *serrata* Moq. l. c. (*A. serrata* Hnds., *A. marina* Rafn 243; Bab. man. ed. 2, p. 258; Koch i Sturm l. c. h. 80; H. N. V, 59). Bladene bredere, tandede; Blomsterdækkets Afsnit triangel-hjerteformede, næsten budte.

Ved Strandbredder, meget alm. * sjældnere end Hovedarten.

21. *Halymus*. Kilebæger.

1255. *H. pedunculatus* [Wallr. Sched. crit. p. 117] (Stilket K.) Drej. n. 305; H. N. I, 57; *Atriplex* L., Rafn 2, p. 244; H. 291; F. D. 304 (ikke god).

Stængelen urteagtig; *Bladene* omvendt-ægformede, budte, heelrandede, spredte eller de nedre modsatte; ♀ *Blomsterdækket* ved Modenheden omvendt-hjerteformet med en Tand i Indskjæringen, paa tilsidst forlængede, udspærrede *Blomsterstilke*.

Hele Planten blaagraa af en tæt Beklædning med Skjæl, $\frac{1}{2}$ —1' høi. 7—9. ☉.

Ved Strandbredder paa Leer- eller Marskbund; funden i alle Provindserne (undt. Bornh.), men ikke alm. ☞

1256. *H. portulacoides* [Wallr. l. c.] (Stilkløs K.) *Atriplex* L., H. II, 150; F. D. 1889; H. N. XIV, 61; *Obione portulacoides* Moq.

Stængelen buskagtig, opstigende; *Bladene* modsatte, omvendt-ægformet-lancetformede, heelrandede; *de frugtbærende Blomsterdækker* ustilkede, trelappede, paa Ryggen vortede.

Hele Planten, ligesom foreg., beklædt med hvidgraae Skjæl. 7—8. ♀.

Ved Strandbredder, sjelden og hidtil kun funden paa *Slesvigs* Vestkyst, hvor den efter Nolte er hyppig udenfor Marskdigerne (f. Ex. Husum) og paa Halligerne (f. Ex. Beenshallig), Gating paa *Føhr* (20)! Amrom (Jessen). ☞

VI. Hex-Polyandria.

22. *Sagittaria*. Piilblad.

1257. *S. sagittæfolia* L. (Spids P.) H. 962; Drej. n. 943; F. D. 172; Rehb. ic. fl. g. VII, 94.

Bladene langstilkede, spidse, piilformede med forlænget-triangelformede, spidse Grundflige; *Skaflet* bladløst, med krandsstillede *Blomster* foroven, dannende en fjernblomstret Klase.

2—3' høi. Rodstokken skyder fra de nedre Bladhjørner Udløbere, hvis knolleformigt opsvulmede Spidse løsrives fra Moderplanten og i det følgende Aar danner en ny Plante. De tidligst udviklede og under Vandet nedsænkte Blade ere baandformede. Kronbladene hvide med rød Negl. 7. 4.

I Aaer og Søer, hyppigst i de store Aaer paa *Halvøens* Vestkyst, sparsommere paa *Øerne*. (Paa Loll., Falst. og Bornh. ikke bemærket).

23. *Myriophyllum*. Tusindblad.

1258. *M. spicatum* L. (Axbloinstret T.) H. 961; Drej. n. 945; F. D. 681.

Bladene krandsstillede, børsteformigt kamdeelte med alm. modsatte *Flige*; *Blomsterne* i Krands, danne et mellembudt, før Udspringningen opret Ax; *de nedre Dækblade* indskaarne, af Længde med eller lidet længere end Blomsterkrandsene, *de øvre* kortere, heelrandede.

Stængelen, som hos de følg., flydende. Støvknapperne før Bestøvningen røde. 7—8. 4.

I Færsk- og Brakvand, alm., og kun i enkelte Egne ikke tilstede, f. Ex. Sydvest-Sjæll. (17).

1259. *M. alterniflorum* [DC. Fl. fr. V, 529] (Haarfliget T.) Drej. n. 944; F. D. 2061; H. N. IV, 82.

Bladene krandsstillede, haarformigt kamdeelte, med alm. afvexlende *Flige*; *Dækbladene* som hos foreg.; *Blomsterne* i et mellembudt, før Udspringningen nikkende Ax, dannet foroven af afvexlende ♂ Blomster, forneden af 2—3 halvt krandsstillede ♀ Blomster.

Finere og spædere end foreg. og følg. 7—8. 4.

I Søer, Bække og Tørvgrave, sjældnere end de andre Arter: *J.* Vadum i Vendsyssel! alm. i Varde-Eggen (30), Fjlsø! i Kongeaaen og Tørvgrave i Nærheden af samme mellem Skodborg og Kolding (28), *Sl.* Husum Mølle dam (F. Müll.); *Sj.* Gurre Sø (11); *Bornh.* en Sø i Almindingen!

1260. **M. verticillatum** L. (Krands-T.) H. 962; Drej. n. 946; F. D. 1046 (β).

Bladene krandsstillede, børsteformigt kamdeelte, med alm. modsatte *Flige*; alle *Dækbladene* kamdeelte, længere end de regelmæssige, i Spidsen tæt samlede Blomsterkrandse, som danne et opret, forneden mellembrudt Ax.

Alm. mere frisk grøn end de foreg. Støvknapperne gule. 6—8. 4. Var.

α , *pinnatifidum* Wallr. (*M. verticillatum* DC.) Dækbladene mange Gange længere end Blomsterkrandsene.

β , *pectinatum* Wallr. (*M. pectinatum* DC.) Dækbladene lidet længere end Blomsterkrandsene, hvorved disse danne et Ax.

I Søer, Damme og Grøfter alm.

24. **Ceratophyllum. Hornblad.**

1261. **C. oxyacanthum** [Chamisso i Linnæa 1829, p. 504] (Tornet H.) Drej. n. 948; *C. demersum* L., H. 961; F. D. 2000; H. N. IX, 63.

Bladene haandsnitdeelte, dobbelt gaffeldeelte, med omtrent 4 bruskagtigt tandede *Flige*; *Frugten* med 2 tilbagebøiede Torne ved Grunden og en vedblivende *Griffel* af Frugtens Længde (eller længere) i Form af et Horn i Spidsen.

7—9. 4. Var. med Tornene ved Grunden indskrænkede til korte Vorter (*C. apiculatum* Cham.).

I Søer og Damme, alm. i Danmark.

1262. **C. muticum** [Cham. l. c.] (Tornløs H.) Drej. n. 947; *C. submersum* L., H. 961; Nolt. nov. p. 75; F. D. 510 (ikke god); H. N. IX, 64.

Bladene krandsstillede, tredobbelt gaffeldeelte, med 5—8 finere og svagere tandede *Flige*; *Frugten* ved Grunden tortet, uden Torne, med et Horn (af den vedblivende *Griffel*) i Spidsen, som er meget kortere end selve *Frugten*.

Bladfligene finere og mere oprette end hos foreg. 6—7. 4.

Paa lignende Steder som foreg., men meget sjeldnere: *Sj.* Roes-

kilde (Nolt.), mellem Hvedstrup og Heringeløse (15)! Bøgelund og Bisserup ved Skjelskør (Nielsen, 14)! *Falst.* Stubbekjøbing (19); *Loll.* Nakskov, Slotø (19); *Sl.* Husum (F. Müll.), Frederiksstad (F. D.).

25. *Poterium. Bibernelle.*

1263. *P. dictyocarpum* [Spach, Ann. Sc. nat. 1846, p. 34] (Blodstillende B.) Gren. & Godr. fl. Fr. I, 562; *P. Sanguisorba* L. (part.), H. 963; F. D. 1939; H. N. VII, 52.

Stængelen kantet; *Bladene* uligefinnede med modsatte, ægformet-ovale, dybt saugtakkede *Smaablade*; *Blomsterhovedet* ovalt eller kugleformet; *Skalfrugten* beenhaard, nætformigt rynket, aflang med 4 budte, svagt vingede Kanter.

1—2' høi. Stænglerne var. oprette, opstigende eller nedliggende, dens nedre Deel og Bladene glatte eller duunhaarede. 6—7. 4.

Paa Kalkgrund, sjelden: *J.* Aagaards Kalkbakker (16), Aalborg (Brix), Dybdal! N. Sundby (12), Dal Hede (Branth), Viborg (H.). Tøiluushaven ved Randers (7); *Bornh.* ved Læsaaen og mellem Vældensby og Arnager (19), Pythuset (14), Havskrænter mellem Baunodde og Horsemyreodde (Hjorth). Forvildet forekommer den ved Qvintus udenfor Kjøbenhavn (Hauberg)! *

26. *Carpinus. Avnbøg.*

1264. *C. Betulus* L. (Almindelig A.) H. 969; Drej. n. 951; F. D. 1345; Rehb. ic. fl. germ. XII, fig. 1296.

Bladene elliptisk-ægformede, tilspidsede, rynket-fjernervede, skarpt og dobbelt saugtakkede; *Hylsterets Midtflig* forlænget, saugtakket eller heelrandet, *Sidefligene* spidse; *Nødden* ægformet, stribet; *Størknapperne* i Spidsen skjæghaarede.

Høit Træ med lys askegraa Bark. 5 (blomstrer samtidigt med Løvspringet. Frugterne modnes 7—8). 4.

I Skove: paa *Halvoen* og i *Nordsjælland* sparsom, i *Fyen. Sydsjælland* og paa de sydlige *Øer* temmelig hyppig, især i Mængde paa *Bornholm*, hvor den træder istedetfor Bøgen. *

27. *Corylus. Hassel.*

1265. *C. Avellana* L. (Almindelig H.) H. 970; Drej. n. 952; F. D. 1468; Rehb. l. c. fig. 1300.

Bladene æg-hjerteformede eller rundagtige, tilspidsede,

dobbelt tandede; *Grifterne* purpurrøde; *Hasen* klokkeformig-aaben, i *Spidsen* uregelmæssigt fliget.

Buskagtig, sjældnere middelstort Træ, Bladstilkene og de unge Grene alm. kirtelhaarede. Nøddens Form meget forskjellig. 3—4. (blomstrer før Løvspringet. Frugterne modnes 8—9). *h*.

I Kratskove alm.; forekommer desuden overalt plantet ved levende Hegn og i Haver formedelst dens spiselige Frugter.

† *C. tubulosa* Willd. (Lamberts-N.) Rehb. l. c. fig. 1301. *Hasen* bladagtigt forlænget ud over den ægformede, fladtrykt-tilspidsede Nød.

Dyrkes i Haver.

28. Fagus. Bøg.

1266. *F. silvatica* L. (Almindelig B.) H. 965; Drej. n. 953; F. D. 1283; Rehb. l. c. fig. 1304; H. N. I, 59.

Bladene ægformet-elliptiske, spidse, utydeligt bølget-tandede, i *Randen* og paa *Nerverne* silkehaarede; *Åxelbladene* lancetformede, bruun-hindeagtige, hurtigt affaldende; *Skaalen* beklædt med Blødpigge.

Frøbladene nyreformede, kødfulde, paa Underfladen hvide. 5. (fr. 8—9). *h*.

Det almindeligste Træ i de danske Skove, mangler paa *Bornh.* (plantet paa nogle faa Steder) og i *Halvøens* Hedeegne. (Kun i Vendsyssel har jeg fundet Bøgen paa Hedebacker, hvor den, blandet med Bævreasp, danner lavt Krat).

† *Castanea. Kastanietræ.*

† *C. vulgaris* [Lam. Dict. I, p. 708] (Ægte K.) *C. vesca* Gärtn., Rehb. l. c. fig. 1305; *Fagus Castanea* L.

Bladene lancetformede, tilspidsede, skarpt saugtakke, med stærkt fremstaaende Nerver; *Knopskjællene* glatte, *Skaalens Pigge* lange og stikkende, *Nødden* bruun glindsende, ved Grunden blegere og glandsløs.

Høit Træ med glatte og glindsende, affaldende Blade. 6 (fr. 9—10). *h*.

Indført fra Sydeuropa, dyrkes hist og her i Haver og taaler godt vort Clima, men Frugterne modnes sjældent her.

29. Quercus. Eg.

1267. *Q. pedunculata* [Ehrh. Arb. n. 77] (Stilk-E.) H. 963; Drej. n. 954; Rchb. l. c. fig. 1313; *Q. foemina* F. D. 1180; *Q. Robur* α , L.

Bladene meget kortstilkede eller næsten siddende, fjerlappede med hjerteformet Basis; *Knopskjællene* regelm. taglagte i 5 Rader. ♀ *Blomsterstilkene* ved Modenheden mange Gange længere end *Bladstilkene*.

Høit Træ med glatte, qm Vinteren alm. affaldende Blade. 5 (fr. 8—9). \mathfrak{h} .

Almindelig i de danske Skove. De i Jyllands Hedeegne saa hyppige lave Egekrat (Pur) bestaae i Regelen af denne Art.

1268. *Q. sessiliflora* [Sm. Fl. brit. 3, 1026] (Vinter-E.) H. 965; F. D. 2667; *Q. Robur* β , L., Rchb. l. c. fig. 1309.

Bladene stilkede med afrundet eller tilspidset Basis, de frugtbærende *Blomsterstilke* af Længde med eller kortere end *Bladstilkene* (stundom 0); *Frugterne* kortere, tykkere og mere afrundede; forøvrigt som foreg.

Bladene blive henvisnede siddende paa Træet om Vinteren. 5. (fr. 8—9). \mathfrak{h} .

I Skove og Krat, sjældnere end foreg. og kun i enkelte Egne: J. Buderupholm (H.), Hald (Strandgaard), Silkeborg! i Skovene paa og omkring Himmelbjerget hyppig og den eneste Art, Rørbæk ved Veile (12); Sj. Dyrehaven mellem Klampenborg og Eremitagen (1 Træ, formodenlig plantet); Glænø (Nielsen, 14)! *Falst.* (H.); *Bornh.* den hyppigste Egeart i Almindingen! I vore Tørvmosers ældre Lag har Prof. Steenstrup (Vid. Selsk. Skr. 9, p. 53) kun fundet Levninger af denne Art.

Juglans. Valnødtræ.

† *J. regia* L. Schk. Handb. tab. 302. *Bladene* vel-lugtende, uligefinnede; *Smaabladene* 3—4 Par, ovale, næsten heelrandede; *Steenfrugten* oval-kugleformet; *Stenen* toklappet.

5 (fr. 10). \mathfrak{h} .

Dyrkes alm. i Haver og omkring beboede Steder paa Grund af de spisehge Frugter. \mathfrak{z}

VII. Monadelphica.

30. Xanthium. Braadfrø.

X 1269. **X. strumarium** L. (Skræppeagtig B.) H. 959; Drej. n. 955; F. D. 970; Rehb. ic. fl. germ. XIX, fig. 1576.

Bladene trenervede, hjerteformede eller nyre-hjerteformede, grovt og uregelm. tandet-lappede (alm. trelappede); flere halvkugleformede ♂ *Blomsterhoveder* i Spidsen af Stængelen; ♀ *Blomsterne* samlede til siddende eller kortstilkede Nøgler i Bladhjørnerne; *Frugterne* duunhaarede og beklædte med stive, i Spidsen hagekrummede Torne.

Blomsterne grønne. 7—9. ☉.

I Nærheden af Byer og beboede Steder; tidligere funden sporadisk i Danmark, f. Ex. *Sj.* Græse (Kyll.); Amagerport og Salpeterværket udenfor Østerport ved Kbhavn, Kjøge (H.); *Møen* ved Stege; *Falst.* ved Nykjøbing (H.). I de senere Aar er den hverken funden paa de anførte Steder eller andensteds, og er maaskee nu aldeles forsvunden af Floraen. ☞

VIII. Polyadelphia.

31. Bryonia. Galdebær.

1270. **B. alba** L. (Enbo-G.) H. 974; Drej. n. 956; F. D. 813; Rehb. ic. fl. germ. XIX, fig. 1620.

Stængelen klattrende ved Hjælp af *Slyngtraade*; *Bladene* rue, hjerteformede, haandlappede, med 5 grovt tandede *Lapper*; *Bægeret* af ♀ *Blomsten* af Længde med Kronen; *Arret* glat.

Blomsterne guulgrønne, Bær sorte. 6—8. ♀.

Ved Gjærder, især omkring Byer, funden i alle danske Provindser, men sporadisk og ikke alm. Ved Tønder forekommer en Var. med mørkgrønne Bær (Branth). ☞

1271. **B. dioeca** [Jacq. Fl. austr. 2, t. 199] (Tvebo-G.) H. 975; F. D. 1830.

Stængelen som foregaaende; *Bladene* rue, hjerteformede,

haandfligede med omtrent 5, heelrandede eller faatandede *Flige*; tvebo; ♀ *Bægeret* af Kronens halve Længde; *Arret* haaret.

Bladfligene alm. smalere end hos foreg., Blomsterne skidengule, Bær hørøde. 6—8. 4.

Ved Gjærder, sjelden: *J.* alm. omkring Ribe (6); *Slesvig* (16); *F.* Sanderumgaard, Faaborg (H.). *

22^{de} Klasse. Dioecia (Tvebo).

1. Orden. Monandria (Enhannede).

Najas (21, 1).

Salix purpurea (22, 2).

2. Orden. Diandria (Tohannede).

1. **Salix** L. ♂ og ♀ Blomsterne i Rakler; Blomsterne omgivne af 1 Rakleskjæl og 1—2 Kirtler; ♂: Støvdragere 1—8; ♀: 1 Frugtknude med 1 Griffel og 2 hele eller tokløvede Ar; Frugten toklappet, mangefrøet Kapsel; Frøene med Frøuld ved Grunden. (Træer eller Buske med affaldende Blade; Knopperne omgivne af 1 enkelt eller 2 kappeformigt sammenvoxne Knopskjæl. N. F. Salicineæ).

Fraxinus. Fr. Vingefrugt (2, 1).

3. Orden. Triandria (Trehannede).

2. **Empetrum** L. Blomsterne i Bladhjørnerne; Bæger og Krone trebladede; ♀: Arret straaaleformet; Frugten et flerfrøet Bær. (Halvbusk med stedsegrønne Blade. N. F. Empetreae).

Salix amygdalina (22, 2).

Carex dioeca (21, 3).

Valeriana dioeca (3, 1).

4. Orden. Tetrandria (Firehannede).

a. Urteagtige Væxter.

Urtica dioeca (21, 4).

b. Buskvæxter.

aa. Blomsterne enlige i Knipper, Frugten bæragtig.

3. **Hippophæe** L. ♂: Blomsterdækket tobladet, med i Spidsen sammenhængende Blade; ♀: Blomsterdækket tofliget, tilsidst kjødfuldt og omgivende Frugten (et falsk Bær); Arret udeelt, knieformet. (Busk med Vedtorne og skjældækte Blade. N. F. Elæagnææ).

4. **Viscum** L. ♂: Blomsterdækket firedeelt, Støvknapperne siddende paa Blomsterdækkets Flige; ♀: Bægeret en svag, oversædig Rand; Kronen firebladet; Griffelen 0; Arret afstumpet *). (Snyltevæxt med knippestillede Blomster i Vinklerne af gaffeldeelte Grene. N. F. Loranthaceæ).

Rhamnus catharticus (5, 1).

Salix cuspidata (22, 2).

bb. Blomsterne i Rakler, Frugten nødagtig.

5. **Myrica** L. ♂: Blomsterne nøgne; 4—6 Støvdragerne befæstede ved Grunden af Rakleskjællene; ♀: Blomsterdækket skjælformet, 2—4-fliget; 1 Frugtknude med 2 traadformede Ar. (N. F. Myricææ).

5. Orden. *Pentandria* (Femhannede).

a. Urteagtige Væxter. (6—7. N. F. Urticaceæ, b).

6. **Humulus** L. ♂: Blomsterne i grenet Klasse (Top); Blomsterdækket femdeelt; Støvdragerne oprette; ♀: Blomsterne i Rakle med 2—3-blomstrede, urteagtige Rakleskjæl; Blomsterdækket skjælformet, to lange traadformede Ar; Frugten nødagtig. (Slyngende Væxt med haandfligede Blade).

† *Cannabis* L. ♂: Blomsterne i korte Klaser, ♀: Blomsterne knippestillede i Bladhjørnerne; ♂: Blomsterdækket femdeelt; Støvdragerne hængende; ♀: Blomsterdækket spaltet i

*) Efter Schleiden har *Viscum* et nøgent Æg (uden Frøgjemme), omgivet af den kjødfuldt tilvoxende Frugtbund; efter J. Agardh o. Fl. en eller flere nøgne Kimsække (uden Æghinder) i Spidsen af Ægstolen, men indsluttede af et Frøgjemme. Det synes derfor endnu tvivlsomt, om denne Familie i det naturlige System skal henregnes til de Nøgenfrøede.

den ene Side og indhyllende den nødagtige Frugt; 1 kort Griffel og 2 traadformede Ar. (Opret Væxt med fingrede Blade).

b. Træagtige Væxter.

7. **Juniperus** L. ♂: Blomsterne i Rakler; Støvknapperne befæstede til Underfladen af skjoldformede Rakleskjæl; ♀: Blomsterne i en kort Rakle, de nedre Rakleskjæl tomme, de 3 øvre ved Grunden sammenvoxne, tilsidst kjødfuldt tilvoxende og omsluttende de 3 ♀ Blomster (dannende et falsk Bær). (Busk eller lavt Træ med stedsegrønne Blade. N. F. Coniferæ, b, Cupressineæ).

Ribes alpinum (5, 1).

Salix pentandra (22, 2).

6. Orden. *Hex—Polyandria* (Sex—Mangehannede).

a. Træagtige Væxter.

aa. Blomsterne i Rakler.

8. **Pópulus** L. Blomsterne af begge Kjøen i Rakler, med saugtakkethligede Rakleskjæl; ♂: 8—30 Støvdragere befæstede paa en skaalformet Udvidelse af Frugtbunden, ♀: 1 Frugtknude (ved Grunden omgivet af en Skaal ligesom ♂) med to fligede (sjeldnere 3—4-lappede) Ar; Frugten toklappet Kapsel*); Frøene talrige, med Frøuld ved Grunden. (Træer med af-faldende Blade, sammentrykte Bladstilke og spiralformigt tag-lagte Knopskjæl. (N. F. Salicineæ).

Salix pentandra (22, 2).

Myrica (22, 4).

bb. Blomsterne i Klase eller Halvskjærm.

Acer. Todelelig Vingefrugt (8, 1).

*) Var. med 3—4-klappet Kapsel (Rostr.).

b. Urter.

aa. Blomsterdækket undersædigt.

9. **Mercurialis** L. Blomsterdækket enkelt, tredeelt, grønt; ♂: 9—12 Støvdragere; ♀: 2 Bistøvdragere, 1 torummet Frugtknude med 2 næsten siddende Ar; Frugten todelelig Spaltefrugt med enfrøede, toklappede Smaafrugter (Hindefrugter). (N. F. Euphorbiaceæ).

Rumex Acetosa og *Acetosella* (6, 3).

Melandrium vespertinum og *diurnum* (10, 4).

Rubus Chamæmorus (12, 3).

bb. Blomsten oversædig. (11—12. N. F. *Hydrocharideæ*).

10. **Stratiotes** L. Bæger og Krone trebladede; talrige Bistøvdragere; ♂: 12 frugtbare Støvdragere; ♀: 6 tokløvede Grifler, Frugten sexrummet, mangefrøet, uopspringende. (Vandplante med linieformede Blade).

11. **Hydrocharis** L. (Bæger og Krone trebladede; ♂: 9 Støvdragere, 3 ufrugtbare Grifler; ♀: 3 traadformede Bistøvdragere og 3 kjødfulde Skjæl, 6 tokløvede Grifler, Frugten sexrummet, mangefrøet, uopspringende. (Vandplante med nyreformede Blade).

7. Orden. *Monadelphica* (Enknippede).

† 12. **Taxus** L. Begge Kjøn udgaae fra Bladhjørnerne; ♂ Raklerne smaae, kugleformede, med taglagte Skjæl ved Grunden og flere forneden søileformigt sammenvoxne Støvdragere med skjoldformede, 5—8-rummede Støvkapper; ♀ flere taglagte tomme Dækskjæl ved Grunden af et endestillet nøgent Æg, det modne Frø omgivet af den kjødfuldt tilvoxende, skaalformede Frøkappe. (Træ med naaleformede Blade. N. F. *Coniferæ c*, *Taxineæ*).

8. Orden. *Syngenesia* (Rørhannede).

Antennaria } (19, 2).
Petasites

I. (II) Diandria.

1. Salix. Piił *).

a. *Amerina* Fr. (Skjörpile). Raklerne stilkede, med bladet Stilk, udvikles samtidigt med Bladene, oftest hængende; Rakleskjællene eensfarvede; Blomsterne (idetmindste ♂) med 2 Kirtler ved Grunden (undt. Nr. 1278) og de nederste i Raklen først udspringende; Støvknapperne gule; »Arrenes Flige rettede tilhøre og venstre (∴ parallelt med Axen)**).

aa. *Fragiles*. Træagtige med skjøre Grene, affaldende
♀ Rakleskjæl (undt. hos Nr. 1275).

1272. *S. pentandra* L. (Laurbær-P.) H. 980; Fr. Mant. 1, p. 41; Drej. n. 957; F. D. 943; Rchb. ic. fl. germ. XI, fig. 1268; H. N. IX, 60.

*) Pilearterne maa undersøges deals om Foraaret under Blomstringen, deals senere paa Aaret naar *Bladene* ere fuldkomment udviklede, til hvilken Tid ogsaa *Axelbladene* først kunne tydeligt erkjendes, medens disse ofte paa de yngre Grene ere ufuldkomne eller endog aldeles ikke tilstede. *Støvdragernes* Antal er hos de fleste Arter 2, og kun naar et andet Antal findes, er dette udtrykkeligt nævnt i Beskrivelserne. En stor Deel af de her anførte Pile ere ikke oprindeligt indenlandske, men da det om mange er vanskeligt at afgjøre, hvorvidt de ere vildvoxende eller ikke, ere alle Arter, som ikke ere fundne i Moser o. a. udyrkede Steder og altsaa øiensynligt tilhøre vor Flora, betegnede med †. Blandt disse blive nogle plantede overalt og ere at betragte som acclimatiserede. Flere Arters fremmede Herkomst antydes ved at Spidserne af de unge Grene bortfryse om Vinteren, eller derved at kun det ene Kjønn findes hos os. (Efter Fries forekomme af de nordligere Arter mod disses Sydgrændse kun ♂, af de sydlige mod Nordgrændsen kun ♀). De fleste dyrkede Pile, selv de som efter deres Natur have en høi Stamme, sees her i Landet næsten altid kun som Buske, fordi Grenene atkappes og benyttes til Gjærder, Kurve o. s. v. Ved Revisionen af denne Slægt har jeg havt god Hjælp af Hr. Seminarielærer *Rostrup*, som i de senere Aar med Opmærksomhed har iagttaget de danske Pilearter og meddeelt mig mange værdifulde Bemærkninger om disse.

**) De her anførte Kjendetegn, som ere hentede fra Raklernes forskellige (centripetale eller centrifugale) Udspringning, har jeg ved

Bladene ægformet-elliptiske, spidse, fint og kirtlet-saug-takkede med flere Kirtler ved Grunden af Pladen, mørkgrønne, glatte; *Støvdragerne* 5—7, med forneden haarede Støvtraade; *Kapselen* glat, kortstilket; *Stilken* to Gange længere end Kirtlerne; *Griffelen* af Middellængde, *Arrene* i Spidsen tokløvede.

Busk eller lavt Træ. Saavel Grene som Blade glindsende, glatte. $\frac{5}{2}$ — $\frac{6}{1}$ (den sildigst blomstrende af de danske Pile). $\frac{1}{2}$.

I Moser og fugtige Kratskove ikke sjelden.

Ann. Axelbladene beskrives som »rette, ægformede«; jeg har kun yderst sjelden fundet disse tydeligt udviklede (kun hos meget storbladede vilde Skud) og selv da som meget smaae, kirtellignende Legemer, hvorfor jeg har udeladt disses Beskrivelse blandt Kjendtegnene paa Arten.

1273. *S. cuspidata* [Schultz Fl. Starg. Suppl. p. 47] (Firehannet P.) F. D. 2487; H. N. XV, 61; S. Meyeriana Willd.; Rehb. l. c. fig. 1266; *S. fragili-pentandra* Wimmer *).

Bladene lancetformet-elliptiske, tilspidsede; *Axelbladene* halvt hjerteformede, skjæve; *Støvdragerne* 3—4; *Kapselens Stilk* 3—4 Gange længere end Kirtlerne; *Arrene* udrandede; forøvrigt som foreg., men høiere af Væxt og blomstrer omtrent 8 Dage tidligere. (5.)

Ved Gjærder: *Sj.* ved Leersøen (19), forhen ved gl. Kongevei! *F.* Vildvoxende i Moser paa Hindsholm, ved Nielstrup og ved Hegn i det sydlige ikke sjelden, hist og her i det sydl. og østl. *Jyll.* (12). ♀ Planten er ikke funden hos os, men stundom findes enkelte androgynø Rakler paa ♂ Planten. *)

† 1274. *S. fragilis* L. (Skjør-P.) H. 983; Fr. Mant. 1, p. 42; Drej. n. 958; F. D. 2484; Rehb. l. c. fig. 1264; H. N. I, 60 og XV, 62 a.

fleraarige Undersøgelser fundet constante hos idetmindste et stort Antal Arter, og jeg er ved Andres samstemmende Meddelelser bestyrket i den Formening, at dette Forhold hensigtsmæssigt kan benyttes til Arternes Adskillelse. Bemærkningerne om Arrenes forskellige Retning ere mig meddeelte af Hr. Rostrup. Disse Forhold anbefales til yderligere Undersøgelse.

*) Prof. Wimmer har i Fl. v. Schles. p. 474 o. fig., i flere senere Athandlinger (sml. Andersons nya bot. Not. 1849 p. 178) og i sin Exsiccatsamling («*Salices exsiccatae*») søgt at bevise en stor Mængde Pilearters hybride Herkomst. Uden at gaae ind paa en

Grenene næsten retvinklet udspærrede; *Bladene* bredt lancetformede, tilspidsede, saugtakke, gulgrønne, paa Underfladen matgrønne; *Axelbladene* halvt hjerteformede; *Støvtraadene* glatte eller svagt haarede ved Grunden; *Kapselen* glat, stillet; *Stilken* 2—3 Gange saa lang som Kirtlerne; *Griffelen* af Middel-længde, *Arrene* tokløvede.

Høit og hurtigt voxende Træ. *Grenene* (i Vinklerne) meget skjøre; *Bladene* glatte, i yngre Tilstand ofte silkehaarede. Blomstrer omtr. 14 Dage senere end foreg. ($\frac{5}{2}$). Var.

* *pendula* (Ser.). S. Russeliana Sm.; Rehb. l. c. fig. 1265 (S. albo-fragilis); *Grenene* tyndere, mindre skjøre, tilsidst nikkende; *Bladene* smalere, silkehaarede; *Axelbladene* længere tilspidsede, *Raklerne* mindre og tyndere; *Støvtraadene* ved Grunden uldhaarede; *Kapslerne* mindre.

Ved Gjærder, omkring Byer ikke sjelden, synes at mangle i det sydlige Fyen og paa Smaaøerne deromkring (12). (Egenlig vildvoxende har jeg ikke fundet den her i Landet). * som i Udseende nærmer sig endel til S. alba, og som maaskee er en egen Art, forekommer sjældnere plantet.

1275. S. *viridis* [Fr. Nov. p. 283] (Grøn P.) F. D. 2486; H. N. 1, 61.

Grenene oprette (i en Vinkel mod Stammen af omtr. 60 °); *Bladene* smalt lancetformede, tilspidsede, glatte, de yngre paa Underfladen blaagraae; *Axelbladene* meget smaae, ægformede (eller 0); *Raklerne* oprette eller udstaaende; *Rakleskjællene* oftest vedblivende; *Støvtraadene* ved Grunden haarede; *Kapselen* glat, stillet; *Stilken* mod Frugtmodningen dobbelt saa lang som Kirtelen, *Griffelen* kort; *Arrene* udrandede.

Middelhøit Træ. De unge Grene glatte, rødbrune. *Bladene* smalere, mørkere grønne end hos foreg., fra hvilken den endog i bladløs Tilstand

nærmere Undersøgelse af dette Spørgsmaal, som ikke her vilde have sin rette Plads, skal jeg kun i Almindelighed bemærke, at jeg ikke kan antage den Anskuelse i hele sin Udstrækning for holdbar, ifølge hvilken omtrent Halvdelen af vore Pilearter skulde være Bastardformer. For Fuldstændigheds Skyld har jeg angivet de Wimmerske Navne blandt Synonymerne for hver af de formentlige hybride Arter.

er let kjendelig ved meget tyndere, mere oprette Grene, samt ved mindre Knopper. (Hos ♀ Blomsterne har jeg kun fundet 1 Kirtel). $\frac{4}{5}$ —5.

Ved Gjærder, omkring Byer o. s. v., meget alm. og i de fleste Egne hyppigere end foreg. I Moser ved Helsingør har jeg fundet den, som det synes, vildvoxende. †

† 1276. **S. alba** L. (Hvid P.) H. 994; Fr. l. c. p. 44; Drej. n. 959; F. D. 2552; Rehb. l. c. fig. 1263; H. N. 1, 62.

Grenene oprette; *Bladene* smalt lancetformede, tilspidsede, saugtakkede, paa begge Flader tiltrykt-silkehaarede; *Axelbladene* meget smaae, lancetformede (eller 0); *Raklerne* buetformigt krummede; *Støttraadene* ved Grunden uldhaarede; *Kapselen* glat, meget kortstilket; *Stilken* kortere end Kirtelen; *Griffelen* meget kort; *Arrene* udrandede.

Høit Træ. De unge Grene graafiltede. ♀ Blomsterne have, ligesom foreg., kun 1 Kirtel. $\frac{5}{2}$. Var.

β, *coerulea* Koch. (*S. coerulea* Sm., Engl. Bot. 2431). Bladene lange, linie-lancetformede, paa Underfladen blaaduggede, tilsidst glatte.

γ, *vitellina* Koch. (*S. vitellina* L.?). Grenenes Bark smukt rødbrun, Rakleskjællene mønnierøde.

Ved Landsbyer og Gjærder ikke sjelden. β, i Leersøen (19); γ, ved Overdrevskroen mellem Roeskilde og Ringsted!

bb. *Amygdalinæ*. Buskagtige, med seigere Grene og vedblivende ♀ Rakleskjæl.

1277. **S. amygdalina** L. (Mandel-P.) Fr. Mant. 1, p. 42; Drej. n. 960; F. D. 2558; Rehb. l. c. fig. 1256—60; H. N. III, 5; *S. triandra* L., H. 980.

De unge Grene kantet-furede; *Bladene* kortstilkede, æg-lancetformede, tilspidsede, sangtakkede, glatte; *Axelbladene* store, halvt hjerteformede, takkede; *Rakleskjællene* i Spidsen glatte; *Støvdragerne* 3; *Kapselen* glat, stilket; *Stilken* 2—3 Gange længere end Kirtlerne; *Griffelen* meget kort; *Arrene* udspærrede, udrandede.

Ved de store, allerede paa de unge Grene kjendelige Axelblade let at adskille fra de foreg. 5. Var. i Bladformen og:

α, *concolor*. Bladene paa begge Flader grønne.

β, discolor. Bladene paa Underfladen blaagraae.

Ved Gjærder og Plantninger, hist og her (ikke alm.), sjelden i Moser: *J.* Vendsyssel (H.), ved Kolding Aa (28), *Sj.* en Mose ved Grøndal mellem Kbhavn og Brøndshøj! Leersøen (19). (Formen *α*, er her i Landet den hyppigste, tvertimod hvad der er Tilfældet i Sydeuropa, og ♂ er hos os meget sjeldnere end ♀).

† 1278. *S. undulata* [Ehrh. Beitr. 6, p. 101] (Bølgebladet P.) H. 980; Fr. l. c. p. 62; Drej. p. 307; F. D. 2550; Rechb. l. c. fig. 1261; H. N. III, 55; *S. triandra viminalis* Wimm.

De unge *Grene* trinde eller svagt kantede; *Bladene* linie-lancetformede, langt tilspidsede, i Randen saugtaktede og svagt bølgede; *Åxelbladene* halvt hjerteformede, tilspidsede, takkede; *Rakleskjællene* uldhaarede; *Støvdragerne* 3; *Kapselen* duunhaaret eller glat, stilket, med 1 Kirtel ved Grunden, *Stilken* dobbelt saa lang som Kirtelen; *Griffelen* forlænget; *Arrene* tokløvede.

Bladene i yngre Tilstand duunhaarede, ældre glatte. *Rakleskjællene* stundom i Spidsen affarvede (røde). 5.

Ved Gjærder: *Sj.* Kbhavn ved Stadsgravene, gamle Kongevei, Lygten! *Valby*, Lundeuset (19); *J.* Vendsyssel og Thy (Viborg). Kun ♀ Planten er funden her i Landet. ♀

b. *Vetrix* (Baandpile). *Grenene* langstrakte, *Raklerne* siddende, udvikles før *Bladene*; *Rakleskjællene* i Spidsen forkjelligfarvede, 1 Kirtel.

aa. *Pruinosæ*. *Yderbarken* overtrukken af en blaaagtig *Dug*, *Inderbarken* citrongul. *Støvknapperne* før *Bestøvningen* brandgule, efter samme skidengule. (De øvre Blomster i ♂ *Raklen* udspringe først).

† 1279. *S. acutifolia* [Willd. Sp. pl. 4, p. 668] (Blaadugget P.) Fr. l. c. p. 46; F. D. 2602; H. N. VIII, 58 og XIV, 63; *S. pruinosa* Wendl., Rechb. l. c. fig. 1255; *S. caspica* hortul.

Grenene mørkt violetbrune, om Efteraaret (og i tørret Tilstand) blaaduggede; *Bladene* linie-lancetformede, langt tilspidsede, saugtaktede, glatte og glindsende; *Åxelbladene* lancet-

formede, tilspidsede; *Kapselen* glat, næsten siddende; *Griffelen* forlænget; *Arrene* linieformede, udeelte.

Funden som vildvoxende (♂) i Leersøens udtørrede Bassin (19). Plantet forekommer den hist og her, dog ikke almindelig og stedse kun ♂, f. Ex. *Sj.* ved Stadsgravene udenfor Nørreport i Mængde! Frederiksberg, Vedbæk (19); *J.* Østergaard og Næsby ved Løgstør (12); *Bornh.* ved Hammershuus (19). 3—4 (den tidligst blomstrende af alle hos os forekommende Pile). [■]

bb. Purpureæ. Yderbarken uden *Dug*, *Inderbarken* citronguul, *Støvknapperne* før *Bestøvningen* rødgule, efter samme sorte. (De øvre Blomster i ♂ *Raklen* udspringe først; »*Arrenes* Flige rettede for- og bagtil 2: lodret paa *Axen*«).

1280. *S. purpurea* L. (Purpur-P.) H. 984; Fr. l. c. p. 63; Drej. n. 961; F. D. 2554; Rchb. l. c. fig. 1230; H. N. II, 56; *S. monandra* Hoffm.

Buskagtig; *Bladene* lancetformede, foroven bredere, tilspidsede, svagt saugtakke; *Axelblade* 0; 1 *Støvdrager* dannet af 2 sammenvoxne Støvtraade med 1 (firerummet) eller 2 (to-rummede) *Støvknapper*; *Kapselen* uldhaaret, siddende, med *Kiølen* naaende op over dens Basis; *Griffelen* kort, *Arrene* udrandede.

De unge Grenes Yderbark alm. mørkrød, sjeldnere guulbruun eller graaagtig, Grenene, især paa ♂ Expl., ofte i Spidsen henvisnede efter Vinterkulden. *Bladene* glatte eller i yngre Tilstand silkehaarede, blive sorte ved Tørring. *Rakleskjællene* i Spidsen sorte. 4—5. Var.

α, gracilis Gren. & Godr. (*S. purpurea* Sm.). Lav Busk. *Bladene* paa Underfladen blaagraae, *Raklerne* meget tynde; *Griffelen* meget kort, *Arrene* korte, ægformede.

β, Helix (S. *Helix* L.). Rchb. l. c. fig. 1232. Grenene opret-aabne, *Bladene* bredere, paa begge Sider ensfarvede; *Griffelen* længere, med linieformede *Ar.*

γ, Lambertiana (Sm.) Rchb. l. c. fig. 1235. Høiere af Væxt, med bredere Blade, tykkere *Rakler*, forøvrigt som *β*.

Forekommer hyppigt plantet, især ved Gjærder, og dyrkes paa flere Steder til Brug ved Kurveflætning. *β*, *Lundehuusmosen* (19); *γ*, ved Sorø Sø!

1281. *S. rubra* [Huds. Fl. angl. p. 428] (Rød P.) Fr. l. c. p. 63; F. D. 2555; Rchb. l. c. fig. 1236; H. N. X, 60.

Høi Buskvæxt; *Bladene* langstrakt-lancetformede, tilspidsede, glatte eller duunhaarede, i Randen tilbagerullede og svagt saugtakke, *Axelbladene* linieformede; *Raklerne* længere og tykkere; *Støvdragerne* 2, sammenvoxne til Midten; *Griffelen* forlænget; *Arrets Flige* udeelte, linieformede; forøvrigt som foreg.

Høiere end foreg.; ligner i Characterer *S. purpurea*, i Udseende *S. viminalis*, og ansees af Wimm. l. c. for en Bastardform mellem disse 2 Arter (*S. purpureo-viminalis*). 4—5. ♀.

Sjelden: *Sj.* i Langholmsmosen ved Dronninggaard (9), Valby! Ryerne mellem Lundehusmosen og Strandveien (19)! *Sl.* Fresendelf ved Trenen (F. Müll.).

cc. Viminalis. Buskagtige med lange riisformede Grene. Yderbarken uden Dug, Inderbarken grønlig-hvid. (»Arrets Flige rettede for- og bagtil 2: lodret paa Axen«).

† 1282. *S. mollissima* [Ehrh. Beitr. 6, p. 101] (Blød P.) H. 993; Fr. l. c. p. 62; F. D. 2604; H. N. 1, 65.

Bladene langstrakt lancetformede, tilspidsede, utydeligt saugtakke, paa Overfladen grønne, paa Underfladen blødhaaert-graafiltede; *Axelbladene* ægformede, spidse (eller 0); *Raklerne* kortstilkede eller næsten siddende; *Rakleskjællene* langhaarede; de nedre Blomster i Raklen udvikles først; *Kapselen* tæthaaret, næsten siddende; *Griffelen* forlænget; *Arrets Flige* tokløvede, under Blomstringen af Længde med Rakleskjællenes Haar.

Grenene glindsende, glatte, bruungule; Rakleskjællene under Blomstringen røde, i Spidsen mørkere, senere rustgule. 4—6.

Sjelden: *Sj.* Kongens Enghave nær gl. Pesthuus (9), Uterslev, Ryerne mellem Lundehuset og Strandveien (19)! *F.* i det sydlige paa flere Steder mellem Faaborg og Svendborg (f. Ex. V. Skjærninge (12)! *Sl.* ved Bredderne af Eideren N. for Rendsborg! Tønning, Süderholz (F. Müll.). Saavidt mig bekjendt er ♂ Planten ikke funden her i Landet.

Anm. Den hos Rehb. (l. c. fig. 1250) afbildede Plante af dette Navn afviger fra den her beskrevne ved langstilkede Kapsler og indtil Midten sammenvoxne Støvtraade. Denne Afbildning hører derfor neppe til den af Fries, Koch o. Fl. beskrevne Art, saameget mindre som Rehb. anseer sin Plante for en Bastard af *S. purpurea* og *caprea*, hvilket aldeles ikke kan passe paa de Expl. jeg har seet, som snarere minde om *S. lanceolata* eller *undulata* end om *S. caprea*.

Wimm. l. c. antager *S. mollissima* for en Bastard af *S. undulata* og *S. viminalis*.

† 1283. *S. viminalis* L. (Baand-P.) H. 994; Fr. l. c. p. 61; Drej. n. 962; F. D. 2485; Rehb. l. c. fig. 1248; H. N. I, 64.

Bladene linie-lancetformede, spidse, heelrandede med tilbagerullet Rand, paa Overfladen graagrønne, paa Underfladen silkehaarede og søvglindsende; *Axelbladene* linieformede; *Raklerne* tæt samlede, næsten siddende, de øvre Blomster i ♂ *Raklen* udspringe først; *Kapselen* hvidfiltet, næsten siddende, *Griffelen* forlænget; *Arrets* Flige linieformede, udeelte, fremragende ovenfor *Rakleskjællenes* Haar.

Ved de meget smale og stedse i Randen tilbagerullede Blade let kjendelig fra de øvrige Arter. Spidsen af Grenene bortfryser ofte om Vinteren. Efter *Wimmer* (Schles. Fl. p. 479) forekomme *Arrene*, endog paa samme Plante, snart hele, snart kløvede, hvilket ogsaa Hr. Rostrup har bemærket at være Tilfældet hos os. $\frac{4}{5} - \frac{5}{1}$.

Meget alm. ved Gjærder overalt i Danmark.

† 1284. *S. stipularis* [Smith Fl. Brit. 1069] (Langbladet P.) F. D. 2668; Engl. Bot. 1214; Rehb. l. c. fig. 1249.

Bladene langstrakt lancetformede, tilspidsede, svagt bølget-rundtakkede eller heelrandede (de ældre uden tilbagerullet Rand), paa Overfladen grønne, tilsidst næsten glatte, paa Underfladen graafiltede; *Axelbladene* store, halvt hjerteformede, tilspidsede, bølget-saugtakkede, af Længde med eller længere end Bladstilken; *Raklerne* siddende; *Rakleskjællene* rødbrune, beklædte med lange, hvide Haar, som naae til Spidsen af *Griffelen*; *Kapselen* hvidfiltet, næsten siddende (Kirtelen længere end *Kapselstilken*); *Griffelen* kortere end *Arrets* linieformede, forlængede, udeelte Flige.

Grenene hvidgraa-filtede. Har Lighed med *S. viminalis* og *S. acuminata*; ved kraftigere Væxt, bredere og svagere filtete Blade og tykkere *Rakler* forskjellig fra hin, ved smalere Blade, lysere *Rakleskjæl*, kortere *Kapselstilk* og længere *Ar* fra denne, og ved de meget store *Axelblade* let kjendelig fra begge. $\frac{4}{5} - 5$.

Ved Gjærder, sjelden og kun ♀: *Sj. Lygten*, *Lundehuusmosen* (19)! *Hornbæks Plantage* (Heiberg)?

† 1285. *S. acuminata* [Sm. Fl. brit. 3, 1088 (ikke Hoffm. eller Koch)] (Spidsbladet P.) Engl. Bot. 1434; F. D. 2669; H. N. XI, 60; *S. dasyclados* Wimm.

Bladene elliptisk-lancetformede, tilspidsede, i Randen bølgede, fjernt og utydeligt saugtaktede (med i yngre Tilstand ved Grunden tilbagerullet Rand), paa Overfladen sortgrønne, tæt, men korthaarede, paa Underfladen blaagraa-filtede; *Axelbladene* halvt hjerteformede, tilspidsede; *Raklerne* siddende, de øvre Blomster udspringe først; *Rakleskjællene* næsten heelt sortbrune, beklædte med lange, hvide Haar, som naae op til Spidsen af Griffelen; *Kapselen* hvidfiltet, kortstilket, dens Stilk ligelang med *Kirtelen*; *Griffelen* af Længde med det udeelte eller udrandede *Ars* Flige.

Grenene meget tykkere end hos foreg. og følg., tilligemed Knopskjællene tæt beklædte med en sortgraa Filt. Raklerne tykke og meget laadne af de lange og tætsiddende Haar. Original-Expl. af *S. dasyclados* Wimm. stemme aldeles overeens med vor Plante. *S. acuminata* Rchb. l. c. fig. 1252 hører neppe herhid. $\frac{4}{2}$ —5.

Ved Gjærder, sjelden: *Sj.* mellem Gl. Kongevei og Falkoneer-Alleen ved Kbhavn! Lundehuusmosen (19), Strædet ved Sorø! *Loll.* Steensgaard (19). (Paa alle disse Steder kun ♀). *

† 1286. *S. lanceolata* [Fr. Nov. p. 283, Mant. 1, p. 61 (ikke Ser. eller Sm.)] (Lancetbladet P.) Drej. n. 963; H. N. I, 63 og II, 59; *S. Smithiana* (Koch?) H. II, 303; F. D. 2551; Rchb. l. c. fig. 1251; Lge. Haandb. 1 Udg. n. 1230; *S. affinis* Gren. & Godr.; *S. viminali-caprea* Wimm.

Bladene lancetformede, spidse, heelrandede eller svagt bølget-tandede, paa Overfladen graagrønne, paa Underfladen silkehaarede og sølvglindsende; *Axelbladene* halvt piiiformet-hjerteformede; *Raklerne* siddende, alm. buekrummede, de nedre Blomster udspringe først; *Kapselen* graafiltet, kortstilket; *Stilken* af Længde med *Kirtelen*; *Griffelen* af Middellængde; alm. kortere end det tokløvede *Ars* linieformede Flige.

Højere end de 3 foreg., stundom træagtig. Grene og Knopskjæl næsten glatte. Arrene ere snart kløvede, snart hele. Saavel disse som Griffelen og Kapselstilkene ere af forskjellig Længde. $\frac{4}{2}$ — $\frac{5}{1}$. *Var.*

α , *acuminata* Wimm. (*S. acuminata* Koch, ikke Hoffm. eller Sm.). Bladene med afrundet Basis, paa Underfladen tæt hvidfiltede; Griffelen og Arrets Flige længere.

β , *capræformis* Wimm. Bladene lancetformede, mod begge Ender afsmalnede, svagere filtede; Griffel og Ar korte.

Alm. ved Gjærder (en af de hyppigst plantede Pilearter her i Landet, hvor jeg dog stedse kun har fundet ♀ Expl.).

Ann. Navnet *S. Smithiana* Willd. har været meget omtvistet og forskjellig anvendt. Gren. & Godr. anvende dette Navn paa en Form af *S. Sericeana* Gaud., *S. lanceolata* Ser. (ikke Fr.), som ikke hidtil er bemærket i vor Flora, men som muligviis kunde findes her. For vor Art har jeg foretrukket Navnet *S. lanceolata* Fr., som er mindre udsat for Forvexling.

c. *Caprea* Fr. Grenene korte, knudrede; Raklerne siddende eller tilsidst stilkede, udvikles førend (hos Nr. 1290 samtidigt med) Bladene.

aa. *Cinerascentes* (Graavidier). Griffelen 0 eller meget kort, „Arrets Flige rettede for- og bagtil o: lodret paa Axen“. Bladene rynkede, tæthaarede. (Forekomme typisk som lave Træer).

1287. **S. cinerea** L. (Graa P.) H. 992; Fr. l. c. p. 54; Drej. n. 965; F. D. 2601; Rehb. l. c. fig. 1222; H. N. VII, 59; *S. acuminata* Hoffm.

Grenene og Knopskjællene graafiltede; Bladene elliptiske eller omvendt-ægformet-lancetformede, spidse, paa begge Flader graa-grønne, paa Overfladen duunhaarede, paa Underfladen filtede, svagt bølget-saugtakke; Axelbladene nyreformede; Raklerne siddende, valseformede (de øvre Blomster i ♂ Raklen udspringe først); Kapselen hvidfiltet, langstillet, Stilken 4 Gange længere end Kirtelen; Arrets Flige ægformede, tokløvede.

4—5. En Misdannelse med androgyne Rakler forekommer af og til. Bladene i Form meget foranderlige: β , *aquatica* (Sm.), H. 992; Rehb. l. c. fig. 1223, har omvendt-ægformede, kort tilspidsede Blade, næsten af samme Form som Bladene hos *S. aurita*. En Var. *lejocarpa*, med glatte Kapsler, er funden i Lundehuusmosen (19).

I Moser og fugtige Kratskove, meget alm.

Ann. I Selskab med *S. cinerea* og *hastata* samlede jeg 1858 paa flere Steder i det nordlige Jyll. (f. Ex. Broust, Fjerritslev) en

Form, som synes at være frembragt ved Krydsning mellem de 2 nævnte Arter (*S. cinereo-hastata*). Bladene ere ovale eller bredt-elliptiske, budte eller med en meget kort Spids, saugtakke, paa Overfladen svagthaarede, paa Underfladen (især i ung Tilstand) graafiltede, rynkede; Axelbladene store, hjerteformede, svagt saugtakke. Da Blomster og Frugter manglede, er jeg dog endnu i Tvivl om dens rette Plads, og maa anbefale den til nærmere Undersøgelse i Blomstrings-tiden.

1288. *S. caprea* L. (Vidie-P.) H. 993; Fr. l. c. p. 54; Drej. n. 966; F. D. 245? (slet) og 2603; Rchb. l. c. fig. 1224.

De ældre Grene og *Knopskjællene* glatte; *Bladene* bredt elliptiske, ovale eller ægformede, spidse, svagt rundtakke, i yngre Tilstand paa begge Flader graafiltede, ældre paa Overfladen glatte og grønne; *Axelbladene* nyreformede; *Raklerne* tykke, ovale eller æg-valseformede (de nedre ♂ Blomster udspringe først); *Kapselen* hvidfiltet, langstilket, Stilken 4—5 Gange længere end Kirtelen; *Arrets* Flige tokløvede.

Bladene var. betydeligt i Form (fra elliptiske til næsten hjerteformede eller kredsrunder), Randen snart heel, snart rundtakket. Forekommer undertiden med tydeligt stilkede ♀ Rakler paa en bladet Stilk. 4— $\frac{5}{1}$.

I Moser og Skove alm. udbredt. Som høit Skovtræ forekommer den hyppigst paa Bornholm.

1289. *S. aurita* L. (Øret P.) H. 989; Fr. l. c. p. 55; Drej. n. 964; F. D. 2600; Rchb. l. c. fig. 1220; H. N. VII, 60.

Knopskjællene glatte; *Bladene* omvendt-ægformede, spidse eller budte med en kort, tilbagebøiet Spids, tandet-rundtakke, nætformig-aarede og rynkede, paa Overfladen duunhaarede, paa Underfladen blaagraa-filtede; *Axelbladene* halvt-nyreformede; *Raklerne* ovale (de nedre ♂ Blomster udspringe først); ♀ Raklerne kortstilkede, med bladet Stilk; *Kapselen* hvidfiltet, stilket, Stilken 2—3 Gange længere end Kirtelen; *Arrets* Flige ud-randede eller tokløvede.

Lavere af Væxt end de foreg., med spædere Grene og alm. mindre Blade, som var. i Formen (men altid med størst Brede ovenfor Midten).

Rakleskjællene i Spidsen rødbrune, hos de 2 foreg. Arter sortbrune. 4—5 (lidet senere end foreg.).

β , *fimbriata*! Bladene dybt og spidst fryndset-tandede, med uligestore, bølgede og i Randen tilbagebøiede Tænder.

I fugtige Enge og Moser, sumpige Skove alm. β , ved Udkanten af Danstrup Hegn nærved Landlyst pr. Fredensborg!

bb. Virescentes (Grønvidier). Buskagtige, med idetmindste de ældre Blade glatte; Griffelen forlænget. (De øvre Blomster i ♂ Raklen udspringe først).

1290. *S. hastata* L. (Spydbladet P.) H. 982; Fr. l. c. p. 48; Drej. n. 967; F. D. 1238; Rchb. l. c. fig. 1213; H. N. III, 53.

De unge Grene hvidfildede; *Bladene* elliptiske, ægformede eller æg-hjerteformede, fint saugtakkede, glatte, paa Underfladen blaagraae og fint aarede; *Axelbladene* store, halvt hjerteformede, saugtakkede; *Raklerne* stilkede med bladet Stilk, udvikles samtidigt med Bladene *); *Rakleskjællene* kruset-uldhaarede; *Kapselen* glat, stilket, Stilken omtrent dobbelt saa lang som Kirtelen; *Arrets* Flige tokløvede, »rettede for- og bagtil (∩: lodret paa Axen)«.

Bladene forandre ikke deres Farve ved Tørring. Herved, samt ved de store Axelblade og fra Begyndelsen stilkede Rakler let kjendelig fra følg.

I Moser, især paa Hedegrund, paa *Halvøen* hist og her, men ikke alm.: *J.* Hanherrederne, Thy (Dr.), Vendsyssel alm.! Nykjøbing p. M. (28), lille Vildmose! Eveldrup (Dr.), Østrup Krat ved Randers (7), Aarslev (H.), Urup, Lundum, Hansted (2), Skjern! paa *Øerne* sjeldnere: *Sj.* Tibirke Mose mod Arresø! Himmeløv ved Roeskilde (8), Langholmsmosen ved Dronninggaard (H.), Leersøen (19).

*) Denne Art afviger ved stilkede Rakler og samtidig Udvikling af Blade og Blomster fra de øvrige Arter i samme Afdeling (c), men kan paa Grund af naturligt Slægtskab ikke adskilles fra denne. En kunstig Gruppering af Pilearterne er paa Grund af de foranderlige Forhold hos mange Arter neppe mulig. Jeg har derfor i det Væsenlige fulgt den ypperlige naturlige Anordning, som er givet af Fries.

1291. **S. nigricans** [Sm. Trans. Linn. soc. 6, 120] (Sortagtig P.) H. 981; Fr. l. c. p. 52; F. D. 2553; Rchb. l. c. fig. 1217; H. N. V, 62 og VIII, 62; *S. phylicæfolia* β , L., F. D. 1053.

Høi Busk; *de yngre Grene* rød- eller sortagtige med hvidgraa-duunhaaret Beklædning; *Bladene* omvendt-ægformet-elliptiske eller smalt ægformede, saugtakke, paa Underfladen blaa-graae, under Lupen fint hvidpunkterede, med silkehaaret Midtnerve, forøvrigt alm. glatte; *Axelbladene* halvt hjerteformede med ret Spids, kirtlet-saugtakke; *Raklerne* udvikles førend eller samtidigt med *Bladene*; ♂ *Raklerne* siddende, ♀ først kort, tilsidst tydeligt stilkede, *Rakleskjællene* langhaarede; *Kapselen* langt tilspidset, stilket, med en Stilk 3—4 Gange længere end Kirtelen; *Arrets* Flige tokløvede eller udrandede, »rettede tilhøire og venstre (σ : parallelt med Axen)«.

Bladene var. betydeligt i Formen (fra ægformede til lancetformede, i frisk Tilstand grønne, tørrede blive de sorte og meddele Papiret, hvori de opbevares, en sort Farve. ♀ *Raklerne* var. fra forlænget valseformede til oval-kugleformede; *Kapslerne* snart glatte (*lejocarpa*), snart mere eller mindre filthaarede (*eriocarpa* Koch). *Knuopskjællene* har jeg alm. fundet haarede hos ♀, ofte glatte hos ♂. 4—5. $\frac{1}{2}$.

I fugtige Enge, sjelden i Danmark: Vildvoxende har jeg fundet den i Flommen ved Sorø (♀), plantet ved Gjærder mellem Falkoner-Allen og gamle Kongevei udenfor Kbhvn (♂). I Leersøens udtørrede Bassin findes begge Kjon (19).

cc. *Argentea* (Sølvidier). Lave Buskræxter med (oftest) underjordisk Stamme, almindelig silkehaarede Blade; Griffelen kort, »*Arrets* Flige rettede for- og bagtil, σ : lodret paa Axen«.

1292. **S. ambigua** [Ehrh. Beitr. VI, p. 103] (Lav P.) Koch Syn. II, 753; F. D. 2670; Rchb. l. c. fig. 1243 b.; *S. incubacea* (L.?) Fr. mant. 1 p. 66; *S. plicata* Fr. fl. Hall. p. 148; H. N. XI, 64; Lge. Haandb. 1 Udg. n. 1235; *S. aurito-repens* Wimm.

Stængelen lav, buskagtig; *Bladene* omvendt ægformet-elliptiske, spidse med tilbagebøjet Spidse, i Randen tilbagerullede,

fjernt tandede eller heelrandede, paa Overfladen nedtrykt, paa Underfladen fiint og ophøiet-aarede, silkehaarede; *Axelbladene* halvt ægformede; *de frugt bærende* ♀ *Rakler* kortstilkede med bladet Stilk; *Kapselen* silkehaaret, stilket, Stilken 2—3 Gange længere end Kirtelen; *Arrets* Flige næsten siddende, udrandede.

Var. i Bladenes Form og Beklædning (paa Overfladen duunhaarede eller glatte, paa Underfladen alm. silkehaarede). Forekommer under 2 Former: den ene (*S. spathulata* Willd. efter Wimm.) høiere (med kortere og bredere Blade, nærmer sig mere *S. aurita*, den anden (*S. ambigua* Ehrh., W.) med smalere Blade og lavere Stængel, staaer nærmere *S. repens*. 4—5.

I Moser og fugtige Skove: *Sj.* Pedersborg ved Sorø! Hornbæks Plantage, Hamtermølleskoven og Lappen ved Helsingør (Heiberg), Hareskoven mellem Kulhusene og Frederiksdal! Leersøen (19).

Ann. Denne Art danner et Mellemed mellem *S. aurita* og *repens*, og ligner denne i Udseende, hiin i de fleste Characterer, hvorfor den af Wimmer ansees for en Bastardform af disse 2 Arter. Navnet *S. incubacea* L., som af Fr. har været overført paa denne, er meget omtvistet af Forff., og jeg har derfor foretrukket at betegne denne Art ved det Ehrhartske Navn. Hartm. søger *S. incubacea* L. i *S. repens*; Smith (efter Linn. Herb.) i *S. angustifolia*; *S. incubacea* Hornem. p. 991 er utvivlsomt en Form af *S. repens*.

1293. ***S. repens* L.** (Krybende P.) H. 990 og *S. incubacea* 991; Fr. l. c. p. 65; Drej. n. 968; F. D. 2489; Rchb. l. c. fig. 1239; H. N. VI, 55; L. Herb. IX, 165.

Stængelen krybende med udstrakte eller oprette *Grene*; *Bladene* fra lancetformede til kredsrunde, heelrandede med tilbagebøiet Rand og Spidse; *Axelbladene* lancetformede (eller 0); *Raklerne* valseformet-ovale, under Blomstringen siddende, efter samme kortstilkede, med bladet Stilk, udvikles før *Bladene*; *Kapselen* glat eller haaret, med en Stilk 2—3 Gange længere end Kirtelen; *Griffelen* meget kort; *Arrets* Flige tokløvede.

4—5. En yderst foranderlig Plante i Henseende til Bladenes Form og Beklædning, Raklernes Form, Kapselens Beklædning o. s. v. Blandt de talrigste Former nævnes som de vigtigste:

β, *fusca* Sm., Rchb. l. c. fig. 1240; *S. fusca* L. (part.) Grenene ofte forlængede; *Bladene* elliptiske eller ovale; *Kapselen* filtet.

γ, *argentea* (Sm.); F. D. 2605; Rchb. l. c. 1243; *S. are-*

naria L.; *S. fusca* H. 991; Bladene ovale eller kredsrunde, paa begge Flader (eller idetmindste paa Underfladen) tæt og tiltrykt silkehaarede, sølvglindsende; Kapselen filtet.

♂, *lejocarpa* Koch; Rchb. l. c. fig. 1241. Bladene glatte eller paa Underfladen silkehaarede; Kapselen glat.

I Tørvmoser og Enge, paa fugtig Hede- og Sandgrund, alm. Af β, har jeg fundet en udmærket Form i Jägersborg Allee mellem Ordrup og Charlottenlund (svarende til Fig. 1240 hos Rchb. og foruden de anførte Kjendetegn mærkelig ved tilsidst langstilkede Rakler); γ, i Klitter, f. Ex. *J.* alm. i Klitterne ved Vesterhavet; *Sj.* ved Tiisvilde: o. fl. St. i Nordsjæll. (19); *Bornh.* alm.! ♂, med Hovedarten, f. Ex. *Sj.* Lappen ved Helsingør (Heiberg), Heder mellem Flaskekroen og Kjøge! Lundehuusmosen! *F.* Skaarup (19).

1294. *S. rosmarinifolia* L. (Rosmarinbladet P.) H. 991; Fr. l. c. p. 64; Drej. n. 969; F. D. 2556; Rchb. l. c. fig. 1242; H. N. VI, 56.

Stængelen krybende, med langstrakte, oprette *Grene*; *Bladene* linieformede eller linie-lancetformede, flade, med ret Spidse, *Raklerne* ægformet-rundagtige, forøvrigt som foreg. 5.

I Moser, meget sjeldnere end foreg.: *Sj.* Lyngby Mose (28)! Lundehuusmosen! Leersøen (19), Ordrups Mose mod Ermelund!

* 1295. *S. angustifolia* [Wulf. i Jacq. Coll. 3, p. 48] (Smalbladet P.) Fr. l. c. p. 65; F. D. 2557; Rchb. l. c. fig. 1238; H. N. II, 60; V, 65; *S. repenti-viminalis* Wimm. Schles. Fl. p. 483.

Høi Busk med overjordisk *Stamme* og opstigende *Grene*; *Bladene* stivt oprette, langstrakt-linie-lancetformede; *Axelbladene* lancetformede; *Raklerne* ovale, tilsidst kort valseformede; *Kapselens* Stilk kortere (lidet længere end Kirtelen); *Griffelen* længere; forøvrigt som foreg.

I Henseende til Bladene ligner den *S. viminalis*, i Characterer staaer den forøvrigt meget nær *S. rosmarinifolia*. Planten er mig for lidet bekjendt til at jeg tør have nogen Mening om, hvorvidt den, som Wimmer antager, er en Bastardform af *S. viminalis* og repens, en Formodning, som dens overalt sjeldne Forekomst maaskee dog kunde bestyrke. Koch (Syn. II, 755) bemærker om denne og de 2 foreg. Arter: „ægre hæ species describuntur, quæ vivæ non difficile distinguuntur“. $\frac{4}{2}-\frac{5}{1}$.

Ved Veien i Frederiksborg store Dyrehave (9), Leersøen (19)! Andre Voxsteder i Danmark ere mig ikke bekendte. ³

† ? 1296. **S. Doniana** [Sm. Engl. Fl. IV, p. 213] Engl. Bot. Suppl. 2599; *S. purpureo-repens* Wimm.

»Lav Busk (3—6') med overjordisk *Stamme* og oprette *Grene*; *Bladene* lancetformede eller omvendt-ægformet-lancetformede med ret Spidse, fjernt saugtaktede, paa Overfladen glindsende, paa Underfladen silkehaarede; *Axelbladene* linieformede; *Raklerne* siddende, tilsidst kortstilkede; ♂ *Støvtraadene* sammenvoxne; ♀ *Kapselen* filtet, dens Stilk næsten dobbelt saa lang som Kirtelen; *Griffelen* kortere end Arrets udrandede, korte Flige.«

Fra *S. purpurea*, som den meget ligner, adskilles den (foruden de angivne Kjendetegn) ved efter Bestøvningen bruungule (ikke sorte) Støvkuapper. Den er mig kun bekjendt af Beskrivelse og Afbildn. i E. B.

Funden ved Slesvig (Jessen, cf. Sond. Fl. hamb. p. 534).

II. (III) Triandria.

2. Empetrum. Krækling.

1297. **E. nigrum** L. (Revlingbær). H. 996; Drej. n. 970; F. D. 975; Rehb. l. c. V, fig. 4810.

Stænglerne fremliggende; *Bladene* krandsstillede eller tæt spiralstillede (³/₈), smalt oval-linieformede, budte, læderagtige, mørkgrønne med lysere Midtnerve paa Underfladen; *Arret* ni-straale; *Frøene* 6—9.

Lynglignende Halvbusk med næsten naaleformede Blade. Kronen mørkrød, Bærrene sorte. 5. h.

I Tørvmoser og paa Lyngheder: paa Halvøen meget alm. i Hedeegnene, sjældnere i de frugtbare Egne mod O. og paa Øerne: **F.** Hals ved Hofmansgave (H.); **Sj.** Aamosen (15), omkring Nykjøbing i Ods herred og i det nordøstl. alm.! Lyngby Mose! Kjøge (9), Holmegaardsmosen! **Loll.** Stokkemarke, Karleby ved Nysted (19); **Falst.** Horreby Lyng (H.), Lidstrup Lyng (Koch); **Bornh.** ikke sjelden i Høilyngen!

III. (IV) Tetrandria.

3. Hippophaë. Tidse.

1298. *H. rhamnoides* L. (Sand-T.) H. 999: Drej. n. 972; F. D. 265; Rchb. l. c. XI, fig. 1165.

Bladene lancet-linieformede, heelrandede, paa Underfladen sølvglindsende, paa begge Flader beklædte med hvidgraae, stjerneformede (Blomsterdækket med rustfarvede) *Skjæl*; ♂ *Blomsterne* i korte, alm. fireradede Ax ved Grunden af de unge 'Grene.

Busk med stærke Vedtorne. Bærrene gule. 5—6. *h*.

Strandklitter (paa Leer eller Kalk) og Sandklitter, i den nordl. og nordvestl. Deel af *Jyll.* alm., sjeldnere mod S. (Riis Skov ved Aarhus!) og paa Øerne! *F.* Vedelsborg (H.); *Sj.* Refsnæs (19), Lerchenborg, Stevns Klint (H.); *Møens* Klint i stor Mængde; *Falst.* mellem Korselitze og Grønsund (H.) og mellem Tromnæs og Bøtø (Koch); *Bornh.* (H.)

4. Viscum. Fugleliim.

1299. *V. album* L. (Misteltein). H. 997; Drej. n. 971; F. D. 1657.

Grenene trinde, leddede, gjentaget-gaffeldeelte; *Bladene* modsatte, lancetformet-tungeformede, budte, 3—5-nervede, heelrandede; *Blomsterne* 3—5 nøgleformigt samlede i Greenvinklerne.

Bladene stedsegrønne, læderagtige, Blomsterne guulgrønne, Bær hvide. 4—5. *h*.

Snyltende Busk paa Træstammer, især Æbletræer, ikke alm.: *Sj.* store Elmue ved Lindersvold (Mørch)! Petersværft (H.); *Loll.* Soesmark (5), Oureby (Rosenørn Lehn); *J.* Trelde Skov ved Fredericia (H.); *Sl.* Bockholt ved Arnæs (16), Husum paa Pæretræer (F. Müll.).

5. Myrica. Pors.

1300. *M. Gale* L. (Mose-P.) H. 998; Drej. n. 973; F. D. 327; Rchb. l. c. XI, fig. 1277.

Bladene lancetformede med størst Brede ovenfor Midten, fra Midten til Spidsen saugtakke; *Raklerne* ovale, siddende

tæt sammen i Spidsen af Grenene; *Rakleskjellene* bredt-ægformede med en kort Spids, brunn-hindeagtige.

Lav Busk. Blomsterne udvikles før Bladene. Vellugtende af en harpixagtig Saft, som udskilles i Form af Draaber fra Blade og Rakler. 4—5. ♀.

I Moser, især i Hedeegne: alm. i den vestlige og midterste Deel af *Halvøen*, sjældnere mod Ø. og paa Øerne: *F.* Sanderumgaard, Røminge (H.); *Sj.* Tiisvilde! Frederiksværk, Gilleleie, Nykjøbing (H.), Aamosen (15), mellem Munkebjergby og Eskildstrup Sø (Lund), Bromme ved Sorø (7), Særløse (20) og Skov-Hastrup ved Roeskilde (15), Holmegaardsmosen! *Falst.* Systofte (Koch); *Loll.* Søholt (H.), Alsø (5); *Bornh.* ved Snogebæk (Lotze), Dueodden (Hjorth).

IV. (V) Pentandria.

6. *Humulus.* Humle.

1301. *H. Lupulus* L. (Almindelig H.) H. 999; Drej. n. 974; F. D. 1239; Rchb. ic. fl. germ. XII, fig. 1326.

Stængelen slyngende, svagt kantet og paa Kanterne ru af hagekrummede Børster; *Bladene* modsatte, rue, haandlappede, med tilspidsede, saugtakke Lapper; *Axelbladene* ovale eller ægformede, hele eller i Spidsen tokløvede.

Blomsterne grønne. ♀ Raklerne (Humlekopper) vellugtende, af bitter Smag. 6—7. ♀.

I Skove og ved Gjærder, alm. ♀ Planten dyrkes.

Cannabis. Hamp.

† *C. sativa* L. (Almindelig H.) Rchb. l. c. XII, fig. 1325.

Bladene rue, haandsnitdeelte, med lancetformede, tilspidsede, saugtakke *Afsnit*.

♀ Planten større og mørkere end ♂. Blomsterne grønne. 7—8. ☉.

Dyrkes som Handelsplante.

7. Juniperus. Ene.

1302. **J. communis** L. (Almindelig E.) H. 1007; Drej. n. 975; F. D. 1119; Rchb. l. c. XI, fig. 1141.

Bladene krandsstillede ($\frac{1}{3}$), linie-sylformede, stikkende, paa Overfladen rendede; paa Underfladen kjølede; *Frugten* (Enebær) kugleformet, sortagtig, overtrukken med blaagraa Dug.

5—6 (Frugterne modnes først i det andet Aar). $\frac{1}{2}$.

Paa Lygheder og tørre Bakker: forekommer oftest buskagtig, men danner flere Steder i det midterste *Jyll.* Skove; hyppig i de magre Egne af Halvøen, i *Nordsjæll.*, paa *Møens* Klint og *Bornh.*, i de øvrige Egne sjelden, og mangler i de mere frugtbare og dyrkede Dele af Landet.

V. (VI) Hex-Polyandria.

8. Populus. Poppel.

a. *Leuce* Duby. Rakleskjællene randhaarede; 8 Støvdragere; Arrets Flige smale; de unge Grene (idet mindste hos unge Planter) filtede eller haarede.

† 1303. **P. alba** L. (Sølv-P.) H. 1001; Drej. n. 978; F. D. 2182; Rchb. ic. fl. germ. XI, fig. 1272; H. N. XIII, 69.

Bladene æg-hjerteformede, bugtet-tandede, paa de unge Grene hjerteformede eller ovale med hjerteformet Basis, 3—5-lappede, alle Bladene paa Underfladen og *Smaagrenene* sneehvidt filtede (med vedblivende Filt); ♀ *Rakleskjællene* lancetformede, saugtakke; *Arrene* todeelte; *Knopperne* filtede.

Høit Træ. 4—5. $\frac{1}{2}$.

Alm. plantet omkring beboede Steder, sjældnere i Skove og maa-skee ikke oprindeligt vildvoxende. $\frac{1}{3}$

† 1304. **P. canescens** [Sm.? Koch Syn. II, 759] (Graa P.) H. 1002; Drej. n. 979; F. D. 2183; P. hybrida M. Bieb., Rchb. l. c. fig. 1271.

Bladene rundagtigt-ægformede, alle bugtet-tandede, paa Underfladen tilligemed *Smaagrenene* og *Knopperne* hvidgraa-

filtede, tilsidst glatte; ♀ *Rakleskjællene* lancetformede, saugtakket-fligede; *Arrene* 2—3-deelte.

Høit Træ. 4—5. h.

Omkring Byer og beboede Steder med foreg. *

Ann. Forekommer stundom enbo (med ♂ og ♀ Rakler paa samme Træ), med androgyne Rakler eller med de nedre[†] Blomster i Raklerne ♀, (4—8 Støvdragere mellem Skaalen og Kapselen (Didr., Rostr.)).

1305. *P. tremula* L. (Bævre-Asp). H. 1002; Drej. n. 977; F. D. 2184; Rehb. l. c. fig. 1274.

Bladene ægformet-kredsrunde, tandet-rundtakkede, glatte; *Knopperne* klæbrige, glatte; *Grenene* glatte, hos det unge Træ eller paa Rodskuddene haarede; ♀ *Rakleskjællene* omvendt-ægformede, dybt haanddeelte; *Arrene* uregelm. 3—4-lappede.

Træ af Middelstørrelse. Bladstilken vender Kanten (den smaleste Side) mod Pladen hos alle Poppelarter; men da Stilken hos denne er fladere end hos de øvrige, bevæges Bladene let af Vinden, hvilken Egenskab den skylder sit Navn. 4—5. h.

* *villosa* (Lang) *P. canescens* (Sm.) Rehb. l. c. fig. 1273. Bladene paa begge Flader eller paa Underfladen tiltrykt-silkehaarede, tilsidst glatte; »*Arrene* firekløvede«.

I Skove og Krat, alm., ogsaa i Hedeegne, danner f. Ex. i Halvøens Hedestrækninger ofte Kratpartier (alene eller i Selskab med andre Træarter). * sjældnere, f. Ex. *Sj. Sorø Sønderskov!* Charlottenlund! *Falst.* Taaderup (14). (Rehb. anseer denne for en egen Art og henfører til den Navnet *P. canescens* Sm. Da jeg ikke tør antage det for afgjort, om det Kjendetegn, som hentes fra *Arrene*, er bestandigt eller ikke, da den hele øvrige Plante er aldeles lig *P. tremula*, og da navnlig Bladenes Behaaring er et ingenlunde paalideligt Mærke, maa jeg ansee den kun for en simpel Varietet)

b. *Aegiros* Duby. Rakleskjællene glatte, Støvdragerne 12—30; Arrets Flige kredsformet-nyreformede; alle Smaagrenene glatte.

† 1306. *P. monilifera* [Ait. Hort. Kew. ed. 1, 3, p. 407] (Kanadisk P.) Drej. p. 312.

Grenene udstaaende, de yngre kantet-furede; *Bladene* triangel-ægformede, kort tilspidsede, saugtakkede, de yngre i Randen svagt duunhaarede.

Høit Træ. 4—5. h. De unge Blade rødlig.

Plantas alm. omkring Byer og i fugtige Skove, oprindelig indført fra Nordamerika. ♀ Planten er her i Landet meget sjelden: 1 Træ ved Svanholm paa[†] gl. Kongevei (19).

† 1307. **P. nigra** L. (Sort P.) H. 1003; Drej. n. 976; Rchb. l. c. fig. 1275; H. N. XII, 64.

Grenene udstaaende, de yngre trinde; *Bladene* triangel-ægformede, langt tilspidsede, i Randen glatte, saugtakket-tandede.

Høit Træ. 4—5. h. Løvspringet 8—14 Dage tidligere end hos foreg., de yngre Blade frisk grønne.

Paa lignende Steder som foreg., men sjeldnere. Jeg har aldrig fundet den vildvoxende, men den er sandsynligviis indført fra Syd-Europa. (Den ældste og største Poppel i Danmark, ved Herlufsholm, er et Expl. af denne Art).

† 1308. **P. pyramidalis** [Rozier i Lam. dict. 5, 235] (Pyramide-P.) Drej. p. 312; P. dilatata Ait.

Grenene opret-tiltrykte; *Bladene* rudeformede, kort tilspidsede, i Randen glatte, saugtakkede, nedenfor Midten heelerandede.

Høit Træ. (Af nogle Forff. henført som Var. til foreg., men ved de mindre og mere rudeformede Blade og især ved dens rank-pyramideformede Væxt yderst forskjellig fra hiin). 4—5. h.

Plantas ofte omkring beboede Steder, oprindelig indført fra Orienten eller Sydeuropa.

† 1309. **P. balsamifera** L. (Balsam-P.) Duham. II, t. 50.

Bladene ægformede, tilspidsede, fiint og tiltrykt-saugtakkede, de yngre og især *Knopperne* stærkt klæbrige, vellugtende.

5. h.

Plantas som de foreg., ikke sjelden, indført fra Amerika.

9. **Mercurialis. Bingelurt.**

1310. **M. perennis** L. (Vedvarende B.) H. 1004; Drej. n. 980; F. D. 400; Rchb. l. c. V, fig. 4804.

Rodstokken krybende; *Stængelen* udeelt; *Bladene* ægformet-elliptiske, rundtakkete-saugtakkede, ruhaarede; ♀ *Blomsterne* langstilkede.

Planten faaer ved Tørring et mørkblaat eller violet Anstrøg. ♀ Planten mørkere end ♂. Blomsterne grønne. 4—5. 4.

I skyggefulde Løvskove, meget alm.

1311. **M. annua** L. (Enaarig B.) H. 1005; Drej. n. 981; F. D. 1890; Rchb. l. c. fig. 4801.

Stængelen opret, grenet med korsviis modsatte *Grene* ($\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$); *Bladene* ægformede eller ægformet-elliptiske, saugtaktede, glatte; ♀ *Blomsterne* kortstilkede eller siddende.

Planten lysere grøn end foreg. Blomsterne grønne. 7—8. ☉.

Ukrud i Haver, ikke alm.: *Sj.* Marienlyst ved Helsingør (Holbøll), Kongens Have ved Frederiksborg (A. Rafn), Kirsebærgangen ved Nørrevold (19), Universitetsgaarden (Heiberg), Rosenborg Have (Schum.); o. fl. St. omkring Kbhavn; *J.* Aalborg (H.); *Sl.* Husum (F. Müll.); *Bornh.* (H.).

10. **Stratiotes. Krebsklo.**

1312. **S. aloides** L. (Aloebladet K.) H. 1006; Drej. n. 983; F. D. 337; Rchb. l. c. VII, 111.

Bladene rosetteformigt samlede ved Roden, linie-sværdformede, kjølede, i Randen tornede; *Skaflet* fladtrykt, med 2 Blomsten omgivende *Hylsterblade* i Spidsen, forøvrigt bladløst.

Fra Rodstokken udgaae lange og talrige Rodtrævler samt Udløbere med en Knop i Spidsen, der tilsidst løsriver fra Moderplanten. Planten før og efter Blomstringen nedsænkt under Vandet. Kronbladene hvide. 7—8. ♀.

I Tørvmoser, Søer og Bække: hyppig paa *Halvoen*, især i Aaer og Marskgrofter mod V., sparsommere paa *Øerne* (i det sydlige Fyen og paa Smaaøerne mangler den. (Jeg har kun fundet ♀ Planter hos os, og maaskee forekommer ♂ Planten ikke i vor Flora. Sml. Nolte *Stratiotes* u. *Sagittaria* p. 31).

11. **Hydrocharis. Frøbid.**

1313. **H. Morsus ranæ** L. (Vand-F.) H. 1005; Drej. n. 982; F. D. 878; Rchb. l. c. VII, fig. 112.

Stængelen svømmende, med forlængede Ledstykker, fra Ledene udgaae Rodtrævler og langstilkede, kreds rundt-nyreformede, heelrandede *Blade*; ♂ *Blomsten* omgivet af 1—2 hylsterformede *Dækblade*.

Kronen hvid. Overvintrer ved Endeknopper fra Udløbere ligesom foreg. 7—8. ♀.

I Tørvgrave, Søer og Aaer, alm. overalt i Danmark.

VI. (VII) Monadelphia.

× 12. Taxus. Taxtræ.

× 1314. *T. baccata* L. (Almindelig T.) H. 1008; Rehb. l. c. XI, tab. 538; F. D. 1240.

Bladene toradede, kortstilkede, i Spidsen alm. krumbøiede, flade, spidse, stedsegrønne; *Frøkappen* høirød, meget saftfuld (hvorved Frøet faaer Lighed med en Steenfrugt).

Busk eller lavt Træ. Bladene mørkgrønne, blegere paa Underfladen. 4—5 (Frugten modnes i October). $\frac{1}{2}$.

Dyrkes stundom i Haver og Lystskove. Findes vildvoxende i alle Nabolandenes Bjergskove, men ikke i Danmark; om den tidligere har været vildvoxende her i Landet, er tvivlsomt (Kyll. angiver den at voxe »udi en Skov ved Fjelderup«).

23^{de} Klasse. Cryptogamia (Lønbo).

1. Orden. Filices (Brægner).

Sporehusene (Kapsler, som indeholde en Mængde smaae, frie Sporer) samlede i Frugthobe (sori) paa Bagsiden af det oftest 1—flere Gange finnetdeelte Løv eller hos nogle (ved Bladjødets Forsvinden) paa Bagsiden af den tilbageblivende Nerve og dennes Forgreninger. (Løvet i Knoptilstanden sneglehuusformig indrullet, udgaende fra en underjordisk Rodstok, og ofte, især ved Grunden, beklædt med hindeagtige Skjæl (Avner).

a. Kapslerne omgivne af en leddet Ring. Frugthobene paa Bagsiden af Løvet,

aa, omgivne af et hindeagtigt Skjæl (*Sloret, indusium*).

α , Frugthobene linieformede eller aflange.

1. *Asplenium* L. (part.) Frugthobene rette eller krummede, omgivne af et enkelt Slør, som er fasthæftet ved den ydre og aabner sig paa den indre Side*) (Løvet snitdeelt).

*) Brægnerne maa undersøges medens Frugterne endnu befinde sig paa et yngre Udviklingsstrin; i ældre Tilstand forstyrres ofte For-

† 2. **Scolopéndrium** Roth. Frugthobene rette, parallelle, i Retning med Løvets Sideaarer; 2 og 2 samlede og fra hver Side omgivne af et Slør, tilsidst sammenflydende. (Løvet heelrandet).

β, Frugthobene kredsrunde. (Løvet fjersnitdeelt).

3. **Aspidium** R. Br. Sløret kredsrundt, skjoldformet og befæstet i Midten af de rundagtige Frugthobe.

4. **Lastræa** Presl. Sløret nyreformet, forøvrigt som foreg.

5. **Cystopteris** Bernh. Sløret rundt eller ægformet, befæstet med Randen til de rundagtige Frugthobe, tidligt afældende.

bb. *Frugthobene omgivne af Løvets tilbagerullede Rand (et uægte Slør).*

α, de frugtbærende og golde Løv eensformede.

6. **Pteris** L. Frugthobene uafbrudt fortløbende langs Randen af det 2—3 Gange fjersnitdeelte Løvs secundære eller tertiære Afsnit.

β, de frugtbærende og golde Løv forskjelligformede.

7. **Blechnum** L. Løvet fjersnitdeelt med heelrandede Afsnit; Frugthobene i 2 parallelle Rækker langs Afsnittenes Midtnerve, bedækkede af de indbøiede Rande.

8. **Struthiopteris** Willd. Løvet fjersnitdeelt med halvfinnede Afsnit; Frugthobene bedække Afsnittenes grenede Sidenerver og tilsidst deres hele Underflade, (i Begyndelsen skjulte af Afsnittenes lige indtil Midtnerven tilbagerullede Bladsubstans, tilsidst frie, idet Randen udbredes og spaltes fjernormigt).

cc. *Frugthobene uden Slør.*

9. **Polypodium** L. (part.). De frugtbærende og golde Løv eensformede, fjersnitdeelte eller trekoblede; Frugthobene kredsrunde, spredte eller i regelmæssige Rækker.

holdet, idet deels Sløret falder af, deels Frugthobene sammenflyde og saaledes tabe deres oprindelige Form.

b. Kapslerne uden Ring, i enkelte eller grene
 Ax paa samme Stængel som (men af forskjelli
 Udseende fra) de golde Løv.

aa. Kapslerne nætformigt stribede, kortstilkede

10. **Osmúnda** L. (part.) Kapslerne kugleformede, to
 klappede, i grene Ax. (Det golde Løv dobbelt fje

bb. Kapslerne uden Striber, siddende.

11. **Botrychium** Sw. Kapslerne adskilte, i grene Ax.
 (Det golde Løv deelt).

12. **Ophioglossum** L. Kapslerne sammenhængende, i grene Ax.
 deres Sider, toradet ordnede til et ensidigt, enkelt Ax. (Det
 golde Løv heelrandet).

2. Orden. *Lycopodiaceæ* (Ulvefødder)

Bladene taglagte, skjæl- eller sylformede, Frugterne oprette
 Klapper, siddende enlige i Bladhjørnerne eller samlede i Ake
 omgivne af Dækblade forskellige fra Stængelbladene

13. **Lycopodium** L. (part.). Frugterne (Sporhusene) ene-
 artede, i Form af rundagtige eller nyreformede, toklappede,
 enrummede Kapsler med frie, støvlignende Sporer (Microsporer).

14. **Selaginella** Spring. 2 Slags Frugter: nogle enklappede
 foreg., andre 3—4-klappede med 3—4 større Sporer (Macro-
 sporer), som ere næsten kugleformede og forsynede med
 Spidsen sammenløbende Striber.

3. Orden. *Isoëtæ* (Brasenurter).

15. **Isoëtes** L. Sporehusene rundagtigt-ovale, indsatte
 af en uopspringende Hinde og indsænkede i de lineære
 Blades udvidede Basis; de i de indre Blades Skeder indeholdende
 Sporehuse indeholde et meget stort Antal mindre Sporer (Mi-
 crosporer), de i de ydre Bladskeder indsluttede et ringere
 Antal større, sphærisk-triangelformede (Macro-) Sporer.

4. Orden. *Rhizocarpeæ* (Rodfrugtæxter).

16. *Pilulária* L. Bladene linie-børsteformede, før Udviklingen sneglehuusformigt sammenrullede; Frugterne paa Rodstokken ved Bladenes Basis, kortstilkede, kugleformede, fire-rummede og i udviklet Tilstand fireklappet-opspringende, indeholdende talrige Sporehuse, hvoraf de nedre indslutte 1 større (Macrospore), de øvre mange smaae (Micro-) Sporer.

5. Orden. *Equisetaceæ* (Padderokker).

17. *Equisétum* L. Stængelen leddet, med en tandet Skede ovenfor hvert Led, udeelt eller med krandsstillede Grene; Sporehusene kredsformigt ordnede i Form af Lapper paa Underfladen af kortstilkede, skjoldformede Forgreninger af den fælles Frugtaxe, hvorved der dannes en endestillet, axformet Klase.

6. Orden. *Characeæ* (Krandsnaalvæxter).*)

Vandplanter med leddede Stængler, uden ægte Blade, men med større eller mindre, fra Ledene krandsformigt udgaaende Grene, hvilke enten forgrene sig paa samme Maade som Hovedaxen eller i Spidsen opløses i Straaler; to Slags Formeringsorganer, enten paa samme eller forskellige Planter (Enbo eller Tvebo): 1, kugleformede *Antheridier* af rød Farve, indeholdende Spiraltraade og 2, *Sporehuse* af oftest aflang Form, indeholdende 1 Spore og omgivne af 5 spiralformigt snoede Celler, hvis frie Ender i Sporehusets Spidse danne en tandet Krone.

18. *Nitella* Ag. Stænglernes Ledstykker encellede, jævne, i tørret Tilstand bindeagtige (kun undtagelsesviis incrusterede);

*) Uden at tage Hensyn til Spørgsmaalet om Characeernes Plads i Systemet, som har været meget omtvistet (de fleste Botanikere ere tilbøielige til at stille dem i Nærheden af Algerne), har jeg efter Opfordring fra forskellige Sider og tillige af Hensyn til at vi i den danske botaniske Litteratur savne saagodtsom al Veiledning til at bestemme de her forekommende Arter af en talrig og eien-dommelig Familie, fundet mig foranlediget til at forsøge en kort Fremstilling af denne og en Beskrivelse af de Arter, som efter hvad jeg har kunnet erfare, findes i Danmark. Jeg tør haabe, at den derved bevirkede Forøgelse af Haandbogens Omfang ikke vil blive misbilliget, hvis det maatte lykkes mig derved at lette

Grenene krandsstillede, i Spidsen straaaleformigt eller gaffelformigt deelte, uden Svøb eller Bracteer ved Grunden af Krandsgrenene eller Straalerne; Antheridierne (hos de enboe Arter) ovenfor Sporehusene i Straalernes eller Smaagrenenes Gaffeldelinger; Sporehusenes Krone opret, tidligt affaldende, dannet af en dobbelt Række Celler (2 i hver af de 5 Flige).

19. **Chara** Vaill. (Ag.). Stænglernes Ledstykker oftest dannede af en større central og flere mindre periphere Celler (og derved sribede), incrusterede, skjøre*) og uigjennem-

Studiet af en Plantefamilie, til hvis Undersøgelse der i Tørv-moser, Mergelgrave og ved vore Kyster findes rigeligt Materiale. Bestemmelsen af Arterne er ofte forbunden med Vanskelighed, idet den samme Art paa forskellige Alderstrin og paa forskellige Voxesteder antager meget forskellige Skikkelser, og i en kortfattat Beskrivelse at meddele nøiagtige Kjendetegn er derfor en vanskelig Opgave, som jeg ikke tør tiltroe mig at have løst overalt fyldestgjørende. Jeg havde hellere ønsket at oppebie den bebudede Monographi af Prof. A. Braun, og tillige at undersøge i den frie Natur de danske Characeer i længere Tid end jeg hidtil har været istand til, men jeg har paa den anden Side troet ikke at burde opsætte til en usikker Fremtid Meddelelsen af de Optegnelser jeg har indsamlet. Da Familien hidtil har været saalidet paaagtet hos os, anseer jeg det for utvivlsomt, at der i vor Flora vil findes adskillige Arter foruden de her nævnte. Ved Arternes Beskrivelse har jeg især benyttet *Wallmanns »J örsök till en system. uppställning af växtfamiljen Characeæ«* Stockh. 1853 samt de nyere Arbejder af *Wahlstedt*: (Skand. Arterne af Characeæ, Lund 1862) og *Nordstedt* (Skandinaviens Characeer, Bot. Not. 1863); og foruden *Hornemanns* o. fl. Herbarier, samt hvad der velvillig er mig meddeelt fra forskellige Egne af Landet, har jeg havt god Hjælp af en rig Samling Characeer, som Prof. A. Braun har havt den Godhed at meddele mig tilligemed sin Bestemmelse af flere her fundne tvivlsomme Arter.

*) Characeerne maa undersøges i frisk Tilstand eller opbevarede i Spiritus; tørrede ere de vanskelige at undersøge, fordi deres fine Dele sammentrykkes og Frugterne let affalde og tillige fordi de tildeels ere meget skjøre, især de Arter som ere overtrukne (incrusterede) af et tykt Lag kulsuur Kalk, der kun ved chemisk Behandling kan fjernes. (De fleste Arter have i levende Tilstand en stærk og meget ubehagelig Lugt).

sigtige (sjældnere encellede, gjennemsigtig-hindeagtige uden Incrustation); Grenene krandsstillede, med 1—2 Rækker naaleformede Celler (Svøb) ved Grunden, deres Axe gjentagne Gange leddet, med krands- eller halvkrandsstillede Forgreninger (»Bracteer«) udgaaende fra Ledene; Antheridierne (hos de enboe) udenfor Bracteerne, nedenfor eller ved Siden af Sporehusene, som i Spidsen bære en vedblivende, af 5 enkelte Celler dannet, ofte stjerneformigt udbredt Krone.

I. Filices.

1. Asplenium. Radeløv.

a. *Athyrium* Roth. Frugthobene aflange, bøiede (Løvet dobbelt fjersnitdeelt, dets Afsnit tiltage i Størrelse mod Midten).

1315. *A. Filix foemina* [Bernh. i Schrad. n. Journ. V, p. 2] (Mangefinnet R.) *Polypodium* L.; *Aspidium* Sw., H. II, 360; *Athyrium* Roth, Drej. n. 991; F. D. 2436.

Løvet i Omrids elliptisk; *Afsnittene* lancetformede, tilspidsede; *de secundære Afsnit* halvfinnede eller fjersnitdeelte med i Spidsen tandede Flige; *Støret* fryndset, med Tilhæftningspunktet mod Randen af de secundære Afsnit; *Frugthobene* talrige, tilsidst rundagtige.

1—2' høj. Løvets Skaft kantet, nedentil beklædt med Avner. Var. betydeligt i Henseende til Størrelse, Løvets Indskjæring o. s. v. 7—9. 4.

I Skove og ved Steengjærder, alm. Danmark.

b. *Asplenium* s. s. Frugthobene linieformede, rette.

aa. Løvet fjersnitdeelt, med rundtakke Afsnit, de midterste størst.

1316. *A. Trichomanes* L. (Rundfinnet R.) H. II, 363; Drej. n. 987; F. D. 119.

Løvet i Omrids linie-lancetformet; *Afsnittene* skjævt ægformet-ovale, budte; *Skafterne* glatte, i ældre Tilstand sort-bruunt-glindsende, paa Overfladen rendede med smal hindeagtig Rand.

4—6" høi. (En af vore mindste, men smukkeste Brægner).
6—10. 4.

I Klipperidser og mellem Stenene i Steengjærder, sporadisk og ikke alm.: *Bornh.* hist og her i Granit-Terrainet! *Sj.* Ravnsholms Hegn (13), Hillerød Skandsebakke (Knæckenborg), Birkerød (H.), Kirkeværløse, Farum (14), mellem Nærum og Søllerød (Petersen), Rudersdal! Hareskoven, Fuglevad Mølle (H.), Lundtofte (24), Ermelundsskoven mod Lyngby (Dr.), Sonnerupgaard (H.), Grydebjerg ved Sorø! Langebæk ved Kallehave (Rosenørn-Lehn); *Falst.* Ourupgaard (Koch), Idestrup (Krebs); *F.* Svindinge! Ørbæklunde! Hundstrup! *J.* Fredrikshavn (H.), Torslev i Vendsyssel (Branth), Bæklund ved Viborg (Morville), Hald Bøgeskov (Strandgaard); *Sl.* Sundeved (H.), Dybbølsbjerg (16); *Als* ved Adserballig (10).

bb. Løvet dobbelt fjersnitdeelt, Afsnittene tiltage i Størrelse nedadtil.

1317. *A. Adiantum nigrum* L. (Sort R.) H. II, 365;
F. D. 250; H. N. X, 98.

Løvet glindsende grønt, i Omrids smalt og tilspidset-triangel-ægformet, dobbelt- (i Spidsen enkelt, ved Grunden ofte tredobbelt) fjersnitdeelt; *de secundære Afsnit* rudeformet-elliptiske, ved Grunden heelrandede, i Spidsen saugtakke; *Sløret* heelrandet.

6—10" høi. Løvskafterne nedentil glindsende mørkbrune. 6—9. 4.

I Ridser af Granitklipperne paa *Bornholm* hist og her: Hammershuus, Kleven (20)! Nørre Borgdal (8), Rø! Gudhjem (H.), Svanike (11).

1318. *A. Ruta muraria* L. (Muurrude). H. II, 365;
Drej. n. 989; F. D. 190; H. N. XIV, 97.

Løvet mat grønt, i Omrids bredt og budt triangel-ægformet; *de secundære Afsnit* omvendt-ægformede, med kileformet, heelrandet Basis, i Spidsen lappet-rundtakke eller næsten heelrandede; *Sløret fryndset*.

2—4" høi. (Smaa Expl. ere alm. kun enkelt fjersnitdeelte). Løvskafterne grønne, sparsomt beklædte med Avner. 6—9. 4.

I Klipperidser og Steengjærder, sjelden: *Bornh.* i Almindingen (F. D., Rafn); *Sj.* Kronborg Mure (21); *J.* Viborg Domkirke (Morville);

Als paa Sønderborg Slotsmuur (20)! *Sl.* Beftoft og Nustrup Kirkemure (Kyll.), Nieblum Kirke paa *Føhr* (20)!

cc. *Løvet* fingerformigt-gaffeldeelt med lancet-linieformede *Afsnit*.

1319. *A. septemtrionale* [Sw. Synops. filic. 75] (Nordisk R.) H. II, 364; Drej. n. 988; *Acrostichum* L., F. D. 60.

Løvet langskaftet, ovenfor Midten 1—2 Gange uregelmæssig gaffeldeelt; *Afsnittene* foroven spidst og dybt 2—3-fligede, heelt bedækkede af *Frugthobene*.

4—6" høi. Løvskafterne tilsidst ved Grunden mørkbrune. 6—10. 4.

Paa lignende Steder som foreg., sjelden: *Bornh.* i Graniterrainet hist og her (f. Ex. Bobbeaen, Lehnsgaard, Nørre Borgdal (8), Gudhjem (11), Kleven (20); *Sj.* Pæleveien i Gribs Skov! Rudehegn mod Dumpedals Mølle! Farumgaard (Mørch); Jonstrup Vang (14), Fuglevad Mølle (Schum.); *J.* Frederikshavn (H.), Torslev og Hørby Kirkemure i Vendsyssel (Lgby).

2. *Scolopendrium*. Miltbrægne.

1320. *S. officinarum* [Sw. Syn. fil. 89] (Hjortetunge). H. II, 366; Drej. n. 990; H. N. X, 99; *Asplenium Scolopendrium* L.

Løvet lancet-tungeformet, spidst, med hjerteformet Basis, heelrandet eller bølget, længere end Skaftet; de 2 samlede *Frugthobe* sammenflyde tilsidst til een. ,

Løvskafterne og Midtnerven beklædte med Avner. De unge Løv hjerteformede. 7—8. 4.

Angives fra Dronninggaard af Kyll., men er siden hans Tid ikke funden der. I Skoven paa den sydlige Skraaning af Aborreberget (Møen) har Hr. Exam. polyt. Hamann fundet et Par Exemplarer. *

3. *Aspidium*. Skjoldbrægne.

1321. *A. angulare* [Kit. i Willd. Sp. V, 257] (Tornfliget S.) F. D. 2559; H. N. XIII, 96; *Polystichum* Presl.; *Aspidium aculeatum* Sw. (*Polypodium* L.); *Aspid. aculeatum* β , *Swartzianum* Koch Syn.

Løvskaftet og *Løvet*s *Midtnerve* tæt beklædte med brune, ægformede, tilspidsede Avner, *Løvet* dobbelt fjersnitdeelt, ligesom de *primære Afsnit* i Omrids lancetformet, tilspidset, de

secundære Afsnit skjævt ægformet-rudeformede eller halvt spydformede (med en øreformet Flig ved Grunden af den fra Løvets Axe bortvendte Side), braadspidset-tandede, det nederste i den øvre Rad af hvert Hovedafsnit størst.

De unge Løv paa Underfladen beklædte af finere Avner. (Ved den tætte Beklædning og Smaaafsnittenens Form let kjendelig fra vore andre Brægnearter). 7—8. 4.

Paa Græsholmen ved Christiansø (Didrichsen 1849)! *Bornh.* Steilebjerg ved Hammerhuus (Zahrtmann); *Sj.* Frederiksdals Skov (Kjærskou)!

Anm. Den i Sydeuropa almindelige *A. lobatum* Sw. (*Polypodium* Huds.); *A. aculeatum* a, vulgare Doell., som er forskjellig fra den her forekommende Form ved smalere og stivere Løv med mindre dybt deelte Afsnit, hvis secundære Afsnit (med Undtagelse af det nedre Par) mangle den øreformede Flig ved Grunden, forenes af de fleste nyere Forfattere, vistnok med Rette, med *A. angulare* Kit., og for begge disse Former vil i saa Fald Fællesnavnet *A. aculeatum* (L.) Doell. rettest blive at anvende.

4. *Lastræa*. Mangeløv.

1322. *L. Thelypteris* [Presl *Pteridogr.* p. 76] (Kjær-M.) *Polypodium* L., F. D. 760; *Aspidium* Sw., H. II, 358; Drej. n. 998; *Polystichum* Roth, Koch Syn. II, 977.

Rodstokken vandret-krybende; *Løvet* fjersnitdeelt (de 1—2 nedre Par Afsnit mindre end de øvrige), med linie-lancetformede, nærmest Axen fjersnitdeelte, mod Spidsen halvfinnede *Afsnit* og budte, heelerandede eller rundbugtede (paa de frugt bærende Løv i Randen tilbagerullede og derved tilsyneladende spidse) *Flige*; *Frugthobene* i Forgreningerne af Fligenes todeelte Sideaarer, danne 2 parallelle, tilsidst sammenflydende Rækker midt imellem Fligenes Rand og Midtnerve.

1—1½' høi, Skaftet meget skjørt, glat; Løvet mat-blaagrønt, med faae og korte, kun under Lupen synlige Haar paa Underfladen, forøvrigt glat. (Frugtbærende Expl. ere temmelig sjeldne). 7—8. 4.

I Moser og fugtige Enge alm. udbredt.

1323. *L. Oreopteris* [Presl l. c.] (Bjerg-M.) *Polypodium* Ehrh., F. D. 1121; *Aspidium* Sw., H. II, 359; Drej. n. 997.

Rodstokken tueformigt sammentrængt; *Løvet* fjersnitdeelt; *Afsnittene* jævnt aftagende i Størrelse fra Midten imod begge

Ender, linie-lancetformede, tilspidsede (de nedre korte, triangelformede), halvfinnede med budte, heelrandede eller rundbugtede, i Randen plane eller kun lidet tilbagerullede *Flige*; *Frugthobene* i 2 Rækker tæt indenfor Randen af Fligene og naaende næsten til Spidsen af disse; *Sløret* tidligt affaldende.

2—3' høi. Skaftet sparsomt beklædt med Avner, Løvet's Underflade med spredte, kun under Lupen synlige Kirtler. 7—8. 7.

Ved Steengjærder og i høitliggende Skove, sporadisk og sjelden: *J.* Frysensborg Skov (Dr.), Skove S. for Veile-Fjord (12)! *Sl.* Huusby (28), Flensborg (1); *Sj.* Fredensborg (Herb. H. Hafn.), Skandsebakken ved Hillerød (Knæckenborg), Birkerød (H.), Gjærder mellem Nærum og Søllerød! Hvide Overdrev ved Særløse pr. Roeskilde (15), Sparresholm (Lund); *Bornh.* Hammershuus (8), Almindingen (20).

1324. *L. Filix mas* [Presl l. c.] Almindelig M.) *Polypodium* L.; *Aspidium* Sw., H. II, 360; Drej. n. 995.

Rodstokken tyk, tueformet, næsten lodret; *Løvet* fjersnitdeelt; *Afsnittene* lidet aftagende i Størrelse nedenfor Midten, lancetformede, fjersnitdeelte (i Spidsen halvfinnede), med afrundede eller afstumpede, rundtakkede, i Randen ikke tilbagebøiede *Flige*; *Fligenes Sidehæver* svage, gaffeldeelte; *Frugthobene* i 2 Rækker fra Grunden til Midten af Fligene, nærved disses Midtnerve; *Sløret* vedblivende.

2—4' høi. Løvene kredsformigt samlede i Spidsen af Rodstokken, glatte eller beklædte med faa Avner paa Underfladen, Skaftet mere eller mindre tæt beklædt med bruunt-hindeagtige Avner. 6—8. 7.

β, erosa Doell (*Aspid. erosum* Schk. crypt. IV, t. 45). *Afsnittene* og deres *Flige* fjernere fra hianden, Fligene uregelmæssigt og dobbelt saugtakkede eller fjerlappede, med saugtakkede Lapper.

γ, lepidota Lge. Løvskaftet indtil Spidsen og Nerverne paa Løvet's Underflade tæt beklædte med Avner.

I Skove og ved Steengjærder meget alm. — *β*, ved Kjølstup i *Fyen* (18)! *J.* Gudumlund pr. Aalborg! *Bornh.* i Almindingen (Baagø)! *Sl.* Morgenstern ved Husum (Didr.)!

1325. *L. cristata* [Presl l. c. p. 77] (Budtfinnet M.) *Polypodium* L., *Aspidium* Sw., H. II, 359; Drej. n. 996; F. D. 1591; H. N. IX, 98.

Rodstokken sammentrængt; *Løvet* fjersnitdeelt, i Omrids smalt (lancetformet eller linie-lancetformet); *Afsnittene* kun lidet aftagende i Størrelse fra Midten, triangel-ægformede, fjersnitdeelte (i Spidsen og hos de ufrugtbare Løv halvfinnede), med afrundede, braadspidset-saugtakkede, i Randen ikke tilbagebøiede *Flige*; *Fligenes Sidenerver* tydelige, fleerdeelte; *Frugthobene* i 2 Rækker fra Grunden til Spidsen af Fligene; *Sløret* vedblivende.

1½—2' høi. Skaftet paa det frugtbare Løv temmelig langt, beklædt med spredte Avner. 6—7. 4.

Paa Tuer og mellem Krat i Tørv- og Hedemoser, sporadisk og ikke alm.

1326. **L. spinulosa** [Presl l. c. excl. *] (Skarpfinnet M.) Polypodium Müll. fl. Fredriksd., F. D. 707; Aspidium Sw., H. II, 361; Drej. n. 994; H. N. XIII, 97.

Rodstokken sammentrængt; *Løvet* i Omrids æg-lancetformet, dobbelt fjersnitdeelt, *det nedre Par Afsnit* kortere end de øvrige; *de secundære Afsnit* ægformet-elliptiske, spidse, fra Grunden braadspidset-saugtakkede med indbøiede Takker (eller halvfinnede med braadspidset-saugtakkede Flige); *Frugthobene* (mindre end hos foreg.), i 2 Rækker fra Grunden til henimod Spidsen af de secundære Afsnit.

1—3' høi, mørkgrøn. 7—9. 4. Løvskafte i forskjellig Grad beklædt med hindeagtige Avner, var. desuden i Henseende til Indskjæringens Grad, Afsnittenes og Fligenes Form o. s. v. Flere Former ere opstillede som egne Arter, blandt disse:

* *dilatata* (Presl) Aspidium dilatatum Sw., H. II, 362; F. D. 759 (Polypod. Dryopteris, ikke god) og 1346 (Aspidium Filix mas). *Løvet* mørkere grønt, større end hos Hovedarten, triangel-ægformet (det nedre Par Afsnit af Længde med eller længere end de øvrige), tredobbelt fjersnitdeelt med saugtaket-halvfinnede eller dobbelt fjersnitdeelt med halvfinnede Smaaafsnit.

I Skove, især paa fugtig Grund, ved Steengjærder o. s. v. alm. — * sjældnere: *Bornh.* i Almindingen! *Falst.* hist og her (14); *Sj.* Jonstrup Vang, Fuursøens Sydstrand (14), Høsterkjøb, Hammermøllen,

Dragerup Skov ved Holbæk (15), Feldskoven ved Sorø! Hæsedø Skov ved Gissselfeld (Jacobsen); *Bornh.* Dynddalen ved Rø (Hjorth), Kleven ved Klemensker, Rønne (Hoff)! *J.* Aalborg (Strandg.), i stor Mængde ved N. Vosborg! *Sl.* Haderslev, Heils (Grønlund).

Anm. De Kjendetegn, der angives for at adskille * som egen Art, forekomme mig foranderlige og ikke tilstrækkelige til at den kan ansees for mere end en Form af *L. spinulosa*.

5. *Cystopteris*. Bægerbrægne.

1327. *C. fragilis* [Bernh. i Schrad. n. Journ. v. 1, p. 2, pag. 26] (Skjør B.) Drej. n. 992; *Polypodium* L., F. D. 401; *Aspidium* Sw., H. II, 362.

Løvet i Omrids lancetformet eller elliptisk (det nederste Par Afsnit lidet kortere end de øvrige), dobbelt fjersnitdeelt; *de nedre secundære Afsnit* halvfinnede eller fjersnitdeelte med spidse eller budte, saugtakke eller tandede *Flige*; *Frugthobene* uordenligt spredte, især henimod Randen af de secundære Afsnit, tilsidst næsten sammenflydende.

$\frac{1}{2}$ —1' høi, Skaffet skjørt, alm. kortere end *Løvet*, forneden rødlig-bruunt, med faae Avner; *Løvet* fiint, lysgrønt, var. i Heuseende til Afsnittenes Form og Indskjæring. 6—7. 4.

I Steengjærder: paa Halvøen sjelden: *J.* Frederikshavn (Drej.), Hørby i Vendsyssel (12); daa Øerne sporadisk og ikke alm.: *F.* Ørbækunde, Peirup (12); Vornæs p. *Thorseng* (12); *Sj.* Alsted (Frk. E Povelsen) og Haverup ved Sorø! Kongsdal! Odinshøi (Heiberg), Mærkerup, Kirkeværløse, Jonstrup (14), Rudersdal, Brede, Fredriksdal, Kulhusene! Vemmetofte (9); *Falst.* Ourupgaard (Koch), Næsgaard, Halskov (14); *Loll.* Sækkjøbing (Benzon), Musse (5); *Møens* Klint (Mørch); *Bornh.* Listed Fiskerleie (Baagøe) o. fl. St. (19!).

1328. *C. montana* [Bernh. l. c.] (Bjerg-B.) Drej. n. 993; F. D. 2250; *Aspidium* Sw., H. II, 363; H. N. III, 96.

Løvet i Omrids triangelformet, tredobbelt fjersnitdeelt; *Afsnittene* stilkede, det nederste Par *Afsnit* længere end de øvrige, med meget større nedadvendte end opadvendte *secundære Afsnit*; *de tertiære Afsnit* halvfinnede med tandede (eller fjersnitdeelte med halvfinnede) *Flige*; *Frugthobene* uordenligt spredte.

$\frac{1}{2}$ —1' høi, Skaffet længere end *Løvet*, med faae, spredte Avner, *Løvet* meget fiint deelt, i Omrids næsten ligt *P. Dryopteris*. 6—7. 4.

I en udtørret Ellemose ved Knapstrup i *Sjæll.* (4), det eneste bekendte Voxested i Danmark.

6. *Pteris*. Ørnebrægne.

1329. *P. aquilina* L. H. II, 367; Drej. n. 999; F. D. 2303.

Løvet tredobbelt fjersnitdeelt med stilkede Afsnit; *de tidligere Afsnit* oval-linieformede, budte, heelrandede, rundbugtede eller ved Grunden med 1—3 Par Flige (eller dobbelt fjersnitdeelt med fra Grunden til Spidsen halvfinnede *Smaaafsnit*).

1—6' høi (i Skove ved Svendborg har jeg fundet Expl. 12' lange). Det nederste Par Afsnit meget større end de øvrige, ofte af Længde med Hovedaxen, hvorved *Løvet* bliver trekoblet; *Løvet* i yngre Tilstand paa Underfladen ofte duunhaaret, ældre glat, læderagtigt, med stærkt fremtrædende Nerver. Karbundterne i Skaftets underjordiske Deel danne i Tværsnit en flakt Ørn. 7. 4.

I Skove, paa Heder mellem Krat o. s. v. meget alm.

7. *Blechnum*. Kambrægne.

1330. *B. Spicant* [Roth fl. germ. 3, p. 44] *Osmunda* L., F. D. 99; *Lomaria* Desv., Drej. n. 1000; *Blechnum boreale* Sw., H. II, 366.

Løvet i Omrids langstrakt-lancetformet, fjersnitdeelt, med bueformigt-opadbøiede, heelrandede, paa de golde Løv tætsiddende, bredt linieformede, budte, paa de frugtbærende fjerne, smalt linieformede, spidse *Afsnit*; de nederste Afsnit af de golde Løv meget korte, budt ægformede.

8—12" høi. 7—8. 4.

I Skove, især paa fugtig Grund mellem Mos og Stene, sporadisk og fortrinsviis i Hedeegne: paa *Halvøen* ikke sjelden, sparsommere paa Øerne: *F.* Kongebroen ved Middelfart (12); *Sj.* Birkerød, Rudergaard, Fredriksdal (H.), Særløse ved Roeskilde (20), Sparresholm (Lund), Gisselfeld (H.), *Bornh.* Nørre Borgdal (8), Almindingen (25), Maidalen i Helgenesbakkerne (Baagøe).

8. *Struthiopteris*. Strudsvinge.

1331. *S. germanica* [Willd. Enum. hort. ber. p. 1071] H. II, 371; *S. europæa* Drej. n. 1001; *Osmunda Struthiopteris* L., F. D. 169.

Det ufrugtbare Løv i Omrids elliptisk-lancetformet, fjersnitdeelt, *Afsnittene* aftage efterhaanden i Størrelse fra Midten af, halvfinnede med heelrandede, seglformigt udadbøiede, budte eller kortspidsede *Flige* (det nederste Par Flige i hvert Afsnit tiltrykte til Hovedaxen), *det frugtbærende Løv* langskaftet, lancetformet, fjersnitdeelt med linieformede, først sammenrullede, tilsidst fladt udbredte *Afsnit*.

Rodstokken tyk, kugleformigt sammentrængt, de ufrugtbare Løv yderst, i en tragtformet Kreds (2—3' høie), de frugtbare Løv i Midten, mørkbrune. 8—9. 4.

Paa fugtige Steder i Skove: i det nordøstl. *Sjæll.* (fra Hammermøllen og Egebæksvang ved Helsingør til Fredriksborg og Bloustrød!) hist og her, ofte i stor Mængde; i de andre Egne af Landet sjelden: *Sj.* Skovsborg (15), Charlottenlund! Skjoldnæsholm, Gisselfeld (H.), Sparresholm (Dr.), Christianslund ved Rønnede (Fru Brun), Langebæk ved Kallehave (Rosenørn Lehn); *F.* Holkenhavn, Hvidkilde, Vissenberg (H.), Høisholt i Tommerup Sogn (24). Paa Halvøen er det mig ikke bekjendt at den er funden. !*

9. Polypodium. Engelsød.

1332. *P. vulgare* L. (Almindelig E.) H. II, 354; Drej. n. 984; F. D. 1060.

Løvet fjersnitdeelt, med afvexlende, linieformede, budte, heelrandede eller svagt rundbugtet-tandede *Afsnit*; *Frugthobene* i 2 Rækker langs Afsnittenes Midtnerve.

Rodstokken tyk, krybende, tæt beklædt med brune Skjæl; *Løvet* mørkgrønt, tilligemed Skaftet glat; *Frugthobene* store, med brandgule Kapsler. 6—10. 4.

Ved Steengjærder, i aabne Skove o. s. v. meget alm.

1333. *P. Phegopteris* L. (Duunhaaret E.) H. II, 355; Drej. n. 985; F. D. 1241.

Løvet i Omrids triangel-ægformet, dobbelt fjersnitdeelt; *Afsnittene* modsatte, lancetformet-tilspidsede, duunhaarede, jævnt aftagende i Længde mod Spidsen, *det nederste Par* nedadvendte; *de secundære Afsnit* linieformet-ovale, budte, de nederste Par paa begge Sider af Hovedaxen indbyrdes sammenvoxne; *Frugthobene* i 2 Rækker langs Randen af de secundære Afsnits nedre Deel.

Rodstokken tynd, krybende, tilligemed Skafterne af de unge Løv beklædt med faa brune Avner. Løvet blegt og mat grønt; Frugthobene smaae, med skidenbrune Kapsler. 6--8. 4.

I Skove, især paa fugtig Grund, sporadisk: paa *Halvøens* Østkyst og i *Sjæll.* hist og her, paa de øvrige Øer sjelden: *Møen* (12); *Falst* Herslebslund (Rasm.), Bregninge (14); *F.* Lakkendrup (19), Ravnholt (A. Lange), Otterup (18); *Bornh.* i Klippeterrainet mod N. V. (Baagøe).

1334. *P. Dryopteris* L. (Tredeelt E.) H. II, 356; Drej. n. 986; F. D. 1943.

Løvet i Omrids bredt triangel- eller muurskeeformet, trekantet, glat; *Smaabladene* dobbelt fjersnitdeelte, de secundære Afsnit forneden fjersnitdeelte, i Midten halvfinnede og i Spidsen tandede eller hele; *Fligene* linieformet-ovale, budte, heelrandede eller svagt rundtakke; *Frugthobene* i 2 Rækker langs Randen af de secundære Afsnit.

Rodstokken tynd, krybende, sort, beklædt med faae brune Avner, Skafterne næsten glatte, glindsende, tilsidst sorte, Løvet blaagrønt, Frugthobene smaae, med blegbrune Kapsler. 6—8.

I høie Skove: ikke sjelden paa *Bornh.*, i *Sjæll.* og paa Østkysten af *Jyll.* Paa de øvrige Øer sjelden: *F.* Brobygaard (24), Skjoldemose (12), Langkildegård, Glorup (19), Ravnholt (A. Lange); *Falst.* Bregninge (14).

10. *Osmunda*. Kongebrægne.

1335. *O. regalis* L., H. II, 372; Drej. n. 1002; F. D. 217; H. N. XII, 98.

Løvet dobbelt fjersnitdeelt; *de secundære Afsnit* linie-lancetformede med æg-hjerteformet, ofte toøret-lappet Basis, heelrandede eller med svagt saugtakket Rand af de talrige og stærke, heelt udløbende Nerver; *Frugterne* samlede i Spidsen af Løvet til en dobbelt finnet Top, sammensat af linieformede Ax.

3—5' høi. (Ved Grunden af det ufrugtbare Løvs Afsnit findes ofte nogle Rækker af Frugter, i Spidsen af de frugtbærende Grene ofte fladt udbredt Løv). 6—8. 4.

I fugtige Skove, Overdrev og Tørvmoser mellem Krat, sporadisk og temmelig sjelden: *Sj.* Helsingør (H.), Frydenlund (11), Søer i Ruderhegn Ø. for Landevejen til Hørsholm! Søllerød (Dr.), Feddet ved Lindersvold! *F.* Holkenhavn (F. D.), Skaarup (19), Græsholms-

skoven ved Svendborg (H.), Rødskebølle (12), Moser N. for Ollerup! Trolleborg, Bommelund (24); *Sl.* Jels (7), Dravit Skov (Rafn), Marie-skoven og Sollie ved Flensborg (16); *Loll.* ved Stokkemærke (19), Søholt (5), Karleby ved Nysted (19); *Falst.* Horreby Lyng, Virket (14); *Bornh.* ved Borre Sø (F. D.), Ølene (14). ☞

11. Botrychium. Maanerude.

1336. **B. Lunaria** [Sw. Syn. fil. p. 171] (Almindelig M.) H. II, 369; Drej. n. 1003; Osmunda L., F. D. 18 (venstre Fig.).

Det ufrugtbare Løv udgaaer omtrent fra Midten af Skaftet, i Omrids oval-hjerteformet, fjersnitdeelt; *Afsnittene* vifteformet-halvmaaneformede med kileformet, heelrandet Basis, i Spidsen hele, rundbugtede eller rundtakket-lappede.

2—6" høi. Skaftet ved Grunden omgivet af brune Skeder. Undertiden findes Frugter i Spidsen af det golde Løvs Afsnit ligesom hos foreg. 4.

* *rutaceum* Fr. nov. p. 289; *B. matricariæfolium* A. Braun, Koch Syn. II, 972; F. D. 18 (høire Fig.)? Det ufrugtbare Løv triangel-ægformet, fjersnitdeelt, med halvfinnede Afsnit.

Paa Græsmarker, Bakker og Lyngheder, sporadisk og ikke alm., hyppigst har jeg fundet den paa Møens Klint. * paa lignende Steder som Hovedarten, men meget sjældnere: *Sj.* Lyngheder mellem Kjøge og Kjøbenhavn! *Møen* (H.); *Bornh.* ved Hammeren (19).

Anm. Formen * betragtes af flere Forff. som egen Art, men uagtet den i Udseende er temmelig afvigende fra *B. Lunaria*, er den dog neppe andet end en Form af denne med i høiere Grad indskaaret Løv, hvilket Overgangsformer (fra Møen) have overtydet mig om.

1337. **B. rutæfolium** [A. Braun i Doell Rhein. Fl. p. 24] (Stilkbladet M.) Koch Syn. II, 972; *B. rutaceum* Sw. (part.), H. II, 370 (excl. loc. nat.); *B. matricarioides* Willd., Fr. nov. p. 288; H. N. III, 99; F. D. 18 (øvre Fig.).

De ufrugtbare Løv alm. 2, det nedre (overvintrende fra forrige Aar) omskedende, det øvre tilvoxet til Basis af Skaftet, i Omrids bredt triangel-hjerteformede, trekoblede med enkelt eller dobbelt fjersnitdeelte *Smaablade*; *Afsnittene* bredt-ægformede, budte, heelrandede eller rundtaktede.

2—4" høi. 6—7. 4.

Paa Lyngbakker og sandige Overdrev, meget sjelden: *Falst.* Bøtø (Benzon); *Sj.* Tiisvilde (27), grusede Bredder N. O. for Gurre Sø (14), Bagsværd (Benzon)! [*

12. Ophioglossum. Slangetunge.

1338. *O. vulgatum* L., H. II, 369; Drej. n. 1004; F. D. 147.

Det ufrugtbare Løv ægformet-elliptisk eller hjerteformet, heelrandet, befæstet lidet ovenfor Midten af det nedentil meget tynde *Skæft*; *Året* linieformet.

4—10" høi. Rodstokken ofte knolleformigt opsvulmet, Rodtræverne i frisk Tilstand gule, Løvet frisk grønt, glindsende. 6—7. 4.

Paa Enge, især i Nærheden af Stranden, fugtige Steder i Skove, funden i alle danske Provindser, men sporadisk og ikke almindelig.

II. Lycopodiaceæ.

13. Lycopodium. Ulvefod.

a. Frugterne i Hjørnerne af Stængelbladene.

1339. *L. Selago* L. (Otteradet U.) H. II, 350; Drej. n. 1005; F. D. 104.

Stænglerne oprette eller opstigende, flere Gange gaffeldeelte med lige høie *Grene*; *Bladene* tiltrykt-taglagte eller tilsidst udstaaende, i 8 Rækker, lancet-ægformede, tilspidsede, læderagtige.

4—8" høi, glindsende mørkgrøn. I Spidsen af Grenene udvikles ofte flere Rækker af fladtrykte Knopper, som, løsrevne fra Moderplanten, spire til nye Planter. 6—8. 4.

I Hedemoser, sandige Overdrev ved Kildevæld, sporadisk og ikke alm.

b. Frugterne omgivne af Dækblade forskellige fra Stængelbladene og samlede til Ax.

aa. *Axene* siddende.

1340. *L. inundatum* L. (Krybende U.) H. II, 352; Drej. n. 1006; F. D. 336; H. N. XV, 97.

Stængelen krybende, tiltrykt til Jorden, grenet, *de frugtbærende Grene* oprette; *Bladene* slappe, linie-traadformede, tilspidsede, paa Hovedstængelen ensidigt opadrettede, paa de frugtbærende Grene alsidigt spredte, opret-tiltrykte; *Dækbladene* ved Grunden udvidede, forøvrigt ligeformede med Stängelbladene; *Åxet* valseformet, omtrent af Længde med og tykkere end den frugtbærende Green.

7—8. 4.

Hedemoser og fugtige Overdrev: paa *Halvøen* hist og her, paa Øerne sparsom: *F.* Hals ved Hofmansgave (H.); *Falst.* Horreby Lyng (Koch), Bøtø (Benzon); *Sj.* Tiisvilde, Rudersdal (H.), Heder ved Kjøge Bugt (15), Kjøge Kro (9), Dybendal ved Munkebjergby (Lund); *Bornh.* ved Hammeren (19), Plantagen N. for Rønne (8).

1341. *L. annotinum* L. (Femradet U.) H. II, 351; Drej. n. 1007; F. D. 127.

Stængelen langstrakt, krybende, mangegrenet; *Grenene* oprette eller opstigende, *Bladene* stive, paa Hovedstængelen i 5, paa *Grenene* i 8 Rækker, udspærrede eller tilbagebøiede, lancet-sylformede, tilspidsede, fjernt saugtakkede; *Dækbladene* bredt ægformede, langt tilspidsede, med hindeagtig, gnavet-tandet Rand forneden; *Åxet* valseformet, tyndere og meget kortere end den frugtbærende Green.

7—8. 4.

I høitliggende Skove og paa Lyngheder: ikke sjelden paa *Halvøen*, mindre hyppig paa Øerne: *F.* Flintholm (12); *Sj.* Hornbæks Plantage (12)! Skoven ved Marianelund (21), Gurre (14), Danstrup Hegn! Gribbs Skov! Gjels Skov (1), Rudehegn (19), Mose i Dyrehaven mod N. (7), Kollekolle (13), Jonstrup Vang, Store Hareskov (14), Roeskilde (Albrecht); *Møens* Storeklint (9); *Falst.* Abelvig Skov, Horreby Lyng (14); *Bornh.* Almindingen (20).

Anm. *L. alpinum* L. (F. D. 79), ved heelrandede, fireradet-tiltrykte *Blade* forskjellig fra foreg., ved siddende *Åx* fra de følg., angives at være funden i Egnen af Hjørring (Drej. i Krøytidsskr. II, 191) men da denne Angivelse beroer paa et enkelt Expl. fra et Herbarium, maa jeg indtil videre ansee denne Fjeldplantes Forekomst i vor Flora for tvivlsom, saa meget mere som en Forvexling med *L. Chamæcyparissus*, der ofte har stor Lighed med hiin, kunde antages at have fundet Sted.

bb. Åxene stilkede.

1342. *L. complanatum* L. (Flad U.) H. II, 351; F. D. 78 (slet) og 2671.

Stængelen krybende; *Grenene* opstigende, gaffeldeelt-mangegrenede; *Smaagrenene* vifteformigt udspilede, fladtrykte, paa den indadvendte Side lidet concave eller næsten plane, med ophøiet Midtlinie, paa den udadvendte Side convexe; *Bladene* (paa *Smaagrenene*) fireradede, sylformede, heelrandede, paa de flade Sider tiltrykte (det indadvendte meget mindre end det udadvendte), paa de skarpe Sider ligestore, i Spidsen udstaaende; *Axstilkene* gaffeldeelte, med 2—4 Ax samlede; *Dækbladene* rundagtigt-æg-hjerteformede, svagt tandede, jævnt tilspidsede i en ved Modenheden tilbagebøiet Spids.

Frisk grøn. 7—8. 4.

Paa Lyngheder, sjelden: *J.* Hørby (12), Torslev og Allerup Bakker (Branth) i Vendsyssel, Mors (H.), i Viborg Amt hyppig (7), Eveldrup (Dr.), Mariager (7), Ø. Nykirke! Skjærhoved (12), Nørup, Førstballe ved Veile (30); *Sl.* (H.); *Sj.* Tiisvilde Indhegning (H.). *

1343. *L. Chamæcyparissus* [A. Braun i Doell. Rhein. Fl. p. 36] (Cypresbladet U.) Koch Syn. II, 970; F. D. 2372; *L. sabinæfolium* Rupr.; H. N. XIII, 100 (neppe Willd.).

Stængelen underjordisk krybende; *Smaagrenene* knippeformigt samlede; *Bladene* alle tiltrykte, de til hinanden svarende paa de flade Sider omtrent ligestore; *Axstilkene* gaffeldeelte, med 2—8 Ax samlede; *Dækbladene* muurskeeformet-hjerteformede, tandede, pludseligt tilspidsede i en længere Spids; forøvrigt som foreg.

Mat og blaaagtig grøn, *Grenene* mindre fladtrykte end hos foreg. 7—8. 4.

Lyngheder: *J.* Viborg (Morville), Vorde ved Viborg (Feddersen)! Thorsted pr. Ringkjøbing, Randbøl Hede! Holsted mellem Kolding og Varde (14); *Sl.* Arrild Hede (12); *Sj.* Svenstrup (J. Hofm. Bang); *Bornh.* i Almindingen (25)! *

Anm. Jeg anseer den uden Betænkning for en fra foreg. vel adskilt Art, hvorom saavel de angivne Kjendetegn som Iagttagelse af deres forskellige Habitus i levende Tilstand har overbeviist mig. Maaskee høre dog nogle af Voxestederne fra foreg. til denne, da der fra flere af disse Steder savnes Expl. for at kunne afgjøre dette.

1344. *L. clavatum* L. (Almindelig U.) H. II, 349; Drej. n. 1008; F. D. 126.

Stængelen krybende, mangegrenet; *Grenene* opstigende, næsten trinde; *Bladene* spredte, i mange Rækker, udstaaende,

med indbøiet, i et Haar endende, Spidse, lancet-linieformede, fjernt tandede; *Axene* parviis samlede, paa en fælles, tæt skjældækt *Axstilk*; *Dækbladene* bredt ægformede, tandede, haar-spidsede og udstaaende.

Planten lysgrøn (Sporerne bekendte under Navn af Hexemeel). 7—8. 4.

Paa Lyngheder, i høitliggende Skove: alm. i *Nordsjæll.* og paa *Halvøen*, sparsom i *Sydsjæll.*, *Fyen* og paa de mindre Øer.

14. *Selaginella*. Dværg-Ulvefod.

1345. *S. spinulosa* [A. Braun l. c. p. 38] H. N. XI, 100; *Lycopodium selaginoides* L., H. II, 352; F. D. 70.

Stængelen nedliggende, med opstigende *Grene*; *Bladene* spredte, udstaaende, lancetformede, tilspidsede, i Randen tornet-tandede; *Axene* langstrakt-kølleformede, enlige i Spidsen af *Grenene*; *Dækbladene* af Form med (men noget større end) *Stängelbladene*.

Spæd Væxt med smukt grønne Blade og tilsidst guldgule Ax. 7—8. 4.

I Hedemoser og fugtige Steder mellem Klitterne, kun funden i det nordvestlige *Jylland*: Aagaard i V. Hanherred (16)! Taabøl (Andresen)! Hillerslev og Klitmøller i Thy (23), Kjærgaard (A. Lange)! Løgstør (Dr.), Bjørnsholm, Thorstedlund (8)!

III. Isoëteæ.

15. *Isoëtes*. Brasenføde.

1346. *I. lacustris* L. [D. R.] (Sortgrøn B.) H. II, 248; F. D. 191; Rchb. ic. fl. germ. VII, 1; H. N. XI, 99.

Rodstokken sammentrængt, i ældre Tilstand med 2 Længdefurer, og derved tolappet, forøvrigt udeelt, med knippestillede *Rodtrævler*; *Bladene* tæt samlede, linieformede, halvtrindt-firekantede, paalangs firerummede, sortgrønne, stive, alm. oprette; *Macrosporerne* meelagtigt hvide, tegnede med nætagtigt-bølgede Ujævnheder paa Overfladen.

Bladene 3—7" lange, uden Spalteaabninger. 7—9. 4.

β, falcata! Lavere (1—1½" høi) med stærkt seglformigt tilbagekrummede Blade, lysbrune Macrosporer, forøvrigt som Hovedarten.

I Søer med Sandbund (under Vandet), meget sjelden: *J. Lyskjær Sø* i Ørum Klit i Thy (Andresen)! *Sl. Tolkvade Sø* (Jessen, 16)! Angives desuden at være funden i en Dam i Frueskov ved Bagsværd (O. F. Müller), men da dette ikke senere har bekræftet sig, kan muligviis en Forvexling have fundet Sted, f. Ex. med *Littorella*, som, naar den voxer under Vandet, ikke er ulig *Isoëtes*. *β*, *Store Øx-Sø* i Rold Skov ved Hobro (J. Mørch)!

1347. *I. echinospora* [D. R. i Bull. soc. bot. Fr. 1861, p. 164] (Gulgrøn B.) A. Braun, 2 deutsche *Isoëtes*-Arten, p. 7.

Bladene gulgrønne, slappe, langt og fint tilspidsede, alm. bueformigt tilbagebøiede; *Macrosporerne* piggede og forsynede med punktformede, spidse (men meget skjøre og let affaldende) Ujævnheder paa Overfladen; forøvrigt som foreg.

Bladene alm. kortere end hos foreg. (2—6"). 7—9. 4.

I Søer med Dynd- og Gruusbund; voxer under Vandet ligesom foreg., hidtil kun fundet paa faae Steder: *J. Porssø* i Hvidberg Sogn (Thy) Andresen 1863! *Sj. Gurre Sø* 1864 (14)!

IV. Rhizocarpeæ.

16. *Pilularia*. Pilledrager.

1348. *P. globulifera* L., H. II, 347; F. D. 223; H. N. XV, 98.

Rodstokken krybende, traadformet; *Frugterne* omtrent af Størrelse som et Frø af *Vicia sativa*, udvendigt bruunfiltede.

7—8. 4.

I Lyngmoser, Søer og Vandhuller, sjelden: *Bornh.* alm. i smaae, om Sommeren udtørrede Søer i Høilyngen! *Sj. Søen* mellem Lyngby og Frederiksdal (F. D.), Nykjøbing (H.); *J. Vang* i Vendsyssel (Dr.), Tolbøl Klit i Thy (Andresen)! *Kjær Ø.* for Vildsted (8)! *Paderup Mose* ved Randers (7); *Ørsø* ved Ribe (Fabricius - Müller); *Sl. Jels Sø* (7), *Tolker Mose* ved Slesvig (Jessen); *Føhr* p. fl. St. (20).

V. Equisetaceæ.

17. Equisetum. Padderokke.

a. *Vernalia* A. Braun. De frugtbærende og golde Stængler forskellige: hine ugrenede, ikke grønne, tidligt fremskydende og efter Sporernes Udtømmelse henvisnende, disse grenede, grønne og senere udviklede.

1349. *E. arvense* L. (Almindelig P.) H. II, 342; Drej. n. 1013; F. D. 2001.

Det frugtbærende Skæft gjennemsigtig - gulbrunt, med fjerne, klokkeformet-tragtformede *Skeder*, der i Spidsen ere kløvede i 8—10 tilspidset-lancetformede Tænder; *den golde Stængel* stribet-furet, krandsgrenet; *Grenene* firekantede med firetandede Skeder; *Tænderne* ennervede, sylformet-tilspidsede, grønne med hvidagtig Rand.

Rodstokken langstrakt og vidtkrybende, ved Ledene ofte knolleformigt opsvulmet. Grenene rue, opret-aabne eller udstaaende, almindelig uden Smaagrene. 4—5. 4.

β , *serotinum* Mey. Chlor. hanov. p. 666. De grenede Stængler i Spidsen axbærende. (Frugtbærende i Juli—Aug.).

γ , *decumbens* Mey. l. c. p. 667 (*E. arv.* γ , *arenarium* Mortens. Mscr.). De frugtbærende Skafter meget korte (2") udvikles samtidigt med de golde, som ligeledes ere korte, talrige og nedliggende, Grenenes Skeder almindelig femtandede.

δ , *nemorosum* A. Braun i Doell. Rhein. Fl. p. 27, den golde Stængel høiere (1½—2') og tykkere, ved Grunden bleg, de 6—7 nedre Skeder uden Grene, Grenene lange, vandret udstaaende eller hængende.

Paa dyrkede Marker, ved Veigrøfter o. s. v., især paa Leergrund, meget almindelig. — β , *Sj.* Bakker ved Nymølle! γ , paa Sandgrund: *Sj.* en sandig Bakke ved Bringe (14)? *J.* Klitter ved Agger i Thy! δ , *Sj.* Hornbæks Plantage! ved Bagverd Sø (Heiberg)!

Anm. 1. De golde Stængler og nogle af Afarterne kunne forveksles med *E. palustre*, men denne adskilles foruden ved det forskellige Vøxested og de ovenfor angivne Kjendetegn tillige derved at Stængelens indre Rum ere alle ligestore, medens hos *E. arvense* det midterste er størst.

Anm. 2. Om den af Hr. Seminarielærer Mortensen fundne meget eiendommelige Form med Rette er henført til *E. arvense decumbens*, om den henhører til en anden af de talrige Former, hvorunder denne Art optræder, eller om den endog er hidtil ubeskreven, tør jeg ikke afgjøre. Paa Grund af Voxestedet, dens lave Væxt o. s. v. har jeg foreløbig henført den til den nævnte Form, men denne er (efter Doell, Fl. von Baden, I, p. 59) hidtil ikke funden med Frugt.

1350. *E. Telmateja* [Ehrh. Beitr. 2, p. 160, 1783], (Elfenbeens-P.) H. II, 343; Drej. n. 1014; F. D. 1469 (β); *E. maximum* Lam. Fl. Fr. I, p. 7 (1778); *E. eburneum* Roth, Catal. bot. 1, p. 128 (1797).

Det frugtbærende Skaft brunagtigt, med tåtsiddende, tragtformede, 20—30-tandede *Skeder*; *Tænderne* børsteformet-sylspidsede; *den golde Stængel* hvidagtig-gjennemsigtig, glindsende, med talrige, krandsstillede, furet-ottekantede *Grene*; *Skederne* 4—5-tandede med tonervede, sylspidsede *Tænder*.

Den frugtbærende Stængel tyk, $\frac{1}{2}$ —1' høi, med omtr. 2" lange Ax, den golde Stængel smukt elfenbeenshvid, 3—6' høi, med rue *Grene*. 5—6. 4.

β , *serotinum*. Den grenede Stængel i Spidsen axbærende. 6—7.

I fugtige Skovdale, ved Randen af Grøfter og Bække, især paa Leer- og Kalkgrund, ikke sjelden i Skovene paa Halvøens Østkyst, mindre hyppig paa Øerne: *F.* Middelfart (1), Lundsgaards Klint ved Kjerteminde (24), Hvedholm (H.), Magaard! *Falst.* ved Tromnæs! Bregninge (med var. β , 14); *Møen* ved Maglevandsfaldet i stor Mængde! *Sj.* Haraldsted Skov ved Kilden (Aabye), Ledreborg (H.)! Egebæksvang (21)! β , sjeldnere: paa *Møen* med Hovedarten! *Falst.* (Koch); *F.* Hvedholm (H.), Lundsgaards Klint (Heiberg); *J.* Rydhave ved Holstebro (Schmidt)! *Sl.* Haderslev (Grønlund). 7.

b. *Subvernalia* A. Braun. De frugtbærende Stængler (idetmindste foroven) brune, udvikles omtrent samtidigt med de golde (grønne), Frugtaxet efter Sporrernes Udtømmelse henvisnende, men selve Frugtskaffet vedblivende og tilsidst grenet.

1351. *E. umbrosum* [Willd. Sp. pl. 5, p. 3] (Lund-P.) H. II, 344; Drej. n. 1615; F. D. 1770; *E. pratense* Ehrh.; H. N. VI, 99.

Det frugtbærende Skaft med fjerne, dybt stribede, hvid-

grønne *Skeder*; spaltede til Midten i 10—15 smalt sylspidsede, sortbrune *Tænder*; *Grenene* udspilede eller bueformigt nedbøiede, alm. ugrene, 3—4-kantede med 3—4-tandede *Skeder*; *Tænderne* ægformede, spidse, ennervede, Nerven forsvindende nedenfor Spidsen.

$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ ' høi, Stængel og Grene rue; Stængelens Furer dybere end hos følg. 5. 4. *Var.*

β , *ramulosum*! De nedre Grene meget lange, med krandsstillede Smaagrener.

I fugtige og skyggefulde Løvskov, paa Skovenge, sporadisk, men ikke sjelden. β , paa Enge ved Skjerumbro mellem Lemvig og Ringkjøbing!

1352. *E. silvaticum* L. (Skov-P.) H. II, 344; Drej. n. 1016; F. D. 1182.

Det frugtbærende Skafte *Skeder* tragtformede, grøn- og bruun-stribede, i Spidsen 5—6-lappet-tandede, med budt-ægformede, rødbrune *Tænder*; *Grenene* opret-aabne, vandrette eller nedbøiede, firekantede, med trekantede *Smaagrener* og 3—4-tandede *Skeder*, hvis *Tænder* ere sylformede, ennervede, med Nerven udløbende til Spidsen.

1—2' høi, mindre ru end foreg. 5. 4.

I Skove, paa Skovenge og side Marker, alm. udbredt.

c. *Aestivalia* A. Braun. De frugtbærende og gølge Stængler eensartede (grønne), henvisnende mod Vinteren, Frugtaxet budt.

1353. *E. palustre* L. (Kjær-P.) H. II, 345; Drej. n. 1010; F. D. 1183.

Stængelen grenet, dybt 6—8-furet, indvendig afdeelt i flere ligestore Rum; *Skederne* 6—8-tandede, med triangelformede, sylspidsede, i Spidsen brune, i Randen bredt-hindeagtige *Tænder*; *Grenene* 5—6-furede, med 5—6-tandede *Skeder*.

Planten næsten jævn, $\frac{1}{2}$ —2' høi. 6—7. 4.

β , *polystachyon*. Alle *Grenene* i Spidsen axbærende.

γ , *arenarium* Fr. Stængelen ved Grunden nedliggende, *Grenenes* *Skeder* dybt og tilspidset-tandede.

♂, *tenue* Doell, Rhein. Fl. p. 29 (E. prostratum Hoppe). Stænglerne talrige fra Grunden, ofte nedliggende.

Paa slette Enge, ved Kildevæld og i Moser alm. og ofte et skadeligt Ukrud. β, med Hovedarten, men sjældnere; γ, paa sandige Marker, ikke alm.: J. ved Haraldslund! ♂, J. Hjallerup i Vendsyssel!

1354. *E. limosum* L. (Dynd-P.) H. II, 345; Drej. n. 1012; H. N. XI, 98; *E. limosum* a, linnæanum Doell, Bad. Fl. 1, p. 64.

Stængelen ugrenet eller faagrenet, i frisk Tilstand svagt, i tørret dybt stribet, indvendig huul (enrummet); Skederne 10—20-tandede; Tænderne smalt sylformede, i Spidsen sortbrune med en meget smal, hindeagtig Rand; Grenene 5—6-furede, med 5—8-tandede Skeder.

1—2' høi, i alle Dele større end foreg., jævn, Stængelen og Skederne forneden glindsende. 5—6. 4.

β, *polystachyon* Lejeune Fl. Spa, p. 274. De øvre Grene axbærende.

* *fluviatile*. H. II, 345; *E. fluviatile* L. Fl. Suec., Drej. n. 1011; F. D. 1184; H. N. XI, 97; *E. limosum* b. verticillatum Doell, Bad. Fl. 1, p. 64. Stængelen mangegrenet; Skedernes Tænder bredt sylformede, tilligemed Skedens øverste Rand sortbrune.

I Kjør, ved Sø- og Aabredder alm. β, Gilleleie (Heiberg)! — * I Aaer og Søer hist og her.

Anm. De fleste nyere Forff. ere enige i, ikke at adskille *E. fluviatile* som Art fra *E. limosum*. Blandt de talrige og foranderlige Former som denne Art frembyder, er det vistnok let at udsondre nogle, som ere i høi Grad forskellige indbyrdes, men Grenenes Antal og Længde samt Tændernes Form forekomme mig idetmindste at være uden bestemt Grændse.

d. *Hiemalia* A. Br. De golde og frugtbærende Stængler eensartede, stedsegrønne og vedvarende om Vinteren; Frugtaxet spidst.

1355. *E. hiemale* L. (Skavgræs). H. II, 345; Drej. n. 1009; F. D. 1409.

Skafterne ugrenede, 14—20-furede, rue; Skederne korte,

valseformede og tæt sluttende omkring *Stængelen*, sorte eller hvide med en sort Rand forneden og foroven; *Tænderne* meget korte, budte med en hurtigt affaldende Spids.

1—3' høi. Fra alle de foreg. let kjendelig ved de rue Striber, som ridse Neglen. 6—7. 4.

I fugtige Skove, ved Kildevæld paa Sandgrund, sporadisk og ikke alm., men funden i alle de danske Provindser.

1356. **E. variegatum** [Schleich. Cat. pl. helv. p. 27] (Sand-P.) F. D. 2490.

Skafterne ugrenede eller ved Grunden faagrenede, 6—8-furede, rue; *Skederne* korte, forneden grønne, i Midten sorte, i Spidsen udvidede, hvidhindedede med 6—8 korte, spidse, vedblivende eller affaldende (i Midten sorte, i Randen hvidhindedede) *Tænder*.

$\frac{1}{2}$ —1' høi og meget finere end foreg. 7—8.

Paa fugtige Steder i Sandegne: Det eneste Expl. jeg har seet fra Danmark findes i Drejers Herb. under Navn af *E. palustre arenarium*, samlet i Klitterne i Thy.

VI. Characeæ.

18. Nitella. Glandstraad.

a. *Nitellæ veræ*. Grenene*) opløses ved deres første Deling i flere eller færre ligestore, symmetrisk ordnede Straaler.

aa. *Krandsgrenene* 2—3 Gange deelte, *Smaagrenene* forsynede med Led, *Endeledstykket* braadspidset.

1357. **N. tenuissima** [Rabenh. Cryptog. Fl. p. 196] (Spæd G.) Wallm. monogr. p. 18; Coss. & Germ. Atl. fl. Paris, tab.

*) For at opnaae saavidt muligt faste Benævnelser for Characeernes talrige Forgreninger har jeg anvendt følgende Udtryk for disse: *Hovedstængelens* første, krandsstillede Forgreninger benævnes i begge Slægter *Hoved-* eller *Krandsgrene* (og der skjelnes mellem de golde og frugtbærende Grene, der ofte ere indbyrdes forskellige),

41 F.; *Chara tenuissima* Desv., A. Braun i Flora 1835, I, p. 53; Rehb. ic. crit. VIII, 1065—68.

Enbo, med traadfine *Stængler*, *Krandsgrenene* 6—8, korte, tæt og næsten kugleformet sammenhobede, tre Gange deelte; *Straalerne* i første og anden Deling 6—7, *Smaagrenene* 3—5, med et enkelt Led og et tilspidset, omtrent dobbelt saa langt som bredt *Endeledstykke*; *Sporehusene* meget smaae, ovale, 6—9-stribede, med kort, afstumpet *Krone*.

Fiin og meget spæd (2—3" høj), oftest lysgrøn, stundom incrusteret. Ved de tæt og kugleformigt sammenhobede Grene og yderst smaae Frugter let kjendelig fra de følgende Arter.

I Færskvand. Angives fra Danmark (Wallm.), men intet Voxested er mig bekjendt. Hornemann anfører fremdeles fra Danmark »*N. flexilis batrachosperma*», men da der intet Expl. findes i hans Herbarium, tør jeg efter den korte Beskrivelse (H. II, 676) ikke have nogen begrundet Mening om der med denne menes *N. tenuissima* eller den ægte *N. batrachosperma* A. Br. (Rehb. l. c. fig. 1070). ^[*]

1358. *N. gracilis* [Ag. Syst. Alg. p. 125] (Fiin G.) Wallm. l. c. p. 19; Coss. & Germ. l. c. t. 41, E.; Wahlstedt Skand. Char. p. 1; *Chara gracilis* Sm., A. Br. l. c. p. 53; Engl. Bot. 4140; Rehb. ic. crit. fig. 1069; H. N. VII, 100; *Nitella flexilis* h. *gracilis* H. II, 676.

Enbo, med tynde, bøielige *Stængler*, 6—7 længere, ikke tæt sammenhobede, 2—3 Gange deelte *Krandsgrene*; *Straalerne* i alle Delinger 3—4; *Smaagrenene* med 2—3 Led; *Endeledstykket* braadspidset, 2—3 Gange saa langt som bredt; *Sporehusene* forholdsviis store, femstribede, næsten kugleformede, med utydelig *Krone*.

disser yderligere Forgreninger benævnes hos *Nitella* *Straaler* af første, anden Deling o. s. v. og *Straalerne* af sidste Deling særligt *Smaagrene*. Hos *Chara* kaldes Hovedgrenenes krands- eller halvkrandsstillede Forgreninger (efter Wallm.) *Bracteer*. Stundom udgaaer indenfor Hovedgrenenes Krandse en eller anden større Green; disse Grene, hvis Forgreningsmaade alm. er eensartet med Hovedstængelens, ere betegnede med Navnet *Vinkelgrene*.

2—6" høi, lys- eller guulgrøn, Grenene meget fine, men ved de angivne Kjendetegn adskilles den let fra foreg.

I Færskvand. Angives fra Danmark (Hornem., Wallm.), men jeg kan intet specielt Voxested anføre.

1359. **N. mucronata** [Kütz. Phyc. germ. p. 256] (Braadspidset G.) Wallm. l. c. p. 25; Chara mucronata A. Braun l. c. p. 52; H. N. XII, 100; Chara flexilis Rehb. l. c. fig. 1071.

Enbo; *Stænglerne* langstrakte, bøielige og gjennemsigtige; *Krandsgrenene* 6—8 uligelange, 1—2 Gange deelte (de golde Grene undertiden udeelte); *Straalerne* i første Deling 3—4, i anden Deling 2; *Smaagrenene* korte, med et enkelt Led og budt, braadspidset *Endeledstykke*; *Sporehusene* ovale, 7—8-stribede, med kort *Krone*.

Høi (indtil over 1'), mørkere eller lysere grøn og glindsende, med bøielige og temmelig lange Grene; Sporehusene mindre end hos foreg. *Var.*

β , *heteromorpha* A. Br. l. c., Coss. & Germ. l. c. t. 40, D, 4—5. De frugtbærende Krandse tæt sammentrængte i Spidsen af Hovedgrenene eller af Vinkelgrene fra Hjørnerne af de golde Grene; Straalerne talrigere, men kortere.

γ , *flabellata* Coss. & Germ. l. c. t. 40, D, 1—3; N. flabellata Kütz., A. Braun, Wallm., Lge. Haandb. 2 Udg. p. 697. Finere end Hovedarten, med Krandsgrenene oftest 3 Gange deelte, længere og alm. talrigere Smaagrene. (Efter Nordstedt, Skand. Charac. p. 37 er den kun en Form af Ch. mucronata og ikke en selvstændig Art).

Hovedarten forekommer uden Tvivl i Danmark, og angives herfra af Wallm. β , i Aaen ved Have Mølle pr. Ringsted (Aaby)! γ , i den botaniske Haves Parker! F. Hals ved Hofmangave (E. Hofm.-Bang)! ^W

bb. Krandsgrenene engang deelte eller udeelte med en Knæbøining i Delingens Sted; Smaagrenene uden Led.

α , enb.

1360. **N. flexilis** [Ag. l. c. p. 124] (Bøielig G.) Wallm. l. c. p. 33; H. II, 675 (undt. varr. a—h); Chara flexilis

Bruzel., A. Braun l. c. p. 50 (neppe L.); *Nitella Brongniartiana* Coss. & Germ. l. c. t. 40, C, 1—2; *N. furculata* Rehb. Mössl. Handb., Nordstedt, Skand. Char. p. 35.

Stængelen lang, bøielig, glindsende; *Krandsene* fjerne; *Krandsgrenene* 6, omtrent af lige Tykkelse med *Stængelen*, 2—3-deelte eller udeelte; *Smaagrenene* lange, budte eller spidse (ikke braadspidsede); *Sporehusene* tilsidt næsten kugleformede, syvstribe, deres *Krone* kort, med i Spidsen sammenstødende Tænder.

Lysere eller mørkere grøn og olieagtigt glindsende, ved Tørring oftest sort. Af denne, ligesom af flere andre Arter, forekommer undertiden en Form af afvigende Udseende (*nidifica*) med Vinkelgrene, hvis Ledstykker ere forkortede og *Krandsgrenene* flere Gange deelte.

I Færskvand, sjeldnere i Havet, ikke alm.: *Sj. Dronninggaard* (11)! Ordrup Mose! Raavaddam (Aabye).

* 1361. *N. procera* [Wallm. l. c. p. 32] (Høi G.)

Stor og kraftig, med 10—12 meget lange, trestraalede *Grene* i de nedre (golde) *Krandse*; de øvre, frugtbærende *Krandsgrene* 4—5, deelte i 2—3 *Straaler*; *Sporehusene* større, stundom 2 samlede, forøvrigt som foreg., med hvilken den er nær beslægtet.

Grimmerup Mose i Angel (Wallm.). ☞

β , tvebo.

1362. *N. syncarpa* [Kütz. l. c. p. 256] (Tvebo-G.) *Chara syncarpa* Thuill., A. Br. l. c. p. 51; Rehb. l. c. fig. 1073—77; *N. flexilis* d. *syncarpa* Wallr., H. II, 675.

Krandsene fjerne, med 8—9 udeelte eller 2—4-straalede *Grene*; *Smaagrenene* tilspidsede; ♂: *Antheridierne* snart enlige i Vinklerne af *Smaagrenene*, snart flere tæt samlede i et endestillet Hoved; ♀: *Sporehusene* 2—3 samlede nedenfor *Straalernes* Delinger eller fra Midten af de udeelte *Straaler*, 5—6-stribede.

Høi (indtil over 1'), smukt grøn. Saavel *Antheridier* som *Sporehuse* sidde oftest flere samlede enten paa de øvre *Krandsgrene* eller hyppigere paa de talrige forkortede Vinkelgrene. Ved det adskilte Kjøen let kjendelig fra *N. flexilis*, med hvilken den ofte har været

forvexlet. Den forekommer under meget forskjellige Former, der af Flere ansees for særegne Arter. Af disse findes hos os:

* *pseudoflexilis* A. Br. (*N. atrovirens* Wallm. l. c. p. 35; *N. opaca* β , *atrovirens* Wahlstedt l. c. p. 7; *N. syncarpa* var. *Smithii* Coss. & Germ. l. c. t. 39, 7—12. Større og mørkere grøn, alm. glindsende, ikke incrusteret; Stængelens Ledstykker kortere end Krandsgrenene; Sporehusene enlige eller 2 samlede.

** *capitata* Coss. & Germ. l. c. t. 39, 1—6; *Chara capitata* N. E., *Nitella* Ag., Wallm. l. c. p. 37. Spædere, bleggrøn, ofte incrusteret, med længere Ledstykker; Sporehusene alm. 3 samlede; Antheridierne ofte hovedformigt samlede paa meget korte Vinkelgrene og alm. indhyllede i Sliim.

I Færskvand, hist og her, f. Ex. *F.* Veistrup (19)! *J.* i Mergelgrave ved Evedrup (Drej.)! Haraldslund! *Sj.* Gurre Sø (14!) golde Exemplarer (?) ** Kjøbenhavns Omegn (Hornem., Aabye)! *

b. *Tolypella* A. Br. Hovedgrenenes Axe forlænget udover den første Deling, ved de 1—3 nedre Led forsynet med mindre Grene, som faae Lighed med Bracteer («falske Bracteer»); Smaagrenene forsynede med Led.

1363. *N. intricata* [A. Braun!] (Mangefrugtet G.) *Chara intricata* Trentep., *Chara polysperma* A. Br. l. c. p. 56; Ganter. Oesterr. Char. p. 12, tab. I, 3; *Nitella* Kütz., Wallm. l. c. p. 41; *Chara fasciculata* Amici.

Enbo; *Krandsgrenene* 8—10; de nedre Grene *golde*, forlængede, deelte; *Smaagrenene* bestaae af flere Led og et tilspidset *Endeledstykke*; de *frugtbærende Grenes* Axe fortløbende i 2—3 Led og ved hvert Led forsynet med 3—5 langstrakte, enkelte eller deelte mindre Grene (*falske Bracteer*); *Antheridierne* stilkede, tilligemed talrige *Sporehuse* tæt samlede ved Grenenes nedre Led eller ved Grunden af Hovedgrenene; *Sporehusene* ovale, 10—12-stribede, gjennemsigtige, med kort, afstumpet *Krone*.

Stor (over 1') og stærkt forgrenet; de frugtbærende Grene tæt sammenhobede, forneden incrusteret og i tørret Tilstand graaagtig.

Udmærket og let kjendelig ved Smaagrenenes talrige Led, de mange tæt sammenhobede Frugter og den tidlige Fructification (4—5). Den har Lighed med Slægten *Chara* ved Incrustation og Forgreningsmaade.

I Leergrave ved Næsbyhoved pr. Odense (Lgby i Horn. Herb.)! ☞

1364. **N. Stenhammariana** [Wallm. l. c. p. 43] (Fugle-rede-G.) *Chara Stenhammariana* Wallm. add. ad Liljebl. Sv. Fl. ed. 3; H. N. XV, 100; *Conferva nidifica* F. D. 761; *Chara nidifica* Bruzel., *Ch. flexilis* c. *nidifica* H. II, p. 675; *Nitella flexilis* (*Chara* L.) Nordstedt l. c. p. 39.

Enbo; *Krandsgrenene* 6—8; de nedre Grene *golde*, udeelte; de *frugt bærende Grene* og *Vinkelgrenene* med sammentrængte Ledstykker, ved de 1—2 nedre Led forsynede med 3—4 udeelte, uligelange *falske Bracteer*; *Smaagrenene* (stundom tillige Hovedaxens og Hovedgrenenes Ledstykker) bestaae af flere Led, med budt *Endeledstykker*; *Sporehusene* 2—flere samlede, tilsidst kugleformede, 7—8-sribede, kastaniebrune, med spids *Krone*; *Antheridierne* enlige, ovenfor eller ved Siden af *Sporehusene*.

Lavere end foreg, i frisk Tilstand lysgrøn, tørret sortgrøn, glindsende, ikke incrusteret. Ved de udeelte Grene og falske Bracteer samt ved budte Endeledstykker desuden kjendelig fra foreg. — Fructificerer senere paa Sommeren (7—9).

I Salt- og Brakvand: *Sj.* Kallebodstrand ved Kbhavn? (Aabye, ufuldst. Expl.); *F.* Odense Fjord ved Hofmansgave (Hofm. Bang)! mellem *Loll.* og *Falst.* (Müll.), Rødby Fjord (19)! ☞

19. *Chara*. Krandsnaal.

a. *Lychnothamnus* Rupr. Stænglernes Ledstykker encellede, jævne, Antheridierne ved Siden af *Sporehusene*. (Gjennemsigtige og bøielige, uden Incrustation)*).

1365. **Ch. alopecuroides** [Delil., var. *Wallrothii* A. Br.] (Rævehale-K.) H. N. XV, 99; *Ch. papulosa* Wallr.; *Ch. Wallrothii* Rupr.; *Nitella flexilis* e, *barbata* H. II, 676.

*) Denne Afdeling danner i flere Henseender en Overgang fra Slægten *Chara* til *Nitella*. Flere Forff. have derfor, da der ogsaa blandt

Enbo; *Stænglerne* stift oprette, med 5—8 *Grene* i *Krandsene* og ved *Grunden* af disse et forskjelligt Antal (4—13) forlængede, udstaaende eller tilbagebøiede *Svøbblade*; *Krandsgrenene* indadbøiede, 3—5-leddede, med 5—6 forlængede, naaleformede *Bracteer* ved hvert *Led* og indenfor hvert af disse enlige *Antheridier* og ovale, 11-stribede, gjennemsigtige *Sporehuse* med utydelig *Krone*.

2—8" høi og spæd, glindsende og smukt grøn, ikke incrusteret. *Stængelens* nedre *Ledstykker* forlængede, de øvrige forkortede, med duskformigt sammentrængte *Krands*. I *Habitus* ikke ulig *Ch. crinita*.

I Salt- og Brakvand, sjelden: *J. Øen Røn* i Limfjorden (Aabye)! *F. Odense Fjord* ved Ulriksholm (H. 4, 18!). !*

b. *Chara genuina*. *Stængelens* *Ledstykker* stribede eller furede af flere parallelle *Celler*, der som et *Barklag* omgive en større *Celle* i *Midten*; *Antheridierne* nedenfor *Sporehusene*.

aa. *Strigosæ*. *Stængelen* beklædt med flere eller færre *Børster* eller *Vorter* (hveranden *Række* af *Stængelens* *Striber* (*Hovedstriberne*) med, hveranden (de *secundære* *Striber*) uden *Børster**).

α, Enbo.

αα, I tørret Tilstand graaagtige, incrusterede, skjøre.

* **Foetida.** *Stænglerne* mindre dybt stribede, svagt beklædte med kornede *Vorter*, sjeldnere med *Børster*; *Krandsgrenenes* *Budeledstykker* og *Bracteerne* budte.

1366. *Ch. foetida* [A. Br. l. c. p. 63] (*Stinkende K.*) Wallm. l. c. p. 76—78; Coss. & Germ. l. c. tab. 37 (ex part.), *Ch. vulgaris* pl. autt., H. N. VI, 100 (dextr.).

Stænglerne forlængede, med 8—10 *Grene* i *Krandsene*, dens *Ledstykker* stribede, *Hovedstriberne* beklædte med vorteformede *Ujævnheder*, sjeldnere med *Børster*, mindre fremragende

foreg. Slægt findes *Arter*, som have flere *Characterer* tilfælles med *Chara*, vedligeholdt den tidligere *Forening* af *Slægterne*.

*) De med *Børster* beklædte *Striber* ligge undertiden dybere og ere mindre fremtrædende end de øvrige, og ere derfor ved *Tørring* ofte ukjendelige.

end de secundære; *Svøbet* kort eller 0; *Grenene* opstigende, 5—6-leddede, med *Bracteer* af ulige Længde; *Sporehusene* ovale, 13-stribede, med opret, temmelig kort *Krone*.

Graagrøn, i tørret Tilstand askegraa, og i Regelen stærkt incrusteret, meget stinkende. Af denne meget forskellige Arts talrige Former forekomme her:

α , *vulgaris* A. Br. (Ch. vulgaris α , Wallr., Kütz.; Ch. foetida Walm. l. c. p. 76; Coss. & Germ. l. c. fig. 1—4). Bleggrøn, med tynde Stængler; Grenenes øverste Ledstykker uden Barklag; de indadvendte Bracteer 4 (2 af Frugternes Længde, 2 længere), de udadvendte 2 meget korte.

β , *longibracteata* A. Br., Coss. & Germ. l. c. fig. 7; (Ch. longibracteata α , Wallm. l. c. p. 77; Ch. vulgaris b. foliosa Horn. 676). Langstrakt, Grenene længere, med Barklag indtil Spidsen; de 2 inderste Bracteer meget lange (4 Gange Sporehusets Længde).

γ , *brevibracteata* A. Br. Stængelen lavere, de 2 længste Bracteer neppe dobbelt saa lange som Sporehuset.

δ , *subhispidata* A. Br. l. c., Coss. & Germ. l. c. fig. 6. Stængelen foroven beklædt med Børster; Grenenes øverste Ledstykker uden Barklag.

ϵ , *munda* A. Br. ined. Uden Incrustation.

I Færskvand almindelig, (især β). Formerne γ , og δ , forekomme hist og her (f. Ex. Hofmangave); ϵ , F. Hofmangave (18); J. Eveldrup (Drej. i Hornem. og Aabyes Herb.).

* 1367. **Ch. contraria** [A. Br. Schweitzer Char. p. 135] Wallm. l. c. p. 76; Wahlst. l. c. p. 15; Ch. foetida var. hispidula & densa (?), Coss. & Germ. l. c. fig. 5 & 8.

Stængelens *periferiske Rør* beklædte med fine Vorter eller længere Børster, de med Ujævnheder beklædte Striber (Hovedrørene) mere fremragende end de secundære Rør, og derved synlige ogsaa i tørret Tilstand; 4 *Bracteer* lidet længere end Sporehusene, forøvrigt som foreg., men spædere, med alm. kortere og ved Frugtmodningen indbøiede *Grene*.

I Færskvand: F. Hasmark Mose ved Hofmangave (18!); J. Flade Sø ved Agger! (Expl. bestemte af Prof. A. Braun). [a]

**** *Hispidæ*.** Stængelens Ledstykker dybt furede, alm. beklædte med længere Børster; Grenenes Endeledstykker og Bracteerne spidse.

1368. **Ch. hispida** [L. (?), Sm. fl. britt. 1, 5] (Stivhaaret K.) Wallm. l. c. p. 80; A. Br. l. c. p. 66; H. II, 677 (excl. varr.); F. D. 154(?), Coss. & Germ. l. c. tab. 38, B. 1—2; Ch. spinosa Rupr., Nordst. l. c. p. 47.

Stængelen høi, tyk og kraftig, med spiralformigt bøiede Striber; Hovedrørene mindre fremragende end de secundære, beklædte med lange og sylspidsede, spredte eller knippestillede, nedadvendte Børster; Krandsgrenene 8—10, i Frugttilstanden opret-aabne, med et Svøb dannet af 2 Rækker Torne nedenfor hver Krands; fra hvert af Grenenes 4—8 Led udgaae 8—10 tilspidsede Bracteer, hvoraf de 3—5 indre ere længere, de 2—4 ydre kortere end Sporehusene (de ydre Bracteer ofte meget smaae eller 0); Sporehusene store, 10—13-stribede, med stor, opret-aaben Krone.

Den største og anseeligste Art, i frisk Tilstand mat lysgrøn, tørret graaagtig, sædvanlig incrusteret og temmelig skjør. Af dens forskellige Former maa følgende særskilt nævnes:

β, *gymnoteles* A. Br. Stængelen mindre incrusteret, næsten uden Børster, Grenenes 2—3 øvre Ledstykker meget lange, uden Barklag.

γ, *micracantha* A. Br., Wahlstedt l. c. p. 27; Nordst. l. c. p. 47; Ch. equisetina Kütz. Stængelen grov, med faae og korte Børster, Krandsgrenenes øvre Ledstykke budt baandformet uden Barklag og Incrustation (en oftest steril Form).

En af de almindeligste Arter, især i Færskvand. β, i Moser ved Kjøbenhavn! Sortedamsø (Aabye). γ, J. Vildsted Sø (8)! Loll. i Tørvgrave ved Birket (19)! Avernakø (12)!

1369. **C. polyacantha** [A. Braun ined.] (Mangetornet K.) Wahlst. l. c. p. 29; Nordst. l. c. p. 48; Ch. hispida var. pseudocrinita Coss. & Germ. l. c. t. 38 B. 3; H. N. XIV, 100.

Langstrakt, men alm. tyndere end foreg., meget skjør og stærkt incrusteret; Stængelens Hovedrør mere fremragende end de secundære, tæt beklædte med lange og spidse Børster, som paa Ledstykernes øvre Deel ere nedadvendte, paa den

nedre Deel opadvendte; *Krandsgrenene* 7—9, korte, med alm. 7 Led, hvorfra udgaae 6—8 indbyrdes omtr. ligelange *Bracteer*; alle længere end de ovale, 13-stribede, sortblaae eller blyfarvede *Sporehuse*.

I Færskvand, sjelden: *Sj.* Bidstrup ved Roeskilde (Nordstedt)! *Loll.* Mose ved Birket (19)!

ββ, *Mindre skjøre, svagt eller aldeles ikke incrusterede og i tørret Tilstand grønne (Balticæ).*

1370. **Ch. horrida** [Wallm. ined.] (Pigget K.) Wahlstedt l. c. p. 24; Nordst. l. c. p. 49; *Ch. hispida* γ, *echinata* Lge. Haandb. 2 Udg. p. 704; *Ch. baltica fastigiata* Wallm. monogr. p. 86; H. N. XIV, 99.

Grøn, næsten uden Incrustation; *Stængelen* langstrakt ($1\frac{1}{2}$ —1'), lidet grenet, furet-stribet; de *secundære Rør* fremstaaende, *Hovedrørene* ved Tørring nedsænkede, med stærke, knippeformede *Børster*, som paa Ledstykernes øvre Deel ere nedadvendte, forneden opadvendte; *Krandsgrenene* 10—13, fjerne, fine, lange, stivt oprette; *Bracteerne* 6—8, omtr. ligelange og længere end det tykke, ovale, tilsidst sortbrune *Sporehuus*.

I Salt- og Brakvand: Hofmansgave indenfor den store Dæmning (27)!

Anm. Denne Art, som i Udseende har endeel tilfælles med *Ch. hispida* og *polyacantha*, synes at danne et Mellemlid mellem disse og *Ch. baltica*. Da den er væsenligt forskjellig fra begge disse Grupper, har jeg med de nyere svenske Monogramer af Characeerne opført den som en egen Art.

1371. **Ch. intermedia** [A. Braun ined.]. Nordst. l. c. p. 50.

Stængelen høi, tyk og kraftig, stærkt stribet; *Hovedrørene* mere fremtrædende end de *secundære*, med faae og korte *Børster*; *Krandsgrenene* 6, bestaaende af 5 Led; de nedre Ledstykker korte, med Barklag, de 2—3 øvre Ledstykker uden Barklag, med en tilledet Braad i Spidsen; de indre *Bracteer* lidet kortere eller længere end de store, ægformede *Sporehuse*.

Skjør og stærkt incrusteret. Danner efter Wallm. et Mellemed mellem *Ch. hispida* og *foetida*, og forekommer under 2 Former:

α , *papillosa* A. Br., Wahlst. l. c. p. 22, *Ch. papillosa* Kütz., Wallm. l. c. p. 80. Lavere (omtr. $\frac{1}{2}$ '), og med færre Børster, Krandsgrenene omtr. 6, indbøiede. (Ligner i Udseende *Ch. contraria* og Former af *Ch. foetida*).

β , *aculeolata* A. Br., Wahlst. l. c. p. 22, *Ch. aculeolata* Kütz. Høiere (1') med flere og længere Børster, Krandsgrenene 7—9, oprette. (Ligner *Ch. Liljebladii* og *Ch. hispida* γ , *micracantha*).

α , I Slien ved Klensby Nor (20)! Expl. bestemte af Prof. A. Braun.
 β , J. Vildsted Sø (8)! β

1372. **Ch. Liljebladii** [Wallm. l. c. p. 86] Wahlst. l. c. p. 19; *Ch. distans* Wallm. olim.

Stængelen grov og langstrakt, med mange og fine periferiske Rør, Hovedrørene meest fremtrædende; *Ledstykkerne* meget forlængede, de nedre uden, de øvre med flere eller færre, knippestillede eller spredte, opret-aabne Børster; *Krandsgrenene* 9—12, kortere end Ledstykkerne, med 2 Rækker nedbøiede Svøblade ved Grunden; Grenenes Led 5—6, det nedre Ledstykke kort og tykt, *Endeledstykket* kort, kegleformet, uden Barklag, de øvrige traadformede, med Barklag, de 1—3 nedre Led frugtbærende, med omtr. 8 Bracteer, de indre længere, de ydre kortere end Sporehusene; de øvre Led golde, med færre Bracteer; *Sporehusene* aflang-valseformede, 10—15-ribede, med stor og udbredt Krone; *Antheridierne* store.

Af Størrelse som *Ch. hispida*, men meget finere, kun lidet incrusteret, og ved Stængelens talrigere, finere Striber, færre, mere opadvendte Børster og en lys, men frisk grøn Farve adskilt fra hin.

»I Guldborgsund mellem Lolland og Kjeldsø, i saa stor Mængde at den hindrer Seiladsen« (Viborg (?) 1792 i Hornem. Herb., Expl. bestemte af Wallm.). I Nakskov Fjord i Mængde (19)! β

1373. **Ch. baltica** [Fr. Nov. p. 289] (Østersøisk K.) Wallm. l. c. p. 85 (undt. var. γ); F. D. 2311; H. N. IX, 100; *Ch. hispida* a. *baltica* H. II, 677.

Stængelen dybt furet, beklædt med talrige og stærke, nedadvendte, enlige eller 3—flere knippeviis samlede *Børster*; *Krandsgrenene* omtrent 9, meget kortere end Ledstykkerne, med 2 Rækker *Svøbblade* ved Grunden; *Grenenes Led* 5—7, de 3 nedre Ledstykker frugtbærende, de 1—3 øvre uden Barklag; *Bracteerne* talrige, krandsstillede; *Sporehusene* næsten kugleformede, i yngre Tilstand hvide, tilsidst sorte, 8—10-stribede, med kort, aaben *Krone*.

Skjør, men alm. uden Incrustation. Dens vigtigste Kjendemærker fra *Ch. hispida* ere ovenfor angivne. *Ch. aspera* er tvebo og desuden adskilt ved en fiint sribet Stængel, meget finere Børster og en guulgraa Farve. Med andre Arter kan den neppe forvexles. Følgende Former adskilles:

α, genuina (*Ch. baltica β, humilis* Wallm. l. c.) Lav, mørk- eller guulgrøn, *Grenenes* øverste Ledstykke meget udvidet, fladtrykt; de ydre *Bracteer* af Længde med, de indre længere end *Sporehusene*.

β, firma Wahlst. l. c. p. 18 (*Ch. firma* Ag.) Omtrent 1' lang, stiv og noget incrusteret, graagrøn eller bruunagtig, de 1—3 øvre Ledstykker smale, de ydre *Bracteer* kortere end, de indre af Længde med *Sporehusene*.

I Saltvand: Øresund ved Kysterne af Saltholm i Mængde! Kallebodstrand ved Amager (Aabye); Store Bælt ved Korsør (4), Reersø (11); *Loll.* i Rødby Fjord (19)! *F.* Odense Fjord (4). *β*, findes i Hornem. Herb., men uden Angivelse af Voxested. E

* 1374. *Ch. Nolteana* [A. Br. l. c. p. 62] (Mørkgrøn K.) Wallm. l. c. p. 84.

Stængelen kraftig, sribet, i Spidsen forsynet med faae, fjerne og korte Børster, forneden nøgen; *Krandsgrenene* 8—12, længere end Ledstykkerne, med meget korte *Svøbblade* ved Grunden; *Grenene* 5—6-leddede, de 1—3 nedre Ledstykker kortere, og (ligesom Hovedstængelen) omgivne af Barkceller; de øvrige Ledstykker uden Barklag, længere og tykkere (af Hovedstængelens Tykkelse), indsnørede ved Ledene; *Endeledstykket* kort og tilspidset; *Bracteerne* faae, korte og uligelange, de ydre meget korte eller 0; *Sporehusene* blege, med kort, aaben *Krone*.

Omr. $\frac{1}{2}$ ' høi, mørk olivengrøn, glindsende, uden Incrustation. En af vore sjeldneste og eiendommeligste Characeer, som i Udseende har Lighed med Former af den sydeuropæiske *Ch. scoparia* Bauer. Prof. Braun, som tidligere antydede dens Slægtskab med *Ch. hispida gymnoteles*, har meddeelt mig, at han nu er tilbøielig til at forene den med *Ch. baltica*. Ogsaa Wahlstedt og Nordstedt (l. c.) forene saavel denne Art som *Ch. Liljebladii* med *Ch. baltica*; jeg har imidlertid beholdt disse adskilte, fordi de forekomme mig i høi Grad iøinefaldende, saavel i deres ydre Udseende som i flere Characterer.

Slesvig (Nolt.), i Slien ved Louisenlund (20)! ☞

β , Tvebo.

$\alpha\alpha$, *Asperæ* Wahlst. Stængelen fin, oftest incrusteret, Børsterne fine, talrige og enlige.

1375. **Ch. aspera** [Willd. Berl. Mag. III, 298 (Hvas K.) A. Br. l. c. p. 71; Wallm. l. c. p. 94; Coss. & Germ. l. c. t. 38, D; H. N. III, 100; *Ch. hispida* (L. fl. Suec.) Nordstedt l. c. p. 44; F. D. 1940; *Ch. hispida* e. *aspera* H. II, 678.

Stænglerne talrigt samlede, stivt oprette, tynde, fint strikede, beklædte med flere eller færre, fine og sylspidsede, vandrette, foroven nedbøiede, forneden opadvendte Børster; Krandsgrenene 7—8, oprette (i Spidsen lidet ud- eller indadbøiede), kortere end Stængelens Ledstykker, ved Grunden omgivne af 2 Rækker Svøblade, 4—8-leddede med forlængede Ledstykker; Bracteerne 6—8 uligelange (de to indre dobbelt saa lange som, de mellemste af Længde med og de ydre kortere end Frugterne); Sporehusene oval-kugleformede, 10—11-stribede, voxgule, med tydelig, budt Krone.

Var. i Henseende til Grenenes Længde og Antal af Led, Børsternes Beskaffenhed o. s. v. Følgende ere de mærkeligste Former:

α , *maritima* (Wallm. l. c. 95). Mindre skjør og alm. ikke incrusteret, tæt beklædt med Børster, der alm. ere lidet længere end Stængelens Gjennemsnit.

1. *pallida*! Bleg- eller guulgrøn.

2. *nigricans* (*Ch. hispida* d. *nigricans* Horn. l. c.). Hele Planten af en sortgrøn Farve.

β , *leptophylla* A. Br. Grøn, ikke incrusteret, med tynde Stængler og haarfine Grene, faae, fjerne og svage Torne.

γ , *stagnalis* (Wallm. l. c.). Spædere og mere eller mindre langstrakt, med længere Grene og færre Børster. Oftest incrusteret, meget skjør og af graaagtig eller lys spanskgreen Farve.

δ , *aculeolata* (Wallm. l. c. p. 96), *Ch. hispida* c. *curta* Horn. l. c., *Ch. curta* Nolt. mscr. i Horn. Herb. (?). Stærkt incrusteret, skjør og lys askegraa, med meget korte Børster; Grenene korte, med indbøiet Spidse.

Hører til de hyppigste Arter i Danmark, dels i Salt- eller Brakvand (α), dels i Færskvand (β og γ). α 2, Brakvand ved Amager (27); β , J. Vildsted Sø ved Løgstør (8)! \mathcal{F} . Brakvand ved Hofmangave (18)! δ , Gyrstinge Sø (Aabye)!

Anm. *Ch. fragilis* er enbo, og desuden let kjendelig ved Stængelens Mangel paa Børster. *Ch. hispida*, med hvis mindre Former den har nogen Lighed, er ogsaa enbo, ligesom *Ch. baltica*, hvilken den staaer nærmest, men som ved flere ovenfor anførte Kjendemerker er tilstrækkelig adskilt. Med andre Arter kan den ikke forvexles. — Wallm. og Nordstedt ansee denne Art for Linnés *Ch. hispida*.

$\beta\beta$, *Crinitæ* Wahlst. Grønne, uden Incrustation, hvasse af talrige, fine, krands- eller knippeformede, udspærrede Børster.

1376. **Ch. crinita** [Wallr. Ann. bot. 190, tab. 3] (Tæt-haaret K.) A. Braun l. c. p. 70; Ganter. l. c. p. 14, tab. II, 8; H. N. VIII, 100; *Ch. hispida* b. *crinita* Horn. l. c. p. 678.

Stænglerne talrigt samlede, oprette, tynde og fine, tæt beklædte med talrige, vandret udspilede, haarfine Børster (der ere mere end dobbelt saa lange som Stængelens Tværnsnit); Krandsgrenene 8—10, opret-aabne eller tilbagebøiede, 4—6-leddede, ved Grunden omgivne af en dobbelt Række Svøbblade (den øvre Række opad-, den nedre nedadbøiet); Brackeerne omtrent 8: de 6 ydre ligelange og meget fine (mere end dobbelt saa lange som Sporehusene), de 2 indre meget korte; Sporehusene svagt 10—13-sribede; tilsidst sortagtige, med kort og afstumpet Krone.

Mørkgreen, af et meget sirligt Udseende. Dens spæde Væxt,

talrige og lange Børster o. s. v. gjøre den let kjendelig fra de øvrige Arter. Exemplarer med Antheridier ere yderst sjeldne. — Man adskiller 2 Former:

α , *genuina* (Ch. *crinita* Wallm. l. c. p. 91; Ch. *crinita* **α** , *leptosperma* A. Br. l. c. 71). Høiere, med forlængede Ledstykker (længere end Krandsgrenene), lysere, i tørret Tilstand graaagtig-grøn; Sporehusene elliptisk-ovale.

β , *condensata* (Ch. *condensata* Wallm. l. c. p. 92; Ch. *crinita* **β** , *pachysperma* A. Br.; Ch. *canescens* Lois.). Lavere, med forkortede Ledstykker (kortere end Krandsgrenene), mørkgrøn, tørret olivenfarvet; Sporehusene kugleformede.

I Salt- eller Brakvand, sjeldnere i Færskvand, ikke alm. i Danmark: **α** , J. Norsminde Fjord (Aabye)! **F.** Hofmansgave (18)! **Sj.** Glænv ved Skjelskør (14)! Øresundet ved Amager (Aabye)! **β** , Hofmansgave (4)! Baagø (Liebm. Herb.)! **Loll.** Naskov Fjord ved Lienlund (19)! **Sj.** Kallebodstrand!

$\gamma\gamma$, *Ceratophyllæ Wahlst.* Tykstænglede, i levende Tilstand oftest rødlig, med faae (eller næsten ingen) korte, ægformede, opblæste Børster.

1377. **Ch. ceratophylla** [Wallr. Ann. bot. p. 192] (Hornbladet K.) A. Braun l. c. p. 65; Ch. *tomentosa* **β** , *ceratophylla* Wahlenb., H. II, 677.

Stængelen stiv og tyk, med spiralformede Hovedrør*), svagt beklædt med korte og brede Børster; Krandsgrenene 6—8, aabne eller udspilede, ved Grunden omgivne af 2 Rækker Svøblade, 3—6-leddede; Endeledstykket (eller de 2—3 øvre Ledstykker) uden Barklag; Bracteerne krandsstillede, ligelange, korte, brede og spidse; Sporehusene lidet kortere end Bracteerne, 13—15-tribede, med udbredt Krone; Antheridierne store.

Skjør og incrusteret, forneden mørkgrøn, foroven teglsteensrød, i tørret Tilstand graaagtig. Ved de brede og korte Bracteer, den tykke Stængel o. s. v. let kjendelig fra de øvrige Arter. Med *Ch. hispida* og *Ch. foetida*, hvormed nogle af dens Former have Lighed, kan den paa Grund af Kjønnetts Fordeling paa 2 Planter og de eendommelige brede, blæreformede Børster ikke forvexles. Den er

*) Stængelen har, ifølge Wahlstedt, ingen secundære Rør.

iøvrigt en meget foranderlig Art, og hos os forekomme især 2 Former:

α , *macroptila* A. Br. (?) Ch. *ceratophylla* [Wallr. Stængelen langstrakt, med flere og længere Børster; Grenene og de talrige Bracteer længere, udstaaende.

β , *microptila* A. Br. (Ch. *latifolia* Willd., F. D. 1656 (δ)). Stængelen kortere (2—3" lang), med faae Børster, kortere og mere oprette Grene og Bracteer og et meget bredt, forlænget Endeledstykke.

* *tomentosa* (Ch. *tomentosa* L. (?), Wallm. l. c. p. 89; F. D. 1941 (δ); H. N. V, 100); Stængelen tyndere, med forlængede Ledstykker, Grenene og Bracteerne længere, udstaaende; i frisk Tilstand orangeifarvet eller grøn, i tørret Tilstand frisk grøn, næsten uden Incrustation.

I Færskvand, temmelig sjelden: α , F. Egense ved Hofmansgave (18)! β , S. j. Gyrstinge Sø (Aabye), Fuursøen (Lgby, Vahl!); J. Vildsted Sø ved Løgstør i Mængde (8)! * hyppigst i Brak- eller i Saltvand: F. Einsiedelsborg (F. D., Hofm. Bang)!

Anm. Wallmann adskiller Ch. *tomentosa* og Ch. *ceratophylla*, hvorimod disse sammenfattes under een Art af A. Braun, og denne Forening af de 2 Former til een Art bekræftes yderligere i en udførlig Fremstilling af Wahlstedt (l. c. p. 34). Efter de Expl. jeg har seet, maa jeg ansee den Anskuelse, at de ere Modificationer af samme Art, frembragte ved forskjelligt Voxested, for fuldstændig begrundet, i modsat Fald burde Ch. *latifolia*, som er endeel afvigende fra de øvrige Former, ogsaa sondres som en egen Art. Mellem de forskjellige Former synes desuden ikke at være nogen skarp Grændse. Da de linneiske Navne i denne Slægt ere saa lidet sikre og da tilmed Navnet Ch. *tomentosa* er lidet betegnende, har jeg foretrukket det nyere Wallrothske Navn for den samlede Art.

bb. Inermes. Stængelen uden Børster langs Striberne.

1378. Ch. *fragilis* [Desv. i Lois. not. p. 126] (Skjær K.) A. Braun l. c. p. 68; Wallm. l. c. p. 101; Coss. & Germ. l. c. t. 38, C; Ch. *vulgaris* (L. part.) H. II, 676.

Enbo; Stænglerne tynde, fint sribede; Krandsgrenene 7—10, alm. kortere end Stængelens Ledstykker, i frugtbærende Tilstand opret-tiltrykte eller buetformigt indbøiede, med en dobbelt Række af smaae og tiltrykte (stundom utydelige) Svøblade; Grenenes Led 6—10; Bracteerne fine og tilspidsede, hurtigt

affaldende, de ydre meget smaae eller 0, de indre af forskjellig Længde; *Sporehusene* ovale eller ægformet-elliptiske, 13—15-stribede, med lang, opret *Krone*.

Meget skjør, for det meste frisk grøn og uden Incrustation. I Udseende nærmer den sig meest *Ch. foetida*, men ved de meget finere Stængler, de tidligt affaldende Bracteer, hvorved Grenene (især de golde) synes nøgne o. fl. Kjendetegn adskilt fra denne. Fremtræder især under nedenstaaende Former, mellem hvilke dog neppe lader sig drage nogen skarp Grændse:

β , *Hedwigii* (Ch. Hedwigii Bruzel.; Ch. vulgaris a. Hedwigii Horn. l. c.; H. N. VI, 100 (venstre Pl.). Større, blaagrøn, ofte incrusteret; de indre Bracteer af Sporehusenes Længde.

γ , *pulchella* (Ch. pulchella Wallr.; Ch. vulg. c. pulchella Horn. l. c., H. N. XII, 99). Finere, oliven- eller graagrøn, uden Incrustation; Krandsgrenene længere, med talrige Led; de indre Bracteer lidet kortere end Sporehusene.

δ , *capillacea* (Ch. capillacea Wallm.; Ch. fragilis β , longibracteata Rabenh., A. Br.). Meget fin, frisk grøn uden Incrustation; Krandsgrenene lange (ofte længere end Ledstykkerne, de indre Bracteer ofte meget længere end Sporehusene.

ϵ , *barbata* Ganterer (Ch. frag. var. foliolata Hartm.). Bracteerne lange, Grenene lange og fine, med tydelige, ofte meget lange Svøbblade; har undertiden Spor af Børster i Form af Vorter paa Stængelen.

* *annulata* (Ch. annulata Wallm., Lge. Haandb. 2 Udg. p. 710). Lav, tueformet, mørkgrøn, mindre skjør, med færre Krandsgrene, korte og talrige (15—20) Ledstykker paa Grenene og sortgrønne, ringformigt indsnørede Led, uden Bracteer (oftest gold).

I Færskvand, en af de almindeligste Arter i Danmark. Formen ϵ , synes at være sjældnere: *F.* Tørvgrave ved Mynderup (12)! * (en eiendommelig Form, som jeg tidligere med Wallm. optog som selvstændig Art, men som af A. Braun og de øvrige nyere Forff. ansees for en Form af *Ch. fragilis*) er funden i *Sl.* i Slien ved Louisenlund (20)! *Sj.* Gurre Sø! (Paa begge Steder uden Frugt.)

Rettelser og Tillæg,

som bedes bemærkede før Brugen af Bogen.

Side 2 Lin. 12 tilføies: Ørsløv ved Skjelskør (14).

- | | | | |
|-----------------------------|----------|---|---|
| — 6 | — 14 | — | Egebæks Vang (Grønlund), Munkevangen i Gribs Skov ved Esroml |
| — 9 | — 14 | — | Lerchenborg (Smith), Holsteinborg (Nielsen)! (forma α , gracilis). |
| — 17 | — 23 | — | Aalholm (Møller). |
| — 18 | — 23 | — | Hald Sø (Feddersen). |
| — 33 | — 4 | — | Tjæreby, Ørsløv, Basnæs (Nielsen), Lerchenborg (Smith). |
| — 36 | — 9 | — | Vildsted ved Løgstør (8)! |
| — " | — 2 f.n. | — | Malle ved Løgstør (8)! |
| — 40 | — 4 f.n. | — | Karup paa Alheden (Feddersen). |
| — 44 | — 5 | — | Aventoft ved Tønder (Branth). |
| — 45 | — 17 | — | Bøgelunde, Stubberup og Snedinge ved Skjelskør (Nielsen). |
| — 48 | — 13 | — | Kjærmoser N. for Vildsted Sø ved Løgstør (8)! |
| — 50 | — 17 | — | Brøndshøj! |
| — 51 efter Lin. 5 tilføies: | | | |

Anm. Den her beskrevne Plante er funden i de fleste Lande af Europa, men overalt, som det synes, sporadisk og temmelig sjelden, og er neppe nogetsteds iagttaget med moden Frugt, hvilket bekræfter den Anskuelse, som allerede *A. Braun* (Flora 1844) har udtalt, at den skulde være en Bastardform af *Lolium perenne* og *Festuca pratensis*, og hvormed flere nyere Forskeres Undersøgelser stemme overeens (sml. *Crepin*, not. s. pl. crit. de la Belg. IV, p. 53, *Focke* og *Ascherson* i Bot. Zeit. 1864).

Unægtelig synes denne Mening, ifølge hvilken Planten maatte opføres enten under *Lolium* (som *L. pratensi-perenne* Syn. *L. festucaceum* Lk.) eller under *Festuca* (som *F. perenni-pratensis*, Syn. *F. elongata* Ehrh. Beitr. VI, 133) at have mere for sig end dens Indordning enten under *Brachypodium* (Fries) eller især under *Glyceria* (Gren. & Godr.), fra hvilke Slægter den i flere Henseender er væsenlig forskjellig. Ifølge Ascherson (Bot. Z. 1864, p. 25) maa det tidligere anvendte Navn for denne Plante (*F. loliacea*) være at henhøre ikke til Huds., men til Curtis, Koch o. fl. Forff., idet den Hudsonske Plante af dette Navn maa antages at være en axblomstret Form af *Glyceria fluitans* (β , *triticea* Fr.) og at fremdeles rimeligviis Grenier & Godr. have havt den samme Form for Øie ved deres *Glyceria loliacea*, idet de beskrive dens Frugt som stemmende med *Glyceria*-Frugter, medens ingen andre Forfattere have iagttaget modne Frugter hos *Lolium festucaceum* Link.

Side 52 Lin. 8 f. n. tilføies: *Sj. Dyrehaven ved Skjelskør (Nielsen)!*

J. Lundbæk ved Nibe (8)!

— 59 — 2 f. n. »ikke bemærket paa Bornh.« rettes til: *Bornh. Lehnsklint (Hjorth).*

— 60 — 20 tilføies: *Oryza clandestina (Web.) A. Braun, Verhandl. d. bot. Vereins f. Brandenb. 2, 195.*

— " — 3 f. n. **) forandres til: I vort Clima blomstrer den saa seent paa Aaret, at Toppen stundom ikke naaer sin fulde Udvikling. I Sommeren 1862 fandt jeg dog ved Hellebæk Exemplarer, paa hvilke den endestillede Top var fuldt udtraadt af Skeden, og hvor der blandt mange gølge Blomster fandtes enkelte, kjendelige ved en mørkere Farve, i hvilke Frugten var fuldmoden. Foruden den endestillede Top findes der i de øvre og mellemste Bladskeder skjulte eller kun med den øverste Spidse fremragende Blomsterstande, og disses Blomster ere stedse lukkede, med ufuldkomne Støvknapper, som kun sparsomt udvikle Blomsterstøv, men dog i Regelen bære fuldt udviklede Frugter (sml. Duval-Jouve i Bull. soc. bot. Fr. 1863, Walz og Ascherson i Bot. Z. 1864).

— 62 Lin. 11 tilføies: *Brede Bakker (Schütz).*

— 65 — 18 — *Tønder (Branth).*

— 74 — 18 — *Sylt (28)!*

— 84 efter nederste Linie tilføies: *♂, divaricatum!* Topgrenene udspærret-aabne.

— 85 Lin. 3 tilføies: *♂, Sorø (Nielsen)!*

— 88 — 13 f. n. tilføies: *Ranum ved Løgstør (8)!*

- Side 90 Lin. 13 tilføies: Jonstrup Vandmølle (14)!
- 93 — 10 — Teglstrup Hegn, Store Hareskov (14).
- 101 — 17 — Ballerup (14).
- 104 nederste Linie tilføies: Kalkbakker ved Smakmølle pr. Løgstør (8)!
- 112 Lin. 18 tilføies: Frederiksdal (14).
- 119 — 7 f.n. — Sj. Gurre, Smørumøvre, Vensløv ved Skjelskør (14)!
- 122 — 20 — J. Næsby ved Løgstør (8)!
- 124 — 3 — i Gurre Vang meget almindelig!
- 127 — 12 — Randrup Krat ved Viborg (Feddersen).
- 134 — 11 f.n. — Tjustrup Sø (Nielsen)!
- 136 — 4 f.n. — Bringe (14), Borreby (Nielsen)!
- 139 efter Lin. 3 f.n. tilføies:
- γ*, *dichotomus* Wallr. (Sched. crit. p. 67; ? *P. flabellatus* Bab.?). Stængelen noget fladtrykt, Bladskederne store, oppustede, tveæggede, med bred, hindeagtig Rand; Bladene korte, flade, kort og pludseligt tilspidsede, alm. trenervede, paa de gølge Grene vifteformigt udstaaende; Axet kort og faablomstret, med tætsiddende Krandse. Passer nogenlunde til Babingtons Beskrivelse af *P. flabellatus*, og er muligviis en egen Art, forskjellig fra *P. zosteraceus* ved kortere Blomsterstilke, tætsiddende Blomsterkrandse og meget kortere Blade med større Skeder, fra *P. pectinatus* ved en fladtrykt Stængel, flade, trenervede, kortspidsede Blade.
- 140 Lin. 3 tilføies: Sj. Gadekjær i Haarsløv ved Skjelskør (14)!
- J. Brakvand ved Nibe Fjord (8)!
- " efter Lin. 4 tilføies: *γ*, i Østersøen ved Omø (Nielsen, 14)!
- " Lin. 24 tilføies: Søndersøen ved Jonstrup (14)!
- 159 — 5 — Bjørnsholm (8)!
- 160 — 3 f.n. — Faartoft ved Thisted (Jacobsen), Lade-
gaarden ved Aalborg (Branth).
- 168 — 1 — *Kantbæger*.
- " — 12 — Sl. Bov (Petersen).
- 169 — 6 f.n. — I Foraaret 1864 har Hr. Nielsen dog samlet *P. elatior* ved Skjelskør, hvor han hidtil havde søgt den forgjæves. (I Overeensstemmelse hermed maa den ovenstaaende Anmærkning forandres.

Side 177 Lin. 6 tilføies: 7—8. ☉.

— 190 — 2 f. n. Krat mellem Karup og Resen (Feddersen).

— 177 — 10 tilføies: 7—8. ☉.

— 210 — 7 f. n. tilføies: J. Smaaholme ved Nibe og Sebbesund (8)!

— 212 — 13 tilføies: Edelgave i Ledøie Sogn (14).

— 217 — 13 — Ukrud i Haver ved Tønder (Branth).

— 219 — 8 f. n. nordvestlige rettes til nordøstlige.

— 220 — 2 f. n. Skove rettes til Hove.

— 231 — 12 f. n. tilføies: Høier (Branth).

— 236 — 22 tilføies: 7—8. 4.

— 240 — 8 — Refsnæs (15).

— 248 — 15 — Draved Skov (Branth).

— 266 — 2 — almindelig langs alle Bredder af Gurre Sø (paa Gruus)!

— 273 — 4 f. n. tilføies: Bredderne af Hald Sø (Feddersen).

— 287 — 1 f. n. — Store Hareskov (14).

— 289 efter Lin. 10 f. n. tilføies:

γ, *littorellæfolium* Mortens. mscr. Bladene (alle med Undtagelse af de 1—2 yngste) linieformede, jævnt tilspidsede (omtrent som hos *Littorella lacustris*)
o: Bladstilken er fladt udbredt og Bladpladen mangler.

— " Lin. 7 f. n. tilføies: *γ*, Tjustrup Sø ved Sorø (14)!

— 303 — 8 f. n. — almindelig ved Tønder (Branth).

— 319 — 2 f. n. — Aborreberget paa Møen (Baagøe)!

— 321 — 7 tilføies: Sj. Hornbæks Plantage!

— " — 12 f. n. tilføies: *Loll* ved Knuthenborg (Thaning).

— 324 — 16 tilføies: Høgild Mose ved Karup Aa (Feddersen).

— 329 — 10 — Nørbjerg Kalkbakke i V. Hanherred (8)!

— 353 — 6 — 7—9.

— " — 20 — 7—8. ☉.

— " — 12 f. n. tilføies: Sj. Maaløv (14), Høragre ved Tikjøb i Mængde!

— 355 — 21 tilføies: Nymølle (14)!

— " nederste Linie tilføies: Sj. Nybølle (14)!

— 358 Lin. 1 tilføies: Mørkegaard ved Qvistgaard Station (15), Nyrup, Danstrup Hegn!

— " efter Lin. 13 tilføies: Prof. A. Braun, som ifølge min Anmodning har undersøgt *S. lividum* i Willdenows Herbarium, har meddeelt mig, at denne Plante, saavidt det af de i Herbariet opbevarede maadelige Exemplarer kan skjønnes, er forskjellig fra vor; Navnet *S. lividum*, som først af Drejer er brugt for denne, maa derfor opgives. Jeg maa

altsaa indtil videre antage den for en Form af *S. Fabaria* Koch (*S. purpureum* Tausch), thi til *S. purpurascens* Koch (saaledes idetmindste som jeg opfatter denne) kan den neppe henhøre.

- Side 362 Linie 3 tilføies: Heder ved Tjele pr. Viborg (Feddersen).
 — 365 — 4 — Søndersøens Nordskrænt (14).
 — 373 — 5 — Krat ved Gurre Sø (14)!
 — 374 — 5 f. n. 6—7 rettes til 7—8.
 — 408 — 12 f. n. tilføies: Hedebakker mellem Resen og Karup (Feddersen).
 — 413 — 14 f. n. — Skovgaard ved Viborg (Feddersen).
 — 423 — 1 f. n. — Holsteinborg, Stubberup, Basnæs, Glænø (Nielsen).
 — 424 — 7 f. n. — Høier, List (Branth).
 — 435 — 15 tilføies: og i Henseende til Kronens Læber. (Ved Tikjøb har jeg fundet en Form med 4—5-tandet Overlæbe og alle Underlæbens Flige rundtakkede).
 — 443 — 23 — Asmild Klosters Have (Feddersen).
 — 446 — 2 — Lindum Skov, Møgelkjær (Feddersen).
 — 448 efter Lin. 8 tilføies:
 † *M. piperita* L. (Peber-M.) forvildet ved St. Jørgensgaard i Fyen (12).
 — 449 Lin. 23 tilføies: *s. J.* Barmer ved Nibe Fjord (8)!
 — 450 — 13 — *Sj.* forvildet i Haver ved Tikjøb!
 — 451 — 8 — *β, J.* Kjettrup i Ø. Hanherred (8)!
 — " — 9 (ikke funden i det egenlige Danmark o. s. v.) rettes til: *Sj.* Bredderne af Gurre Sø (paa Gruusbund)!
 — 453 — 18 tilføies: Aalholm (Møller).
 — 457 — 2 f. n. tilføies: Slettestrand i V. Hanherred (8)!
 — 467 — 3 f. n. — Løgstør (8)!
 — 469 — 15 efter »tokløvede« tilføies (eller hele).
 — " — 23 brunagtig rettes til violetbrun eller skidenguul med violet Anstrøg.
 — " — 12 tilføies: *O. Cirsii oleracei* Caspary (Schr. der Phys. Ges. z. Königsberg, 2 Jahrg. p. 46 t. 1).
 — 477 — 21 — ved Kysterne af Omø i stor Mængde (Nielsen, 14).
 — 478 — 9 — Omø (14).
 — 484 — 18 — Porskjær i Taabel Hede ved Agger (Andresen).
 — 493 — 14 f. n. tilføies: Bisserup ved Skjelskør (Nielsen)!

Side 503 Lin. 19 tilføies: **Sj.** Store Hareskov (14); **Loll.** Aalholm (Møller).

- 512 — 4 f. n. — Granskov ved Sølyst N. for Esrom Sø!
- 521 — 1 f. n. — Slettestrand i V. Hanherred (8)!
- 528 — 15 tilføies: Glængø ved Skjelskør (Nielsen).
- 537 — 5 f. n. tilføies: Tørvmose i Asnæs Skov (Smith)!
- 541 — 8 f. n. — Nykjøbing paa Falster (Trojel).
- 597 — 5 tilføies: Aagerup (Smith).
- 705 — 10 — Rødby Gader (Benzon)!
- 782 — nederste Lin. tilføies: Vildsted Sø ved Løgstør (8)!

Register

over

de i Haandbogen indeholdte Arters og Varieteters Navne.

(De med *Cursiv* trykte Navne ere Synonymer.)

A.

- Abies, 653.
 X excelsa Lam., 666.
 X pectinata DC., 666.
 X vulgaris Poir., 666.
 Acer, 292.
 campestre L., 300.
 platanoides L., 300.
 Pseudoplatanus L., 300.
 Achillea, 561.
 Millefolium L., 616.
 " β , lanata Koch, 616.
 " γ , magna Sond., 616.
 X Ptarmica L., 615.
 X Achyrophorus maculatus Scop., 583.
 Acinos, 450.
 thymoides Moench, 453.
 Aconitum, 402.
 X Napellus L., 410.
 X neomontanum H., 410.
 Acorus, 243.
 Calamus L., 272.
 Acrostichum septemtrionale L., 757.
 Actæa, 401.
 X spicata L., 406.
 Adoxa, 293.
 moschatellina L., 506.
 Aegopodium, 152.
 Podagraria L., 218.
 " β , subsimplex, 219.
 Aesculus, 290.
 X Hippocastanum L., 290.
 Aethusa, 153.
 X Aethusa Cynapium L., 224.
 " β , pygmæa, 224.
 " segetalis Boenn., 224.
 X Agraphis nutans Link, 249.
 Agrimonia, 358.
 X Eupatoria L., 360.
 X odorata Mill., 360.
 X procera Wallr., 360.
 Agropyrum, 23.
 acutum DC., 54.
 " β , macrostachyum, 54.
 " α , microstachyum, 54.
 X adfine Dethard., 54.
 X adfine Drej., 53.
 X caninum R. S., 56.
 " β , gracilius, 56.
 junceum Beauv., 52.
 littoreum Drej., 56.
 obtusiusculum Lge., 53.
 X pungens R. & Sch., 55.
 X repens Beauv., 55.
 " β , arundinaceum Fr., 56.
 " γ , firmum, 56.
 " δ , littorale Bab., 56.
 strictum Deth., 53.
 Agrostemma, 311.
 X Githago L., 342.
 Agrostis, 25.
 alba L., 73.
 " β , coarctata Blytt., 74.
 " δ , gigantea Rehb., 74.
 " γ , maritima Mey., 71.
 " ϵ , vivipara Rehb., 74.

Agrostis arundinacea L., 71.

× *canina* L., 72.

× *capillaris* F. D., 73.

× *coarctata* Schum., 70.

flava F. D., 74.

gigantea Roth, 74.

maritima Lam., 74.

pumila L., 73.

† *rubra* H., 72.

silvatica L., 74.

× *Spica venti* L., 72.

× *stolonifera* α, L., 73.

stolonifera β, L., 74.

 " *decumbens* Rafn, 74.

tenella Hoffm., 73.

× *vulgaris* With., 73.

 " δ, *pumila* F. D., 73.

 " β, *stolonifera*, 73.

 " γ, *tenella*, 73.

 " ε, *vivipara*, 73.

Aira, 27.

aquatica L., 85.

coerulea L., 84.

× *cæspitosa* L., 79.

 " β, *pallida*, 79.

 " δ, *stolonifera*, 79.

 " γ, *vivipara*, 79.

canescens L., 79.

caryophyllea L., 80.

cristata L., 77.

† *flexuosa* L., 78.

glauca Schrad., 77.

præcox L., 80.

uliginosa Whe., 78.

Wibeliana Sond., 79.

Airopsis, 27.

× *caryophyllea* Fr., 80.

× *præcox* Fr., 80.

Ajuga, 429.

× *pyramidalis* L., 445.

× *reptans* L., 445.

Albucea nutans Rchb., 258.

Alchemilla, 108.

† *Aphanes* Leers, 126.

arvensis Scop., 126.

montana Willd., 126.

† *vulgaris* L., 125.

 " β, *subsericea* Koch, 126.

Alectorolophus hirsutus Rchb., 465.

major Rchb., 465.

minor Rchb., 466.

Reichenbachii Drej., 466.

Alisma, 244.

natans L., 289.

† *Plantago* L., 288.

Alisma Plantago γ, *graminifolium* Ehrh., 289.

 " β, *lanceolatum* With., 289.

 " δ, *latifolium* Lge., 289.

ranunculoides L., 289.

 " γ, *littorellæfolium* Mort., 795.

 " β, *repens*, 289.

repens Cav., 289.

Alliaria, 474.

× *officinalis* Andr., 500.

Allium, 242.

acutangulum Schrad., 257.

angulosum Nolt., 257.

arenarium Sm., 253.

arenarium Fr., 254.

× *ascalonicum* L., 255.

carinatum L., 256.

× *Cepa* L., 255.

fallax R. & S., 257.

 " * *serotinum*, 257.

† *Kochii* Lge., 254.

montanum Schmidt, 256.

× *oleraceum* L., 255.

 " β, *canaliculatum* Fr., 256.

Porrum L., 253.

× *sativum* L., 254.

Schoenoprasum L., 256.

Scorodoprasum L., 253.

 " β, *minus* Fr., 253.

senescens W. Gr., 257.

sphærocephalum L., 255.

× *ursinum* L., 257.

× *vineale* L., 254.

 " α, *capsuliferum* Koch, 254.

 " β, *compactum* Thuill., 254.

 " γ, *purpureum* Koch, 254.

Alnus, 655.

× *glutinosa* Gärt., 706.

× *incana* DC., 706.

Alopecurus, 25.

× *agrestis* L., 65.

× *fulvus* Sm., 66.

× *geniculatus* L., 65.

× *nigricans* Horn., 65.

× *pratensis* L., 65.

Alsine, 511.

marina Drej., 536.

media L., 541.

 " *decastemon*, 542.

rubra Whlbg., 533.

tenuifolia Whlbg., 537.

 " β, *viscosa*, 537.

viscosa Schreb., 537.

Alsinella marina F. D., 534, 536.

- Alsinella rubra* Sw., 533.
viscosa Hartm., 537.
Althæa, 501.
× officinalis L., 504.
Alyssum, 472.
× calycinum L., 483.
incanum L., 483.
Amarantus, 654.
Blitum L., 704.
Amelia media Alef., 320.
" minor Alef., 320.
Ammophila arenaria Lk., 67.
baltica Lk., 68.
Anacamptis, 633.
× pyramidalis Rich., 639.
Anagallis, 146.
× arvensis L., 185.
" coerulea, 185.
× coerulea Schreb., 185.
Anchusa, 143.
† arvensis M. B., 166.
× officinalis L., 166.
Andromeda, 309.
† polifolia L., 322.
Anemone, 403.
× Hepatica L., 411.
† nemorosa L., 412.
" γ, sulfurea Pritz., 412.
pratensis L., 413.
Pulsatilla L., 412.
ranunculoides L., 412.
ranunculoidi-nemorosa Kze., 412.
Anethum, 154.
† graveolens L., 227.
Angelica, 154.
× Archangelica H., 228.
× littoralis Fr., 228.
× silvestris L., 228.
Antennaria, 560.
† dioeca Gärtn., 608.
× " β, hyperborea Don., 608.
Anthemis, 561.
† arvensis L., 614.
" β, disciflora, 615.
× Cotula L., 614.
" β, disciflora, 614.
× tinctoria L., 615.
" β, discolor Fr., 615.
Anthericum, 242.
† Liliago L., 259.
ossifragum L., 259.
raiosum L., 258.
" β, Pseudo-Liliago Lge., 259.
Anthoxanthum, 25.
× odoratum L., 64.
Anthoxanthum odoratum γ, laxiflorum, 64.
" β, majus, 64.
" α, vulgare, 64.
Anthriscus, 155.
× Cerefolium Hoffm., 231.
× silvestris Hoffm., 232.
× vulgaris Pers., 231.
× Anthyllis, 508.
maritima Schweigg., 521.
× Vulneraria L., 521.
" β, maritima, 521.
" γ, rubriflora, 521.
Antirrhinum, 452.
Cymbalaria L., 459.
Elatine L., 459.
Linaria L., 457.
minus L., 458.
× Orontium L., 460.
spurius L., 458.
Apargia autumnalis Willd., 587.
hirta Sm., 586.
hispida Host., 587.
Taraxaci Sm., 587.
Apera Spica venti Beauv., 72.
Aphanes arvensis L., 126.
Apium, 152.
† graveolens L., 218.
inundatum Rehb., 217.
Petroselinum L., 218.
repens Rehb., 217.
Aquilegia, 402.
× vulgaris L., 411.
Arabis, 474.
× arenosa Scop., 495.
† hirsuta Scop., 494.
perfoliata Lam., 496.
suecica—biennis Fr., 495.
Thaliana L., 495.
Aracium, 556.
× paludosus Monn., 572.
Arbutus uva ursi L., 522.
Archangelica, 155.
× littoralis Fr., 228.
officinalis Hoffm., 229.
Arctium, 557.
Bardana Willd., 588.
intermedium Lge., 589.
Lappa L., 588—90.
" majuscula Hartm., 589.
majus Schk., 590.
minus Schk., 589.
tomentosum Schk., 588.
Arctostaphylos, 309.
officinalis W. & Gr., 322.

- * *Arctostaphylos Uva ursi* Spr., 322.
Arenaria, 311.
 marginata DC., 336.
 marina F. D., 335.
 media F. D., 334.
 peploides F. D., 337.
 rubra L., 333.
 " β , *marina*, 336.
 serpyllifolia L., 337.
 " β , *glutinosa*, 338.
 " α , *scabra*, 338.
 tenuifolia F. D., 337.
 trinervia L., 338.
Aristolochia, 635.
 * *Clematidis* L., 631.
Armeria, 157.
 campestris γ , *Höfmanni*, 239.
 " β , *Kochii*, 239.
 elongata Drej., 239.
 maritima Willd., 239.
 purpurea Koch, 239.
 * *vulgaris* Willd., 239.
 " α , *elongata*, 239.
 " γ , *humilis*, 239.
 " β , *purpurea*, 239.
Armoracia rusticana fl. wett., 485.
Arnica, 562.
 * *montana* L., 627.
Arnosericis, 555.
 pusilla Gärtn., 565.
Arrhenatherum elatius M. K., 83.
Artemisia, 559.
 * *Absinthium* L., 604.
 + *campestris* L., 605.
 " β , *sericea* Fr., 605.
 gallica Willd., 604.
 * *maritima* L., 604.
 " β , *gallica*, 604.
 " γ , *salina*, 604.
 salina Willd., 604.
 * *vulgaris* L., 605.
Arum, 652.
 * *maculatum* L., 659.
Arundo arenaria L., 67.
 baltica Flüg., 68.
 Culamagrostis L., 70.
 Epigejos L., 68.
 neglecta Ehrh., 70.
 Phragmites L., 84.
 Pseudophragmites Nolt., 60.
 silvatica Schrad., 71.
 stricta Timm., 70.
Asarum, 358.
 + *europæum* L., 359.
Asclepias Vincetoxicum L., 212.
Asparagus, 241.
 * *officinalis* L., 247.
Asperugo, 142.
 procumbens L., 160.
Asperula, 106.
 odorata L., 112.
 tinctoria L., 113.
Aspidium, 751.
 aculeatum Doell., 758.
 aculeatum Sw., 757.
 " β , *Swartzianum*, 757.
 " α , *vulgare*, 758.
 angulare Kit., 757.
 cristatum Sw., 759.
 dilatatum Sw., 760.
 erosum Schk., 759.
 Filix foemina Sw., 755.
 Filix mas Sw., 759.
 fragile Sw., 761.
 montanum Sw., 761.
 Oreopteris Sw., 758.
 spinulosum Sw., 760.
 Thelypteris Sw., 758.
Asplenium, 750.
 Adiantum nigrum L., 756.
 * *Filix foemina* Bernh., 755.
 * *Ruta muraria* L., 756.
 Scolopendrium L., 757.
 * *septemtrionale* Sw., 757.
 * *Trichomanes* L., 755.
Asprella oryzoides Lam., 60.
Aster, 562.
 annuus L., 622.
 salignus Willd., 621.
 * *Tripolium* L., 621.
Asterocephalus Columbaria Wallr., 110.
 suaveolens Wallr., 110.
Astragalus, 509.
 arenarius F. D., 522.
 * *Cicer* L., 523.
 * *danicus* Retz., 522.
 glycyphyllos L., 524.
 hypoglottis L., 523.
 hypoglottis pl. autt., 522.
Astrantia, 151.
 major L., 216.
Athamanta Libanotis L., 223.
 Oreoselinum L., 225.
Athyrium Filix foemina Roth, 755.
Atriplex, 656.
 angustifolia Sm., 716.
 arenaria Woods, 710.
 " β , *parvifolia*, 711.
 Babingtonii Woods, 712.

- Atriplex Babingtonii* β , virescens, 712.
calotheca Fr., 714.
 " α , macrosepala, 714.
 " β , macrotheca, 714.
 " β , microsepala, 714.
 " γ , microtheca, 714.
 " γ , parvifolia, 714.
crassifolia Fr., 712.
crassifolia Gren. & Godr., 710.
crassifolia C. A. Mey., 711.
deltoides Bab., 713.
erecta Huds., 716.
hastata Sm., 714.
hastata L., 712.
 " γ , *calotheca*, 714.
 " α , *deltoides*, 713.
 " β , *macrotheca*, 713.
 " β , *microcarpa*, 713.
 " β , *microtheca*, 713.
 " δ , *platysepala* Guss., 713.
 " γ , *prostrata*, 713.
 " γ , *salina*, 713.
 " γ , *triangularis*, 713.
 " *hortensis* L., 709.
laciniata L. fl. Suec., 714.
laciniata F. D. 710.
latifolia Whlbg., 712.
littoralis L., 716.
 " * *serrata*, 717.
longipes Drej., 714.
 " β , *muricata*, 715.
marina L., 717.
microsperma W. K., 713.
nitens Rebert., 710.
oppositifolia DC., 713.
 " *patula* L., 715.
 " δ , *angustifolia*, 716.
 " β , *erecta*, 716.
 " α , *genuina* Westerl., 715.
 " δ , *muricata* Ledeb., 715.
 " γ , *oblongifolia* W. K., 716.
pedunculata L., 717.
portulacoides L., 717.
prostrata Bouch., 713.
rosea Bab., 712.
rosea L., 710.
 " β , *arenaria* Westerl., 710.
 " δ , *parvifolia* Moq., 711.
serrata Huds., 717.
 " δ , *parvifolia* Moq., 711.
ruderalis Wallr., 713.
stipitata Westerl., 715.
 " var. *longipes* Westerl.,
Atropa, 144.
- Atropa Belladonna* L., 167.
physaloides L., 168.
Avena, 27.
caryophyllea Web., 80.
 " *elatior* L., 83.
 " β , *typica*, 83.
 " α , *vulgaris*, 83.
 " *fatua* L., 81.
flavescens L., 80.
flexuosa M. K., 78.
 " *hybrida* Peterm., 81.
intermedia Lindgr., 81.
 " *orientalis* Schreb., 82.
 " *præcox* Beauv., 80.
 " *pratensis* L., 82.
 " *pubescens* L., 83.
 " *sativa* L., 82.
 " *strigosa* Schreb., 82.
Avenella flexuosa Bluff, 78.
- B.**
Baldingera arundinacea Fl. wett., 65.
Ballota, 428.
alba L., 439.
foetida Lam., 439.
 " β , *alba*, 439.
nigra L., 438—39.
 " β , *borealis*, 439.
 " α , *foetida*, 439.
 " *ruderalis* Sw., 438.
 " β , *nepetoides*! 439.
 " γ , *urticæfolia*, 439.
urticæfolia Ortm., 439.
Barbarea, 474.
parviflora Fr., 493.
præcox R. Br., 494.
stricta Fr., 493.
vulgaris R. Br., 493.
 " β , *arcuata*, 493.
 " γ , *acidula* Hartm., 494.
Bartsia Odontites Sm., 467.
 " β , *littoralis* Rehb., 467.
Batrachium, 403.
circinnatum Fr., 419.
confusum (Gren. & Godr.), 418.
fluitans (Lam.), 420.
hederaceum, Fr., 415.
heterophyllum Fr., 417.
 " β , *crassicaule* Fr., 417.
 " γ , *succulentum* Koch, 418.
hololeucon (Lloyd), 418.
marinum Fr., 419.
peltatum Fr., 417.
 " *sceleratum* (L.), 416.

- Batrachium trichophyllum* Chaix, 418.
Bellis, 561.
 hybrida Ten., 610.
 perennis L., 610.
 " *β*, *caulescens*, 610.
Berberis, 240.
 vulgaris L., 244.
Berteroa, 472.
 incana DC., 483.
Berula angustifolia Koch, 221.
Beta, 149.
 Cicla L., 204.
 maritima L., 204.
 vulgaris L., 204.
 " *α*, *Cicla*, 204.
 " *β*, *rapacea*, 204.
Betonica, 428.
 officinalis L., 440.
 stricta Ait., 440.
Betula, 655.
 alba L., 707.
 Alnus α, L., 706.
 " *β*, *incana* L., 706.
 carpathica Willd., 708.
 glutinosa Wallr., 707.
 odorata Bechst., 707.
 " *β*, *tiliaefolia*, 707.
 " **** *carpathica*, 708.
 " *** *pubescens*, 707.
 odorata Rehb., 707.
 pubescens Ehrh., 707.
 verrucosa Ehrh., 707.
Bidens, 558.
 cernua L., 601.
 " *γ*, *minima*, 601.
 " *β*, *radiata*, 601.
 minima L., 539.
 platycephala Ørst., 600.
 tripartita L., 599.
 " *β*, *minor*, 600.
Blechnum, 751.
 boreale Sw., 762.
 Spicant Roth, 762.
Blitum, 149.
 Bonus Henricus Mey., 209.
 botryoides Drej., 208.
 capitatum L., 207.
 glaucum Koch, 209.
 rubrum Rehb., 208.
 virgatum L., 208.
Blysmus compressus Panz., 44.
 rufus Panz., 44.
Borrago, 143.
 officinalis L., 165.
Botrychium, 752.
 Lunaria Sw., 765.
 " *** *rutaceum* Fr., 765.
 matricariaefolium Braun, 765.
 matricarioides Willd., 765.
 rutaceum Sw., 765.
 rutae-folium Braun, 765.
Brachyolobus amphibius All., 486.
 anceps Drej., 487.
 palustris Drej., 487.
 silvestris Drej., 486.
Brachypodium, 23.
 gracile Beauv., 51.
 " *β*, *majus*, 52.
 loliaceum Fr., 51.
 pinnatum Beauv., 52.
 silvaticum R. S., 52.
Brassica, 474.
 campestris L., 497.
 " *β*, *esculenta* Gren. & Godr., 497.
 lanceolata Lge., 498.
 Napus L., 497.
 " *β*, *oleifera annua*, 497.
 " *α*, *oleifera biennis*, 497.
 " *γ*, *rapifera*, 497.
 nigra Koch, 498.
 oleracea L., 496.
 Rapa L., 497.
 Richeri Lge., 498.
Briza, 28.
 media L., 85.
Bromus, 29.
 arenarius Thom., 101.
 arvensis L., 99.
 arvensis F. D., 99.
 asper Murr., 103.
 commutatus Schrad., 100.
 erectus Huds., 103.
 giganteus L., 97.
 gracilis Schum., 52.
 hordeaceus Whlbg., 101.
 inermis Leyss., 104.
 littoreus Retz., 86.
 mollis L., 101.
 " *β*, *lejostachys*, 101.
 " *γ*, *pygmæus*, 101.
 nanus Weig., 101.
 pinnatus L., 52.
 pratensis Ehrh., 100.
 racemosus L., 100.
 secalinus L., 99.
 serotinus Beneken, 103.
 silvaticus Juss., 52.
 sterilis L., 102.

- Bromus tectorum* L., 102.
triflorus L., 98.
Brunella, 431.
grandiflora Jacq., 455.
vulgaris Mönch., 454.
Bryonia, 658.
γ alba L., 723.
dioeca Jacq., 723.
Bulbocapnos Halleri Drej., 514.
Bulliarda, 109.
aquatica DC., 127.
Bunias, 471.
Cakile L., 476.
γ orientalis L., 476.
Bunium Carvi M. B., 219.
Bupleurum, 152.
rotundifolium L., 217.
tenuissimum L., 216
Butomus, 308.
γ umbellatus L., 308.

C.

- Cakile*, 471.
maritima Scop., 476.
β, integrifolia Horn., 477.
monosperma Lge., 477.
Calamagrostis, 25.
arenaria Roth, 68.
γ arundinacea Roth, 71.
baltica Hartm., 68.
γ Epigejos Roth, 68.
β, glauca, 69.
glauca M. B., 69.
gracilis Schum., 70.
Halleriana DC., 69.
γ lanceolata Roth, 70.
Langsdorfii Trin., 69.
γ neglecta Ehrh., 70.
β, geniculata Fr., 71.
nutans Saut., 69.
phragmitoides Lge., 69.
rubicunda Blytt., 69.
silvatica DC., 71.
stricta Spreng., 70.
Calamintha Acinos Benth., 453.
Clinopodium Benth., 454.
Calendula, 564.
officinalis L., 631.
Calla, 245.
γ palustris L., 272.
Callitriche, 652.
autumnalis L., 662.
hamulata Kütz., 662.
ptatycarpa Kütz., 664.
Callitriche stagnalis Scop., 663.
verna L., Kütz., 662.
α cæspitosa Schultz., 663.
α minima Hopp., 663.
α repens H., 663.
α tenuifolia H., 663.
Calluna, 292.
γ vulgaris Salisb., 302.
β, pubescens Koch, 302.
Caltha, 404.
γ palustris L., 426.
Calystegia sepium R. Br., 175.
Camelina, 472.
dentata Pers., 480.
β, integrifolia, 480.
α, pinnatifida, 480.
γ foetida Fr., 480.
microcarpa Andr., 481.
pinnatifida Horn., 480.
sativa Fr., 480.
β, dentata Horn., 480.
α, silvestris Fr., 480.
sativa Rehb., 481.
γ silvestris Wallr., 480.
β, microcarpa DC., 481.
Campanula, 146.
Cervicaria L., 190.
γ glomerata L., 190.
hederacea L., 190.
γ latifolia L., 189.
patula L., 188.
γ persicæfolia L., 187.
β, calycida, 187.
γ rapunculoides L., 189.
Rapunculus L., 187.
γ rotundifolia L., 188.
α, calycida! 188.
γ, parviflora! 188.
β, stricta Schum., 188.
Trachelium L., 189.
Cannabis, 725.
γ sativa L., 745.
Capsella, 472.
Bursa pastoris L., 479.
Cardamine, 473.
amara L., 491.
β, hirta W. & Gr., 491.
γ, minor Lge., 491.
hirsuta L., 490.
α, campestris Fr., 490.
β, silvestris Fr., 491.
hirsuta F. D., 491.
hirsuta Horn., 490.
α silvatica H., 491.
impatiens L., 489.

- Cardamine intermedia* Horn., 490.
 parviflora L., 498.
 pratensis L., 492.
 " β , *dentata* Koch, 492.
 " δ , *gynocrates* Didr., 492.
 " γ , *parviflora* Bot. For., 492.
 silvatica Link., 490.
 " β , *clandestina* Fr., 491.
Carduus, 558.
 acanthoides L., 592.
 acanthoides Gren. & Godr., 593.
 acaulis L., 597.
 arvensis Curt., 598.
 crispo-acanthoides Lge., 593.
 crispo-nutans Koch, 593.
 crispus L., 592.
 " γ , *ochroleucus*, 592.
 " β , *polyanthemos* Godr., 592.
 heterophyllus L., 597.
 lanceolatus L., 594.
 marianus L., 599.
 multiflorus Gaud., 592.
 nutans L., 593.
 oleraceus Vill., 596.
 palustris L., 595.
 rigens La Chen., 596.
 tenuiflorus Curt., 591.
Carex, 654.
 acuta L., 687.
 aemulans Drej., 688, 703.
 Agastachys Ehrh., 691.
 ampullacea Good., 701.
 " β , *robusta* Sond., 702.
 appropinquata Schum., 676.
 aquatilis Whlbg., 686.
 arenaria L., 675.
 argyroglochin Horn., 680.
 axillaris Good., 683.
 Balbisi Spr., 698.
 biformis β , *fertilis* Schultz., 698.
 " α , *sterilis* Schultz., 699.
 binervis Horn., Drej. 698.
 Boenninghauseniana Whe, 683.
 " β , *subpaniculata*! 683.
 brizoides L., 682.
 Buxbaumii Whlbg., 689.
 cæspitosa L., 684.
 cæspitosa Good., 686.
 canescens L., 681.
 " β , *tenuis* Lang, 681.
 chordorrhiza Ehrh., 674.
 ciliata Willd., 694.
 collina Willd., 693.
 curta Good., 681.
 cyperoides L., 687.
 Carex digitata L., 695.
 dioeca L., 671.
 " β , *isogyna* Fr., 672.
 " γ , *scabriuscula* Hartm., 672.
 distans L., 698.
 distans Wahlenb., 698.
 disticha Huds., 674.
 divisa F. D., 696.
 divulsa Good., 677.
 " β , *intermedia*, 678.
 Drejeri Lang, 685.
 Drymeja Ehrh., 700.
 elongata L., 680.
 ericetorum Poll., 694.
 extensa Good., 697.
 " β , *pumila*, 697.
 filiformis L., 703.
 filiformis Poll., 695.
 flava L., 696.
 " * *lepidocarpa*, 696.
 frisica H. Koch, 687.
 fulva Good., 699.
 glauca Scop., 692.
 " β , *sphærostachya* Lange, 695.
 hirta L., 704.
 " β , *sublævis* Horn., 704.
 hirtæformis Pers., 704.
 Hornschuchiana Hopp., 698.
 incurva Lightf., 675.
 intermedia Good., 674.
 Kochiana DC., 703.
 lepidocarpa Tausch., 696.
 leporina L., 680.
 " β , *argyroglochin*, 680.
 leucoglochin Ehrh., 672.
 limosa L., 689.
 maxima Scop., 691.
 montana L., 693.
 muricata L., 678.
 " β , *virens* 678.
 nemorosa Rebert., 679.
 obtusangula Schum., 701.
 obtusata Schum., 687.
 Oederi Ehrh., 696.
 " * *oedocarpa* And., 697.
 ovalis Good., 680.
 pacifica Drej., 685.
 pallescens L., 690.
 paludosa Good., 702.
 " γ , *depauperata*! 703.
 " β , *elongata* Schum., 703.
 " β , *spadicea* Roth, 703.
 panicea L., 691.
 " β , *sublivida* Hartm., 692.

- Carex paniculata* L., 677.
 " β , simplicior, 677.
 paradoxa Willd., 676.
 pauciflora Lightf., 672.
 pendula Huds., 691.
 pilulifera L., 693.
 " β , *longebracteata*! 694.
 polygama Schk., 689.
 præcox Jacq., 694.
 prolixa Fr., 688.
 Pseudocyperus L., 700.
 pulicaris L., 672.
 recurva Huds., 692.
 remota L., 682.
 riparia Curt., 702.
 " β , *gracilescens*, 702.
 silvatica Huds., 699.
 speirostachya Sm., 698.
 stellulata Good., 679.
 stricta Good., 684.
 strigosa Huds., 690.
 subulata Schum., 689.
 tenuis Schum., 685.
 teretiusecula Good., 675.
 thuringiaca Schk., 693.
 tricostata Fr., 687.
 trinervis Degland., 687.
 turfosa Fr., 685.
 undulata Kunze, 690.
 vesicaria L., 701.
 virens Lam., 678.
 vulgaris Fr., 685.
 " γ , *juncella* Fr., 686.
 " β , *stolonifera* Hartm., 686.
 " δ , *tenuis* Hartm., 686.
 vulpina L., 678.
 " β , *nemorosa*, 679.
Carlina, 558.
 vulgaris L., 599.
Carpinus, 657.
 Betulus L., 720.
Carum, 152.
 Carvi L., 219.
Castanea, 658.
 vesca Gärt., 721.
 vulgaris Lam., 721.
Catabrosa, 28.
 aquatica Beauv., 85.
 " β , *subtilis* Hook., 85.
Cathartolimum pratense Rehb., 502.
Caucalis, 155.
 Anthriscus H., 250.
 daucoides L., 250.
 nodosa Scop., 250.
 scandicina Roth, 251.
Caulinia fragilis Willd., 660.
Centaurea, 563.
 Cyanus L., 650.
 decipiens Thuill., 629.
 Jacea L., 628.
 var. capitata Koch, 629.
 " β , *cuculligera*, 628.
 " γ , *lacera*, 628.
 " δ , *laciniata*, 629.
 montana L., 631.
 nigra L., 629.
 nigrescens Gren. & Godr., 629.
 nigrescens Willd., 629.
 phrygia L., 630.
 Ssabiosa L., 650.
Centaureum Erythræa Rafn, 177.
 inapertum Rafn, 176.
 vulgare Rafn, 177.
Centinodium aviculare Rehb., 278.
Centunculus, 107.
 minimus L., 125.
 " β , *simplex*, 125.
 simplex Horn., 125.
Cephalanthera, 634.
 ensifolia Rich., 644.
 grandiflora Bab., 644.
 Lonchophyllum G. Rehb., 644.
 pallens Rich., 644.
 rubra Rich., 644.
 Xiphophyllum G. Rehb., 644.
Cenhalaria pilosa Gren. & Godr., 111.
Ceramanthe vernalis Rehb., 460.
Cerastium, 312.
 aquaticum L., 349.
 arvense L., 348.
 brachypetalum Desport., 347.
 glomeratum Thuill., 347.
 glutinosum Fr., 346.
 glutinosum Rehb., 346.
 macilentum Aspegr., 347.
 ovale Pers., 347.
 pumilum Curt., 345.
 " β , *abortivum* Lge., 346.
 semidecandrum L., 346.
 " β , *viscidum* Fr., 346.
 strigosum Fr., 347.
 tetrandrum Curt., 345.
 triviale Link., 348.
 viscosum L., 347.
 viscosum Horn., 346.
 viscosum Sm., 348.
 vulgatum L., 348.
 " β , *holosteoides* Fr., 348.
 vulgatum Rehb., 347.
Cerasus avium DC., 566.

Cerasus caproniana DC., 365.
Padus DC., 566.
Ceratophyllum, 657.
apiculatum Cham., 719.
demersum L., 719.
muticum Cham., 719.
oxyacanthum Cham., 719.
submersum L., 719.
Cerefolium sativum Bess., 231.
Chærophyllum, 155.
sativum Lam., 231.
silvestre L., 232.
temulum L., 232.
Chætopora ferruginea Rchb., 35.
Chaiturus Murrubiastrum Rchb., 444.
Chamæmelum inodorum Vis., 612.
Chamænerium, 291.
angustifolium Scop., 294.
Chamæplium officinale Wallr., 499.
Chamonilla discoidea Gay., 614.
Chara, 754.
alopecuroides Del. c., 780.
annulata Wallm., 791.
aspera Willd., 787.
" *δ*, aculeolata, 788.
" *β*, leptophylla, 788.
" *α*, maritima, 787.
" *γ*, stagnalis, 788.
baltica Fr., 785.
" *fastigiata* Wallm., 784.
" *β*, firma, 786.
" *β*, *humilis*, 785.
canescens Lois., 789.
capillacea Wallm., 791.
capitata N. E., 779.
ceratophylla Wallr., 789.
" *α*, macroptila, 790.
" *β*, microptila, 790.
" * *tomentosa*, 790.
condensata Wallm., 789.
contraria A. Br., 782.
crinita Wallm., 789.
crinita Wallr., 788.
" *β*, *condensata*, 789.
" *α*, *leptosperma*, 789.
" *β*, *pachysperma*, 789.
curta Nolt., 788.
distans Wallm., 785.
equisetina Kütz., 783.
fasciculata Amici, 779.
firma Ag., 786.
flexilis L. (Bruzel.), 777.
" *nidifica* Horn., 780.
flexilis Rchb., 777.
foetida A. Br., 781.
" *γ*, *brevibracteata*, 782.

Chara foetida β, *longibracteata*, 782.
" *ε*, *munda*, 782.
" *δ*, *subhispidata*, 782.
" *α*, *vulgaris*, 782.
fragilis Desv., 790.
* *annulata*, 791.
" *ε*, *barbata*, 791.
" *δ*, *capillacea*, 791.
" *β*, *Hedwigii*, 791.
" *γ*, *pulchella*, 791.
gracilis Sm., 776.
Hedwigii Bruzel., 791.
hispidata (L.?) Sm., 783.
" *aspera* H., 787.
" *baltica* H., 785.
" *crinita* H., 788.
" *curta* H., 788.
" *γ*, *echinata*! 784.
" *β*, *gymnoteles*, 785.
" *γ*, *micracantha* A. Br., 783.
" *nigricans* H., 787.
" *pseudocrinita* Coss., 783.
horrida Wallm., 784.
intermedia A. Br., 784.
intricata Trentep., 779.
latifolia Willd., 790.
Liljebladii Wallm., 785.
longibracteata Wallm., 782.
mucronata A. Br., 777.
nidifica Bruzel., 780.
Nolteana A. Br., 786.
papillosa Kütz., 785.
papulosa Wallr., 780.
polyacantha A. Br., 783.
polysperma A. Br., 779.
pulchella Wallr., 791.
spinosa Rupr., 783.
Stenhammariana Wallm., 780.
syncarpa Thuill., 778.
tenuissima Desv., 776.
tomentosa L., 790.
" *β*, *ceratophylla*, 789.
Wallrothii Rupr., 780.
vulgaris α, Wallr., 791.
" L. (part.), 790.
" *b*, *foliosa* Horn., 782.
" *Hedwigii* Horn., 791.
" *pulchella*, 791.
Chelidonium, 401.
laciniatum Willd., 406.
majus L., 406.
" *β*, *crenatum*, 406.
Chenopodina, 149.
maritima Moq., 210.
" *β*, *erecta*, 210.
" *γ*, *vulgaris*, 210.

- Chenopodium*, 149.
 album L., 205.
 " γ , glomerulosum, 206.
 " β , viride, 206.
 Bonus Henricus L., 209.
 Botrys L., 206.
 botryoides Sm., 205.
 ficifolium Sm., 206.
 glaucum L., 209.
 hybridum L., 204.
 maritimum L., 210.
 murale L., 205.
 olidum Curt., 207.
 opulifolium Schrad., 206.
 polyspermum L., 207.
 " β , acutifolium, 207.
 rhombifolium Mühl., 205.
 rubrum L., 208.
 " ϵ , *crassifolium*, 208.
 " δ , *glomeratum*, 208.
 urbicum L., 205.
 " β , *intermedium* Koch, 205.
 viride L., 206.
 Vulvaria L., 207.
Chilochloa Boehmeri Beauv., 67.
Chimaphila uniflora Fr. 319.
Chrysanthemum, 561.
 corymbosum L., 612.
 inodorum L., 612.
 Leucanthemum L., 611.
 " β , *coronopifolium*, 611.
 " γ , *hirsutum*, 612.
 Parthenium Pers., 612.
 segetum L., 611.
Chrysosplenium, 293.
 alternifolium L., 305.
 oppositifolium L., 305.
Cicendia, 107.
 filiformis Rehb., 123.
Cichorium, 555.
 Intybus L., 565.
Cicuta, 152.
 virosa L., 220.
Cineraria, 563.
 alpina γ , L., 627.
 campestris Retz., 627.
 palustris L., 627.
Circæa, 2.
 alpina L., 5.
 " *major* H., 6.
 alpino-lutetiana Mey., 6.
 intermedia Ehrh., 6.
 lutetiana L., 6.
 " *intermedia* Whlbg., 6.
 lutetiano-alpina Mey., 6.
Cirsium, 558.
 acaule All., 597.
 " β , *caulescens*, 597.
 acauli-oleraceum Rehb., 596.
 arvense Scop., 598.
 " γ , *horridum*, 598.
 " δ , *integrifolium*, 598.
 " β , *mite*, 598.
 " ϵ , *semidecurrens*! 598.
 Chailleti Gaud., 595.
 decoloratum Koch, 596.
 Drejeri Rehb., 594.
 heterophyllum All., 597.
 lanceolatum Scop., 594.
 " ** *Drejeri*, 594.
 " * *nemorale*, 594.
 nemorale Rehb., 594.
 oleraceo-acaule Näg., 596.
 oleraceum Scop., 596.
 oleraceo-lanceolatum J. Vahl, 594.
 palustre Scop., 595.
 " β , *putatum* Näg., 595.
 palustri-oleraceum Näg., 595.
Cistus Helianthemum L., 408.
Cladium, 22.
 germanicum M. K., 48.
 Mariscus R. Br., 47.
Clinopodium, 430.
 vulgare L., 454.
Cnicus oleraceus L., 596.
Cnidium, 153.
 venosum Koch, 224.
Cochlearia, 472.
 anglica L., 481.
 Armoracia L., 485.
 Coronopus L., 475.
 danica L., 481.
 " β , *integrifolia* DC., 481.
 officinalis L., 482.
Coeloglossum, 633.
 viride Hartm., 642.
Colchicum, 244.
 autumnale L., 287.
Comarum, 364.
 palustre L., 399.
Conferva nidifica F. D., 780.
Conium, 156.
 maculatum L., 233.
Conringia Thaliana Rehb., 495.
Convallaria, 241.
 bifolia L., 125.
 majalis L., 247.
 multiflora L., 247.
 Polygonatum L., 247.
 verticillata L., 247.

Convolvulus, 145.
 ↗ *arvensis* L., 175.
 ↗ *sepium* L., 175.
 " *β*, *coloratus*! 176.
Conyza squarrosa L., 617.
Corallorhiza, 654.
 ericetorum Drej., 649.
 innata R. B., 649.
 virescens Drej., 649.
Coreopsis Bidens L., 601.
Coriandrum, 156.
 ↗ *sativum* L., 253.
Cornus, 107.
 ↗ *sauguinea* L., 124.
 ↗ *suecica* L., 123.
Coronopus Ruellii All., 475.
Corrigiola, 156.
 ↗ *littoralis* L., 255.
Corvisartia Helenium Mérat, 619.
Corydalis, 507.
 bulbosa Pers., 514.
 ↗ *cava* Schw. & K., 514.
 ↗ *claviculata* Pers., 512.
 digitata Pers., 514.
 ↗ *fabacea* Pers., 513.
 grandifolia Mort., 513.
 Halleri F. D., 513.
 laxa Fr., 514.
 Lobelii Tausch, 513.
 pumila Host, 513.
 " *β*, *latiloba*! 513.
 solida Sm., 514.
Corylus, 657.
 ↗ *Avellana* L., 720.
 ↗ *tubulosa* Willd., 721.
Corynephorus, 27.
 ↗ *canescens* Beauv., 79.
 " *β*, *maritimus* Gren. & Godr., 80.
Cotoneaster, 362.
 ↗ *vulgaris* Lindl., 331.
Cotula, 560.
 coronopifolia L., 606.
 matricarioides Bong., 614.
Crambe, 471.
 ↗ *maritima* L., 477.
Cratægus, 362.
 Aria α, L., 369.
 " *β*, L., 369.
 ↗ *monogyna* Jacq., 367.
 " *β*, *denudata* Schum., 367.
 oxyacantha L., 367.
 oxyacantha Jacq., 367.
 punctata Ait., 368.
 torminalis L., 368.

Crepis, 555.
 ↗ *biennis* L., 570.
 diffusa DC., 571.
 paludosa Münch., 572.
 præmorsa Tausch., 571.
 stricta Schultz., 571.
 tectorum L., 570.
 " *β*, *segetalis* Roth, 571.
 virens L., 571.
 " *γ*, *capillaris* Fr., 571.
 " *β*, *elatior* Drej., 571.
 " *α*, *multicaulis* Kph., 571.
Critamus Falcaria Rehb., 220.
Crocus, 20.
 vernus L., 54.
Cucubalus Behen L., 329.
 maritimus Lam., 330.
 Otites L., 331.
 viscosus L., 332.
Cuscuta, 150.
 densiflora Soy.-Will., 213.
 Epilinum Whe., 213.
 Epithymum Murr., 214.
 " *β*, *Trifolii* Choisy., 214.
 europæa L., 213.
 " *β*, *nefrens* Fr., 214.
 Ligustri Aresch., 214.
 major DC., 213.
 minor DC., 214.
 Schkuhriana Pfeiff., 214.
 Trifolii Bab., 214.
Cydonia, 363.
 vulgaris Pers., 371.
Cynanchum vincetoxicum R. Br., 212.
Cynoglossum, 143.
 Lappula Wallr., 161.
 ↗ *officinale* L., 161.
 Omphalodes L., 161.
Cynosurus, 30.
 cristatus L., 105.
Cyperus, 21.
 flavescens L., 35.
 fuscus L., 35.
Cystopteris, 751.
 fragilis Bernh., 761.
 montana Bernh., 761.
Cytisus, 508.
 Laburnum L., 519.

D.

Dactylis, 29.
 abbreviata Bernh., 104.
 glomerata L., 104.

- Dactylis glomerata* β , abbreviata Drej., 104.
 " γ , lobata Drej., 104.
Daphne, 292.
Mezereum L., 504.
Datura, 144.
 Stramonium L., 171.
Daucus, 155.
 Carota L., 229.
Delphinium, 402.
 Ajaxis autt., 410.
 Consolida L., 410,
 orientale L. Gay., 410.
Dentaria, 473.
 bulbifera L., 488.
Deschampsia caespitosa Beauv., 79.
 Thuillieri Gren. & Godr., 78.
Dianthus, 510.
 Armeria L., 326.
 barbatus L., 327.
 Carthusianorum L., 327.
 deltoides L., 328.
 " β , *glaucus*, 328.
 glaucus L., 328.
 prolifer L., 326.
 superbus L., 328.
 " β , *caespitosus* Drej., 329.
 " γ , *micropetalus* Lge., 329.
Dichostylis fluitans Rehb., 40.
Digitalis, 432.
 purpurea L., 461.
Digitaria, 24.
 ciliaris Koel., 62.
 filiformis Koel., 61.
 glabra, 61.
 humifusa Pers., 61.
 sanguinalis Scop., 62.
 " β , *ciliaris* Gren. & Godr., 62.
 " α , *genuina*, 62.
Digraphis, 24.
 arundinacea Trin., 63.
Diplotaxis, 474.
 tenuifolia DC., 496.
Dipsacus, 106.
 pilosus L., 111.
 silvestris Mill., 112.
Doronicum, 563.
 Pardalianches L., 622.
Draba, 472.
 incana L., 483.
 verna L., 482.
Drosera, 156.
 anglica Huds., 236.
 intermedia Hayne, 237.
 longifolia L., 256.
 " β , *obovata*, 236.
 obovata M. K., 236.
 rotundifolia L., 256.
 " β , *bracteata* Lgby., 256.

 E.
Echinochloa, 24.
 Crus galli Beauv., 63.
Echinops, 564.
 sphærocephalus L., 632.
Echinopsilon hirsutum Moq., 210.
Echinosperrum, 143.
 Lappula Lehm., 161.
Echium, 142.
 vulgare L., 158.
Elatine, 293.
 Alsinastrium L., 307.
 Hydropiper L., 307.
 " α , *gyrosperra*, 307.
 " β , *orthosperra*, 307.
Eleocharis, 21.
 acicularis R. Br., 38.
 multicaulis Sm., 38.
 palustris R. Br., 37.
 uniglumis Lk., 37.
Elsholzia, 429.
 cristata Willd., 451.
Elymus, 23.
 arenarius L., 60.
 " β , *minor*, 60.
 caninus L., 56.
 europæus L., 59.
Empetrum, 724.
 nigrum L., 743.
Endymion, 241.
 nutans Dumort., 249.
Enodium, 28.
 coeruleum Gaud., 84.
 " β , *altissimum* Lk., 84.
 " δ , *divaricatum* Lge., 793.
 " γ , *viviparum*, 84.
Epilobium, 291.
 angustifolium L., 294.
 hirsutum L., 298.
 " β , *micranthum*! 299.
 hirsutum β , L., 298.
 montanum L., 295.
 nudum Schum., 294.
 palustre L., 295.
 parviflorum Schreb., 298.
 pubescens Roth, 298.
 " β , *subglabrum* Koch, 298.
 purpureum Fr., 297.
 rivulare Whlbg., 298.

- Epilobium roseum* Schreb., 294.
roseo-pubescens Lge., 299.
tetragonum L., 297.
 " β , *obscurem* Schreb., 297.
virgatum Fr., 296.
Epipactis, 654.
atrорubens Hoffm., 645.
ensifolia Sw., 644.
Helleborine 1, microphylla, 645.
 " 2, *rubiginosa*, 646.
 " 3, *varians*, 645.
 " 4, *viridans*, 645.
latifolia All., 645.
media Fr., 645.
microphylla Ehrh., 646.
pallens Sw., 644.
palustris Crtz., 645.
 rubiginosa Gaud., 646.
 rubra All., 644.
 viridiflora Irm., 646.
Epipogium Gmelini Rich., 645.
Epipogon Gmel., 634.
aphyllum Sw., 643.
Equisetum, 753.
 arvense L., 771.
 " γ , *decumbens* Mey., 771.
 " δ , *nemorosum* Braun, 771.
 " β , *serotinum* Mey., 771.
 eburneum Roth, 772.
 fluviatile L., 774.
 hiemale L., 774.
 limosum L., 774.
 " * *fluviatile* H., 774.
 " β , *polystachyon*, 774.
 palustre L., 773.
 " γ , *arenarium*, 773.
 " β , *polystachyon*, 773.
 tenue Doell., 774.
 pratense Ehrh., 773.
 silvaticum L., 773.
 Telmateja Ehrh., 772.
 " β , *serotinum*, 772.
 umbrosum Willd., 772.
 " β , *ramulosum*, 773.
 variegatum Schl., 773.
Eranthis, 404.
hiemalis Salisb., 426.
Erica, 292.
 Tetralix L., 302.
 vulgaris L., 302.
Erigeron, 562.
 acris L., 620.
 " β , *strictus*, 620.
 canadensis L., 620.
 speciosus DC., 621.
Eriophorum, 21.
 alpinum L., 47.
 angustifolium Roth, 46.
 gracile Koch, 45.
 latifolium Hopp., 46.
 polystachyon L. (α , β), 46.
 " γ , 45.
 triquetrum Hopp., 45.
 vaginatum L., 47.
Erodium, 309.
 cicutarium L'Her., 319.
 pimpinellæfolium Willd., 319.
Erophila vulgaris DC., 482.
Ervum, 509.
 hirsutum L., 530.
 tetraspermum L., 530.
Eryngium, 151.
 campestre L., 215.
 maritimum L., 215.
Erysimum, 474.
 Alliaria L., 500.
 Barbarea L., 493.
 cheiranthoides L., 492.
 hieraciifolium L., 492.
 officinale L., 499.
 præcox Sm., 494.
 strictum Fl. Wett., 492.
Erythræa, 145.
 Centaurium Pers., 177.
 linarifolia Pers., 177.
 " *minor* Hartm., 177.
 littoralis Fr., 177.
 pulchella Fr., 176.
 ramosissima Pers., 176.
Esmarchia cerastoides Rchb., 345.
Euonymus, 107.
 europæus L., 124.
Eupatorium, 558.
 cannabinum L., 601.
Euphorbia, 653.
 Esula L., 665.
 exigua L., 664.
 Helioscopia L., 664.
 Lathyris L., 665.
 Peplus L., 665.
 segetalis L., 665.
Euphrasia, 433.
 gracilis Fr., 467.
 Odontites L., 468.
 officinalis L., 466.
 parviflora Fr., 466.
 " β , *curta* Fr., 467.
 " α , *imbricata*, 467.
Euzolus viridis Moq., 704.
Exacum filiforme Willd., 123.

F.

- Faba vulgaris* Mönch, 530.
Fagopyrum, 295.
 esculentum Moench, 306.
 tataricum Gärtn., 305.
Fagus, 658.
 Castanea L., 721.
 silvatica L., 721.
Falcaria, 152.
 Rivini Host, 220.
Farsetia incana R. Br., 483.
Fedia dentata Wallr., 32.
 eriocarpa Rehb., 33.
 olitoria Vahl, 32.
Festuca, 29.
 arenaria Osb., 95.
 arundinacea Liljebl., 76.
 arundinacea Schr., 96.
 aspera M. K., 103.
 borealis M. K., 76.
 bromoides L., 98.
 decumbens L., 77.
 dumetorum L., 95.
 duriuscula L., 94.
 " *β, cæsia* Fr., 94.
 elatior L., 96.
 elatior Sm., 96.
 elongata Ehrh., 793.
 erecta Wallr., 103.
 fluitans L., 88.
 gigantea Vill., 97.
 " *β, triflora*, 97.
 glauca F. D., 95.
 glauca Lam., 94.
 gracilis Moench, 52.
 hirsuta F. D., 95.
 littorea Whlbg., 96.
 " *β, pauciflora* Hartm., 97.
 lohiacea Huds., 51.
 lohiacea F. D., 95.
 nemorum Leyss., 95.
 ovina L., 93.
 " *γ, glauca* Fr., 94.
 " *β, tenuifolia*, 94.
 pinnata Moench, 52.
 pratensis Huds., 96.
 " *β, pseudololiacea* Fr., 96.
 rubra L., 94.
 " *β, arenaria* Fr., 95.
 " *- cæsia* Fr., 95.
 " *α, genuina*, 95.
 " *β, dumetorum*, 95.
 sabulicola L. Duf., 95.
 sciuroides Roth, 98.
 Festuca silvatica Vill., 97.
 speciosa Schreb., 104.
 tenuifolia Sibth., 94.
Ficaria, 403.
 ranunculoides Moench, 425.
Filago, 560.
 apiculata Sm., 610.
 arvensis L., 609.
 canescens Jord., 609.
 lutescens Jord., 610.
 germanica L., 609.
 minima Fr., 608.
 montana L., 609.
 montana F. D., 608.
Flumina, 26.
 arundinacea Fr., 76.
Fragaria, 364.
 collina Ehrh., 392.
 elatior Ehrh., 392.
 grandiflora Ehrh., 392.
 sterilis L., 393.
 vesca L., 392.
 virginiana Ehrh., 392.
Fraxinus, 2.
 excelsior L., 4.
Fritillaria, 241.
 Meleagris L., 249.
Fumaria, 507.
 bulbosa α, γ, L., 514.
 bulbosa β, L., 513.
 capreolata L., 511.
 claviculata L., 512.
 officinalis L., 511.
 " *β, densiflora* Parl., 511.
 " *γ, floribunda* Hamm., 511.
 " *β, minor* Hamm., 511.
 Vaillantii Lois., 511.

G.
Gagea, 242.
 arvensis Schult., 251.
 lutea Schnlt., 252.
 minima Schult., 251.
 spathacea Schult., 250.
 stenopetala Rehb., 252.
 " *β, bifolia* Koch, 252.
Galanthus, 240.
 nivalis L., 245.
Galeobdolon, 428.
 luteum Huds., 443.
Galeopsis, 428.
 angustifolia Ehr., 435.
 bifida Boenn., 436.
 cannabina Roth, 436.

- Galeopsis dubia* Leers., 434.
Galeobdolon L., 443.
intermedia Vill., 435.
Ladanium L., 435.
 ▪ *β*, *angustifolia* W. Gr., 435.
 ▪ *α*, *latifolia* W. Gr., 435.
latifolia Hoffm., 435.
ochroleuca Lam., 434.
pubescens Bess., 436.
Reichenbachii Reut., 436.
Tetrahit L., 435.
 ▪ *β*, L., 436.
versicolor Curt., 436.
Galinsoga, 561.
parviflora Cav., 616.
Galium, 107.
Aparine L., 118.
 ▪ *γ*, *confertum* Westerlund, 119.
 ▪ *γ*, *infestum* W. K., 119.
 ▪ *γ*, *marinum*, 119.
 ▪ *β*, *tenerum*, 119.
Bocconi All., 116.
boreale L., 113.
 ▪ *hyssopifolium*, 113.
 ▪ *latifolium*, 113.
decolorans Gren. & Godr., 115.
elatum Thuill., 114.
elongatum Presl., 117.
eminens Gren., 116.
erectum Huds., 115.
 ▪ *β*, *rigidum*, 115.
glaucum F. D., 114.
hercynicum Weig., 117.
infestum W. K., 119.
insubricum Gaud., 114.
laeve Thuill., 116.
Mollugo L., 114.
 ▪ *β*, *ochroleucum*, 114.
 ▪ *γ*, *umbrosum*, 114.
palustre L., 117.
pusillum Sm., 116.
saxatile L., 117.
silvaticum L., 114.
silvaticum Drej., 114.
silvestre Poll., 116.
 ▪ *α*, *glabrum* Schrad., 116.
 ▪ *β*, *hirtum* Koch, 116.
 ▪ *γ*, *supinum* Gaud., 116.
spurium L., 119.
 ▪ *β*, *Vaillantii*, 119.
tenerum Schleich., 119.
tricornis With., 119.
uliginosum L., 118.
Vaillantii DC., 119.
Galium verum L., 115.
 ▪ *γ*, *altissimum*, 116.
 ▪ *β*, *effusum*, 115.
 ▪ *δ*, *littorale* Lge., 116.
Genista, 508.
 anglica L., 517.
 germanica L., 518.
 pilosa L., 518.
 tinctoria L., 518.
Gentiana, 145.
 Amarella L., 177.
 campestris L., 178.
 Centaurium L. (*α*, *β*), 176—77.
 filiformis L., 123.
 germanica L., 178.
 lingulata Ag., 178.
 Pneumonanthe L., 178.
 pulchella Sw., 176.
 uliginosa Willd., 178.
Geranium, 508.
 cicutarium L., 319.
 columbinum L., 317.
 dissectum L., 317.
 lividum L'Herit. 315.
 lucidum L., 318.
 molle L., 317.
 palustre L., 315.
 phæum L., 315.
 ▪ *β*, *lividum* Koch, 315.
 pratense L., 314.
 pusillum L., 316.
 pyrenaicum L., 315.
 robertianum L., 318.
 ▪ *β*, *rubricaulis* H., 318.
 rotundifolium L. Sp., 316.
 rotundifolium L. fl. Su., 316.
 ▪ *β*, *minus* Fr., 316.
 sanguineum L., 313.
 silvaticum L., 314.
 viscidulum Fr., 316.
Geum, 364.
 intermedium Ehrh., 399.
 rivale L., 400.
 ▪ *hybridum* Horn., 400.
 urbanum L., 399.
Githago segetum Desf., 342.
Glaucium, 401.
luteum Scop., 406.
Glaux, 148.
 maritima L., 102.
Glechoma, 429.
hederaceum L., 444.
Glyceria, 28.
 airoides Rehb., 85.
 aquatica Presl., 85.

Glyceria aquatica Whlbg. 87.
arundinacea Fr., 76.
Catabrosa Kl. & R., 85.
distans Whlbg., 86.
 " β , *pulvinata*, 87.
fluitans M. K., 88.
 " α , *acutiflora* Doell., 88.
 " δ , *obtusiflora* Sond., 87.
 " β , *triticea* Fr., 88.
lobiacea Gren. & Godr., 51.
maritima M. K., 85.
 " β , *anomala* Lge., 86.
plicata Fr., 87.
 " β , *triticea*, 88.
spectabilis M. K., 87.
Gnaphalium, 560.
 " *arenarium* L., 606.
arvense Willd., 609.
dioecum L., 608.
germanicum Willd., 609.
luteo-album L., 606.
montanum Willd., 608.
nudum Hoffm., 607.
rectum Sm., 608.
silvaticum L., 608.
 " *uliginosum* L., 607.
 " γ , *glabrum* Koch, 607.
Gratiola, 3.
officinalis L., 17.
Gymnadenia, 633.
albida Rich., 640.
conopsea R. Br., 640.
Gypsophila, 310.
muralis L., 328.
serotina Rehb., 325.
Vaccaria Sibth., 325.

H.

Habenaria albida R. Br., 640.
Helianthus, 311.
peplodes Fr., 337.
Haloscias, 153.
scoticum Fr., 223.
Halymus, 656.
 " *pedunculatus* Wallr., 717.
portulacoides Wallr., 717.
Hedera, 148.
Helix L., 201.
Hedysarum Onobrychis L., 522.
Heleocharis Bæothryon Drej., 39.
Heleochloa aquatica Fr., 87.
distans Drej., 86.

Helianthemum, 401.
 " *vulgare* Gärtn., 408.
Helianthus, 563.
 " *tuberosus* L., 631.
Helichrysum arenarium DC., 606.
Helleborine latifolia F. D. 645.
Helleborus, 409.
hiemalis L., 426.
 " *viridis* L., 427.
Helosciadium, 152.
inundatum Koch, 217.
repens Koch, 217.
Hepatica nobilis Rehb., 411.
triloba Chaix, 411.
Heracleum, 154.
sibiricum L., 226.
 " *australe* Hartm., 226.
 " *Sphondylium* L., 226.
 " β , *elegans* Koch, 226.
Herminium, 635.
Monorchis R. Br., 642.
Herniaria, 149.
 " *glabra* L., 205.
 " β , *subciliata* Bab., 203.
hirsuta L., 203.
Hesperis, 475.
inodora L., 488.
 " *matronalis* L., 488.
Hieracium, 556.
anfractum Fr., 578.
aurantiacum L., 574.
Auricula L., 573.
boreale Fr., 581.
 " β , *angustifolium* Fr., 582.
cæsium Fr., 577.
 " β , *nemorum* Fr., 577.
collinum Rehb., 574.
cymigerum Rehb., 575.
cymosum L., 575.
dubium H., 574.
glomeratum macilentum Fr., 575.
gothicum Fr., 580.
incisum Koch, 576.
 " *integrifolium* Lge., 576.
 " *murorum* L., 575.
 " γ , *incisum* Fr., 576.
 " *integrifolium* H. N., 576.
 " β , *rotundatum* Kit., 576.
 " *silvaticum* L., 576.
 " *silvaticum* F. D., 579.
 " *subcæsium* Fr., 576.
Nestleri Vill., 575.
paludosum L., 574.
 " *Pilosella* L., 572.
 " *pilosissimum* Fr., 573.

Hieracium poliotrichum Rehb., 575.
præmorsum L., 572.
 † *pratense* Tausch, 574.
ramosum W. & K., 578.
rigidum Hartm., 580.
 " *β*, *tridentatum*, 579.
rotundatum Kit., 576.
sabaudum F. D., 582.
silvaticum Lam., 578.
Taraxaci L., 587.
tridentatum Fr., 579.
 " *β*, *angustifolium* Fr., 579.
 " *β*, *asperum* Fr., 580.
 " *γ*, *integrifolium* Fr., 579.
 † *umbellatum* L., 582.
 " *δ*, *coronopifolium*, 582.
 " *ε*, *dunense*, 582.
 " *β*, *filifolium*, 582.
 " *γ*, *humile*, 582.
 " *β*, *villosum*, 582.
vulgatum Fr., 578.
 " *β*, *angustifolium* Fr., 758.
 * *integrifolium* Fr., 576.
 " *irriguum* Rehb., 580.
 " *γ*, *latifolium* Fr., 578.
 " *δ*, *ramosum* Fr., 578.
Hierochloa, 26.
 † *borealis*, R. S., 75.
Himantoglossum viride Drej., 642.
Hippoglossum maritimum Hartm., 159.
Hippophaë, 725.
 † *rhamnoides* L., 744.
Hippuris, 1.
 vulgaris L., 2.
 " *β*, *fluitans* Lilj., 2.
Holcus, 26.
 avenaceus Scop., 83.
 lanatus L., 76.
 mollis L., 76.
 odoratus L., 75.
Holosteum, 30.
 umbellatum L., 105.
Honkenya peploides Ehrh., 337.
Hordeum, 23.
 distichon L., 58.
 hexastichon L., 58.
 maritimum With., 58.
 murinum L., 59.
 polystichum Doell., 57.
 " *β*, *hexastichon* Doell., 58.
 " *α*, *vulgare* Doell., 57.
 pratense Huds., 58.
 secalinum Schreb., 58.
 silvaticum Huds., 59.

Hordeum vulgare L., 57.
Hottonia, 146.
 palustris L., 183.
Humulus, 725.
 Lupulus L., 745.
Hyacinthus botryoides L., 249.
 non scriptus L., 249.
Hydrocharis, 727.
 Morsus ranæ L., 749.
Hydrocotyle, 151.
 vulgaris L., 215.
Hyoscyamus, 144.
 agrestis Kit., 171.
 niger L., 170.
 " *β*, *agrestis* Fr., 171.
Hyoseris minima L., 565.
Hypericum, 550.
 dubium Leers., 552.
 hirsutum L., 553.
 humifusum L., 551.
 montanum L., 552.
 perforatum L., 551.
 " *β*, *angustifolium*, 551.
 pulehrum L., 553.
 quadrangulum L., 552.
 quadrangulum F. D., 552.
 tetragonum (Fr.), 552.
 tetrapterum Fr., 552.
Hypochoeris, 556.
 glabra L., 583.
 † *maculata* L., 583.
 " *β*, *Mülleri* Lge., 584.
 radicata L., 583.

I.

Jacobæa aquatica Drej., 625.
 paludosa Fl. wett., 626.
 sarracenica Moench, 626.
 vulgaris Moench, 625.
Jasione, 147.
 montana L., 191.
 " *β*, *littoralis* Fr., 191.
Iberis nudicaulis L., 477.
Ilex, 109.
 † *Aquifolium* L., 127.
 " *β*, *integrifolia*, 127.
Illecebrum, 148.
 verticillatum L., 202.
Impatiens, 147.
 Noli tangere L., 198.
 parviflora DC., 199.
Imperatoria, 154.
 † *Ostruthium* L., 225.

Intybus præmorsus Fr., 572.
Inula, 562.
 Britannica L., 618.
 Conyza DC., 617.
 dysenterica L., 617.
 Helenium L., 619.
 pulicaria L., 617.
 salicina L., 619.
Iris, 20.
 Pseudacorus L., 34.
 spuria L., 34.
Isatis, 471.
 tinctoria, 475.
Isoëtes, 752.
 echinospora DR., 770.
 lacustris L., 769.
 β, *falcata*, 770.
Juglans, 658.
 regia L., 722.
Juncus, 242.
 acutiflorus Ehrh., 263.
 β, *macrocephalus* Koch, 263.
 alpinus Vill., 265.
 β, *rariflorus*, 265.
 anceps Laharp., 265.
 articulatus L., 264.
 β, *subatratus*, 264.
 atratus Krock, 265.
 atratus H. N., 264.
 atricapillus Drej., 264.
 α, *congestus*, 264.
 β, *sparsiflorus*, 264.
 balticus Willd., 262.
 ** inundatus*, 262.
 bottnicus Whlbg., 267.
 bufonius L., 268.
 β, *fasciculatus* K., 268.
 bulbosus L., 266—67.
 β, *maritimus* H., 267.
 campestris L., 272.
 capitatus Weig., 269.
 communis Mey., 261.
 compressus Jacq., 267.
 conglomeratus L., 260.
 diffusus Hopp., 261.
 effusus L., 261.
 β, *compactus* Leight., 261.
 γ, *prolifer* Sond., 261.
 filiformis L., 262.
 Gerardi Lois., 267.
 glaucus Ehrh., 261.
 insularis Viv., 269.
 inundatus Drej., 262.
 lagenarius Laharp., 264.

Juncus lamprocarpus Ehrh., 264.
 δ, *multiflorus*, 264.
 γ, *pauciflorus*, 264.
 β, *repens*, 264.
 maritimus Lam., 260.
 nigricans Rchb., 265.
 nigritellus D. Don., 264.
 obtusiflorus Ehrh., 263.
 pilosus α, L., 270.
 pilosus δ, L., 270.
 pygmæus Thuill., 269.
 repens Nolt., 264.
 repens Req., 264.
 retroflexus Rafn., 263.
 silvaticus Reich., 263.
 squarrosus L., 266.
 subuliflorus Drej., 261.
 subverticillatus Wulf., 266.
 supinus Moench, 266.
 γ, *fluitans*, 266.
 β, *repens*, 266.
 γ, *terrestris*, 266.
 Tenageja Ehrh., 268.
 tenuis Willd., 267.
 triandrus Rchb., 269.
 uliginosus Roth, 266.
 ustulatus Hopp., 265.
Juniperus, 726.
 communis L., 746.

K.

Knautia, 106.
 arvensis Coult., 110.
 β, *campestris*, 110.
Kochia, 150.
 hirsuta Nolt., 210.
Koeleria, 27.
 cristata Pers., 77.
 glauca DC., 77.

L.

Lactuca, 555.
 macrophylla, 568.
 muralis Fresen., 567.
 Plumieri Gren. & Godr., 568.
 sativa L., 568.
 Scariola L., 567.
Lalia orientalis Desv., 476.
Lamium, 428.
 album L., 440.
 β, *integrifolium*, 440.
 γ, *roseum* Lge., 441.

Lamium amplexicaule L., 442.
 " β , *clandestinum*, 442.
 confertum Fr., 442.
Galeobdolon Crantz., 443.
 garganicum L., 441.
 incisum Willd., 442.
 intermedium Fr., 442.
 maculatum L., 441.
 parietariæfolium Benth., 440.
 purpureum L., 441.
Lampsana, 554.
 communis L., 564.
Lappa, 557.
 intermedia Lge., 589.
 major Gärtn., 590.
 " β , *subtomentosa* Lge., 590.
 minor DC., 589.
 " *campestris* Fr., 589.
 officinalis All., 590.
 tomentosa Lam., 588.
 " β , *denudata* Lge., 588.
Lapsana communis L., 564.
Larix, 653.
 europæa DC., 667.
Laserpitium, 155.
 latifolium L., 229.
 " β , *asperum*, 229.
 " γ , *tenuissimum* Lge., 229.
Lastræa, 751.
 cristata Presl., 759.
 dilatata Presl., 760.
 Filix mas Presl., 759.
 " β , *erosa*, 759.
 " γ , *lepidota* Lge., 759.
 Oreopteris Presl., 758.
 spinulosa Presl., 760.
 " * *dilatata*, 760.
 Thelypteris Presl., 758.
Lathræa, 453.
Squamaria L., 468.
Lathyrus, 509.
 Aphaca L., 531.
 heterophyllus L., 534.
 latifolius H., 534.
 macrorrhizus Wimm., 535.
 maritimus Fr., 535.
 " β , *acutifolius* Bab., 533.
 niger Wimm., 535.
 palustris L., 533.
 pratensis L., 532.
 " β , *villosus* Drej., 532.
 silvestris L., 534.
 " β , *platyphyllus*, 534.
 " γ , *stenophyllus* Lge., 534.
 tuberosus L., 552.

Lathyrus vernus Wimm., 535.
Leersia, 23.
 oryzoides Sw., 60.
Lemna, 654.
 gibba L., 668.
 " β , *major* Koch, 669.
 minor L., 668.
 " * *tenella*, 668.
 polyrrhiza L., 668.
 trisulca L., 668.
Leontodon, 557.
 autumnalis L., 587.
 " γ , *coronopifolius*, 587.
 " δ , *nigro-lanatus*, 587.
 " β , *salinus*, 587.
 corniculatus Kit., 566.
 hastilis L., 587.
 hirtus L., 586.
 hirtus F. D., 584.
 hispidus L., 587.
 obliquus F. D., 566.
 palustris Sm., 566.
 Taraxaci Lois., 587.
 Taraxacum L., 566.
 " 3 *obliquus* Fr. 566.
 " 1 *palustris* Fr., 566.
Leonurus, 429.
 Cardiaca L., 443.
 Marrubiastrum L., 444.
Lepidium, 471.
 campestre R. Br., 478.
 latifolium L., 499.
 ruderales L., 478.
 sativum L., 477.
Lepigonum, 311.
 fasciculare Lönnr., 336.
 lejospermum Kdbg., 335.
 " α , *cymosum*, 335.
 " β , *racemosum*, 335.
 marinum Wahlb., 336.
 " β , *fasciculare*, 336.
 medium Fr., 335.
 neglectum Kindb., 334.
 rubrum Fr., 333.
 " β , *arenarium*, 334.
 " α , *campestre* Fenzl., 334.
 " β , *pingue* Fenzl., 334.
 " β , *radicans* Kdbg., 334.
 salinum Kdbg., 334.
 salinum Fr., 335.
Lepturus, 22.
 filiformis Trin., 48.
 " α , *strictus* Lge., 49.
 " β , *subcurvatus* Lge., 49.
 incurvatus Drej., 48.

- Lepturus incurvatus* Trin., 49.
Leucanthemum vulgare Lam., 611.
Leucojum, 240.
 æstivum L., 246.
Levisticum, 154.
 officinale Koch, 227.
Libanotis, 153.
 montana All., 223.
 vulgaris DC., 223.
Ligusticum Levisticum L., 227.
 scoticum L., 223.
Ligustrum, 3.
 vulgare L., 7.
Lilium, 241.
 bulbiferum L., 250.
 Martagon L., 250.
Limnanthemum, 145.
 nymphoides Hffg. & Lk., 179.
Limnorchloa alpina Drej., 47.
 cæspitosa Rehb., 40.
Limodorum Epipogium Sw., 643.
Limosella, 452.
 aquatica L., 457.
 β, *minor*, 457.
 borealis Less., 457.
Linaria, 452.
 Cymbalaria Mill., 459.
 Elatine Mill., 459.
 genistæfolia Mill., 458.
 minor Desf., 458.
 spuria Mill., 458.
 vulgaris Mill., 457.
Linnæa, 431.
 borealis L., 456.
Linum, 501.
 catharticum L., 502.
 β, *condensatum* M. Lange, 502.
 Radiola L., 127.
 usitatissimum L., 502.
Listera, 634.
 cordata R. Br., 648.
 ovata R. Br., 647.
Lithospermum, 142.
 arvense L., 159.
 officinale L., 158.
Littorella, 655.
 lacustris L., 705.
Lobelia, 146.
 Dortmanna L., 186.
Lolium, 22.
 arvense H., 50.
 arvense With., 51.
 Bouchéanum Kth., 50.
 festucaceum Link., 51.
Lolium Halleri Gmel., 50.
 italicum A. Br., 50.
 Linicola Sond., 50.
 perenne L., 49.
 γ, *aristatum*, 50.
 α, *vulgare*, 50.
 β, *tenue* H., 50.
 temulentum L., 50.
 tenue L., 50.
Lomaria Spicant Desv., 762.
Lonicera, 147.
 Periclymenum L., 191.
 Xylosteum L., 191.
Lotus, 510.
 corniculatus L., 536.
 angustifolius H., 537.
 γ, *carnosus* Pers., 537.
 silvaticus H., 536.
 β, *villosus* Thuill., 537.
 major Scop., 536.
 maritimus L., 537.
 tenuifolius Rehb., 537.
 tenuis Kit., 537.
 uliginosus Schk., 536.
Lunaria, 472.
 annua L., 484.
 biennis Moench, 484.
 rediviva L., 484.
Luzula, 242.
 albida DC., 271.
 campestris DC., 272.
 β, *erecta*, 271.
 β, *pallescens*, 271.
 congesta Lej., 271.
 erecta Desv., 271.
 Forsteri DC., 270.
 maxima DC., 270.
 multiflora Lej., 271.
 γ, *congesta*, 271.
 β, *pallescens*, 271.
 pilosa Willd., 270.
 β, *simplex*, 270.
 silvatica Gaud., 270.
 vernalis DC., 270.
Lychnis, 312.
 dioeca α, L., 345.
 dioeca β, L., 345.
 diurna Sibth., 345.
 Flos cuculi L., 344.
 pratensis Rafn., 345.
 silvestris Rafn., 345.
 Viscaria L., 344.
Lycium, 144.
 barbarum L., 170.
 vulgare Dun., 170.

- Lycopodium*, 732.
 alpinum L., 767.
 annotinum L., 767.
Chamæcyparissus Br., 768.
 ✓ *clavatum* L., 768.
 complanatum L., 767.
 inundatum L., 766.
 sabinaefolium Willd., 768.
 selaginoides L., 768.
 Selago L., 766.
Lycopsis arvensis L., 166.
Lycopus, 3.
 ✓ *europæus* L., 7.
Lysimachia, 146.
 ✓ *nemorum* L., 185.
 ✓ *nummularia* L., 184.
 punctata Jacq., 184.
 ✓ *thyrsiflora* L., 183.
 ✓ *vulgaris* L., 184.
Lythrum, 358.
 ✓ *Salicaria* L., 359.

M.

- Majanthemum*, 108.
 ✓ *bifolium* DC., 125.
 Convallaria Web., 125.
Majorana hortensis Mch., 452.
Malachium, 312.
 aquaticum Fr., 349.
 " *β*, *saxatile* Fr., 349.
Malaxis, 635.
 Loeselii Sw., 650.
 paludosa Sw., 650.
Malus silvestris Mönch., 370.
Malva, 502.
 ✓ *Alcea* L., 505.
 " *β*, *fastigiata*, 505.
 borealis Wallm., 507.
 excisa Rehb., 505.
 fastigiata Cav., 505.
 mauritanica L., 506.
 ✓ *moschata* L., 505.
 nicæensis All., 506.
 pusilla With., 507.
 rotundifolia L., Fr., 506, 507.
 ✓ *silvestris* L., 506.
 ✓ *vulgaris* Fr., 506.
Marrubium, 427.
 vulgare L., 454.
Maruta Cotula Cass., 614.
Matricaria, 561.
 ✓ *Chamomilla* L., 613.
 discoidea DC., 614.

- Matricaria inodora* L., 612.
 " *ambigua* Fr., 613.
 " ** *borealis* Hn., 613.
 " * *salina*, 613.
 maritima L., 613.
 Parthenium L., 612.
Medicago, 510.
 ✓ *falcata* L., 558.
 ✓ *lupulina* L., 539.
 " *β*, *Willdenowiana*, 539.
 maculata Willd., 540.
 ✓ *minima* Lam., 539.
 ornithopodioides Fr., 540.
 polymorpha μ, *minima* L., 539.
 ✓ *sativa* L., 538.
Melampyrum, 452.
 arvense L., 464.
 cristatum L., 463.
 nemorosum L., 464.
 pratense L., 464.
 silvaticum L., 465.
Melandrium, 311.
 ✓ *diurnum* Fr., 343.
 " *β*, *expallens*, 343.
 ✓ *noctiflorum* Fr., 344.
 ✓ *vespertinum* Fr., 343.
 " *γ*, *coloratum* Rostr., 343.
 " *β*, *laciniatum* Lge., 343.
Melica, 26.
 coerulea L., 84.
 ✓ *nutans* L., 75.
 ✓ *uniflora* Retz., 75.
Melilotus, 510.
 ✓ *alba* Lam., 540.
 ✓ *arvensis* Wallr., 541.
 ✓ *dentata* Willd., 541.
 macrorrhiza Pers., 541.
 officinalis Willd., 541.
 officinalis Lam., 541.
 ornithopodioides H., 540.
 Petitpierreana Rehb., 541.
 vulgaris Willd., 540.
Melissa, 430.
 officinalis L., 454.
Mentha, 429.
 acutifolia Sm., 449.
 aquatica L., 448.
 " *A*, *capitata* Fr., 448.
 " *B*, *subspicata* Aresch., 448.
 " *C*, *verticillata* Fr., 448.
 " *δ*, *acutifolia*, 449.
 " *γ*, *brevifolia*, 449.
 " *β*, *glabrata*, 449.
 " *ε*, *latifolia*, 449.
 " *α*, *vulgaris*, 449.

Mentha arvensis L., 450.
 " γ , glabriuscula, 450.
 " β , parietariæfolia, 450.
 " δ , riparia, 451.
gentilis L., 449.
 " β , Agardhiana, 450.
gracilis Sole, 450.
hirsuta aquatica H., 448.
 " *sativa* H., 448.
palustris Rehb., 448.
pratensis Sole, 449.
Pulegium L., 451.
pyramidalis Lloyd., 448.
rotundifolia L., 446.
sativa L., 449.
sativa Fr. 448, 450.
silvestris L., 447.
viridis L., 447.
Menyanthes, 145.
nymphoides L., 179.
trifoliata L., 179.
Mercurialis, 727.
annua L., 749.
perennis L., 748.
Mertensia maritima Don., 159.
Mespilus Cotoneaster L., 368.
monogyna Willd., 367.
Oxyacantha Gärtn., 367.
oxyacanthoides Thuill., 367.
Microcala filiformis Lk., 123.
Milium, 26.
effusum L., 74.
Mimulus, 452.
luteus L., 462.
Moehringia, 511.
trinervia Clairv., 358.
Molinia coerulea Mönch, 84.
littoralis Host, 84.
Moneses grandiflora Salisb., 319.
Monotropa, 292.
glabra Bernh., 301.
hirsuta Nolt., 301.
Hypophegea Wallr., 301.
Hypopitys Wallr., 301.
 " β , *glabra*, 301.
 " α , *hirsuta*, 301.
Montia, 20.
fontana L., 33.
 " β , *major* F. D., 33.
lamprosperma Cham., 33.
minor Gmel., 33.
rivularis Gmel., 33.
Morus, 655.
alba L., 708.
nigra L., 708.

Mulgedium Plumieri DC., 568.
Muscari, 241.
botryoides Mill., 249.
Myagrum paniculatum L., 475.
sativum L., 480.
Mycelis muralis Rehb., 567.
Myosotis, 145.
arvensis L., 163.
cæspitosa Schultz., 164.
collina Hoffm., 163.
hispida Schl., 163.
intermedia Link, 163.
Lappula L., 161.
laxiflora Rehb., 165.
lingulata R. S., 164.
 " β , *radicans* Lge., 164.
palustris With., 165.
 " β , *laxiflora*, 165.
 " γ , *strigulosa*, 165.
repens Don, 165.
scorpioides α , *arvensis* L., 163.
 " β , *palustris*, 165.
silvatica Hoffm., 164.
sparsiflora Mik., 163.
strigulosa Rehb., 165.
stricta Link, 162.
versicolor Pers., 162.
Myosurus, 403.
minimus L., 425.
Myrica, 725.
Gale L., 744.
Myriophyllum, 656.
alterniflorum DC., 718.
pectinatum DC., 719.
spicatum L., 718.
verticillatum L., 719.
 " β , *pectinatum*, 719.
 " α , *pinnatifidum*, 719.
Myrrhis, 156.
odorata Scop., 233.
Myrtillus silvaticus Drej., 303.
uliginosus Drej., 303.

N.

Najas, 652.
major Roth, 660.
marina L., 660.
monosperma Willd., 660.
Narcissus, 241.
poëticus L., 246.
Pseudonarcissus L., 246.
Nardus, 22.
stricta L., 48.

Narthecium, 242.
Ossifragum Huds., 259.
Nasturtium, 473.
amphibium R. Br., 486.
anceps Rehb., 487.
Armoracia Fr., 485.
officinale R. Br., 485.
 " γ , *microphyllum*, 486.
 " β , *siifolium*, 486.
palustre DC., 487.
silvestre R. Br., 486.
 " β , *rivulare* Rehb., 486.
Naumburgia thyrsoflora Drej., 183.
Neottia, 634.
Nidus avis Rich., 648.
Nepeta, 429.
Cataria L., 444.
nuda L., 444.
Neslia, 471.
paniculata Desv., 475.
Nicandra, 144.
physaloides Gärtn., 168.
Nitella, 753.
atrovirens Wallm., 779.
Brongniartiana Coss. & Germ., 778.
capitata Ag., 779.
flabellata Kütz., 777.
flexilis Ag., 777.
 " *e*, *barbata*, 780.
 " *batrachosperma*, 776.
 " *h*, *gracilis*, 776.
 " *d*, *syncarpa*, 778.
furculata Rehb., 778.
gracilis Ag., 776.
intricata A. Br., 779.
mucronata Kütz., 777.
 " γ , *flabellata*, 777.
 " β , *heteromorpha*, 777.
opaca β , *atrovirens* Wahlst., 779.
polysperma Kütz., 779.
procera Wallm., 778.
Stenhammariana Wallm., 780.
syncarpa Kütz., 778.
 " ** *capitata*, 779.
 " * *pseudoflexilis*, 779.
tenuissima Rabenh., 775.
Nuphar, 402.
luteum Sm., 409.
pumilum Sm., 409.
Nymphaea, 402.
alba L., 408.
lutea L., 409.

O.

Obione portulacoides Moq., 717.
Odontites, 453.
littoralis Fr., 467.
rubra Pers., 468.
 " β , *pallida*, 468.
serotina Drej., 468.
verna Rehb., 467.
Oenanthe, 153.
conioides (Nolt.), 223.
fistulosa L., 221.
fluviatilis Colem., 223.
Lachenalii Gmel., 222.
Phellandrium Lam., 222.
pimpinelloides Sm., 222.
Oenothera, 291.
biennis L., 299.
muricata Murr., 299.
Oglifa arvensis Cass., 609.
minima Rehb., 608.
Omphalodes, 145.
verna Moench, 161.
Onobrychis, 509.
sativa Lam., 522.
Ononis, 508.
arvensis L., 520.
arvensis Retz., 521.
campestris Koch & Z., 519.
hircina Jacq., 521.
procurrens Wallr., 520.
repens L., 520.
 " β , *mitis*, 520.
 " γ , *spinosissima*, 520.
spinosa L., 520.
spinosa α , β , L., 519—20.
 " α , *glomerata* Schum., 519.
Onopordon, 558.
Acanthium L., 591.
Ophioglossum, 752.
vulgatum L., 766.
Ophrys, 633.
anthropophora F. D., 636.
corallorhiza L., 649.
cordata L., 648.
Loeselii L., 650.
Moenchii L., 642.
muscifera Huds., 645.
myodes Sw., 645.
Nidus avis L., 648.
ovata L., 647.
paludosa L., 650.
spiralis L., 649.
Oporina autumnalis Don., 587.
Orchis, 653.
angustifolia W. Gr., 638.

Orchis bifolia L., 641.
conopsea L., 640.
fusca Jacq., 635.
incarnata L., 638.
 " β , hæmatodes, 639.
latifolia L., 638.
latifolia F. D., 638.
maculata L., 639.
 " β , concolor, 639.
majalis Rchb., 638.
mascula L., 637.
militaris β , L., 656.
 ✧ *Morio* L., 636.
purpurea Huds., 635.
pyramidalis L., 639.
sambucina L., 637.
 ✧ *ustulata* L., 636.
Origanum, 430.
Majorana L., 452.
 ✧ *vulgare* L., 452.
Ornithogalum, 242.
arvense Pers., 251.
luteum L., 252.
minimum L., 251.
nutans L., 258.
pratense H., 252.
spathaceum Hayn., 250.
stenopetalum Fr., 252.
 ✧ *umbellatum* L., 258.
Ornithopus, 508.
perpusillus L., 522.
Orobanche, 433.
Cirsii Fr., 469.
Cirsii oleracei Casp., 796.
elatior Sutt., 568.
major L., 468.
minor Sutt., 469.
Picridis Vauch., 470.
stigmatodes Wimm., 468.
Orobis, 510.
niger L., 535.
silvaticus L., 525.
tuberosus L., 535.
 ✧ *vernus* L., 535.
Osmunda, 752.
Lunaria L., 765.
regalis L., 764.
Spicant L., 762.
Struthiopteris L., 762.
Oxalis, 501.
Acetosella L., 503.
 " β , lilacina, 503.
corniculata L., 504.
stricta L., 503.
Orycoccus palustris Pers., 504.

P.

Panicum, 24.
ciliare Retz., 62.
Crus galli L., 63.
glabrum Gaud., 62.
glaucum L., 61.
 ✧ *miliaceum* L., 62.
sanguinale L., 62.
sanguinale Poll., 61.
verticillatum L., 61.
viride L., 61.
Papaver, 401.
 ✧ *Argemone* L., 404.
 " β , *lejocarpum*, 404.
 ✧ *dubium* L., 404.
 ✧ *Rhoeas* L., 405.
 " β , *strigosum*, 405.
 ✧ *somniferum* L., 405.
Parietaria, 108.
 ✧ *erecta* M. K., 125.
officinalis L., 125.
Paris, 293.
 ✧ *quadrifolia* L., 306.
Parnassia, 157.
 ✧ *palustris* L., 237.
Pastinaca, 154.
 ✧ *sativa* L., 226.
 " β , *silvestris*, 227.
Pedicularis, 433.
palustris L., 462.
Sceptrum Carolinum L., 463.
silvatica L., 462.
Peplis, 240.
Portula L., 245.
Petasites, 559.
 ✧ *albus* Gärtn., 602.
 ✧ *officinalis* Mönch., 602.
spurius Rchb., 603.
vulgaris Desf., 602.
Petroselinum, 152.
hortense Rchb., 218.
 ✧ *sativum* Hoffm., 218.
Peucedanum, 153.
Oreoselinum Mönch., 225.
Ostruthium Koch, 225.
 ✧ *palustre* Mönch, 225.
Phalaris, 25.
arundinacea L., 63.
 ✧ *canariensis* L., 63.
oryzoides L., 60.
phleoides L., 67.
Phaseolus, 509.
 ✧ *compressus* DC., 524.
 ✧ *multiflorus* Willd., 524.

- Phaseolus nanus* L., 524.
 ✕ *vulgaris* Savi, 524.
 " *β*, *nanus*, 524.
Phellandrium aquaticum L., 222.
 conioides Nolt., 223.
Philadelphus, 362.
 ✕ *coronarius* L., 366.
Phleum, 25.
 ✕ *arenarium* L., 67.
 ✕ *Boehmeri* Wib., 67.
 nodosum L., 66.
 phalaroides Koel., 67.
 ✕ *pratense* L., 66.
 " *β*, *nodosum*, 66.
Phragmites, 28.
 ✕ *communis* Trin., 84.
 " *γ*, *flavescens*, 84.
 " *β*, *repens*, 84.
Physalis, 144.
 ✕ *Alkekengi* L., 167.
Phyteuma, 147.
 ✕ *spicatum* L., 190.
Picea, 653.
 ✕ *excelsa* Link., 666.
Picris, 557.
 hieracioides L., 588.
Pilularia, 675.
 globulifera L., 753.
Pimpinella, 152.
 ✕ *magna* L., 219.
 nigra Willd., 220.
 ✕ *Saxifraga* L., 219.
 " *dissectifolia* Wallr., 220.
Pinguicula, 3.
 ✕ *vulgaris* L., 17.
Pinus, 653.
 Abies L., 666.
 Larix L., 667.
 Picea L., 666.
 ✕ *silvestris* L., 666.
 Strobus L., 666.
Pisum, 509.
 ✕ *arvense* L., 531.
 maritimum L., 533.
 ✕ *sativum* L., 531.
Plantago, 107.
 ✕ *Coronopus* L., 122.
 " *β*, *pygmæa*, 122.
 intermedia Gil., 120.
 ✕ *lanceolata* L., 121.
 " *β*, *eriphylla* Dcne., 121.
 major L., 120.
 " * *intermedia*, 120.
 " *β*, *minima*, 120.
 " *γ*, *pubescens*, 120.
Plantago maritima L., 122.
 " *β*, *dentata*, 122.
 " *γ*, *pygmæa*, 122.
 media L., 121.
 uniflora F. D., 705.
Platanthera, 633.
 bifolia Rich., 641.
 brachyglossa Rehb., 641.
 ✕ *chlorantha* Cust., 641.
 montana Rehb., 641.
 solstitialis Drej., 641.
 " *β*, *densiflora*, 641.
 " *α*, *latiflora*, 641.
 " *γ*, *patula*, 641.
 viridis Lindl., 642.
Poa, 28.
 adspersa Drej., 90.
 angustifolia L., 90.
 ✕ *annua* L., 88.
 aquatica L., 88.
 arenaria Rafn., 77.
 bulbosa L., 90.
 " *β*, *vivipara*, 90.
 Chaixi Vill., 92.
 ✕ *compressa* L., 93.
 costata Schum., 92.
 decumbens Scop., 77.
 distans L., 86.
 ✕ *fertilis* Host., 89.
 fluitans Scop., 88.
 hybrida Gaud., 91.
 maritima Huds., 86.
 ✕ *nemoralis* L., 89.
 " *γ*, *firmula* Gaud., 89.
 " *β*, *subuniflora* Rehb., 89.
 " *α*, *vulgaris* Koch, 89.
 palustris F. D., 89.
 palustris Roth, 90.
 ✕ *pratensis* L., 92.
 " *γ*, *angustifolia* Rehb., 92.
 " *β*, *humilis* Rehb., 92.
 serotina Ehrh., 89.
 silvatica Poll., 97.
 sudetica Schrad., 92.
 sudetica Hänk., 91.
 sudetica *, *remota* Fr., 91.
 trivialis L., 91.
 " *β*, *multiflora* Rehb., 91.
Polemonium, 143.
 coeruleum L., 176.
Polygala, 507.
 amara L., 516.
 depressa Wend., 516.
 oxyptera Rehb., 515.
 serpyllacea Whe., 516.

Polygala uliginosa Rehb., 516.
vulgaris L., 515.

 " * *depressa*, 516.

 " * *oxyptera*, 515.

Polygonatum anceps Mönch, 248.

multiflorum Mönch, 248.

verticillatum Mönch, 248.

Polygonum, 243.

amphibium L., 274.

 " α , *natans*, 274.

 " β , *terrestre*, 274.

aviculare L., 278.

 " δ , *angustifolium*, 278.

 " ϵ , *depressum*, 278.

 " γ , *erectum*, 278.

 " β , *littorale*, 278.

 " α , *prostratum*, 278.

✕ *Bistorta* L., 273.

✕ *Convolvulus* L., 278.

dubium Stein, 277.

dumetorum L., 279.

Fagopyrum L., 306.

✕ *Hydropiper* L., 277.

incanum DC., 275.

intermedium Ehrh., 277.

✕ *lapathifolium* L., 274.

 " γ , *incanum*, 275.

 " β , *pallidum* Fr., 275.

 " γ , *nodosum* Fr., 275.

 " δ , *procumbens* Sond., 275.

laxiflorum Whe., 277.

laxum E. Bot., 275.

minus H., 276.

mite Schrk., 277.

mite autt., 277.

nodosum Pers., 275.

pallidum With., 275.

✕ *Persicaria* L., 275.

 " *biforme* Whlbg., 276.

pusillum Lam., 276.

strictum All., 276.

 " α , *elatum* Fr., 276.

 " β , *pusillum* Fr., 276.

tataricum L., 305.

viviparum L., 275.

Polypodium, 751.

aculeatum L., 757.

cristatum L., 759.

✕ *Dryopteris* L., 764.

Filix foemina L., 755.

Filix mas L., 759.

fragile L., 761.

Oreopteris Ehrh., 758.

Pheopteris L., 763.

spinulosum Müll., 760.

Polypodium Thelypteris L., 758.
vulgare L., 763.

Polystichum angulare Presl., 757.

Thelypteris Roth, 758.

Populus, 726.

✕ *alba* L., 746.

balsamifera L., 748.

canescens Sm., 747.

canescens Rehb., 746.

dilatata Ait., 748.

hybrida M. B., 746.

✕ *monilifera* Ait., 747.

✕ *nigra* L., 748.

pyramidalis Roz., 748.

tremula L., 747.

 " *villosa*, 747.

Potamogeton, 109.

acuminatum Schum., 133.

acutifolius Link., 136.

caespitosus Nolt., 137.

coloratus Horn., 130.

compressus Oed., 137.

compressus Fr., 136.

crispus L., 135.

 " β , *gemmifer*, 135.

curvifolius Hartm., 131.

decepiens Nolt., 133.

densus L., 135.

fasciculatus Wolfg., 140.

filiformis Pers., 140.

flabellatus Bab., 139, 794.

fluitans Roth, 128.

 " β , *rivularis*, 129.

fluitans H., F. D., 131.

Friesii Rupr., 137.

gracilis Fr., 138.

gramineus L., 132.

 " α , *graminifolius* Fr., 132.

 " β , *heterophyllus* Fr., 132.

 " β , *Zizii* Koch, 133.

gramineum Schum., 132.

heterophyllus Schreb., 132.

Hornemannii Mey., 130.

lucens L., 133.

 " β , *acuminatus*, 133.

 " *angustifolius* H., 131.

 " β , *heterophyllus* Fr., 133.

 " β , *minor* Nolt., 133.

marinus L., 140.

 " β , *fasciculatus*, 140.

monogynus I. Gay, 139.

mucronatus Schrad., 137.

natans L., 128.

 " β , *fluviatilis* Fr., 128.

 " β , *prolixus*, 128.

- Potamogeton nitens* Web., 131.
 " β , *heterophyllus*, 131.
 " α , *salicifolius*, 131.
oblongus Viv., 129.
obtusifolius M. K., 137.
parnassicefolius Schrad., 130.
pectinatus L., 139.
 " γ , *dichotomus* Wallr., 794.
 " γ , *flabellatus*, 139.
 " β , *scoparius*, 139.
perfoliatus L., 134.
plantagineus Duer., 130.
polygonifolius Pourr., 129.
 " α , *angustifolius*, 130.
 " β , *amphibius*, 130.
prælongus Wulf., 134.
pusillus L., 138.
 " γ , *major* Fr., 137.
 " β , *tenuissimus*, 138.
 " α , *vulgaris*, 138.
rufescens Schrad., 131.
rutilus Wolfg., 137.
serrulatus Schrad., 135.
serratum Schum., 131.
setaceum Schum., 140.
sparganifolius Læst., 129.
trichoides Cham., 138.
Zizii M. K., 133.
zosteraceus Fr., 139.
zosteræfolius Schum., 136.
- Potentilla*, 364.
 anserina L., 398.
 " β , *tenella*, 398.
 argentea L., 395.
 " γ , *impolita*, 395.
 cinerea, 394.
 collina Wib., 395.
 Egedii Wormskj., 399.
 Fragaria Sm., 393.
 Fragariastrum Ehrh., 393.
 Güntheri Pohl., 395.
 impolita Wahlenb., 395.
 incana Moench, 394.
 mixta Nolt., 397.
 nemoralis Nest., 397.
 norvegica L., 396.
 opaca L., 393.
 palustris Scop., 399.
 pilosa Willd., 396.
 procumbens Sibth., 397.
 procumbenti-reptans Lehm., 397.
 recta L., 395.
 reptans L., 398.
 sordida Fr., 395.
 Tormentilla Sibth., 396.
- Polentilla verna* F. D., 393.
 verna L., 394.
- Poterium*, 657.
 dictyocarpum Spach, 720.
 Sanguisorba L., 720.
- Prenanthes muralis* L., 567.
- Primula*, 145.
 acaulis Jacq., 182.
 brevistyla DC., 182.
 elator Jacq., 181.
 " β , *acaulis* Fr., 182.
 " β , *decipiens* Sond., 181.
 " *macrocarpa* Personn. 181.
 farinosa L., 180.
 grandiflora Lam., 182.
 " β , *caulescens*, 182.
 officinalis Jacq., 180.
 " β , *subacaulis* Doell., 181.
 officinali-elator Muret., 181.
 silvestris Scop., 182.
 Tommasinii Gren. & Godr., 181.
 unicolor Nolt., 181.
 variabilis Goupil., 182.
 veris γ , *acaulis* L., 182.
 " β , *elator* L., 181.
 " α , *officinalis* L., 181.
 vulgaris Huds., 182.
- Prunella grandiflora* Jacq., 455.
 vulgaris L., 454.
- Prunus*, 362.
 avium L., 366.
 Cerasus L., 365.
 domestica L., 365.
 fruticans Whe., 364.
 insititia L., 365.
 insititia Drej., 364.
 Padus L., 366.
 spinosa L., 364.
 " β , *coæthaneæ* W. Gr., 364.
- Psamma*, 25.
 arenaria R. S., 67.
 baltica R. S., 68.
- Pteris*, 751.
 aquilina L., 762.
- Pulegium vulgare* Mill., 451.
- Pulicaria dysenterica* Gärt., 617.
 vulgaris Gärt., 617.
- Pulmonaria*, 142.
 angustifolia L., 160.
 angustifolia F. D., 160.
 azurea Bess., 160.
 maritima L., 159.
 officinalis L., 159.
- Pulsatilla*, 403.
 nigricans Störk., 415.

Pulsatilla nigricans β , schizocalyx, 413.

pratensis Mill., 413.

vulgaris Mill., 412.

Pyrethrum inodorum Sm., 612.

β , salinum Wallr., 613.

Parthenium Sm., 612.

Pyrola, 309.

chlorantha Sw., 321.

media Sw., 320.

minor L., 320.

rotundifolia L., 321.

β , arenaria Koch, 321.

secunda L., 320.

uniflora L., 319.

Pyrus, 362.

acerba DC., 371.

communis L., 370.

α , Achras Wallr., 370.

β , Pyraster Wallr., 370.

Cydonia L., 371.

Malus L., 370.

α , austera Wallr., 371.

β , mitis Wallr., 371.

torminalis Ehrh., 368.

Q.

Quercus, 658.

foemina F. D., 722.

pedunculata Ehrh., 722.

Robur α , L., 722.

β , L., 722.

sessiliflora Sm., 722.

R.

Radiola, 109.

linoides Gmel., 127.

millegrana Sm., 127.

Ranunculus, 403.

acris L., 422.

γ , multifidus, 422.

β , Steveni, 422.

aquatilis L., 417.

aquatilis β , L., 417.

β , phellandrifolius Schum., 418.

arvensis L., 425.

auricomus L., 421.

Boraeanus Jord., 422.

bulbosus L., 424.

circinnatus Sibth., 419.

divaricatus Schrk., 419.

Flammula L., 420.

Ranunculus Flammula β , intermedium, 421.

β , radicans, 421.

Ficaria L., 425.

fluitans H., 419.

fluitans Lam., 420.

fluviatilis Web., 420.

hederaceus L., 416.

hirsutus Curt., 424.

lanuginosus L., 422.

Lingua L., 420.

pantothrix Bert., 418.

capillaceus DC., 419.

parviflorus L., 424.

parvulus L., 424.

paucistamineus Tausch, 418.

peltatus Schrk., 417.

Petiveri Koch, 418.

Philonotis Ehrh., 424.

β , parvulus, 424.

polyanthemos L., 423.

α , angustifolius, 423.

β , latifolius, 423.

repens L., 423.

reptans L., 421.

sceleratus L., 416.

tripartitus Nolt., 418.

β , obtusiflorus DC., 418.

Raphanistrum segetum Baumg., 487.

Raphanus, 473.

Raphanistrum L., 487.

sativus L., 488.

Rapistrum paniculatum Gärtn., 475.

Reseda, 358.

luteola L., 361.

Rhamnus, 148.

catharticus L., 199.

Frangula L., 199.

Rhinanthus, 453.

Crista galli α , 466.

β , L., 465.

major Ehrh., 465.

β , apterus Fr., 465.

α , platypterus Fr., 465.

minor Ehrh., 466.

Rhynchospora, 21.

alba Vahl, 37.

fusca Vahl, 36.

Ribes, 148.

alpinum L., 201.

Grossularia L., 200.

α , pubescens, 200.

β , glandulosum, 200.

nigrum L., 200.

rubrum L., 201.

Ribes rubrum β , leucocarpon, 201.

Uva crispa L., 200.

Rosa, 365.

alba F. D., 377.

✕ *canina* L., 375.

" *alba*, 377.

" ** *collina*, 375.

" * *dumetorum*, 375.

" α , *nitida* Fr., 375.

" β , *opaca* Fr., 375.

ciliato-petala Koch, 377.

✕ *cinnamomea* L., 374.

collina Jacq., 375.

✕ *coriifolia* Fr., 376.

✕ *dumetorum* Thuill., 375.

fluvialis F. D., 374.

✕ *inodora* Fr., 375.

✕ *lucida* Ehrh., 374.

mollis Sm., 377.

✕ *mollissima* Willd., 377.

" γ , *arenaria*, 377.

" β , *nemorialis*, 377.

pimpinellæfolia L., 375.

pomifera Herm., 377.

rubiginosa L., 374.

" β , *horrida*, 374.

spinosissima L., 375.

suavifolia Lightf., 374.

tomentosa Sm., 376.

" β , *alba*, 377.

villosa L., 377.

" β , *pomifera*, 377.

Rottboellia filiformis Roth, 48.

incurvata Cav., 49.

incurvata autt. scand., 48.

Rudbeckia, 564.

✕ *fulgida* Ait., 631.

Rubia, 107.

tinctorum L., 120.

Rubus, 365.

affinis Whe., 381.

apiculatus Whe., 387.

Arrhenii Lge., 386.

Bellardi Whe., 387.

Borreri Bell.-Salt., 385.

cæsius L., 391.

" β , *agrestis* Whe., 391.

" γ , *aquaticus* Whe., 391.

" ϵ , *hispidus* Whe., 388.

" δ , *pseudo-idæus* Whe., 391.

" α , *umbrosus* Whe., 391.

carpinifolius Whe., 385.

Chamæmorus L., 378.

cordifolius Whe., 382.

✕ *corylifolius* Sm., 389.

Rubus corylifolius γ , *appendiculatus*, 390.

" β , *grandifolius*! 389.

" β , *intermedius*, 388.

" β , *pruinosis*, 390.

discolor Whe., 385.

" α , *genuinus*, 383.

" β , *pubescens*, 384.

" * *umbrosus*, 385.

dumetorum Whe., 390.

" α , *glabratus* Arrh., 390.

" β , *tomentosus* Whe., 390.

fastigiatus Whe., 380.

fissus Lindl., 380.

foliosus Whe., 387.

fruticosus Arrh., 380.

fruticosus Whe., 381.

✕ *glandulosus* Bell., 387.

" β , *umbrosus* Godr., 388.

Güntheri Whe., 388.

hirtus Drej., 384.

✕ *hirtus* W. K., 386.

Hystrix Whe., 387.

✕ *idæus* L., 378.

" β , *canescens*, 391.

" β , *microphyllus* Wallr., 379.

Köhleri Whe., 385.

latifolius Bab., 388.

leucostachys β , *vestitus* Bab., 384.

macrophyllus Whe., 385.

Menkei Whe., 387.

nemorosus Hayn., 390.

nitidus Whe., 380.

plicatus Whe., 380.

" ** *adfinis*, 381.

" β , *fastigiatus*, 380.

pruinosis Arrh., 390.

pubescens Whe., 384.

✕ *Radula* Whe., 384.

" β , *Köhleri*, 385.

rhamnifolius Whe., 382.

rudis Whe., 385.

saxatilis L., 378.

scaber Whe., 386.

Schlechtendalii Whe., 383.

serpens Gren. & Godr., 388.

silvaticus Whe., 385.

Sprengelii Whe., 385.

" * *Arrhenii*! 386.

suberectus And., 379.

" β , *fissus*, 380.

✕ *thyrsoides* Wimm., 381.

" α , *candicans*, 382.

" β , *gracilis*, 382.

" α , *oblongifolius*, 382.

- Rubus umbrosus* Whe., 383.
vestitus Whe., 384.
 " β , *viridis*, 384.
villicaulis Whe., 385.
vulgaris Whe., 382.
 " β , *carpinifolius*, 383.
 " α , *umbrosus*, 385.
 " * *discolor* Arrh., 383.
 " * *Radula* Arrh., 384.
Wahlbergii Arrh., 388.
Rumex, 245.
 X *Acetosa* L., 286.
 X *Acetosella* L., 287.
acutus L., 285.
acutus H., 284.
aquaticus β , *Drejeri* Sond., 281.
conglomeratus Murr., 284.
conspersus Hartm., 283.
 X *crispus* L., 282.
cristatus Wallr., 283.
divaricatus L., 284.
divaricatus Fr., 284.
domesticus Hartm., 281.
 " *latifolius* Hartm., 281.
Friesii Gren. & Godr., 284.
Helolapathum Drej., 281.
heterophyllum Schultz., 280.
Hippolapathum Fr., 280.
 * *Helolapathum*, 280.
Hydrolapathum Huds., 279.
longifolius DC., 282.
maritimus L., 286.
 V *maximus* Schreb., 280.
Nemolapathum Ehrh., 284.
Nemolapathum Wallr., 285.
 X *nemorosus* Schrad., 285.
 " β , *sanguineus*, 285.
 " α , *viridis*, 285.
 X *obtusifolius* L., 284.
 " *divaricatus*, 284.
obtusifolius Wallr., 284.
palustris Sm., 285.
pratensis M. K., 285.
propinquus Aresch., 282.
sanguineus L., 285.
silvestris Wallr., 284.
Ruppia, 109.
brachypus I. Gay, 141.
maritima L., 141.
rostellata Koch, 141.
spiralis L., 140.

S.

- Sabulina viscosa* Rehb., 337.
Sagina, 312.

- Sagina apetala* L., 350.
 " β , *decumbens* F. D., 350.
ciliata Fr., 350.
depressa Schultz., 350.
erecta F. D., 350.
maritima Don., 350.
nodosa Torr. & Gray., 352.
 " β , *moniliformis* Lge., 352.
procumbens L., 351.
 " β , *crassifolia* Nolt., 351.
 " γ , *spinosa* Gibs., 351.
stricta Fr., 349.
 " β , *maritima* Fr., 350.
subulata Torr. & Gr., 251.
Sagittaria, 656.
 X *sagittæfolia* L., 717.
Salicornia, 2.
biennis Afz., 5.
 " *radicans* Fr., 5.
 X *herbacea* L., 4.
 " α , *erecta* F. D., 5.
 " β , *patula* F. D., 5.
radicans Sm., 5.
Salix, 724.
acuminata Sm., 736.
acuminata Hoffm., 737.
acuminata Koch, 737.
acutifolia Willd., 732.
affinis Gren. & Godr., 736.
 V *alba* L., 731.
 " β , *coerulea*, 731.
 " γ , *vitellina*, 731.
albo-fragilis Rehb., 730.
 X *ambigua* Ehrh., 740.
 X *amygdalina* L., 731.
 " α , *concolor*, 731.
 " β , *discolor*, 732.
 V *angustifolia* Wulf., 742.
arenaria L., 741.
aurita L., 738.
 " β , *fimbriata* Lge., 739.
aurito-repens Wimm., 740.
caprea L., 738.
caspiæ hort., 732.
cinerea L., 737.
 " β , *aquatica*, 737.
cinereo-hastata? 738.
coerulea Sm., 731.
 X *cuspidata* Schultz., 729.
dasyclados Wimm., 736.
Doniana Sm., 743.
fragili-pentandra Wimm., 729.
 X *fragilis* L., 729.
 " *pendula*, 730.
fusca L., 741.

- Salix hastata* L., 739.
Helix L., 733.
incubacea Fr., 740.
incubacea H., 741.
lanceolata Fr., 736.
 • α , *acuminata*, 737.
 • β , *capræformis*, 737.
Meyeriana Willd., 729.
mollissima Ehrh., 734.
monandra Hoffm., 733.
nigricans Sm., 740.
pentandra L., 728.
phylicæfolia β , F. D., 740.
plicata Fr., 740.
pruinosa Wendl., 732.
purpurea L., 733.
 • α , *gracilis*, 733.
 • β , *Helix*, 733.
 • γ , *Lambertiana*, 733.
purpureo-repens Wimm., 743.
purpureo-viminalis Wimm., 734.
repens L., 741.
 • γ , *argentea*, 741.
 • β , *fusca*, 741.
 • δ , *lejocarpa*, 742.
repenti-viminalis Wimm., 742.
rosmarinifolia L., 742.
rubra Huds., 733.
Russeliana Sm., 730.
Smithiana Willd., 737.
spathulata Willd., 741.
stipularis Sm., 735.
triandra-viminalis Wimm., 732.
triandra L., 731.
undulata Ehr., 732.
viminalis L., 735.
viminali-caprea Wimm., 736.
viridis Fr., 750.
vitellina L., 731.
Salsola, 149.
hirsuta L., 210.
Kali L., 210.
Salvia, 5.
pratensis L., 7.
Sambucus, 156.
Ebulus L., 235.
nigra L., 234.
 • β , *laciniata*, 234.
racemosa L., 235.
Samolus, 146.
Valerandi L., 186.
Sanguisorba, 108.
 officinalis L., 126.
Sanicula, 151.
 europæa L., 216.
Saponaria, 310.
 officinalis L., 325.
Vaccaria L., 325.
Sarothamnus, 508.
 scoparius Koch, 519.
 vulgaris Wimm., 519.
Satyrium albidum L., 640.
Epipogium L., 643.
 viride L., 642.
Saxifraga, 310.
 granulata L., 324.
 Hirculus L., 323.
 tridactylites L., 324.
Scabiosa, 106.
 arvensis L., 110.
 canescens W. K., 110.
 Columbaria L., 110.
 suaveolens Desf., 110.
 Succisa L., 111.
Scandix, 155.
 Anthriscus L., 231.
 Ceræfolium L., 231.
 odorata L., 233.
Pecten Veneris L., 232.
Sceptrum Carolinum Rudb., 463.
Schedonorus, 29.
 asper Fr., 103.
 erectus Fr., 103.
 inermis Fr., 104.
 serotinus Rostr., 103.
 sterilis Fr., 102.
 tectorum Fr., 102.
Scheuchzeria, 244.
 palustris L., 287.
Schoberia maritima Mey., 210.
Schoenus, 21.
 albus L., 37.
 compressus L., 44.
 ferrugineus L., 35.
 fuscus L., 36.
 Mariscus L., 48.
 nigricans L., 36.
 rufus Huds., 44.
Scirpus, 21.
 acicularis L., 38.
 Bæothryon Ehrh., 39.
 bifolius Wallr., 45.
 cæspitosus L., 40.
 Caricis Retz., 44.
 carinatus Sm., 42.
 Duvalii Hopp., 42.
 fluitans L., 40.
 glaucus Sm., 41.
 Holoschoenus F. D., 42.
 lacustris L., 41.

Scirpus lacustris β , *glaucus* Fr., 42.
maritimus L., 43.
 " β , *monostachys*, 43.
 " γ , *macrostachys*, 43.
 " δ , *sphaerostachys*, 43.
multicaulis Sm., 38.
nanus Spr., 39.
palustris L., 37.
 " β , *minor* Horn., 37.
parvulus R. S., 39.
pauciflorus Lightf., 39.
 " β , *minor* Blytt., 39.
Pollichii Gren. & Godr., 42.
pungens Vahl, 43.
Rothii Hopp., 43.
rufus Schrad., 44.
 " * *bifolius*, 45.
setaceus L., 41.
silvaticus L., 44.
Tabernæmontani Gm., 41.
 " β , *monostachys* Lge., 45.
trigonus Nolt., 42.
triqueter L., 42.
uniglumis M. K., 37.
Scleranthus, 309.
annuus L., 323.
 " β , *biennis* Fr., 323.
perennis L., 323.
Scolochloa festucacea Link, 76.
Scolopendrium, 751.
officinatum Sw., 757.
Scorzonera, 556.
hispanica L., 586.
humilis L., 585.
 " β , *angustifolia*, 586.
 " α , *latifolia*, 586.
Scrophularia, 432.
alata Gil., 460.
aquatica L., 460.
Balbisii Horn., 461.
Ehrharti Stev., 460.
nodosa L., 461.
vernalis L., 460.
Scutellaria, 431.
altissima L., 456.
commutata Rehb., 456.
galericulata L., 455.
 " β , *hastæformis*, 455.
hastifolia L., 455.
Secale, 23.
cereale L., 57.
Sedum, 512.
acre L., 355.
 " β , *sexangulare* Godr., 355.
album L., 354.

Sedum boloniense Lois., 354.
cruciatum Desf., 354.
Fabaria Koch, 358.
Forsterianum Rehb., 355.
lividum Drej., 357.
maximum Sut., 356.
monregalense Balb., 354.
purpurascens Koch, 357.
reflexum L., 356.
reflexum F. D., 356.
rupestre L., 356.
 " α , *glaucum*, 356.
 " β , *viride*, 356.
sexangulare L., 355.
sexangulare DC., 355.
Telephium L., 356.
 " β , *purpureum* F. D., 357.
Telephium Rehb., 357.
Selaginella, 752.
spinulosa A. Br., 769.
Selinum, 154.
Carvifolia L., 227.
lineare Schum., 224.
palustre L., 225.
silvestre L., 224.
silvestre F. D., 225.
Sempervivum, 359.
tectorum L., 361.
Senebiera, 470.
Coronopus Poir., 475.
Senecio, 563.
aquaticus Huds., 625.
 " β , *pinnatifidus*, 626.
barbareaefolius Rehb., 626.
campestris DC., 627.
denticulatus Müll., 623.
erucæfolius L., 625.
Jacobæa L., 625.
paludosus L., 626.
palustris DC., 627.
pratensis Richt., 626.
salicetorum Godr., 626.
saracenicus L., 626.
silvaticus L., 623.
vernalis W. & K., 624.
viscosus L., 624.
vulgaris L., 623.
 " β , *radiatus* Koch, 623.
Serapias ensifolia Sm., 644.
grandiflora Scop., 644.
latifolia L., 645.
 " β , *atrorubens*, 647.
longifolia L., 645.
microphylla Ehrh., 646.
palustris Scop., 645.

- Serapias rubra* L., 644.
Serratula, 557.
 arvensis L., 598.
 tinctoria L., 590.
Setaria, 24.
 glauca Beauv., 61.
 verticillata Beauv., 61.
 viridis Beauv., 61.
Sherardia, 106.
 arvensis L., 112.
Silene, 310.
 anglica L., 332.
 Armeria L., 330.
 gallica L., 332.
 inflata Sm., 329.
 β, *petræa*, 330.
 infracta Bess., 332.
 maritima With., 330.
 noctiflora L., 344.
 nutans L., 331.
 Otites Sm., 331.
 quinquevulnera L., 332.
 Saponaria Fr., 325.
 silvestris Rehb., 332.
 viscosa Pers., 332.
Silybum, 558.
 marianum Gärt., 599.
Sinapis, 474.
 alba L., 499.
 arvensis L., 498.
 β, *hispida*, 499.
 b, *Schkuhriana*, 499.
 nigra L., 498.
 orientalis Schk., 499.
Sison inundatum L., 217.
Sisymbrium, 474.
 Alliaria Scop., 500.
 amphibium L., 486.
 anceps Whlbg., 487.
 arenosum L., 495.
 Irio L., 500.
 islandicum F. D., 487.
 Loeselii L., 500.
 Nasturtium L., 485.
 officinale Scop., 499.
 palustre Leyss., 487.
 silvestre L., 486.
 Sophia L., 500.
 tenuifolium L., 496.
 Thalianum Gay, 495.
Sium, 152.
 angustifolium L., 221.
 Falcaria L., 220.
 latifolium L., 221.
 nodiflorum F. D., 221.
Sium repens Jacq., 217.
Solanum, 144.
 Dulcamara L., 169.
 δ, *laciniatum*, 170.
 γ, *marinum*, 170.
 β, *tomentosum*, 170.
 humile Bernh., 169.
 miniatum Bernh., 169.
 nigrum L., 168.
 humile, 169.
 miniatum Rehb., 169.
 villosum F. D., 169.
 tuberosum L., 168.
 villosum Lam., 169.
Solidago, 562.
 canadensis L., 620.
 Virga aurea L., 619.
Sonchus, 555.
 arvensis L., 568.
 β, *integrifolius* Lge., 569.
 γ, *lævipès* Koch, 569.
 asper Vill., 569.
 β, *inermis* Bisch., 569.
 macrophyllus Willd., 568.
 maritimus Retz., 569.
 oleraceus L., 570.
 asper H., 569.
 palustris L., 568.
 Plumieri L., 568.
Sorbus, 365.
 Aria Crtz., 368.
 aucuparia L., 370.
 β, *integerrima*, 370.
 fennica Kalm., 369.
 hybrida L. fil., 369.
 intermedia H., 369.
 scandica Fr., 369.
 torminalis Crtz., 368.
Sparganium, 654.
 erectum L. (*α-β*), 670—71.
 minimum Fr., 670.
 natans autt., 670.
 natans L., 670.
 ramosum Huds., 671.
 simplex Huds., 670.
Spartium scoparium L., 519.
Spergella nodosa Rehb., 352.
 subulata Rehb., 351.
Spergula, 312.
 arvensis L., 352.
 β, *sativa*, 353.
 α, *vulgaris*, 353.
 arvensis Rehb., 353.
 laricina F. D., 351.
 maxima Whe., 353.

Spergula Morisonii Boreau, 353.
nodosa L., 352.
pentandra L., 354.
pentandra autt. Scand., 353.
subulata Sw., 351.
vernalis Willd., 353.
Spergularia rubra Pers., 333.
 " β , *pinguis*, 334.
Spiræa, 363.
denudata Hayne, 372.
 ✓ *filipendula* L., 371.
 ✓ *salicifolia* L., 372.
tomentosa L., 373.
ulmaria L., 372.
 " β , *concolor*! 372.
 " α , *discolor* Koch, 372.
Spiranthes, 635.
autumnalis Rich., 649.
Spirodela polyrrhiza Schleid., 668.
Stachys, 428.
ambigua Sm., 437.
annua L., 438.
 ✓ *arvensis* L., 438.
Betonica Benth., 440.
palustris L., 437.
 " β , *canescens*, 437.
palustri-silvatica Schied., 437.
segetum Hagen, 437.
silvatica L., 437.
Statice, 157.
Armeria L., 240.
Armeria F. D., 235.
Behen Drej., 237.
balusiensis Fr., 238.
elongata Hoffm., 239.
Limonium L., 257.
rariflora Drej., 238.
 " β , *borealis* Fr., 238.
 " α , *danica* Fr., 238.
Staurogeton trisulcum Rehb., 667.
Stellaria, 311.
crassifolia Ehrh., 339.
 " α , *elodes* M. B., 339.
 " β , *brevifolia* Rafn, 339.
glauca With., 340.
graminea L., 341.
 " α , *grandiflora*, 341.
 " β , *parviflora*, 341.
 " γ , *spatulata*, 341.
Holostea L., 339.
media Sm., 341.
 " γ , *apetala*, 342.
 " β , *neglecta*, 342.
 " α , *vulgaris*, 342.
nemorum L., 342.

Stellaria neglecta Whe., 342.
palustris Retz., 340.
 " α , *glauca*, 340.
 " β , *viridis*, 340.
uliginosa Murr., 340.
Stenactis, 562.
annua Cass., 622.
bellidiflora A. Br., 622.
speciosa Lindl., 621.
Stenhammaria, 142.
maritima Rehb., 159.
Stratiotes, 727.
aloides L., 749.
Struthiopteris, 751.
europæa Drej., 762.
 ✓ *germanica* Willd., 762.
Sturmia, 635.
Loeselii Rehb., 650.
Suæda maritima Dumort., 210.
Subularia, 472.
aquatica L., 484.
Succisa, 106.
 ✓ *pratensis* Mönch, 111.
Symphytum, 143.
 ✓ *officinale* L., 166.
orientale L., 167.
patens Sibth., 167.
Syringa, 3.
vulgaris L., 8.

T.

Tanacetum, 560.
corymbosum Schultz, 612.
Leucanthemum Schultz., 611.
Parthenium Schultz., 612.
vulgare L., 605.
Taraxacum, 555.
erythrospermum Andr., 566.
 ✓ *officinale* Web., 565.
 " β , *arenarium* Drej., 566.
 " β , *glaucescens*, 566.
 " ϵ , *lividum*, 566.
 " γ , *palustre*, 566.
palustre DC., 566.
Taxus, 727.
 ✓ *baccata* L., 750.
Teesdalia, 471.
nudicaulis R. Br., 477.
Telmatophace gibba Schld., 668.
Tenageja Vaillantii Thuill., 268.
Tetragonolobus, 510.
maritimus Roth, 537.
siliquosus Roth, 537.

- Tetragonolobus siliquosus* β , *maritimus* Ser., 537.
Teucrium, 429.
 Chamaedrys L., 446.
 Scordium L., 446.
Thalictrum, 403.
 dubium Schum., 414.
 elatum H., 414.
 flavum L., 413.
 flexuosum Rehb., 415.
 majus Rehb., 415.
 minus L., 414.
 simplex L., 414.
Thelaia chlorantha Alef., 321.
 intermedia Alef., 321.
 rotundifolia Alef., 321.
Thesium, 148.
 ebracteatum Hayn., 202.
 " β , *subbracteatum*, 203.
 pratense H., 202.
Thlaspi, 472.
 arvense L., 479.
 Bursa pastoris L., 479.
 campestre L., 478.
Thrinicia, 557.
 hirta Roth, 586.
Thymus, 430.
 Acinos L., 453.
 angustifolius Pers., 452.
 Chamaedrys Fr., 453.
 " α , *capitatus*, 453.
 " β , *verticillatus*, 453.
 Serpyllum L., 452.
 " β , *vulgaris* Rehb., 453.
 vulgaris L., 453.
Thysselinum palustre Hoffm., 225.
Tilia, 401.
 europæa Sm., 407.
 grandifolia Ehrh., 406.
 intermedia DC., 407.
 microphylla Willd., 407.
 parvifolia Ehrh., 407.
 pauciflora Hayn., 407.
 platyphyllos Scop., 407.
 vulgaris Hayn., 407.
Tillæa aquatica Lam., 127.
 prostrata Schk., 127.
Tiniaria Convolvulus Drej., 278.
 dumetorum Drej., 279.
Tordylium Anthriscus L., 230.
 nodosum L., 230.
Torilis, 155.
 Anthriscus Gm., 230.
 nodosa Gärtn., 230.
Tormentilla erecta L., 396.
Tormentilla reptans L., 397.
Tragopogon, 556.
 minor Fr., 585.
 porrifolius L., 584.
 pratensis L., 585.
 " β , *tortilis* Mey., 585.
 pratensi-porrifolius Rostr., 584.
Trapa, 107.
 natans L., 124.
Trichera arvensis Schrad., 110.
Trientalis, 260.
 europæa L., 291.
Trifolium, 510.
 agrarium L., 544.
 " β , *brevipes*, 544.
 agrarium Poll., 543.
 alpestre L., 530.
 arvense L., 548.
 aureum Poll., 544.
 dentatum W. K., 541.
 filiforme DC., 543.
 filiforme L., 542.
 flexuosum Jacq., 549.
 fragiferum L., 547.
 hybridum L., 546.
 medium L., 549.
 " β , *strictum* Htm., 550.
 Melilotus officinalis L., 541.
 micranthum Viv., 542.
 minus Sm., 543.
 montanum L., 545.
 ornithopodioides L., 540.
 pratense L., 549.
 " γ , *parviflorum* Bab., 549.
 " β , *sativum* Schreb., 549.
 procumbens L., 543.
 " β , *campestre*, 544.
 " α , *majus*, 544.
 repens L., 546.
 " *phyllanthum*, 546.
 resupinatum L., 547.
 spadiceum L., 544.
 striatum L., 548.
 " β , *strictum* Drej., 548.
Triglochin, 244.
 maritimum L., 288.
 palustre L., 288.
Trigonella, 510.
 ornithopodioides DC., 540.
Triodia, 26.
 decumbens Beauv., 69.
Tripleurospermum inodor. Schultz,
 612.
 maritimum Schultz., 613.
Trisetum, 27.

Trisetum flavescens Beauv., 80.
Triticum, 23.
 acutum DC., 54.
 acutum Fr., 53.
 æstivum L., 57.
 adfine Deth., 54.
 caninum Schreb., 56.
 hebestachyum Fr., 53.
 hibernum L., 57.
 juncum L., 53.
 laxum Fr., 54.
 littoreum Schum., 54.
 repens L., 55.
 " β , *maritimum* Koch, 56.
 strictum Deth., 53.
 turgidum L., 57.
 vulgare Vill., 56.
 " α , *æstivum*, 57.
 " β , *hibernum*, 57.
Trollius, 404.
 europæus L., 426.
Tulipa, 241.
 silvestris L., 250.
Tunica prolifera Scop., 326.
Turritis, 474.
 glabra L., 496.
 hirsuta L., 494.
Tussilago, 559.
 alba L., 602.
 Farfara L., 603.
 hybrida L., 602.
 Petasites L., 602.
 ramosa Hopp., 602.
 spuria Retz., 603.
Typha, 654.
 angustifolia L., 669.
 latifolia L., 669.

U.

Ulex, 508.
 europæus L., 517.
Ulmus, 150.
 campestris H., 211.
 campestris Sm., 211.
 " β , *suberosa*, 212.
 effusa Willd., 212.
 montana Sm., 211.
 pedunculata Foug., 212.
 suberosa Ehrh., 212.
Urtica, 655.
 dioeca L., 706.
 urens L., 705.
Utricularia, 4.

Utricularia Bremii Heer., 19.
 intermedia Hayn., 18.
 major Schmid, 18.
 minor L., 19.
 neglecta Lehm., 18.
 pulchella Lehm., 19.
 vulgaris L., 17.

V.

Vaccaria pyramidata Fl. Wett., 325.
Vaccinium, 292.
 Myrtillus L., 303.
 Oxycoccus L., 304.
 uliginosum L., 305.
 " β , *macrocarpum* Drej., 303.
 Vitis idæa L., 303.
Valeriana, 20.
 angustifolia Tausch., 31.
 dioeca L., 30.
 Locusta α , *olitoria*, 32.
 " δ , *dentata*, 29.
 officinalis L., 31.
 " β , *angustifolia*, 31.
 " β , *minor* Koch, 31.
 olitoria F. D., 32.
 sambucifolia Mik., 31.
Valerianella, 20.
 dentata Poll., 52.
 eriocarpa Desv., 33.
 Morisonii DC., 32.
 " β , *dasycarpa* Rchb., 32.
 " α , *lejocarpa* Koch, 32.
 olitoria Poll., 32.
 " β , *lasiocarpa* Rchb., 32.
Verbascum, 144.
 adulterinum Koch, 174.
 Blattaria L., 174.
 collinum Schrad., 174.
 cuspidatum Schrad., 172.
 Lychnitis L., 173.
 nigro-lychnitis Schied., 175.
 nigro-thapsus Fr., 175.
 nigrum L., 173.
 " β , *thyrsoidum* Koch, 173.
 phlomoides Drej., 172.
 phlomoides L., 171.
 Schiedeanum Koch, 175.
 Schraderi Mey., 172.
 thapsiforme Schr., 172.
 " β , *cuspidatum*, 172.
 thapsiformi-nigrum Schied., 174.
 thapso-nigrum Schied., 174.
 Thapsus L., 172.

Verbena, 431.
 officinalis L., 456.
Veronica, 3.
 agrestis L. (Fr.), 10.
 " β , *calycida*, 10.
 agrestis F. D., 9.
 Anagallis L., 16.
 arvensis L., 11.
 Beccabunga L., 16.
 Buxbaumii Ten., 9.
 Chamædrys L., 15.
 " β , *parviflora*, 15.
 hederæfolia L., 8.
 " β , *umbrosa* Mort., 8.
 latifolia L., 14.
 longifolia L., 13.
 maritima F. D., 13.
 montana L., 15.
 officinalis L., 14.
 " β , *decolorans*, 15.
 opaca Fr., 10.
 parmularia Poit., 16.
 peregrina L., 12.
 persica Poir., 9.
 polita Fr., 9.
 pseudo-Chamædrys Jacq., 14.
 scutellata L., 15.
 " β , *villosa* Schum., 16.
 serpyllifolia L., 12.
 spicata L., 12.
 " β , *integrifolia*, 13.
 triphyllos L., 11.
 verna L., 11.
 versicolor (Fr.), 10.
Viborgia *Acmella* Roth, 616.
Viburnum, 156.
 Opulus L., 234.
 " β , *roseum* R. & S., 234.
Vicia, 509.
 angustifolia Roth, 529.
 " β , *segetalis*, 529.
 cassubica L., 525.
 Cracca L., 526.
 " β , *leptophylla* Fr., 526.
 dumetorum L., 528.
 Faba L., 530.
 hirsuta Koch, 530.
 lathyroides L., 529.
 Orobis DC., 525.
 sativa L., 528.
 segetalis Thuill., 529.
 sepium L., 528.
 silvatica L., 525.
 tenuifolia Roth, 526.
 tetrasperma Koch, 530.

Vicias villosa Roth, 527.
Villar, ia nymphoides Vent., 179.
Vincar 146.
 minot L., 186.
Vincetoxicum, 150.
 officinale Mönch, 212.
Viola, 147.
 arenaria DC., 195.
 arvensis Murr., 198.
 canina L., 195.
 " β , *lucorum* Fr., 196.
 " γ , *minor*, 196.
 " *silvatica* H., 195.
 " β , *sabulosa* Rehb., 196.
 epipsila Ledeb., 192.
 ericetorum Schrad., 195.
 flavicornis Sm., 196.
 hirta L., 193.
 lactea Nolt., 196.
 lancifolia Thore, 196.
 mirabilis L., 194.
 nemoralis Kütz., 196.
 odorata L., 194.
 " β , *alba*, 194.
 palustris L., 192.
 persicæfolia Schreb., 197.
 pratensis M. K., 197.
 pumila Vill., 197.
 Riviniana Rehb., 195.
 Ruppii Rehb., 196.
 sabulosa Bor., 198.
 scanica Fr., 192.
 silvatica Fr., 195.
 " β , *macrantha* Fr., 195.
 silvestris Kit., 195.
 stricta Horn., 196.
 " β , *humilis*, 196.
 tricolor L., 197.
 " β , *angustifolia*, 198.
 " ϵ , *arvensis*, 198.
 " δ , *arenaria*, 198.
 " γ , *hortensis*, 198.
 " ζ , *syrtica*, 198.
 " α , *vulgaris*, 198.
 uliginosa Schrad., 193.
Viscaria, 312.
 purpurea Wimm., 344.
Viscum, 725.
 album L., 744.
Vulpia, 29.
 bromoides Link., 98.
 myuros Gmel., 98.
 pseudo-myuros Rehb., 98.
 sciuroides Gmel., 98.

W.

Wahlenbergia hederacea Rchb., 190.

Waldschmiedia nymphoides Web.,
179.

X.

Xanthium, 658.

strumarium L., 723.

Z.

Zannichellia, 652.

brachystemon Gay., 661.

gibberosa Rchb., 661.

Zannichellia macrostemon Gay.,
661.

palustris L., 660.

" β , *major*, 661.

" α , *repens*, 661.

pedicellata Fr., 661.

pedunculata Rchb., 661.

polycarpa Nolt., 661.

" β , *tenuissima*, 661.

repens Boenn., 661.

Zostera, 652.

marina L., 659.

" β , *angustifolia*, 660.

minor Nolt., 660.

nana Koch, 660.

nana Roth, 660.

Noltei Horn., 660.

Alfabetisk Fortegnelse

over

de danske Plantenavne.

(Slægtnavnene ere trykte med opretstaaende Typer, de meest
bekjendte og i Folkesproget optagne Navne for enkelte Arter
med *Cursiv*).

A.

Aakande, 409.
Abeblomst, 462.
Abild, 370.
Aftenstjerne, 488.
Agermaane, 360.
Agertidsel, 598.
Akeleie, 411.
Alant, 617.
Amarant, 704.
Andefod, 207.
Andemad, 667.
Angelik, 228.
Arum, 659.
Arve, 185.
Ask, 4.
Asparges, 247.
Aster, 621.
Astragel, 522.
Avnbøg, 720.
Avnknippe, 417.
Axelbær, 368.

B.

Baandpile, 732.
Bakkestjerne, 620.
Bakketidsel, 599.
Baldersbræa, 612.
Baldrian, 50.
Barsvælg, 443.

Bede, 204.
Beenbræk, 259.
Beenvæd, 124.
Berberisse, 244.
Betonie, 440.
Bibernelle, 720.
Bingelurt, 748.
Birk, 707.
Bitterblad, 123.
Bittermælk, 588.
Bjørneklo, 226.
Blaabær, 303.
Blaahat, 110.
Blaastjerne, 112.
Blaatop, 84.
Bladhoved, 594.
Blommetræ, 365.
Blærebæger, 167.
Blærerod, 17.
Blære-Smelle, 329.
Boghvede, 305.
Bokar, 112.
Braadfrø, 723.
Brandbæger, 623.
Brasenføde, 765.
Bridurt, 203.
Brombær, 380.
Brudelys, 308.
Bruskbæger, 202.
Bruunrod, 460.
Brændenælde, 705.

Brændeskjærm, 224.
Brøndkarse, 485.
Brøndsel, 599.
Bukkeblad, 179.
Bukketorn, 170.
Bukkehorn, 540.
Bulmeurt, 170.
Bunke, 78.
Burre, 588.
Byg, 57.
Bynke, 604.
Bægerbrægne, 761.
Bækarve, 307.
Bændeltang, 659.
Bævreasp, 747.
Bævregræs, 85.
Bøg, 721.
Bølle, 303.
Bønne, 524.

C.

Centunkel, 123.
Christtorn, 127.
Cikorie, 565.

D.

Dansk Ingefær, 659.
Desmerurt, 306.
Dild, 227.

Djævelsbid, 111.
 Dodder, 480.
 Druemunke, 406.
 Dueurt, 294.
 Duunhammer, 669.
 Dværgbunke, 80.
 Dværgulvefod, 769.
 Dyndurt, 457.
Døvnælde, 440.

E.

Edderkopurt, 258.
 Eg, 722.
 Ene, 746.
 Engblomme, 426.
Engelskræs, 239.
 Engelsød, 763.
Engeskjær, 590.
Engkarse, 492.
 Entian, 177.
 Esparsette, 522.
 Evighedsblomst, 606.

F.

Faareleger, 239.
Falsk Jasmin, 366.
Femfingerurt, 398.
 Festgræs, 75.
 Fiirkløft, 606.
 Fiirling, 349.
 Fingerax, 61.
 Fingerbølle, 461.
Fioringræs, 66.
 Fireblad, 306.
 Fladax, 35.
 Fladbølle, 531.
 Fladknap, 641.
 Fladstjerne, 339.
 Fliglæbe, 647.
 Flipkrave, 477.
 Flitterax, 74.
 Flok, 176.
 Flueblomst, 643.
Fløielsgræs, 76.
 Fnokurt, 627.
 Fodangel, 230.
 Foldfrø, 229.
 Forglemmigei, 160.
 Fredløs, 183.
Fruebær, 378.
 Frytle, 270.
 Frøbid, 749.
 Frøpeber, 416.

Frøstjerne, 413.
Fuglegræs, 341.
Fuglekirsebærtræ, 366.
 Fugleklo, 522.
 Fugleliim, 744.
 Fuglemælk, 258.
 Fuglerede, 648.
 Fyr, 666.
 Følfod, 603.

G.

Gaasefod, 204.
 Gaasemad, 494.
 Gaaseurt, 614.
 Gabeklap, 499.
 Galdebær, 723.
 Galnebær, 167.
 Galtetand, 437.
 Gedeblad, 191.
 Gederams, 294.
 Gedeskjæg, 584.
 Gemserod, 622.
 Gifftyde, 220.
 Gipsurt, 325.
 Gjæslingblomst, 482.
 Gjøgemad, 503.
 Gjøgeurt, 635.
 Glandsfrø, 63.
 Glandstraad, 773.
 Glatbølle, 535.
 Gran, 666.
Gulddusk, 183.
 Guldhavre, 80.
 Guldregn, 519.
 Guldstjerne, 250.
 Gulerod, 229.
 Guulax, 64.
 Gyldenriis, 619.
 Gyvel, 519.
 Gyvelqvæler, 468.

H.

Halvsvøb, 224.
 Hamp, 745.
 Hanekro, 434.
 Hanespore, 63.
 Haremad, 564.
 Hareøre, 216.
 Hassel, 720.
 Havgræs, 140.
 Havre, 81.
 Hedelyng, 302.
 Heire, 99.

Heiresvingel, 102.
Hestebønne, 530.
 Hestegræs, 76.
 Hestehov, 602.
 Hestekastanie, 290.
 Hestetunge, 159.
Hindbær, 378.
 Hindebæger, 237.
 Hindeknæ, 333.
 Hirse, 62.
 Hjelme, 67.
 Hjertelæbe, 650.
 Hjertensfryd, 454.
 Hjertesmand, 443.
 Hjorterod, 223.
 Hjortetrost, 601.
Hjortetunge, 757.
 Hjulkrone, 165.
 Hjørneklap, 482.
 Hornblad, 719.
 Horndrager, 639.
 Hornnød, 124.
 Hornskulpe, 406.
 Humle, 745.
 Hundegræs, 104.
Hundehør, 480.
 Hundesalat, 586.
 Hundetunge, 161.
 Huullæbe, 645.
 Huulsvøb, 232.
 Huusløg, 361.
 Hvede, 56.
 Hvene, 72.
 Hvidblomme, 246.
Hvidroe, 497.
 Hvidtorn, 367.
 Hyld, 234.
 Hyrdetaske, 479.
Høgebærtræ, 366.
 Høgeskjæg, 570.
 Høgeurt, 572.
Hønsbær, 123.
 Hønsetarm, 345.
 Hør, 502.
 Hørsilke, 213.

J.

Jernurt, 456.
 Jordbær, 392.
 Jordbærspinat, 207.
 Jordrøg, 511.
Jordæble, 631.
Jødekirsebær, 167.

K.

Kaal, 496.
Kaalrabi, 497.
 Kabeleje, 426.
 Kalmus, 272.
 Kambrægne, 762.
 Kambunke, 77.
 Kamgræs, 105.
Kameelblomster, 615.
 Kamille, 612.
Kanariegræs, 63.
 Kanthælle, 537.
 Karse, 477.
 Kartebolle, 111.
Kartoffel, 168.
 Kastanietræ, 721.
 Katost, 505.
 Kattefod, 608.
 Kattehale, 359.
 Katteskjæg, 48.
 Katteurt, 444.
 Keiserkrone, 249.
Kiddike, 487.
 Kilebæger, 717.
Kirsebærtræ, 365.
 Kjælderhals, 504.
 Kjællingtand, 536.
Kjæmper, 120.
 Kjæruld, 45.
 Klaseskjærm, 221.
 Klinte, 342.
 Klokke, 187.
Klokkehjacinth, 249.
 Klynger, 378.
 Kløftnaal, 477.
 Kløver, 542.
 Kløvkrone, 349.
 Kløvplade, 483.
 Knavel, 323.
 Knopurt, 628.
 Knælæbe, 643.
 Kobjælde, 412.
 Kodriver, 180.
 Koføde, 463.
 Kogleax, 39.
 Kokleare, 481.
 Kommen, 219.
 Kongebrægne, 714.
 Kongelys, 171.
 Kongepen, 583.
 Konval, 247.
 Korallrod, 649.
Korbær, 391.
 Koriander, 233.

Kornblomst, 630.
 Kornel, 123.
 Korsknop, 444.
 Kortlæbe, 446.
 Kragefod, 399.
 Krageklo, 519.
 Krandsbørste, 454.
 Krandsnaal, 780.
 Krap, 120.
 Krebsklo, 749.
 Kroгнаal, 483.
 Krop, 32.
Krumhals, 166.
 Krydermynte, 451.
 Kræge, 364.
 Krækling, 743.
 Kulsukker, 166.
 Kørvel, 231.

L.

Laktuk, 567.
Lambertsrod, 721.
 Langnæb, 232.
 Leverurt, 237.
 Liguster, 7.
 Liumurt, 329.
 Lilie, 250.
Liliekonval, 247.
 Lind, 407.
 Lindse, 530.
 Linnæa, 456.
 Lobelie, 186.
 Lostilk, 223.
Lucerne, 538.
 Lungeurt, 159.
 Lyng, 302.
 Læbeløs, 445.
 Lærkespore, 512.
 Lærketræ, 667.
 Løg, 253.
 Løgurt, 500.
 Løn, 300.
 Løvefod, 125.
 Løvemule, 460.
 Løvetand, 587.
 Løvstikke, 227.

M.

Maanerude, 765.
 Maiblomst, 125.
 Malurt, 604.
 Mandstro, 215.

Mangeløv, 758.
Mannagræs, 88.
 Marehalm, 60.
Marietidsel, 599.
 Marube, 454.
Matrem, 612.
 Meelbærriis, 322.
 Merian, 452.
Mesterrod, 225.
 Miliegræs, 74.
 Miltbrægne, 757.
 Milturt, 305.
 Mistel, 368.
Misteltein, 744.
 Mjødurt, 371.
 Morbærtræ, 708.
 Morgenfrue, 631.
Multebær, 378.
 Munke, 190.
 Musehale, 425.
 Museurt, 608.
Muurude, 756.
 Mygblomst, 650.
 Mynte, 446.
 Mysike, 112.
 Mysse, 272.
 Mælde, 709.
 Mælkebøtte, 565.
 Mælkurt, 515.
 Mærke, 221.

N.

Naadesurt, 17.
 Naalebæger, 202.
 Najade, 660.
 Narcis, 246.
 Natlys, 299.
 Natskygge, 168.
Naur, 300.
 Nellike, 526.
 Nellikerod, 399.
 Norel, 337.
 Nyserod, 427.
 Næbfrø, 36.
 Nælde, 705.
 Nøkkerose, 408.

O.

Onde Urter, 611.
 Oxetunge, 166.
 Oxøje, 611.

P.

Paaskelilie, 246.
Padderokke, 771.
Pastinak, 226.
Peberrod, 485.
Pebertræ, 304.
Pengeurt, 479.
Perikon, 551.
Persille, 218.
Pestilensurt, 540.
Pibeved, 366.
Pigfrø, 161.
Pigæble, 171.
Piil, 728.
Piilblad, 717.
Pilledrager, 770.
Pimpinellé, 219.
Pindselilie, 246.
Pindsviinknop, 670.
Poppel, 746.
Pors, 744.
Poselæbe, 642.
Potentil, 393.
Pragtstjerne, 348.
Pralbønne, 524.
Prunel, 454.
Præstekrave, 610.
Pnkkellæbe, 642.
Pæretræ, 370.

Q.

Qvalkvæd, 234.
Qvan, 228.
Qvik, 52.
Qvæde, 371.
Qvæsurt, 126.

R.

Radeløv, 755.
Raigræs, 49.
Randfrø, 230.
Ranunkel, 420.
Rapgræs, 88.
Raps, 497.
Rapuntzel, 190.
Ravnefod, 475.
Reddike, 487.
Regnfang, 605.
Revlingbær, 743.
Ribs, 201.
Ridderspore, 410.
Risgræs, 60.

River, 160.
Roe, 497.
Rose, 373.
Rosmarinlyng, 322.
Rottehale, 66.
Rug, 57.
Rundbælle, 520.
Rundskulpe, 475.
Runkelroe, 204.
Rævehale, 65.
Rødbede, 204.
Rødknæ, 287.
Rødtop, 467.
Røllike, 615.
Røn, 368.
Rør, 68.
Rørgræs, 63.
Rørsvingel, 76.

S.

Safran, 34.
Salat, 568.
Salomons Lysestage, 478.
Salomons Segl, 248.
Salturt, 4.
Salvie, 7.
Samel, 186.
Sanct Hansurt, 356.
Sandkryb, 202.
Sandskjæg, 79.
Sandvaaner, 337.
Sanikel, 216.
Seglblad, 220.
Seline, 227.
Selleri, 218.
Senep, 498.
Simmer, 411.
Singrøn, 186.
Siren, 8.
Siv, 260.
Skabiose, 110.
Skarntyde, 233.
Skavgræs, 774.
Skedeknæ, 273.
Skeeblad, 288.
Skjaller, 465.
Skjoldbrægne, 757.
Skjolddrager, 455.
Skjælrod, 468.
Skjæne, 35.
Skjær, 590.
Skjærmax, 61.
Skjærmille, 217.

Skorem, 235.
Skorzonere, 585.
Skovarve, 338.
Skovlilie, 644.
Skovmærke, 112.
Skovstjerne, 291.
Skrueax, 649.
Skræppe, 279.
Slaaentorn, 364.
Slangehoved, 158.
Slangerod, 651.
Slangetunge, 766.
Smalstraale, 622.
Smelle, 329.
Smørblomst, 425.
Sneebolletræ, 234.
Sneglebælle, 538.
Snerle, 175.
Snerre, 113.
Snittebønne, 524.
Snylterod, 301.
Sodaurt, 210.
Solbær, 200.
Soldug, 236.
Solsikke, 631.
Solsie, 408.
Sommerraps, 497.
Spansk Hyben, 377.
Spansk Kørvel, 233.
Spergel, 352.
Spidsgab, 105.
Spidshale, 48.
Springbalsamin, 198.
Springfrø, 198.
Springklap, 489.
Springknap, 125.
Sqvalderkaal, 218.
Star, 671.
Stedmodersblomst, 197.
Steenbræk, 323.
Steenfrø, 158.
Steenkløver, 540.
Steenurt, 354.
Steffensurt, 5.
Stjerneskjærm, 216.
Stikkelsbær, 200.
Stilkax, 51.
Stokrose, 504.
Stolthenrik, 209.
Storkenæb, 313.
Stormbat, 410.
Storskjærm, 225.
Strandarve, 337.
Strandgaasefod, 210.

Strandbo, 705.
Strandkaal, 477.
Strandmalurt, 604.
Strandsennep, 476.
Strandært, 553.
Strudsvinge, 762.
Sukkertop, 249.
Sumpstraa, 37.
Suurkløver, 503.
Svalerod, 212.
Svaleurt, 406.
Svinemælk, 568.
Svineøie, 565.
Svingel, 93.
Svovlrod, 225.
Sværdlilie, 34.
Sværtevæld, 7.
Sylblad, 484.
Syre, 286.
Sæbeurt, 325.
Sækbæger, 484.
Sødgræs, 85.
Sødskjærm, 233.
Sølvblad, 599.
Sølvpoppel, 746.

T.

Taarnurt, 496.
Tagrør, 84.
Takkeklap, 476.
Tandbæger, 438.
Tandbælg, 77.
Tandrod, 488.
Tangurt, 210.
Taxtræ, 750.
Tidløs, 287.
Tidse, 744.
Tidse, 591.
Tidse, 632.
Timian, 452.
Timotheigræs, 66.
Tjærenelike, 344.

Tornblad, 517.
Torskemund, 457.
Traadspore, 640.
Tranebær, 504.
Tranehals, 319.
Trehage, 288.
Troldurt, 463.
Trævlekrone, 544.
Tulipan, 250.
Tusindblad, 718.
Tusindfryd, 610.
Tusindfrø, 127.
Tusindgylden, 176.
Tveblad, 359.
Tvetand, 440.
Tyttebær, 303.
Tæppegræs, 85.
Tørstetræ, 199.

U.

Ulvefod, 766.

V.

Vaarforglemmigei, 161.
Vaid, 475.
Valbirk, 300.
Valmue, 404.
Valnødtræ, 722.
Valsk Bønne, 530.
Vandarve, 53.
Vandax, 128.
Vandkarse, 491.
Vandkrands, 660.
Vandkryber, 245.
Vandnavle, 215.
Vandpeberrod, 486.
Vandrøllike, 183.
Vandspær, 2.
Vandstjerne, 662.
Vau, 361.
Vedbende, 201.

Veibred, 120.
Vibefedt, 17.
Vibæg, 249.
Vidie, 737—38.
Vikke, 525.
Vild Persille, 224.
Vild Rosmarin, 322.
Vinterblomme, 426.
Vintergjæk, 245.
Vintergrøn, 319.
Vinterkarse, 493.
Vinterraps, 497.
Viol, 192.
Visse, 517.
Voldtimian, 453.
Volverlei, 627.
Vortemælk, 664.
Vorterod, 425.
Vrietorn, 199.
Væselhale, 98.

Y.


Ypern, 211.

Æ.

Æbletræ, 370.
Ædelgran, 666.
Æl, 706.
Ælm, 211.
Ærenpriis, 8.
Æretæ, 300.
Ært, 531.
Æselsfoder, 591.

Ø.

Øientrøst, 466.
Ørnebrægne, 762.
Ørneøie, 572.



New York Botanical Garden Library

QK 287 .L3 1864

gen

Lange, Joh/Haandbog i den danske flora



3 5185 00104 2629

